四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第三冊目次

唐王燾先生外臺秘要方四十卷（一）（唐）王燾撰 明崇禎程衍道經餘居刻本 〇〇一

唐王燾先生外臺秘要方四十卷（一）

（唐）王燾撰

明崇禎程衍道經餘居刻本

外臺祕要四十卷（通行本）

唐王燾撰。燾，郿人，王珪孫也。唐書附見珪傳，稱其性至孝，爲徐州司馬，母有疾，彌年不廢帶，視絮湯劑。（案視絮二字未詳，然玉海所引亦同，是宋本已然，姑仍其舊。）數從高醫游，遂窮其術。因以所學作外臺祕要，討釋精明，世寶焉。歷給事中、鄴郡太守。藝文志載外臺祕要四十卷，又外臺要略十卷。今要略久佚，惟祕要尚傳。此本爲宋治平四年孫兆等所校，明程衍道所重刻。前有天寶十一載燾自序，又有皇祐二年內降劄子及兆校上序。其卷首乃題林億等名。考書錄解題引宋會要，稱嘉祐二年置校正醫書局於編修院，以直集賢院掌禹錫、林億校理，張洞校勘，蘇頌等竝爲校正。後又命孫奇、高保衡、孫兆同校正。每一書畢，即奏上，億等皆爲之序。則卷首題林億名，乃統以一局之長，故有等字也。燾居館閣二十餘年，多見宏文館圖籍方書。其作是編，則成於守鄴時。其結銜稱持節鄴郡諸軍事兼守刺史，故曰外臺。（案猗覺寮雜記曰：外臺見唐高元裕傳，故事三司監院官帶御史者號外臺。）書錄解題作外臺祕要方，自序亦同。唐書及孫兆序中皆無方字，蓋相沿省其文耳。書分一千一百四門，皆先論而後方。其論多以巢氏病源爲主，每條下必詳註原書在某卷，世傳引書註卷第，有李涪刊誤及程大昌演繁露，而不知例創於燾，可以見其詳確。其方多古來專門祕授之遺。陳振孫在南宋末，已稱所引小品、深師、崔氏、許仁則、張文仲之類，今無傳者，猶間見於此書。今去振孫四五百年，古書益多散佚，惟賴燾此編以存，彌可寶貴矣。其中附及禁術，蓋千金翼方已有此例。唐小說載賈耽以千年梳治蝨瘕爲異聞，其方乃出於此書第十二卷中。宋小說載以念珠取誤吞漁鉤爲奇技，其方乃在今八卷中。又唐制臘日賜口脂面藥，今不知爲何物，其方亦具在三十一卷中，皆足以資博物。三十七卷、三十八卷皆乳石論。世說載何晏稱服五石散令人神情開朗。玉臺新詠有姬人怨服散詩。蓋江左以來，用爲服食之術，今無所用。又二十八卷載貓鬼野道方，與巢氏病源同。亦南北朝時鬼病，唐以後絕不復聞。然存之亦足資考訂也。衍道刻此書，頗有校正，惟不甚解唐以前語，與後世多異。如痢門稱療痢稍較，衍道註曰，較字疑誤。考唐人方言，以稍可爲校，故薛能黃蜀葵詩有記得玉人春病校

句。馮班校才調集辨之甚明。衍道知其有誤。而不知較爲校誤。猶爲未審。然大致多所訂定。故今亦並存焉。

重校唐王燾先生外臺秘要

本堂藏板

序

論周官者曰先王於民物皆有醫而不及王后世子卿大夫則以也曰萬民之疾治於巳然與王而下力足致醫嗟是編戶齊民不幸有風雨雪之感

力雖自醫並自可以無備梁陶景序肘後百一方亦云夫生民之所大患莫急乎疾疾疾而不治猶救火而不以水也今夫師業之從郊郭已希況窮村迥陌遠山絕浦其間夭枉當可勝

乏葛氏曰謂其書可以拯救貧家野居然而搢紳君子或淺之祿於邑將無遠集或祖佐幕闈或霸秉戎陣韜鈐負倉卒之閒拱手孰若挾之枕笥而隨在醫師若夫虞摯之咏瘥瘥無別曰

講和緩之餘論君越人之遺方考異同以求中稽東術以簡良穩為之暇定食散則五日系乃韵蹤操散音量部分定不付舊壽無顧問律斯莫之通神建殊功於今世夫瘥瘥不無於金

方而一散暑夫珍膜洵陰字屬不就黃太尉之辟而專精於方業並以淺分銖不假稱量蓋微玄妙之旨者不一一告語人若孰敷地無高士無學精必果之傳如程君衍道者以良醫之

以代良宰知其風頌已而子實過我藉之頌之喜遇季考病脾虛而偕客以一葦遙訪不意下榻作宿遂霍然一已我董模以墻為之千無濟遍至以尤以不下子年靡屢于甫人而瘥瘥為最

朝鮮是亟哉而因使人乃以盡年
姑以主司焉秘要方焉振飭刻
而布之海內令天下事之待踐
淺予之待補救伊耆作方書者
然寃息脈陶唐用之以平洚
水有虞用之以殄盜人却渴

除毒之義一也刻等而按案之
余至是年年暇盡讀秘要程
是刻秘要之書則金匱而殊之
況乎治已然之治未然凡抱䒭
體而重民命之書者又焉一可
不知之以講求之哉

東閣大學士禮部尚書
方逢年撰




重刻外臺秘要方序

程子敬通醇儒也而旁通於醫吾於醫固未之學而一接程子指脉說病則目無全人微言高論疊見層生聞未聞解未解程子之於醫幾乎道

又見其醫人也雖極賤貧但一接手則必端問詳審反覆精思未嘗有厭怠之色其疑難者多至盈時惟恐少誤無惑而後動其心行復如是是其人一第而爲宰官推是道

也用是心也以往其謀國以善萬里生民之寄豈可及哉有唐王刺史外臺秘要一書更五代至宋孫中丞一較正行之及今而絕程子不忍圖令其流布人間而爲余言余

因問程子如欲知醫何道而能精曰必好學將何學曰先讀書讀書可以醫乎曰讀書而不能醫者有之矣决未有不讀書而能醫者也嗚呼天下事皆然耳獨醫也乎余因

問程子以子之道醫世之人當吾世而旣日不暇給及身後而書不盡言言不盡意吾懼其不傳也盍得其人而傳之何以書程子曰師之求弟甚於弟之求師有來學者吾願盡所學焉爾而無如今之來學者未嘗求學徒以求行也是道也非苦心十年不可得而今之學者來輒問曰欲就師授十日足乎一若是其亟也吾雖欲傳其何從而傳

嗚呼天下之學大抵然耳獨醫也乎古之君子其於道也其始也急求人而已及其求人不可得則不得不有事於書以與其長存天地之間其於書也不必自著書而章隱繼絕圖存古人之書古人之書其賴有心之後人以獲行世者多矣初不必後人之盡有心盡好學而能讀也而其書則不忍以不存以爲萬有一人焉有心好學而一能讀

是書也則是一書爲遂不虛
存也更百世而當有人焉出
而覩今日之敬通程子亦猶
程子之覩唐宋王刺史孫中
丞兩先生也則今日之及程
子之門而欲以十日盡學其

所學者程子其亦可以謝之
而無所負矣

賜進士出身翰林院庶吉士
奉
命叅佐軍務
欽授山東道監察御史

郡人金聲撰

黃一心刻并書

自序

蓋聞上古之世方不如醫中古之世醫不如方甚矣醫與方之並重也世降而方愈夌雜莫不各據一家言彼此互相是非間有二三驗方亦惟是父師傳之

子弟絕不輕以示人而其鐫行於世者率皆依樣葫蘆時或改頭換面以傳名高則已矣余獨取外臺秘要付之剞劂者何請得而備言之蓋自神農氏深明藥性著本草經三卷而未有方也軒轅氏曰與岐伯雷公剖析病機著素問靈樞經各九卷而未有方也商周之間如伊尹如和如緩如跗皆以醫名而未有方也越人受長桑君之禁方所傳於世者八十一難經及治虢

太子尸厥耳而其爲帶下醫小兒醫耳目痺醫俱未悉其所以爲方也倉公受公乘陽慶之禁方所可蹟者莨菪子湯苦參湯耳其他火齊湯下氣湯陽劑剛石陰劑柔石亦未悉其所以爲

方也若夫刳腸滌胃無論其方不傳卽令華元化方傳至今而亦難乎倣其爲方也惟是仲景氏出有卒病論以治傷寒著方乙百一十三有金匱要畧以治雜病著方乙百一十二醫方寔開先焉盖鼻祖也又得叔和王氏爲之詮次俾仲景之微旨益以彰明叔和氏不更立方卽述仲景之方爲方者也皇甫士安之甲乙經特重鍼刺而無方巢元方之病源每病必有源源必

立論而無方覽者咸以無方致憾廹唐有孫真人者初著方三十卷晚復增三十卷自珍其方曰千金醫方較明備焉盖大宗也乃前後乎孫真人者人則有深師崔尚書孫處士張文仲孟同州許仁則吳昇若而人方則有廣濟錄驗刪繁肘後延年小品必効若而方門分派別編帙浩繁從未有綜而輯之者獨刺史王燾先生前居館閣二十年採摭群書彙成方畧上遡炎昊

下及諸家傷寒壹遵仲景發論率冠病源雖置鍼法不言而大唐以前之方靡有遺佚千金則居多焉卷凡四十方餘六千蓋集醫方之大成者题曰秘要悉皆秘密樞要也自宋皇祐詔論

刊布後無復鋟梓以廣其傳豈非沿習時尚而探源証本者之寡其傳哉夫天下何事不宜師古文則六經之外必追秦漢字則篆籀而後必法鍾王至於醫而何獨不然昔祖訥云辨釋經

典小有異同不足以傷風教湯藥小小不達則後人受弊不淺此余亟欲以外臺秘要公諸海內之深意也向購寫本訛鈌頗多因復殫力校讐遇有疑義則旁引類証錄于篇側其無文可

徵者不敢强釋以俟解人十載始竣厥工客閱而謂余曰奥義之難析也圓机之莫辨也淺識可以漫試乎余曰用其所信闕其所疑可也又謂世代之推遷也風氣之殊尚也陳緻可以適

晰乎余曰不師其法而師其意可也且謂同病而異方也同方而異治也毫厘不幾千里乎余曰三部微妙別之在指五藏精華察之在目合色脉而後定方求其曲當可也總之以方爲方

方遂一成而不易以矩爲方方乃萬變而不窮誠究心於平昔會其所以立方之意斟酌于臨時施其確然對症之方果屬熱而當寒何不叅之河間濕而宜燥何不叅之東垣可汗可吐而可下何不叅之子和陰陽乖錯榮衛失調何不叅之丹溪博洽前方勿執我見期於寔有拯救不愧前賢濟民利物之心則請以外臺秘要一書爲醫家之筌蹄也亦奚不可

新安後學程衍道敬通父謹識



重訂唐王燾先生外臺秘要方

宋皇祐三年五月二十六日
內降劄子臣寮上言臣昨南方州軍連年疾疫瘴癘其尤
甚處一州有死十餘萬人此雖天令差舛致此札瘥亦繫
醫工謬妄就增其疾臣細曾詢問諸州皆闕醫書習讀除
素問病源外餘皆傳習僞書舛本故所學淺俚訛謬病者
欲望
聖慈特出秘閣所藏醫書委官選取要用者較定一本降
付杭州開板模印庶使
聖澤及於幽隱民生免於夭橫奉

聖旨宜令逐路轉運司指揮轄下州府軍監如有疾疫瘴
癘之處於聖惠方內寫錄合用藥方出牓曉示及遍下諸
縣許人抄劄仍令秘閣簡外臺秘要三兩本送國子監見
較勘醫書官子細較勘聞奏劄付孫兆依此至治平二年
二月二日准中書劄子較正醫書所狀醫書內有外臺秘
要一項今訪聞前較正官孫兆較對已成所有淨草見在
本家欲乞指揮下本家取赴本局修寫進冊所貴早得了
當候指揮奉
聖旨依所申施行至四年三月　日
進呈訖

不夭橫熙熙然歌樂於聖造者也前將仕郎守殿中丞同
較正醫書臣孫兆謹上

校正唐王燾先生外臺秘要方序

夫外臺者刺史之任也秘要者秘密樞要之謂也唐王燾臺閣二十餘年久知弘文館得古今方上自神農下及唐世無不採摭集成經方四十卷皆諸方秘密樞要也以出守于外故號曰外臺秘要方凡一千一百單四門以巢氏病源諸家論辨各冠其篇首一家之學不爲不詳王氏爲儒者醫道雖未及孫思邈然而採取諸家之方頗得其要者亦崔氏孟詵之流也且古之如張仲景集驗小品方最爲名家今多亡逸單載諸方中亦不能別白王氏紀次各題名號使後之學者皆知所出此其所長也又謂鍼能殺

生人不能起死人其法云亡且久故取灸而不取鍼亦醫家之蔽也此方撰集之時或得缺落之書因其闕文義理不完者多矣又自唐歷五代傳寫其本訛舛尤甚雖鴻都秘府亦無善本國家詔儒臣校正醫書臣承命呂其書方證之重者刪去以從其簡經書之異者註解以著其詳錯魚豕亥煥然明白臣竊以三代而下文物之盛者必曰西漢止以侍醫李柱國較方技亦未嘗命儒臣也臣雖濫吹儒學但書所聞見以備正之有所闕疑以待來哲總四十卷并目錄一卷恭惟　主上盛德承統深仁流化頒此方論惡及區宇贊天地之生育正萬物之性命使疾無疵癘人

孫處士張文仲孟同州許仁則吳昇等十數家皆有編纂並行於代美則美矣而未盡善何者各擅風流遞相矛盾或篇目重雜或商較繁蕪今並味精英鈐其要妙俾夜作晝經之營之捐衆賢之砂礫掇群才之翠羽皆出入再三伏念旬歲上自炎昊迄於聖唐括囊遺闕稽考隱秘不愧盡心焉客有見余此方曰嘻博哉學乃至於此邪余答之曰吾所好者壽也豈進於學哉至於遁天倍情懸解先覺吾常聞之矣投藥治疾庶幾有瘳乎又謂余曰禀生受形咸有定分藥石其如命何吾甚非之請論其目夫喜怒不節飢飽失常嗜慾攻中寒溫傷外如此之患豈由天乎夫

爲人臣爲人子自家刑國由近兼遠何談之容易哉則聖人不合啟金縢賢者曷爲條兵瘢斯言之玷竊爲吾子羞之客曰唯唯嗚呼齊梁之間不明醫術者不得爲孝子曾閔之行宜其用心若不能精究病源深探方論雖百醫守疾衆藥聚門適足多疑而不能一愈之也　主上尊賢重道養壽祈年故張王李等數先生繼入皆欽風請益貴而遵之故鴻寶金匱青囊綠帙往往而有則知日月所照者遠聖人所感者深至於嗇神養和休老補病者可得聞見也余敢採而錄之則古所未有今並繕緝而能事畢矣若乃分天地至數別陰陽至候氣有餘則抑其經渠以安之

志不足則循其復溜以養之滌滌液液調上調下吾聞其語矣未遇其人也不誣方將請俟來哲其方凡四十卷名曰外臺秘要方并敢傳之都邑且欲施於後賢如或詢謀亦所不隱是歲天寶十一載歲在執徐月之哉生明者也

重訂唐王燾先生外臺秘要方目錄

卷第一 傷寒上 十二門

諸論傷寒八家合一十六首

論傷寒日數病源并方二十一首

肘後方七首

深師方四首

小品方四首

集驗方五首

千金方六首

千金翼方一十三首

崔氏方一十五首 附一方

張文仲方一十首

古今錄驗方八首

雜療傷寒湯散丸方八首 並是諸中所要

卷第二 傷寒下 二十一門

傷寒中風方九首

傷寒結胸方七首

傷寒嘔噦方一十四首

傷寒喉咽痛方八首

傷寒吐唾血及下血方二首

傷寒衄血方四首
傷寒煩渴方九首
傷寒癖實及宿食不消方二首
傷寒春冬欬嗽方三首
傷寒攻目生瘡兼赤白翳方六首
傷寒口瘡方二首
傷寒手足欲脫疼痛方八首
傷寒虛羸方四首
傷寒不得眠方四首
傷寒小便不利方九首
傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首

傷寒䘌瘡方一十首
傷寒陰陽易方八首
傷寒勞復食復方二十五首
傷寒百合病方七首
傷寒狐惑病方四首
卷第三 天行二十一門
天行病發汗等方四十二首
天行病方七首 許仁則
天行嘔逆方七首
天行嘔啘方七首
天行喉咽痛方二首
天行衄血方四首
天行口瘡及口乾苦方四首
天行欬嗽方五首
天行發斑方三首
天行發瘡豌豆皰瘡方一十三首
天行虛煩方二首
天行狂語方三首
天行熱毒攻手足方五首
天行大小便不通脹滿澀方四首

天行熱痢及諸痢方四首
天行䘌瘡方八首
天行陰陽易方一首
天行虛羸方二首
天行後禁忌方一首
天行勞復食復方六首
天行差後勞發方五首 許仁則
卷第四 溫病及黃疸二十門
溫病論病源二首

辟溫方二十首
斷溫令不相染方二首
溫病噦方四首
溫病渴方二首
溫病發斑方七首
溫病勞復方四首
諸黃方　十三首
急黃方六首
黃疸方一十三首
黃疸遍身方一十一首

陰黃方三首
黃疸小便不利及腹滿喘方二首
黃汗方二首
女勞疸方四首
黑疸方三首
酒疸方七首
穀疸方三首
許仁則療諸黃方七首
雜黃疸方三首
卷第五瘧病一十五門
瘧病方二十一首
五藏及胃瘧方六首
溫瘧方五首
山瘴瘧方一十九首
十二時瘧方一十二首
發作無時瘧方三首
痎瘧方五首
間日瘧方二首
久瘧方八首
勞瘧方三首

牡瘧方二首
一切瘧方四首
灸瘧法一十三首
禳瘧法六首
許仁則療瘧方四首
卷第六霍亂及嘔吐二十九門
霍亂病源論三首
霍亂吐痢方一十二首
霍亂臍上築方三首
霍亂腹痛吐痢方七首

霍亂不止及洞下泄痢方八首
霍亂後脉絶手足冷方四首
霍亂煩躁方八首
霍亂與藥療不効方二首
乾濕霍亂及痰飲方五首
霍亂心腹痛方三首
霍亂煩渴方四首
霍亂乾嘔方五首
霍亂轉筋方一十四首
霍亂雜灸法二十六首

三焦脉病論二首
上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣方九首
中焦熱及寒泄痢方三首
下焦熱方六首
下焦虛寒方六首
許仁則霍亂方三首
雜療霍亂方四首
乾嘔方六首
嘔噦方四首
噦方七首

嘔逆吐方八首
嘔逆不下食方八首
許仁則療嘔吐方四首
雜嘔吐噦方三首
噫醋方七首

卷第七 心痛心腹痛及寒疝三十一門

心痛方八首
九種心痛方三首
諸蟲心痛方一十八首
冷氣心痛方五首

惡疰心痛方三首
心痛癥塊方二首
心背徹痛方四首
卒心痛方一十四首
中惡心痛方五首
多唾停飲心痛方二首
心下懸急懊痛方四首
心痛不能飲食方二首
久心痛方六首
雜療心痛方三首

腹痛方四首
卒腹痛方七首
心腹痛及脹滿痛方一十首
心腹脹滿及鼓脹方一十四首
卒心腹脹滿方六首
脹滿雷鳴方三首
腹內諸氣及脹不下食方一十一首
灸諸脹滿及結氣法二十二首
胸脇痛及妨悶方四首
脇肋痛方二首

胸膈氣方三首
寒疝腹痛方九首
寒疝心痛方三首
卒疝方三首
七疝方三首
寒疝不能食方四首
寒疝積聚方四首
心疝方四首

卷第八痰飲胃反噎鯁等二十門

痰飲論二首
痰飲食不消及嘔逆不下食方九首
懸飲方二首
溢飲方三首
支飲方九首
留飲方二首
酒澼飲方三首
留飲宿食方七首
痰澼方二首
飲澼方二首
澼飲方七首
冷痰方四首

痰結實及宿食方三首
胸中痰澼方三首
痰厥頭痛方八首
風痰方五首
療諸痰飲方四首
胃反方二十首
脾胃弱不能食方三首
脾胃病日漸瘦困不食方三首
胃實熱方二首

胃虛寒方七首
五膈方八首
七氣方三首
氣噎方六首
諸噎方一十二首
卒食噎方九首
五噎方三首
諸骨哽方三十五首
雜誤吞物方一十七首

卷第九 欬嗽二十三門
欬嗽方三首
五嗽方四首
新久欬方三首
卒欬嗽方八首
暴熱嗽方二首
冷欬方三首
欬失聲方四首
氣嗽方八首
呷欬方二首
頭欬法六首
療欬方一十四首
積年久欬方二十一首
久欬坐臥不得方二首
欬嗽短氣方七首
九種欬方一首
欬逆及厥逆飲欬方七首
十欬方七首
久欬嗽上氣唾膿血及濁涎方五首
欬嗽膿血方一十一首
久欬嗽膿血方四首

欬嗽唾粘方二首
許仁則療欬方一十二首
雜療欬嗽方三首
卷第十 肺痿肺氣上氣欬嗽二十八門
肺痿方一十首
肺氣客熱方二首
肺熱兼欬方七首
肺虛寒方三首
肺氣不足口如含霜雪方四首
肺脹上氣方四首

肺氣積聚方二首
肺癰方九首
大腸論二首
大腸熱實方三首
大腸虛寒方三首
皮虛實方二首
上氣方九首
卒上氣方六首
久上氣方四首
上氣胸滿方二首

上氣欬身面腫滿方四首
上氣喉中水雞鳴方一十二首
因食飲水上氣方四首
卒短氣方四首
上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首
欬嗽上氣方八首
欬逆上氣嘔吐方四首
上氣欬嗽多唾方三首
上氣欬喉方一首
久欬嗽上氣方三首
欬逆上氣方五首
雜療上氣欬嗽方四首
卷第十一 消渴消中 十八門
消渴方一十七首
近効極要消渴方二首
近効極要熱中小便多漸瘦方四首
渴利虛經脈澀成癰膿方一十一首
消渴口乾燥方三首
消中消渴腎消方八首
睡中尿床不自覺方六首

渴後小便多恐生諸瘡方二首
渴後恐成水病方三首
虛勞小便白濁如脂方四首
强中生諸病方六首
消渴不宜針灸方一十首
卒消渴小便多太數方八首
近効祠部李郎中消渴方二首
將息禁忌論一首
敘魚肉等一十五件
敘菜等二十二件

飯米豆等九件菜酒
卷第十二（癖及痃氣積聚癥瘕胸痺奔豚三十八門）
療癖方五首
癖結方三首
寒癖方五首
久癖方二首
癖羸瘠方二首
痃癖方四首
痃氣方三首
癖及痃癖不能食方一十四首

瘕癖等一切病方四首
癖硬如石腹滿方二首
食不消成瘕積方四首
心下如杯結癥方二首
痃癖痃氣灸法四首
積聚方五首
積聚心腹痛方三首
積聚心腹脹滿方一首
積聚宿食寒熱方四首
療癥瘕方三首
暴癥方六首
鼈癥方四首
米癥方二首
食癥及魚肉成癥方二首
髮癥方二首
蝨癥方一首
鼈瘕方一首
蛇瘕方一首
蛟龍病方一首
胸痺方二首

胸痺短氣方三首
胸痺心下堅痞緩急方四首
胸痺噎塞方二首
胸痺咳唾短氣方四首
胸痺心痛方四首
胸痛方二首
奔豚氣方三首
奔豚氣衝心胸方四首
雜療奔豚及結氣方六首
灸奔豚法六首

卷第十三骨蒸傳屍鬼疰鬼魅二十六門
虛勞骨蒸方七首
骨蒸方一十七首
灸骨蒸法圖四首
痃氣骨蒸方三首
虛損慘瘁作骨蒸方四首
瘦病方五首
傳屍方四首
伏連方五首
飛尸方三首

遁尸方三首
五尸方一十一首
尸疰方四首
五疰方四首
江南九十九疰方二首
江南三十六疰方三首
疰病相染易方三首
鬼疰方二首
鬼疰心腹痛方一首
鬼疰羸瘦方二首

鬼氣方三首
鬼魅精魅方八首
鬼神交通方四首
白虎方五首
無辜方二首
除骨熱方四首
盜汗方七首
卷第十四中風上三十一門
中風及諸風方一十四首
卒中風方七首

四肢中風方四首
中風發熱方三首
賊風方一十二首
歷節風方一十首
中風角弓反張方七首
風口噤方一十首
風口喎方九首
風失音不語方八首
風不得語方二首
風身體手足不隨方二首

風半身不隨方八首
攤緩風方四首
風痱方三首
偏風方九首
風猥退方三首
風嚲曳及攣躄方二首
柔風方二首
許仁則療諸風方七首
張文仲療諸風方九首
卷第十五 風狂及諸風下二十四門

風狂方九首
風驚恐失志喜忘及妄言方六首
風邪方八首
五邪方五首
風驚悸方九首
風驚恐方二首
風癲方七首
五癇方三首
癇方三首
風癇及驚癇方五首

風毒方五首
風多汗及虛汗方五首
風熱方六首
頭風及頭痛方一十首
風頭眩方九首
頭風旋方七首
癮疹風疹方一十三首
風搔身體癮疹方五首
風熱頭面疹痒方四首
風搔癮疹生瘡方六首
風身體如蟲行方四首

癧瘍風方一十五首
白癜風方九首
白駮方七首
卷第十六 虛勞上十九門
五臟勞論一首
肝勞論一首
肝勞實熱方二首
肝勞虛熱方四首
肝勞虛寒方五首

膀[illegible][illegible]方三首
髓虛實方二首
咽門論并傷破聲嘶方二首
六極論一首
筋極論一首
筋實極方四首
筋虛極方二首
筋虛胞轉方二首
轉筋方七首
心勞論一首
心勞實熱方五首
心實熱方二首
脈極論一首
脈熱極方三首
脈寒極方四首
脾勞論一首
脾勞實熱方四首
脾勞虛寒方三首
脾實熱方六首
瀉脾丸主脾氣不調及病方三首

溫脾湯主脾氣不足及不調下痢方六首
溫脾丸主脾胃中冷及不足方四首
肉極論一首
肉極熱方四首
肉極寒方五首
肺勞論一首
肺勞實熱方五首
肺勞虛寒方二首
肺虛勞損方三首
氣極論一首
氣極熱方三首
氣極寒方二首
腎勞論一首
腎勞實熱方二首
腎勞虛寒方二首
腎勞熱方二首
腎熱方三首
骨極論一首
骨極實方四首
骨極虛方七首

精極論并方二首
虛勞失精方五首
虛勞尿精方八首
虛勞夢洩精方一十首
卷第十七 虛勞下二十九門
素女經四季補益方七首
五勞六極七傷方一十首
雜療五勞七傷方三首
腰痛方六首
風濕腰痛方四首

腎著腰痛方二首
腎虛腰痛方七首
臂腰痛方三首
卒腰痛方七首
久腰痛方二首
腰胯痛方二首
腰腳疼痛方三首
腰胯疼冷方二首
腰腎膿水方二首
虛勞補益方九首

補益虛損方七首
虛勞羸瘦方五首
虛勞食不生肌膚方三首
長肌膚方三首
腎氣不足方六首
虛勞裏急方六首
虛勞心腹痛方二首
虛勞偏枯方一首
虛勞骨熱方二首
虛勞虛煩不得眠方八首

病後不得眠方二首
虛勞百病方五首
虛勞陰萎方七首
虛勞小便利方五首
卷第十八 腳氣上十二門
腳氣論二十三首
腳氣服湯藥色目方一十九首
腳氣不隨方五首
風毒腳弱痹方六首
大小續命湯中風方二首

不仁不能行方三首
因脚氣續生諸病方四首
大法春秋宜服散湯方六首
脚氣嘔逆不下食方二首
脚氣痹不仁方二首
脚氣衝心煩悶方二十二首
嶺南瘴氣脚氣酒湯散方一十三首
卷第十九 脚氣下十六門
脚氣腫滿方二十九首
脚氣腫滿小便澀方三首

脚氣上氣方五首
脚氣心腹脹急方四首
脚氣寒熱湯酒方一十首
脚氣痹弱方七首
脚氣痹攣方二首
風偏枯方二首 從風偏枯以下五門並兼療脚氣及風等相類
風四肢拘攣不得屈伸方五首
風不仁方三首
風濕痹方四首
風濕方九首
許仁則療脚氣方三首
論陰陽表裏灸法四十七首
灸用火善惡補瀉法一首
雜療脚氣方一十四首
卷第二十 水病二十六門
水腫方一十三首
水病方七首
十水方三首
大腹水腫方五首
風水方八首

水蠱方四首
卒腫滿方六首
腫入腹苦滿方四首
水通身腫方一十一首
水氣腫鼓脹方三首
水腫欬逆上氣方三首
氣兼水身面腫方四首
水氣方七首
皮水方三首
水腫從脚起方四首

水癥方二首
水瘕方一首
石水方四首
暴腫滿方四首
氣滿胸急方八首
虛熱及先服石風水腫方三首
三焦決漏水病方二首
男女新久腫方三首
水腫小便澀方三首
上氣大便澀方二首
水病雜療方一十二首

卷第二十一 眼疾二十四門
天竺經論眼序一首
敘眼生起一首
出眼疾候一首
眼疾品類不同候一首
眼將節謹慎法一首
眼暴腫痛方一十首
赤目痛方二十一首
胎赤久赤方七首

目暴卒赤方十八首
目痒方四首
目中風腫方五首
眼熱礳痛赤腫方三首
眼闇令明方一十四首
失明方六首
青盲及盲方六首
雀目方四首
目膚瞖方一十五首
暈瞖方四首
生膚息肉方八首
目風淚出方六首
眯目方八首
肝氣不足方二首
肝實目痛方二首
眼雜療方二十首

卷第二十二 耳鼻牙齒脣口舌咽喉病五十六門
耳聾方二十三首
風聾方三首
耳聾有膿方三首

久聾方五首
耳鳴方六首
聤耳方一十首
耳卒疼痛方三首
耳卒腫方二首
通耳中膿方二首
蟲入耳方一十首
蜈蚣入耳方三首
蚰蜒入耳方二首
飛蛾入耳方二首

蟻入耳方二首
耳雜療方八首
鼻中息肉方一十一首
鼻齆方五首
肺寒鼻齆方二首
鼻窒塞不通利方七首
鼻塞常清涕方二首
鼻生瘡及疳蟲食方九首
牙疼方八首
齒痛方一十一首

齒疼方六首
牙齒疼痛方八首
蜃齒方五首
齒風疼痛方三首
齲齒方七首
齒蟲方五首
風齒方四首
風齒根出方二首
風齒口臭方二首
牙齒風齲方三首

牙齒疼風蟲俱療方五首
風齗牙齒搖動方二首
疳蟲食齒方一十首
齒痛有孔方四首
齒挺出及脫落方五首
齒間血出方三首
齒血不止方四首
齒腫方二首
牙疼痛及蟲方三首
牙齒雜療方七首

緊脣方一十三首
瀋脣瘡爛方五首
脣瘡方三首
口瘡方一十一首
口瘡久不差方二首
口吻瘡方四首
口乾燥方五首
口臭方九首
舌論一首
舌本縮口噤方二首

舌上瘡方二首
咽喉舌諸疾方七首
口脣舌鼻雜療方一十四首
卷第二十三 癭瘤咽喉瘰癧等二十八門
癭病方一十八首
氣癭方一十首
五癭方八首
灸癭法一十三首
瘤方三首
白瘤及二三十年瘤方三首

喉痺方二十一首
咽喉中閉塞方三首
喉舌生瘡爛方八首
喉咽生瘡方四首
咽喉腫方五首
喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首
懸癰腫方三首
咽喉雜療方四首
寒熱瘰癧方一十一首
瘰癧結核方四首

惡核瘰癧方四首
癰腫瘰核不消方五首
鼠瘻及瘰癧方一十一首
毒腫瘰癧方四首
灸瘰癧法六首
九瘻方三十五首
諸瘻方一十五首
腋臭方三十七首
漏腋方三首
七孔臭氣方三首

令人體香方四首
雜療汗出不止方一十首
卷第二十四癰疽發背九門
癰疽方一十四首
癰腫方二十五首
石癰方五首
癰癤方一十四首
附骨疽方七首
瘭疽方一十六首
緩疽方四首
發背方四十一首
癰疽發背雜療方二十六首
卷第二十五痢三十三門
水穀痢方一十首
水痢方六首
久水痢不差腸垢方四首
冷痢方二十二首
冷痢食不消下方六首
白痢方八首
重下方六首

卒暴冷下部疼悶方二首
冷熱痢方七首
熱毒痢方三首
熱毒血痢方六首
赤痢方四首
久赤痢方二首
卒下血方七首
血痢方六首
久血痢方三首
蠱注痢方三首
腸蠱痢方一首
膿血痢方七首
赤白痢方六首
久赤白痢方四首
疳痢方六首
久疳痢及久痢成疳方九首
數十年痢方一十一首
休息痢方五首
腹肚不調痢方一首
洩痢不禁不斷及日數十行方三首

下焦虛寒及遠血近血方二首
下痢食完出及上入下出方一首
下痢腸滑方三首
大注痢及赤白困篤腸滑方二首
痢兼渴方二首
許仁則痢方七首

卷第二十六 痔病陰病九蟲等二十五門

五痔方一十二首
五痔數年不差方六首
五痔脫肛方二首

腸痔方一十五首
諸痔方二十八首
痔下部如蟲齧方九首
大便下血風冷積年變作痔方三首
灸痔法二首
雜療痔方五首
脫肛方三首
肛門突出方三首
卒大便脫肛方六首
腸肛俱出方二首

腸肛歷年不愈方三首
疝氣及癩方六首
卒病癩方五首
癩卵偏大方三首
灸諸癩法一十四首
陰腫方六首
陰瘡腫縮方一首
陰卒腫痛方三首
陰囊腫痛方五首
陰下痒濕方七首

陰痛方三首
陰瘡方七首
陰邊粟瘡方五首
著硇砂方四首
九蟲方一首
五藏蟲方七首
長蟲方二首
蛔蟲方九首
寸白方一十九首
蟯蟲方六首

三蟲方三首
雜療蟲方三首
卷第二十七 淋并大小便難病二十七門
諸淋方三十五首
五淋方三首
石淋方一十六首
血淋方五首
小便赤色如紅方三首
熱淋方三首
勞淋方三首

氣淋方五首
膏淋方二首
許仁則淋方二首
大便難方六首
大便不通方一十七首
大便秘澀不通方七首
大便失禁并關格大小便不通方二十二首
關格脹滿不通方四首
許仁則大便暴閉不通方一首
小便不通方一十三首

小便難及不利方九首
遺尿方六首
尿血方一十一首
胞轉方一十五首
小便血及九竅出血方一十二首
小便不禁方二首
小便數及多方五首
許仁則小便數多方四首
尿牀方六首
灸穴雜法一十二首

卷第二十八 中惡蠱注自縊暍死一十八門
中惡方一十三首
卒死方二十三首
客忤方一十三首
卒魘方二十一首
鬼擊方一十首
尸厥方一十一首
中蠱毒方二十一首
蠱吐血方一十首
蠱下血方九首

五蠱方一十二首
蠱注方三首
蠱毒雜療方五首
猫鬼野道方三首
自縊死方一十五首
熱暍方七首
溺死方九首
凍死方一首
入井塚悶方二首

卷第二十九墜墮金瘡等四十七門

從高墮下方三首
從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首
墜損方三首
墮落車馬方六首
折骨方三首
傷筋方三首
筋骨俱傷方七首
折腕方一首
折腕瘀血方四首
蹉跌方三首

被打有瘀血方一十三首
被打損青腫方七首
許仁則療吐血及墮損方三首
金瘡禁忌序一首
金瘡預備膏散方三首
金瘡方一十一首
金瘡續筋骨方三首
金瘡止痛方五首
金瘡生肌方四首
金瘡去血多虛竭內補方二首
金瘡中風方八首
諸瘡中風寒水露方五首
被刀箭傷方一十一首
竹木刺不出方一十六首
狐尿刺方二首
狐刺方四首
惡刺方三首
灸瘡方四首
灸瘡膿不瘥方三首
火燒瘡及火油天火瘡方三首

火灼爛壞方五首
湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首
湯火瘡無問大小方四首
湯火爛瘡方五首
湯煎膏火所燒方四首
漆瘡方二十七首
侵淫瘡方七首
月蝕瘡方一十二首
代指方一十一首
甲疽方五首

肉刺方二首
手足皸裂方五首
手足逆臚及瘃瘃方二首
疣目方一十九首
去黑子方二首
疣贅疵黑子雜療方六首
滅瘢痕方一十七首
卷第三十 惡疾大風癩瘡等二十三門
惡疾大風方一十首
諸癩方九首

烏癩方一首
白癩方五首
十三種丁腫方一十二首
丁腫方二十首
犯丁腫重發方二首
惡腫一切毒瘡腫方一十七首
反花瘡及諸惡瘡腫方四首
魚臍瘡方一十首
丹毒方九首
赤丹方五首
白丹方一十二首

丹胗方四首
赤胗白胗方一十一首
肺風冷熱胗方二首
雜丹胗毒腫及諸色雜瘡方五首
瘑瘡方一十二首
瘑瘡久不差方五首
瘑瘡方一十一首
乾濕癬方一十五首
疥癬惡瘡方五首

疥風痒方七首
卷第三十一 採藥時節所出土地諸家丸散酒煎解諸毒等二十二門
採藥時節一首
藥所出州土一首
用藥分兩煮湯生熟法則一十六首
古今諸家丸方一十七首
乞力伽丸方一首
耆婆萬病丸方一首
大麝香丸方一首
小麝香丸方一首

溫白丸方一首
張仲景備急丸方一首
理中丸方一首
駐車丸方一首
牛黃五香丸方一首
玉壺丸方一首
青木香丸方一首
李子昭七宣五補丸方二首
犀角丸方一首
黃連丸方一首

麻人丸方一首
三黃丸方一首
古今諸家散方六首
小金牙散方一首
五香散方一首
備急散方一首
紫雪散方一首
仙人絳雪方一首
腎瀝煮散方一首
古今諸家膏方四首

神明白膏方一首
陳元膏方一首
烏膏方一首
蓮子膏方一首
古今諸家煎方六首
阿魏煎方一首
鹿角膠煎方一首
蒜煎方一首
地黃煎方一首
單地黃煎方一首

近効地黄煎方一首
古今諸家酒方一十一首
天門冬酒方一首
大金牙酒方一首
鍾乳酒方一首
五精酒方一首
术酒方一首
枸杞酒方一首
蒼耳酒方一首
烏麻酒方一首

枸杞酒方一首
地黄酒方一首
五加酒方一首
代茶飲方一首
解飲食相害成病百件
食魚中毒及食鱠不消方五首
食椒菜瓠中毒方四首
解一切食中毒方三首
酒醉過度恐腸爛及喉舌生瘡方三首
飲酒連日醉不醒方九首

飲酒令難醉方一首
飲酒積熱方二首
斷酒方一十五首
服藥過劑及中毒方一十一首
解諸藥草毒方二十九首
解諸蛇蟲毒方六首
辨五大毒方一首
解金鐵等毒方八首
惡毒瘴氣毒風腫毒方四首
卷第三十二 面部面脂藥頭膏髮髮衣香澡豆等三十四門

面膏面脂兼療面病方一十三首
洗面藥方二首
面色悦方五首
令面色白方四首
面皯方一十三首
面皯黯方二十一首
面皯皰方一十五首
面皶皰方一十三首
面粉滓方四首
化面方二首

雜療面方六首
頭風白屑方四首
沐頭去風方五首
頭風白屑兼生髮方八首
生髮膏方一十一首
生眉毛方二首
令髮黑方八首
拔白髮良日并方三首
變白髮染髮方五首
髮黃方三首
鬢髮禿落方一十九首
白禿方一十二首
赤禿方二首
令髮不生方三首
鬼舐頭方二首
澡豆方八首
手膏方三首
口脂方二首
燒甲煎香六首
造胭脂法一首

造水銀霜法二首
鹿角桃花粉方二首
熏衣濕香方五首
裛衣乾香方五首
卷第三十三婦人上三十七門
求子法及方一十二首
久無子方五首
養胎法并禁忌一十三首
妊娠隨月數服藥及將息法一十九首
妊娠嘔吐及惡食方九首
妊娠胎動方九首
動胎腰腹痛方三首
頓仆胎動方四首
胎數傷及不長方三首
妊娠傷寒方四首
妊娠患瘧方三首
妊娠下痢方四首
妊娠心痛方八首
妊娠腹痛方二首
妊娠漏胞方五首

妊娠下血及尿血方七首
妊娠小便不通利方五首
妊娠子淋方五首
妊娠大小便不利方五首
妊娠子癇方二首
妊娠水氣方三首
損娠方六首
數墮胎方四首
妊娠得病欲去子方三首
落胎去胎方四首

產乳序論三首
年立成法一首
十二月立成法一首幷圖
推日遊法一首幷圖
體玄子爲產婦借地法一首
日歷法二首
安置產婦法二首
產難方二十四首
逆產方一十二首
橫產方四首

子死腹中欲令出方一十五首
胞衣不出方二十首
卷第三十四婦人下四十八門
產婦忌慎法六首
令易產方六首
下乳汁方一十五首
妒乳瘡痛方一十四首
乳癰腫方一十八門
產後血暈心悶方一十首
乳母運絕方五首

產後血不盡腹臍疼惡露不下方七首
產後惡露不絕方四首
產後血氣煩悶方四首
產後心痛方三首
產後腹中絞刺痛方九首
產後虛熱方二首
產後虛勞方四首
產後風虛瘦損方四首
產後虛羸方三首
產後中風方三首

產後下痢方四首
產後赤白痢方五首
產後冷熱痢方二首
產後痢日數十行方二首
產後卒患淋方五首
產後小便不禁兼數方四首
產後小便數兼渴方二首
產後渴方二首
許仁則產後方一十六首
產後遺糞方三首

產後陰道開方二首
產後陰下脫方六首
八瘕方一十二首
肉癥方二首
崩中方一十一首
崩中去血方一十三首
帶下方一十首
婦人虛羸及月病不能食方三首
陰蝕及疳方八首
陰中腫痛方四首

陰中瘡方五首
陰癢方五首
陰下脫方四首
陰瘡有蟲方六首
陰挺出方三首
女人傷丈夫頭痛方二首
交接輒血出痛方二首
童女交接他物傷方三首
小戶嫁痛方四首
坐藥方二首

婦人欲斷產方四首
卷第三十五 小兒諸方上 三十六門
小兒方序例論一首
小兒初生將護法一十七首
小兒初生將息法二首
小兒初受氣論一首
小兒變蒸方二首
相兒命長短法并論二十八首
小兒藏衣法五首
浴兒法一十一首

剃兒頭法一首
哺兒法三首
襁褓法十二首
擇乳母法一首
小兒驚癇啼壯熱不喫妳吐不已不小便方五首
小兒將息衣厚薄致生諸癇及諸疾方并灸法二十八首
小兒驚悸方二首
小兒夜啼方一十首

小兒驚夜啼方七首
小兒客忤方一十首
小兒癥瘕癖方六首
小兒痰結方二首
小兒因食痞滿羸瘦不下食肚脹方四首
小兒食不下及不消不嗜食方四首
小兒霍亂方一十二首
小兒霍亂雜病方六首
小兒吐痢方四首
小兒噦方二首
小兒口噤方四首
小兒重舌方并灸法一十三首
小兒鷰口鵝口方六首
小兒口瘡方五首
小兒口中涎出方三首
小兒舌上瘡脣腫方五首
小兒咽喉生瘡方二首
小兒喉痺方四首
小兒聤耳方四首
小兒鼻塞方四首

卷第三十六 小兒諸疾下五十門

小兒中風方四首
小兒欬嗽方八首
小兒欬逆上氣方七首
小兒傷寒方三首
小兒天行方八首
小兒諸黃方四首
小兒諸瘧方九首
小兒眼赤痛方八首
小兒諸淋方六首

小兒小便不通方五首
小兒遺尿失禁方五首
小兒大便有血方三首
小兒大便不通方四首
小兒赤白痢方七首
小兒蠱毒血痢方九首
小兒熱渴痢方四首
小兒疳痢方七首
小兒無辜疳痢方三首
小兒諸雜痢方四首

小兒忽衄血方六首
小兒齒不生方二首
小兒頭熱盜汗方三首
小兒顖開不合方四首
小兒解顱方二首
小兒月蝕耳瘡方三首
小兒臍中汁出并瘡腫方一十一首
小兒癰腫方二首
小兒丹毒方七首
小兒禿瘡方七首
小兒頭瘡方三首
小兒頭面熱瘡方七首
小兒瘰癧方二首
小兒浸淫瘡方三首
小兒蠼螋瘡方二首
小兒惡瘡方五首
小兒火灼瘡方二首
小兒風軫瘙痒方五首
小兒疝氣陰㿗方八首
小兒陰瘡及腫方八首

小兒脫肛方六首
小兒蠱蝕下部方四首
小兒疳濕瘡方六首
小兒蚘蟲方七首
小兒蟯蟲及寸白方五首
小兒瘻瘡方四首
小兒疥瘡方六首
小兒癬瘡方六首
小兒誤吞物方四首
小兒雜療方六首

卷第三十七 乳石論上 一十九門

薛侍郎服乳石體性論一首
李補闕研鍊鍾乳法一首
曹公草鍾乳丸法二首
崔尚書乳煎鍾乳餌法二首
雜餌鍾乳丸散補益法二首
雜餌鍾乳酒法二首
東陵處士鍾乳丸餌并補乳法二首
周處溫授侍郎鍊白石英粉丸等餌法并論紫石白石英體性及酒法五首

雜煮石英和金銀草藥餌及銀鎗煮水飲法三首同州使君餌石法一首
羊肉中蒸石英及石汁餵猪肉蒸作薑豉服法三首
猪肚中煮石英及飼牛取乳兼石英和磁石浸酒服餌法三首
服石後有不可食者有通食而無益人者有益人利石者蘇菜等一十條
張文仲論服石法要當違人常性有五乖七急八不可兼備不虞藥并論二十三條
乳石陰陽體性并草藥觸動形候等論并法一十五首
銓擇薛侍郎等服石後將息補餌法一十五條
飲酒發熱諸候將息補餌論并法一十條
餌寒食五石諸雜石等解散論并法四十九條
癰疽發背證候等論并方五十三首

卷第三十八 乳石下 一十八門

乳石發動熱氣上衝諸形候解壓方五十三首
石發熱嗽衝頭面兼口乾方六首
石發兼虛熱痰澼乾嘔方五首
石發吐血衄血方七首

石發熱煩及渴方一十六首
石發熱風頭痛心煩寒熱方三首
石發口瘡連胸面及上心痛方一十五首
諸石發腹脹痞滿兼心痛諸形證方七首
石發熱目赤方一十首
石發痰結大小腹留壅老小虛羸方六首
石發大小便閉不通兼小便淋方一十六首
石發後變霍亂及轉筋方一十六首
石發後變下痢及諸雜痢方一十二首
石發兩脚卒冷兩脇腋卒熱并口噤方三首

石發苦熱解折下石方四首
服石後將息飲食所宜法二首
紫餅飥并食飲將慎法三首
服石後防慎貯備雜藥等一首
卷第三十九 明堂灸法七門
明堂序
論邪入皮毛經絡風冷熱灸法
論疾手足腹背灸之多少及補瀉八木火法
不宜灸禁穴及老少加減法
年神傍通并雜忌傍通法

五藏六腑變化流注出入傍通
十二身流注五藏六腑明堂
第一肺藏人一十八穴
第二大腸腑人四十五穴
第三肝藏人二十二穴
第四膽腑人一百四穴
第五脾藏人四十八穴
第六胃腑人九十一穴
第七心藏人十六穴
第八小腸腑人二十六穴

第九心包絡人一十六穴
第十腎藏人七十七穴
第十一膀胱腑人一百四十四穴
第十二三焦腑人五十六穴
卷第四十 蟲獸傷觸人及六畜疾三十二門
熊虎傷人瘡方七首
辨蛇一首
禁蛇法二首
辟蛇法三首
蛇嚙人方一十四首

蛇螫方六首
蛇毒方三首
青蝰蛇螫方二首
蝮蛇螫方一十首
虺蛇螫方四首
衆蛇螫方七首
蜘蛛咬方六首
蜂螫方一十首
蜈蚣螫方八首
蠍螫方二十七首

蠼螋尿方二首
惡蛇方三首
蠆螫方二首
射工方一十九首
溪毒方二十一首
沙虱毒方六首
犬咬人方九首
狂犬咬人方二十二首
猪嚙人方二首
馬咋踏人方四首

剥死馬馬骨傷人方三首
馬骨所刺及馬血入舊瘡方八首
馬汗及毛入人瘡方六首
驢馬諸疾方三十一首
牛狗疾方六首
牛觝觸腸出方一首
油衣粘及松脂著人衣并蟲蝕氊罽法五首

新安程季友是友父總校

重訂唐王燾先生外臺秘要方目錄終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第一卷目錄 傷寒上 一十二門

諸論傷寒八家合一十六首
論傷寒日數病源并方二十一首
肘後方七首
深師方四首
小品方四首
集驗方五首
千金方六首
千金翼方一十三首
崔氏方一十五首 附一方

張文仲方一十首
古今錄驗方八首
雜療傷寒湯散丸方八首 並是諸中所要

通按傷寒論大〻大治

唐王燾先生外臺秘要方第一卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等　上進

中憲大夫徽州府知府當湖玉岸陸錫明校閱

新安後學程衍道敬通父訂梓

諸論傷寒八家合一十六首

陰陽大論云春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰冽此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子周密則不傷於寒觸冒之者乃名傷寒耳其傷於四時之氣皆能為病以傷寒為毒者以其最成殺厲之氣也中而即病者名曰傷寒不即病者寒毒藏於肌膚中至春變為溫病至夏

變為暑病暑病者熱極重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致非時行之氣也凡時行者春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則時行之氣也（仲景日病源小品千金同）

王叔和曰傷寒之病逐日淺深以施方治今世人得傷寒或始不早治或治不對病或日數久淹困乃告醫醫又不知次第而治之則不中病皆以臨時消息制方無不效也今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真方有神驗者擬防世急也又土地高下寒溫不同物性剛柔飡居亦異是故黃帝興四方之問岐伯舉四治之能以訓後賢開其未悟臨病之工宜須兩審也（小品千金同）

又曰夫表和裏病（一作陽盛陰虛）下之而愈汗之則死裏和表病（一作陽盛陰虛）汗之而愈下之則死夫如是則神丹不可以誤發（神丹丸在此卷崔氏部中六味者是也）甘遂何可以妄攻（甘遂者水導散也在第二卷天行狂語部中甘遂等二味者是也出千金方）表裏之治相背千里吉凶之機應若影響然則桂枝下咽表和則斃（桂枝湯在此卷仲景日數部中甘草等五味者是也）承氣入胃裏平則亡（承氣湯在上卷仲景日數部中二味者是也）此表裏虛實之交錯其候至微發汗吐下之相反其禍至速而醫術淺

狹為治乃誤使病者殞沒自謂其分至令冤魂塞於冥路死尸盈於曠野仁者鑒此豈不痛歟（千金同）

又凡兩感病俱作治有先後發表攻裏本自不同而執迷妄意者乃云神丹甘遂合而服之且解其外又除其內言巧似是於理實違安危之變豈可詭哉夫病發熱而惡寒者發於陽無熱而惡寒者發於陰發於陽者可攻其外發於陰者宜溫其內發表以桂枝溫裏宜四逆（四逆湯在第二卷傷寒不得眠部中三味者是也○通按第二卷傷寒不得眠部並無四逆湯二味方惟小便不利部內有四逆散加減法）

華佗曰夫傷寒始得一日在皮當摩膏火灸即愈若不解

者至二日在膚可法鍼服解肌散發汗汗出即愈若不解者至三日在肌復發汗則愈若不解者止勿復發汗也至四日在胸宜服藜蘆丸微吐則愈若更困藜蘆丸不能吐者服小豆瓜蒂散吐之則愈視病尚未醒醒者復一法鍼之藜蘆丸近用損人不錄之瓜蒂散在此卷末諸療中范汪方二味者是也五日在腹六日入胃入胃則可下也若熱毒在胃外未入於胃而先下之者其熱乘虛便入胃則爛胃也然熱入胃病要當須復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此為病三死一生此皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但論人有強弱病有難易功効相倍耳病者過日不以時下之熱不得泄亦胃爛斑出矣上翁氏曰藜蘆丸見第五卷許仁則療云胃爛發斑師一方大効三味者是也

若得病無熱但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以五苓散一方寸匕水和服之五苓散仲景云豬苓散是也在第二卷傷寒中深師中千金異方五味者是也當以新汲井水強飲一升若一升半可至二升益佳令以指刺喉中吐之病隨手愈不即吐者此病輩多不善勿強與水水停即結心下也當更以餘藥吐之皆令相主當者不爾即危若此病不急以豬苓散吐解之者其死殆速耳亦可先吐去毒物及法鍼之尤佳

又云春夏無大吐下秋冬無大發汗發汗法冬及始春大寒宜服神丹丸亦可摩膏火灸膏在雜療中黃膏七味白膏四味范汪方是也若末夏月及秋凡此熱月不宜火灸又不宜厚覆宜服六物青散青散在雜療中范汪方六味者是也若崔文行度瘴散度瘴散在雜療中范汪方四味者是也赤散赤散在雜療中范汪方七味者是也本出華佗雪煎亦善雪煎在雜療中若無丸散及煎但單煮柴胡數兩傷寒時行並可服也不但一也至再三發汗不解當與湯實者轉下之其脈朝夕駃者為實癖也朝平夕駃者非癖也轉下湯為可早與但當少與勿令下多耳少與當數其間

病有虛煩熱者與傷寒相似然不惡寒身不疼痛故知非傷寒也不可發汗頭不痛脈不緊數故知非裏實也不可下如此內外皆不可攻而師強攻之必遂損竭多死矣諸虛煩但當行竹葉湯竹葉湯在第一卷天行虛煩部中出文仲方是也若嘔者與橘皮湯一劑不愈者可重與也橘皮湯在第二卷傷寒嘔噦部中四味者是也出於深師此法宮泰數用甚效傷寒後虛煩亦宜服此湯仲景方千金方同

陳廩丘云或問得病連服湯藥發汗汗不出如之何荅曰醫經云連發汗汗不出者死吾思可蒸之如蒸中風法蒸濕之氣於外迎之不得不汗出也後以問張苗苗云曾有

文理順

通按千金無黃帝字以伯對荅說段

人作事疲極汗出臥單簟中冷得病但苦寒𤸷諸治弭與丸散湯四日之內凡八發汗汗不出蒸令燒地布桃葉蒸之即得大汗於被中就粉傅身極燥乃起便愈後數以此發汗汗皆出也人性自有難使汗出者非但病使其然蒸之無不汗出也（小品千金同蒸法在此卷後氏日數部中阮河南法又有桃葉湯熏其法在第三卷天行部中文仲方支太素法是）

范汪論黃帝問於岐伯曰人傷於寒而得病何以反更為熱岐伯曰極陰變陽寒盛則生熱熱盛則生寒諸病發熱惡寒脈浮洪者便宜發汗當發汗而其人適失血及大下利如之何岐伯荅曰數少與桂枝湯使體潤漐漐汗纔出

連日如此自當解也（千金同）

九卷云黃帝曰傷寒熱病死候有九（太素云不可刺者有九）一曰汗不出大灌發者死（太素云汗不出大顴發赤噦者死）○（通按靈樞熱病篇中大顴發赤噦者死）二曰泄而腹滿甚者死（一作黃）三曰目不明熱不已者死四曰老人嬰兒熱病腹滿者死五曰汗不出嘔下血者死六曰舌本爛熱不已者死七曰欬而衄汗不出出不至足者死八曰髓熱者死九曰熱而痙者死熱病痙者腰反折瘈瘲齒噤齘也熱病七八日脈微小病者便血口中乾一日半而死熱病七八日脈不躁不數後三日中有汗三日不汗四日死熱病已得汗而脈尚躁盛此陰脈之極也死其

通按熱字千金作勢更妥

得汗而脈靜者生熱病脈常盛躁而不得汗者此陽脈之極也死脈盛躁得汗者生（甲乙太素同出楊氏曰躁發躁驟也清也先不出汗後則若灌然之脈主而淋漓發處亡陽也）

小品論曰古今相傳稱傷寒為難療之病天行溫疫是毒病之氣而論療者不別傷寒與天行溫疫為異氣耳云傷寒是雅士之辭云天行溫疫是田舍間號耳不說病之異同也考之眾經其實殊矣所宜不同方說宜辨是以略述其要焉（此論上卷中千金同）

千金論曰人生天地之間命有遭際時有否泰吉凶悔吝苦樂安危喜怒愛憎存亡憂畏關心之慮日有千條謀身

之道時生萬計乃度一日是故天無一歲不寒暑人無一日不憂喜故有天行瘟疫病者則天地變化之一氣也斯蓋造化必然之理不得無之故聖人雖有補天立極之德而不能廢之雖不能廢之而能以道御之其次有賢人善於攝生能知撙節與時推移亦得保全天地有斯瘴癘還以天地所生之物以防備之命曰知方則病無所侵矣然此病也俗人謂之橫病多不解療皆云日滿自差以此致枉者天下大半凡始覺不佳即須救療迄至於病愈汝食競進折其毒熱自然而差必不可令病氣自在恣意攻人拱手待斃斯為誤矣今博採群經以為上下兩卷廣設備

還按熱字千金作勃覺字作

寒疫亂後小疾一字

還按勅字宜是勅字千金作孝史明題

熱好發生者可得詳焉
又夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣分爭榮衛否
隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者
頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表發汗則愈三日以上氣
浮在上部塡塞胸心故頭痛胸中滿當吐之則愈五日以
上氣沉結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈明矣
當須消息病候不可亂投湯藥虛其胃氣也經言脈微不
可吐虛細不可下又夏亦不可下此醫之大禁也 文仲同
又脈有沉浮轉能變化或人得病數日方以告醫雖云時
覺頭痛已積日其病源結成非復發汗解肌所除當診其

脈隨時形勢救解求免也不可苟以次第爲固失其機要
乃致禍矣此傷寒次第病三日以內發汗者謂當風解衣
夜臥失覆寒溫所中并時有疾疫賊風之氣而相染易爲
惡邪所中也至於人自飲食生冷過多腹藏不消轉動稍
難頭痛身溫其脈實大者便可吐下之不可發汗也
又凡人有少病苦似不如平常則須早道若隱忍不療冀
望自差須臾之間以成痼疾小兒女子益以滋甚若天行
不和當自戒勅若有小不和則須救療尋其邪由及在腠
理以時早療鮮有不愈者患人忍之數日乃說邪氣入藏
則難可制此雖和緩亦無能爲也癰疽疔腫尤爲其急此

自養之至要也
又凡作湯藥不可避晨夜時日吉凶覺病須臾即宜便治
不等早晚則易愈矣服藥當如方法若縱意違師不須療
之也
又凡得時氣病五六日而渴欲飲水飲不能多不當與也
所以爾者腹中熱尚少不能消之便更與人作病矣若至
七八日大渴欲飲水者猶當依證而與之勿令極意也能
飲一斗者與五升若飲而腹滿小便澀若喘若噦者不可
與之飲而忽然汗出者已愈也人得病能飲水者欲愈也
出第九卷中

經心錄論曰傷寒病錯療禍及如反覆手耳故諺云有病
不治自得中醫者論此疾也其病有相類者傷寒熱病風
溫濕病陰毒陽毒熱毒溫疫天行節氣死生不同形候亦
別宜審詳也 出第二卷中

論傷寒日數病源并方二十一首

素問黃帝曰夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死其死皆
以六七日閒其愈皆以十日以上者何也岐伯曰巨陽者
諸陽之屬也其脈連於風府故爲諸陽主氣也人之傷於
寒也則爲病熱熱雖甚不死其兩感於寒而病者必死帝
曰願聞其狀岐伯曰一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二

宋版夾字作扶

通字宋本傷寒本

宋無不滿二字

宋版譫字作讝

日陽明受之陽明主肌肉其脈夾鼻絡於目故身熱目疼
而鼻乾不得臥三日少陽受之少陽主膽其脈循脇絡于
耳故胷脇痛而耳聾三陽經絡皆受其病而未入於藏者
故可汗而已四日太陰受之太陰脈布胃中絡於嗌故腹
滿而嗌乾五日少陰受之少陰脈貫腎絡肺繫舌本故口
燥舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脈循陰器而絡於肝故
煩滿而囊縮三陰三陽五藏六府皆受病榮衛不行五藏
不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈
八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日
太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不

滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆
去病日已矣
帝曰治之柰何岐伯曰治之各通其藏脈病日衰已矣其未
滿三日者可汗而已其滿三日可泄而已
又帝曰其病兩感於寒者其脈應與其病形何如岐伯曰
兩感於寒病者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾
煩滿而渴也二日則陽明與大陰俱病則腹滿身熱不欲
食譫語三日則少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿
不入不知人豁六日而死
帝曰五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死

宋版一胃字作小腸小腸乃太陽任也

宋版肉字作氣

何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其氣血盛故不知
人三日其氣乃盡故死 出第九卷中甲乙太素同
病源傷寒一日太陽受病太陽者小腸之經也為三陽之
首故先受病其脈絡于腰脊主於頭項故得病一日而頭
項背膊腰脊痛也
又傷寒二日陽明受病陽明者胃之經也主於肌肉其脈
絡鼻入目故得病二日內熱鼻乾不得眠也諸陽在表表
始受病在皮膚之間故可摩膏火灸發汗而愈 出第七卷中
仲景傷寒論傷寒一二日心中悸而煩小建中湯主之方
桂心三兩　甘草炙二兩　生薑三兩　大棗擘十二枚

膠飴一升　芍藥六兩
右六味切以水七升先煮五味取三升去滓內飴更上
火微煮令消解溫服一升日三服如嘔家不可服建中
湯以甜故也忌海藻菘菜生葱 千金翼同出第三卷中
○張仲景傷寒論傷寒一二日內麻黃湯主之 此云小建中湯非也此方但治心中悸而煩
病源傷寒三日少陽受病少陽者膽之經也其脈循於脇
上於頸耳故得病三日胷脇痛而耳聾也三陽經絡始相
傳病未入於藏故皆可汗而解 出第七卷中
仲景傷寒論療太陽病三日發其汗病不解蒸蒸發熱者
屬調胃承氣湯方

甘草炙三兩 芒硝半升 大黃四兩

右三味切以水三升煑二物取一升去滓內芒硝更煑微沸溫溫頓服以調胃承氣則愈忌海藻菘菜經心錄同 出第十卷中 ○張仲景傷寒論三日亦可服麻黃湯此云調胃承氣湯非也此方但治三日發汗不解蒸蒸發熱者

病源傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也爲三陰之首是知三日以前陽受病訖傳之於陰而太陰受病焉其脉絡於脾主於喉嗌故得病四日腹滿而嗌乾其病在胷膈也故可吐而愈

又傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脉貫腎絡肺

繫於舌故得病五日口燥舌乾渴而引飲也其病在腹故可下而愈矣 並出第七卷中

仲景傷寒論傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者小柴胡湯主之方

柴胡半斤 栝蔞根四兩 桂心三兩 黃芩三兩

牡蠣三兩 甘草炙二兩 乾薑三兩

右七味切以水一斗二升煑取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服初服微煩溫覆汗出者便愈也忌生葱海藻菘菜 范汪同出第三卷中 ○仲景傷寒論名柴胡姜桂也合用柴胡人參甘草黃芩半夏生薑大棗七味小柴胡湯是也玉函千金翼同

病源傷寒六日厥陰受病厥陰者肝之經也其脉循陰器絡於肝故得病六日煩滿而囊縮也此則陰陽俱受病毒氣在胷故可下而愈

又傷寒七日太陽病衰頭痛少愈傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳盡故也今七日以後病反甚不除者欲爲再病也再經病者是陰陽諸經絡重受病故也 並出第七卷中

仲景傷寒論療傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其人小便反清者知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯方 士弱氏曰藥非衄後用乃當汗時則不衄矣先未汗故衄耳

桂枝湯方

桂枝 芍藥各三兩 甘草炙二兩 生薑三兩

大棗擘十二枚

右五味切以水七升煑取三升去滓溫服一升須臾歠稀粥一升助藥力覆取微汗忌生葱海藻菘菜 集驗備急文仲范汪同 ○仲景傷寒論此方六七日病在表者可服之

又傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在故可與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解

病源傷寒八日陽明病衰身熱少愈傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣未

盡所以病證猶存也

又傷寒九日少陽病衰耳聾微聞傷寒九日以上病不除者或初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰致停滯累日病證不罷者或三陽三陰傳病已畢又重感於寒故日數多而病候改變（出第七卷中）

仲景傷寒論療傷寒八九日風濕相搏身體疼痛而煩不能自轉側不嘔不渴下之脈浮虛而澁者屬桂枝附子湯若大便鞕小便自利者附子白术湯

桂枝附子湯方

桂心（四兩）　附子（三枚炮去皮）　生姜（三兩）　甘草（二兩炙）

大棗（十二枚擘）

右五味切以水六升煑取二升去滓溫分三服忌生葱猪肉海藻菘菜

附子白术湯方

白术（四兩）　大棗（十二枚）　甘草（炙一兩）　生姜（二兩）

附子（三枚炮去皮四破）

右五味切以水六升煑取二升去滓溫分三服初一服其人身如痺半日許復服之都盡其人如冐狀者勿怪此以附子术併走皮中逐水氣未除故使人如冐狀也本云附子一枚今加之二枚名附子湯忌葱猪肉菘菜海藻桃李雀肉等（千金翼同出第十一卷中○張仲景論法當加桂枝四兩此本一方二法以大便鞕小便自利故去桂也以大便不鞕小便不利當加桂附子三枚恐多也虛弱家及産婦宜減之此二方但治風濕非治傷寒也）

病源傷寒十日太陰病衰腹減如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而嚏十二日厥陰病衰囊縱少腹微下大氣皆去病日已矣（出第七卷中素問太素甲乙並同）

仲景傷寒論療吐下之後不大便五六日至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安微喘但發熱譫（譫黃而寐寐自譫也）語者屬大承

氣湯方

大黃（去皮四兩）　陳枳實（五枚炙）　芒硝（三合）　厚朴（半斤）

右四味切以水一斗先煑二物取五升去滓內大黃煑取二升去滓內芒硝煑一二沸分爲兩服初一服便得利者止後服不必盡劑（千金方并翼同出第五卷中）

又太陽病過經十餘日及二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小胡柴湯嘔不止心下急（一云嘔止小安）鬱鬱微煩者爲未解也可與大柴胡湯下之即愈方

柴胡（半斤）　黃芩　芍藥（各三兩）　半夏（半斤水洗）

大棗（十三枚擘）　生薑（五兩）　枳實（四枚炙）

通按傷寒本文作已而微利

右七味切以水一斗二升煮至六升去滓更煎取三升溫服一升日三服一方加大黃二兩今不加大黃恐不名爲大柴胡湯也忌羊肉餳菲主天行千金翼肘後同

又傷寒十三日不解胷脇滿而嘔日晡所發潮熱熱畢而微利此本柴胡證下之不得利今反利者知醫以丸藥下之此非其治也潮熱者實也先宜服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒硝湯主之方

柴胡一兩十六銖　黃芩　人參　甘草炙

生薑各一兩　半夏五枚　大棗四枚擘　芒硝二合

右八味切以水四升煮七味取二升去滓下芒硝更上火煎一二沸分爲兩服未解更作忌海藻菘菜羊肉餳等出第五卷中一方芒硝三合桑螵蛸五個大黃四分煮取一升半溫服五合微下愈本云柴胡湯再服以解其外餘一升加芒硝大黃桑螵蛸是也

肘後方七首

肘後療傷寒有數種庸人不能分別今取一藥兼療者若初覺頭痛肉熱脉洪起一二日便作此葱豉湯方

葱白一虎口　豉一升綿裹

右二味以水三升煮取一升頓服取汗若汗不出更作加葛根三兩一方更加升麻三兩水五升煮取二升分溫再服徐徐服亦得必得汗卽差若不得汗更作加麻黃三兩去節服取汗出爲效文仲同

又方

葱白一握切　米三合　豉一升

右三味以水一斗煮米少時下豉後內葱白令大熟取三升分溫三服則出汗

又方

豉一升綿裹

右一味以童子小便三升煮取二升分溫再服汗出爲效集驗方加葱白一升切云神良支太醫文仲備急同

又方

葛根四兩切

右一味以水一斗煮取三升內豉一升更煮取一升半分溫再服取汗爲差又方擣生葛根汁一二升服亦佳

又療傷寒汗出不歇已三四日胷中惡欲令吐者方

豉三升綿裹　鹽一兩

右二味以水七升煮取二升半去滓內蜜一升入煮三沸頓服一升安臥當吐如不吐更服一升取吐爲效

又方

苦參二分　甘草炙一分　瓜蒂　赤小豆各二七枚

右四味切以水一升煮取半升一服之當吐吐不止者

作葱豉粥解之必息忌海藻菘菜
又方
苦參　黃芩各二兩　生地黃半斤
右三味切以水八升煎取二升服一升或吐下毒物忌
蕪荑
深師方四首
深師療傷寒一日至三日應汗者作此湯方
葛根半斤　烏梅十四枚　葱白一握　豉一升綿裹
右四味切以水九升煮取三升分爲三服初一服便厚
覆取汗汗出粉之

又麻黃解肌湯療傷寒三四日煩疼不解者方
麻黃三兩去節　甘草一兩炙　杏仁七十枚去皮尖熬　桂心二兩
右四味切以水九升先煮麻黃減二升掠去沫乃內諸
藥合煮取二升半絞去滓分服八合以汗出爲度忌海
藻菘菜生葱本仲景麻黃湯千金翼并同
又黃芩湯療傷寒六七日發汗不解嘔逆下利小便不利
胷脇痞滿微熱而煩方
黃芩　桂心各三兩　茯苓四兩　前胡八兩
半夏半升洗
右五味切以水一斗二升煮取六升分爲六服日三服
夜三服間食生薑粥投取小便利爲差忌羊肉餳生葱
酢物
又石膏湯療傷寒病已八九日三焦熱其脉滑數昏憒身
體壯熱沉重拘攣或時呼呻而已攻內體猶沉重拘攣由
表未解今直用解毒湯則攣急不差直用汗藥則毒因加
劇而方無表裏療者意思以三黃湯以救其內有所增加
以解其外故名石膏湯方
石膏　黃連　黃蘗　黃芩各二兩
香豉一升綿裹　梔子十枚擘　麻黃三兩去節
右七味切以水一斗煮取三升分爲三服一日併服出

汗初服一劑小汗其後更合一劑分兩日服常令微汗
出拘攣煩憒即差得數行利心開令語毒折也忌豬肉
冷水出第十四卷中
小品方四首
小品詔書發汗白薇散療傷寒二日不解方
白薇二兩　麻黃七分去節　杏仁去皮尖熬　貝母各三分
右四味擣散酒服方寸匕厚覆臥汗出愈古今錄驗千金同
又雞子湯療發汗後二三日不解頭痛肉熱方
麻黃一兩去節　甘草一分炙
右二味切以水二升加雞子白令攪水內合和令勻內

藥復攪令和上火煎之勿動煎至一升適寒溫頓服之
葢覆汗出粉傅之有效忌海藻菘菜 古今錄驗備急同
張文仲療天行
又葛根湯療傷寒三四日不差身體熱毒方
葛根八兩 生薑三兩 龍膽 大青各半兩
桂心 甘草炙 麻黃去節各二兩 萎蕤一兩
芍藥 黃芩各二兩 石膏碎 升麻各一兩
右十二味切以水一斗先煮葛根麻黃取八升掠去沫
後內餘藥煮取三升分三服日二夜一忌海藻菘菜生
葱 千金同名葛根龍膽湯

又療傷寒六七日其人大下寸脉沉遲手足厥逆下部脉
不至咽喉痛不利唾膿血泄利不止者麻黃升麻湯方
麻黃二兩半去節 升麻三分 當歸五分 知母
萎蕤一作菖蒲 黃芩各三分 麥門冬去心一作天門冬 石膏碎
桂心 芍藥 乾薑
甘草炙 茯苓 白朮各一兩
右十四味切以水一斗先煮麻黃減二升掠去上沫內
諸藥煮取三升去滓溫分三服相去如炊三斗米頃令
盡汗出便愈忌海藻菘菜生葱酢桃李雀肉等 此出第六卷中此張仲景傷寒論方 ○通按千金作麻黃半兩萎蕤黃芩各二兩餘十味作各二兩爲異耳然此方者當以傷寒論爲正

集驗方五首
集驗療傷寒時氣溫疫頭痛壯熱脉盛始得一二日者方
眞丹砂末一兩
右一味以水一斗煮之取一升頓服之覆取汗忌生冷
物 千金同
又療疫氣傷寒三日以後不解者方
好豉一升綿裹 葱白切一升
右二味童子小便五升煮取二升分再服覆取汗神效
千金同

又療傷寒五六日斑出以後湯方
豬膽三合 雞子一枚 苦酒三合
右三物合和煎令三沸強人盡服之羸人煎六七沸分
爲兩服取汗出爲効 文仲備急千金同
又療傷寒七八日不解默默煩悶腹中有乾糞譫語大柴
胡湯方
柴胡 半夏湯洗各八兩 生薑四兩 知母
芍藥 大黃 萎蕤各二兩 甘草炙
一方加枳實四兩 黃芩二兩
右十味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日二服

忌海藻菘菜羊肉餳 范汪加人參三兩 崔氏同 千金用
芍藥不用枳實
又療傷寒熱病十日以上發汗不解及吐下後諸熱不除
及下利不止斑出方
大青四兩 甘草炙二兩 阿膠炙珠二兩 豉一升綿裹
右四味切以水八升煮二味取三升半去滓內豉煮三
沸去滓乃內膠令溶分溫三服欲盡更作當使有餘湯
祈當飲但除熱止吐下無毒忌海藻菘菜 肘後深師同 千
金翼同 出第二卷中
千金方六首 合一十一法

千金治傷寒頭痛項強四肢煩疼青膏方
當歸 芎藭 吳茱萸 附子
烏頭 莽草 蜀椒各三兩 白芷三兩
右八味切以淳苦酒漬再宿以豬脂四斤微火煎候白
芷色黃絞去滓以煖酒服棗核大三枚日三服取汗不
知稍增可服可摩如初得傷寒一日苦頭痛背強宜摩
之佳忌豬肉
又少陰病得病二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯
又少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯
又陽明証其人善忘必有畜血所以然者本有久瘀血故
令善忘雖大便堅反易色必黑宜抵當湯下之
又傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利者此爲有血
不可餘藥宜抵當丸
又太陽病身黃脉沉結少腹堅小便不利者此爲無血也
小便自利其人如狂者血證諦也宜抵當湯下之
又陽明病脉遲雖汗出不惡寒體必重短氣腹滿而喘有
潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此爲大便
已堅宜承氣湯主之若汗多而微發熱惡寒爲外未解宜
桂枝湯其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不大便可少
與承氣湯微和其胃氣勿令致大下

又陽明病潮熱微堅者可與承氣湯不堅者勿與之若不
大便六七日恐胃中有燥糞欲知之法可與小承氣湯若
腹中轉失氣者爲有燥糞乃可攻之若不轉失氣者此爲
但頭堅後溏不可攻之攻之必腹滿不能食欲飲水者即
噦其後發熱者必復堅與小承氣湯和之不轉失氣者愼
不可攻之
大實則譫語虛則鄭聲鄭聲重語也 直視譫語喘滿者死若下
利者亦死
又傷寒四五日脉沉喘滿沉爲在裏而反發汗津液越出
大便爲難表虛裏實久則譫語

承氣湯方

枳實（陳者五枚炙） 大黃（四兩） 芒硝（三合） 厚朴（半斤）

右四味切以水一斗先煮二味取五升內大黃更煮取二升去滓內芒硝更上微火一兩沸分溫再服得下餘勿服也

小承氣湯方

大黃（四兩） 厚朴（二兩炙） 枳實（大者三枚炙）

右三味切以水四升煮取一升二合去滓分溫再服若一服得利譫語止勿服之也

又抵當丸方

水蛭（熬二十枚） 桃仁（二十枚去皮尖雙仁） 蝱蟲（二十枚去足翅熬）

大黃（三兩）

右四味末下篩合分為四丸以水一升煮一丸取七合頓服晬時當下血不下仍須服之取血下為效

又抵當湯方

水蛭（熬三十枚） 桃仁（三十枚去皮） 蝱蟲（三十枚去足翅熬）

大黃（三兩）

右四味切以水五升煮取三升分為三服不下更服

又療傷寒頭痛壯熱百節疼痛湯方

柴胡 芍藥 梔子仁（各四兩） 知母（四兩）

香豉（一升綿裹） 石膏（八兩碎） 黃芩 大青

升麻 杏仁（去尖皮雙仁各三兩）

右十味切以水九升煮取二升七合分三服若熱盛者加大黃（四兩）（出第十卷中）

千金翼方一十三首（合一十三法）

千金翼療少陰病一二日口中和其背惡寒者當灸之服附子湯方

大附子（一枚炮） 茯苓 芍藥（各三兩） 人參（二兩）

白朮（四兩）

右五味切以水八升煮取三升溫服一升日三服忌豬

肉桃李雀肉酢

又療少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯方

甘草湯方

甘草（二兩）

右一味切以水三升煮取一升半服七合日三服忌海藻菘菜

又桔梗湯方

大桔梗（一兩） 甘草（炙二兩）

右二味切以水三升煮取一升分兩服吐膿血差忌豬

肉海藻菘菜

又療少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止而便膿血桃華湯方

赤石脂（一斤一半全用綿裹一半篩末）　乾薑（一兩切）　粳米（一升）

右三味以水七升煮取米熟去滓取七合內赤石脂末一方寸匕日三服（傷寒論千金崔氏范汪同）

又療少陰病得之二三日已上心中煩不得臥者黃連阿膠湯主之方

黃連（四兩）　黃芩（一兩）　雞子中黃（二枚）　芍藥（二兩）　阿膠（三兩炙一云三片）

右五味切以水六升先煮三味取二升去滓內阿膠煮烊盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服忌豬肉冷水（并出第十一卷中）

又療傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞堅或心下悸小便不利或不渴外有微熱或欬小柴胡湯方

柴胡（八兩）　半夏（洗半斤）　生薑　黃芩　人參　甘草（炙各三兩）　大棗（擘十二枚）

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服但胸中煩而不嘔者去半夏人參加栝樓實一枚若渴者去半夏加人參合前成四兩半栝樓根四兩若腹中痛者去黃芩加芍藥三兩若脅下痞堅者去大棗加牡蠣六兩若心下悸小便不利者去黃芩加茯苓四兩若不渴外有微熱者去人參加桂心三兩溫覆取微汗若欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾薑二兩忌羊肉餳海藻菘菜（崔氏深師同）

又療傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛此爲未解梔子豉湯方

肥梔子（十四枚擘）　香豉（四合綿裹）

右二味以水四升先煮梔子取二升半去滓內豉更煮取一升半去滓溫分再服若一服得吐餘更勿服之若嘔者用後梔子加生薑湯（傷寒論傷寒論忽悶傷寒勞痺不得眠）

又梔子生薑湯方

肥梔子（十四枚擘）　香豉（四合）　生薑（五兩切）

右三味以水四升煮梔子生薑取二升半去滓內豉更煮取一升半去滓溫分再服若一服安即勿服（傷寒論虛煩不得眠耳）

又傷寒六七日結胷熱實其脉沉緊心下痛按之如石堅宜陷胷湯主之方

大黃六兩切　甘遂末一錢　芒硝一升

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒硝煮一二沸乃內甘遂小溫分再服得快利止後服

又傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯主之

又諸亡血家不可與白虎湯虛者亦不可與李得之腹痛而利者但可溫之

又傷寒無大熱而口乾渴心煩其背微惡寒者白虎湯主之

又傷寒脈浮發熱無汗其表不解者不可與白虎湯渴欲飲水無表證者白虎湯主之方

知母六兩　石膏一斤碎綿裹　甘草二兩炙　粳米六合

右四味切以水一斗二升煮取米熟去米內藥煮取六升去滓分六服日三服忌海藻菘菜千金傷寒論備急文仲崔氏范汪經心錄同諸家無療天行之病

又白虎加人參湯方

石膏　粳米各一升　知母六兩　人參二兩

甘草二兩炙

右五味切以水一斗二升煮米熟內藥煮取六升去滓分服一升日三服此方立秋後立春前不可行白虎湯正二三月時尚冷亦不可與服與之則嘔利而腹痛忌海藻菘菜

又療傷寒八九日下之後胸滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯方

柴胡四兩　黃芩　生薑　龍骨

人參　牡蠣熬　鉛丹　桂心

茯苓各一兩半　半夏一合半洗　大棗六枚擘　大黃二兩

右十二味切以水八升煮取四升內大黃切如博棊子煮取二升去滓溫分再服忌羊肉餳生葱酢物

又陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出其身無有劑頸而還小便不利渴引水漿此為瘀熱在裏身必發黃宜服茵蔯湯方

茵蔯六兩　大肥梔子十四枚擘　大黃二兩

右三味切以水一斗二升先煮茵蔯減六升去滓內諸藥煮取三升分三服小便當利如皂莢沫狀色正赤一宿腹減黃從小便去並出第九卷中

崔氏方一十五首

崔氏療傷寒始得一二日方

便可灸頂三壯又灸大椎三壯各加至五壯益良用

盡深妙字作赤

之驗大椎平肩斜齊高大者是也仍不得侵項分取
之則非也上接項骨下肩齊在椎骨節上是餘穴盡
在節下凡灸刺不得失之毫釐今崔氏不定高下是
以言之出黃帝鍼灸經
又療傷寒一日至三日可發汗度瘴散方
麻黃十分去節 桔梗 蜀椒汗 細辛
白朮 吳茱萸 防風各四分 烏頭炮
乾薑 桂心各五分
右十味擣篩為散溫酒服方寸匕溫覆取汗或數服得
汗即止若得病一二日而輒者服此藥皆得汗解若得

便覺者頗不能解也然可以二大豆許著鼻孔中覺燥
涕出一日可二四著必愈兼辟天行病忌豬肉生蔥生
菜桃李雀肉等
又療傷寒敕色惡寒發熱體疼發汗神丹丸方
人參五分 烏頭四分炮 半夏五分洗 茯苓五分
朱砂一分研 附子四分炮
右六味擣為末蜜和丸如大豆每服三丸生薑湯下發
汗出令體中濈濈然如汗未出更以熱粥投之令汗出
若汗少不解復如前法若得汗足不解當服桂枝湯此
藥多毒飲水解其熱愈周護軍子期自說天行用之甚

良故記之忌豬羊肉大酢生血等物明繁范汪同第十五
天行
又療傷寒服度瘴散而不汗出者便作蔥豉湯方
蔥十四莖 豉一升綿裹
右二味以水三升煮取一升頓服溫覆取汗出勝度
瘴散也與前肘後方重
又療傷寒服蔥豉湯不得汗可服葛根湯方
蔥白十四莖 豉一升綿裹 葛根三兩切
右三味以水五升煮取二升分為再服溫覆取汗汗不
出更服尒時用此一服輒汗略不再服救數十人甚效

又療傷寒前府直更用虎服葛根湯再服不得汗余更
還之甚思爽內物急更思作麻黃湯以解之方
麻黃一兩去節 葛根三兩 蔥白十四莖 豉一升綿裹
右四味切以水七升煮取二升半分三服虎再服快汗
愈具疹與周虎相似者服之皆汗十餘人差
又療傷寒阮河南蒸法
薪火燒地良久掃除去火可以水小灑取蠶沙若桃
葉桑柘葉諸禾糠及麥麩皆可取用易得者牛馬糞
亦可用但臭耳桃葉欲落時可益收取乾之以此等
物著火處令厚二三寸布席臥上溫覆用此發汗汗

皆出若過熱當細消息大熱者可重席汗出周身輒便止當以溫粉粉身勿令遇風

又療傷寒三五日疑有黃則宜服此油方

取生烏麻清油一盞水半盞以雞子白一枚和之熟攪令相得作一服令盡

又小前胡湯療傷寒六七日不解寒熱往來胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔寒疝腹痛方胡洽云出張仲景

前胡八兩 半夏半升洗 生薑五兩 黃芩

人參 甘草各三兩炙 乾棗十二枚擘

右七味切以水一斗煮取三升分四服忌羊肉餳海藻

菘菜古今錄驗同○[illegible]

又療傷寒或始得至七八日不大便或四五日後不大便或下後秘塞者承氣湯方

厚朴炙 大黃各三兩 枳實六片炙

右三味切以水五升煮取二升體強者服一升羸者服七合得下必效止范汪同

又若胃中有燥糞令人錯語正熱盛亦令人錯語若秘而錯語者宜服承氣湯通利而錯語者宜服下四味黃連除[illegible]承氣湯舊用芒硝余以有毒故去之用之數年安穩得下良既服湯亦應外用生薑兌一作鋋使必去燥糞若服湯兼兌而並不得下者可依本方加芒硝一兩

又薑兌法

削生薑如小指長二寸鹽塗之內下部中立通

又方

以豬膽灌下部用亦立通張仲景傷寒論云豬膽和法醋少許灌穀道中

又前軍督護劉車者得時疾三日已汗解因飲酒復劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得臥余思作此黃連解毒湯方

黃連三兩 黃芩 黃蘗各二兩 梔子十四枚擘

右四味切以水六升煮取二升分二服一服目明再服進粥於此漸差余以療凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠皆佳傳語諸人用之亦效此直解熱毒除酷熱不必飲酒劇者此湯療五日中神效忌豬肉冷水

又大前胡湯療傷寒八九日不解心腹堅滿身體疼痛內外有熱煩嘔不安方胡洽云出張仲景

前胡半斤 半夏半升洗 生薑五兩 枳實八片炙

芍藥四兩 黃芩三兩 乾棗十二枚擘

右七味切以水一斗煮取三升分四服日三夜一服忌羊肉餳等物古今錄驗同○張仲景用柴胡不用前胡[illegible]大黃二兩不加大

范汪不名大柴胡湯

又凡少陰病寒多表無熱但苦煩憒默默而極不欲見光有時腹痛其脉沈細而不喜湯經日不差舊用四順湯余怪其熱不甚用也若少陰病下利而體猶有熱者可服黃連龍骨湯若已十餘日而下利不止手足微冷及無熱候者可服增損四順湯方（黃連龍骨湯見第三卷天行中）

甘草二兩炙　人參二兩　龍骨二兩

黃連　乾薑各二兩　附子中形者一枚炮去黑皮

右六味切以水六升煮取二升分再服不差復作甚良若下而腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮一兩忌海藻菘

菜豬肉冷水

又療少陰病二十日後下不止可服陟釐丸范汪方

陟釐四兩　當歸四兩　漢防已二兩　黃連二兩

紫石英二兩研別擣末細　豉二升　厚朴二兩炙

苦酒五升

右八味切以二升苦酒漬防已一宿出切炙之燥復內苦酒中盡止又以三升苦酒漬豉一宿小蒸之研絞取汁擣下篩諸藥以酒豉汁和之丸如梧桐子大冷漿水服二十丸丸極燥乃可服之忌豬肉冷水（並出第一卷中）

張文仲方一十首

張文仲葛氏療傷寒及溫病頭痛壯熱脉盛始得一二日方

破雞子一枚著冷水半升中攪令相得別煮一升水令沸以雞子水投其湯中急攪調適寒溫頓服覆取汗（備急同）

又療傷寒二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡半斤　人參　甘草炙　黃芩

生薑各二兩　半夏五合洗　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煮取三升分三服微覆取汗

半日便差不差更服一劑忌羊肉餳海藻菘菜（備急文仲范汪千金翼方同）

又療傷寒溫病等三日以上胷中滿陶氏云若傷寒溫病已三四日胷中惡欲令吐者服酒膽方

苦酒半升　豬膽一枚

右二味和盡服之吐則愈神驗支云去毒氣妙（肘後備急千金同）

又療傷寒疫熱方凡胷中惡痰飲傷寒熱病瘴瘧須吐者方

豉末一大匙

右一味以生熟湯調下須臾則吐吐不快明旦更服佳
良備急同
又瓜蔕散主傷寒胷中痞塞宜吐之方
瓜蔕 赤小豆各一兩
右二味擣散白湯服一錢七取得吐去病差止備急經
心錄范汪同
又療傷寒已四五日頭痛體痛肉熱如火病入腸胃宜利
瀉之方
生麥門冬一升去心 生地黃一升切 知母二兩
生薑五兩切 芒消二兩半

右五味以水八升煮取二升半內芒消煎五沸分五服
取利為度忌蕪荑備急同
又療傷寒五日以上宜取下利陶氏云若汗出大便堅而
譫語方
大黃四兩 厚朴二兩炙 枳實四枚炙
右三味以水四升煮取一升二合分兩服通者一服止
此是仲景方備急范汪同與前千金崔氏方同
又療傷寒八九日不差名為敗傷寒諸藥不能消者方
鼈甲炙 蜀升麻 前胡 烏梅
枳實炙 犀角屑 黃芩各二兩 甘草一兩炙

生地黃八合
右九味切以水七升煮取二升半分五服日三服夜二
服 忌海藻菘菜莧菜蕪荑備急方同
又若十餘日不大便者服承氣丸方
大黃 杏人各二兩去皮尖 枳實一兩炙 芒消一合
右四味擣下篩蜜和丸如彈子以生薑湯六七合研一
丸服之須臾即通不通更服一丸取通為度備急同
又療晚發傷寒三月至年末為晚發方
生地黃一斤打碎 梔子二十枚擘 升麻二兩
柴胡 石膏各五兩

右五味切以水八升煮取三升分五服頻頻服若不解
更服若頭面赤去石膏用乾葛四兩無地黃用豉一升
煮取二升分三服忌蕪荑備急同並出第二卷中
古今錄驗方八首
古今錄驗陽毒湯療傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下
之後變成陽毒身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見神
鬼或吐血下利其脈浮大數面赤斑斑如錦文喉咽痛唾
膿血五日可療至七日不可療也宜服升麻湯方
升麻二分 當歸二分 蜀椒一分汗 雄黃研
梔子 桂心各一分 甘草一分炙 鼈甲大如手一片炙

右八味切以水五升煮取二升半分三服如人行五里久再服溫覆手足汗出則汗汗出則解不解重作服亦取得吐佳陰毒去雄黃忌海藻菘菜生葱莧菜（張仲景方無桂子桂心陰毒去雄黃蜀椒）

又陰毒湯療傷寒初病一二日便結成陰毒或服湯藥六七日以上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛喉咽不利毒氣攻心心下堅強短氣不得息嘔逆唇青面黑四肢厥冷其脈沉細緊數（一本無數字）仲景云此陰毒之候身如被打五六日可療至七日不可療宜服甘草湯方

甘草（炙） 升麻 當歸（各一分） 蜀椒（一分出汗）

鼈甲（一大如手片炙）

右五味切以水五升煮取二升半分再服如人行五里頃復服溫覆當出汗汗出則愈若不得汗則不解當重服令汗出忌海藻菘菜莧菜（千金集驗備急文仲小品肘後同出第二卷中）

又還魂丸療傷寒四五日及數年諸癖結堅心下飲食不消目眩四肢疼咽喉不利壯熱脾胃逆滿腸鳴兩脇裏急殘尸鬼注邪氣或爲驚恐傷瘦背痛手足不仁口苦舌燥天行發作有時風溫不能久住吐惡水方

巴豆（去心皮熬） 甘草（炙） 朱砂 芍藥（各二兩）

麥門冬（二兩去心）

右五味各擣下篩合和以蜜擣三千下丸如梧桐子大每服兩丸葱棗湯下小兒二歲以上服如麻子大二丸日二服忌海藻菘菜野豬肉蘆筍生血物（出第三卷中）

又麥奴丸療傷寒五六日以上不解熱在胸中口噤不能言唯欲飲水爲敗傷寒醫所不療方

麻黃（去節） 大黃 芒消 竈突中墨

黃芩（各二分） 麥奴 梁上塵 釜底墨（各一分）

右八味擣篩蜜和如彈丸以新汲水五合研一丸病者渴欲飲水但極飲冷水不節升數須臾當寒寒訖汗出則愈若日移五丈不汗依前法服一丸以微利止藥勢

盡乃食當冷食以除藥勢一名黑奴丸小麥黑勃名爲麥奴是也（肘後兩治小品刪繁文仲深師范汪經心錄崔氏通同）

又解肌湯療傷寒發熱身體疼痛方

葛根（四兩） 麻黃（去節） 茯苓（各三兩） 牡蠣（二兩熬）

右四味切以水八升煮取三升分三服徐徐服之得汗通則止忌醋物（千金有生甘草）

又調中湯療夏月及初秋忽有暴寒折於盛熱熱結四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下痢或血或水或赤帶下壯熱且悶脈微且數宜下之方

大黃 葛根 黃芩 芍藥

桔梗　茯苓　藁本　白术

甘草各二兩炙

右九味以水九升煮取三升分三服服別相去二食久勿以食隔須取快下壯熱便歇其下亦止也凡秋夏早熱積日忽有暴寒折之熱無可散喜搏著肌中作壯熱氣也胃為六腑之長最易得傷非忽暴寒傷之而下也虛冷人則不在壯熱但下痢或霍亂也少實人有服五石人喜壯熱其適與藥吃斷下則加熱喜悶而死矣亦有不止便作𧏾熱毒壯熱甚不歇則劇是以宜此調中湯下之和其胃氣其表熱者宜前胡大黃下之也忌海

藻菘菜豬肉酢物桃李雀肉等

又療往來寒熱胸脅逆滿桃人承氣湯方

大黃四兩別漬　甘草炙　芒消湯成下

桂心各二兩　桃人五十枚去皮尖碎

右五味以水七升煮取二升半去滓內芒消更煎一兩沸溫分三服忌海藻菘菜大醫校尉史脫方肘後傷寒論千金翼同並出第二卷中

雜療傷寒湯散丸方八首並是論中所要者

范汪療傷寒敕色頭痛頸強賊風走風黃膏方

大黃　附子　細辛　乾薑

蜀椒去目　桂心各一兩　巴豆好者五十枚去皮

右七味各切以淳苦酒漬藥一宿以臘月豬脂一斤煎之調適其火三上三下藥成傷寒敕色發熱酒服如梧桐子許又以摩身數百遍兼療賊風絕良風走肌膚追風所在摩之已用有效此趙泉方千金同忌野豬肉生葱生菜蘆筍

又療傷寒白膏摩體中手當千遍藥力方行并療惡瘡小兒頭瘡牛領馬鞍皆療之先以鹽湯洗惡瘡布拭之著膏瘡肺上摩向火手遍日再自消方

天雄　烏頭炮　莽草　羊躑躅各三兩

右四味各切以苦酒三升漬一宿作東向露竈又作十

二聚土各一升許成煎豬脂三斤著銅器中加竈上炊以葦薪為火令膏釋內所漬藥炊令沸下著土聚上沸定頃上火煎如此十二過令土聚盡遍藥成絞去滓傷寒頭痛酒服如杏核一枚溫覆取汗咽痛含如棗核日三咽之不可近目千金同忌豬肉等

又崔文行解散療傷寒發熱者方一名皮膚散

烏頭一斤燒　桔梗　細辛各四兩　白术八兩

右四味擣散皆令盡若中寒服一錢匕覆取汗若不覺復少增服之以知為度時氣不和旦服錢五匕辟惡氣欲省病服一服皆酒服忌生菜豬肉桃李雀肉等千金同

又六味青散療傷寒勑色惡寒者方勑通作赤

烏頭炮　桔梗　白朮各十五分

附子炮五分　防風　細辛

右六味擣篩爲散溫酒服錢五匕不知稍增服後食頃不汗出者飲薄薄粥一升以發之溫覆汗出濈濈可也勿令流離勿出手足也汗微出勿粉若汗大出不止溫粉粉之不得汗者當更服之得汗而不解當服神丹丸忌生菜豬肉桃李雀肉等千金同

又服桂枝湯大汗出後脈洪大者與桂枝湯如前法若形如瘧一日再發者汗出便解屬桂枝二麻黃一湯主之方

桂心一兩十七銖　杏人十六枚去尖皮　芍藥一兩六銖　麻黃十六銖去節

生薑一兩六銖切　甘草一兩二銖炙　大棗五枚擘

右七味切以水五升先煑麻黃一兩沸掠去沫乃內諸藥煑得二升去滓溫服一升日再本云桂枝湯二分麻黃湯一分合爲二升分再服今合爲一方忌海藻菘菜生葱本張仲景傷寒論方崔氏療天行

又療傷寒及天行瓜蔕散吐方

赤小豆一兩　瓜蔕一兩

右二味擣作散溫湯二合服一錢匕藥下便臥若吐便且急忍也候食頃不吐者取錢五匕散二合湯和服之便吐矣不吐復稍增以吐爲度吐出青黃如菜汁者五升以上爲佳若吐少病不除者明日如前法復服之可至再三不令人虛也藥力過時不吐服湯一升助藥力也吐出便可食無復餘毒若服藥過多者益飲冷水解之張前發文仲方重

又療傷寒熱病辟毒氣疫病七味赤散方

朱砂　烏頭炮各二兩　細辛　躑躅

乾薑　白朮各一兩　栝樓一兩半

右藥擣散服半錢匕用酒調服汗出解不解增至一錢匕除邪氣消疫癘忌桃李雀肉生菜豬肉生血等物出第二十一卷中

又療傷寒雪煎方

麻黃十斤去節　杏人一升去雙人尖皮熬擣如膏　大黃一斤十三兩金色者各細剉

右三味以雪水五石四斗漬麻黃於東向竈釜中三宿入大黃攪調炊以桑薪煑至二石去滓復於釜中下杏人脂煎至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三斗合煎得二斗六升其藥已成可丸如彈子大有病者以三沸白湯五合研一丸入湯中適寒溫服立汗出若不愈者復服一丸密封藥勿令泄氣也此本出第三卷中千金同

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元較正

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第一卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二卷目錄 傷寒下二十一門

傷寒中風方九首

傷寒結胷方七首

傷寒嘔噦方一十四首

傷寒喉咽痛方八首

傷寒吐唾血及下血方三首

傷寒衄血方四首

傷寒煩渴方九首

傷寒癖實及宿食不消方二首

傷寒春冬欬嗽方三首

傷寒攻目生瘡兼赤白瞖方六首

傷寒口瘡方二首

傷寒手足欲脫疼痛方八首

傷寒虛羸方四首

傷寒不得眠方四首

傷寒小便不利方九首

傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首

傷寒䘌瘡方一十首

傷寒陰陽易方八首

傷寒勞復食復方二十五首

傷寒百合病方七首
傷寒狐惑病方四首

唐王燾先生外臺秘要方第二卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等 上進

奉政大夫同知徽州府事歙陽許僩一彥父較

新安後學程衍道敬通父訂梓

傷寒中風方九首 臣億等按傷寒論傷寒中風自是兩疾今云傷寒中風非

病源中風傷寒之狀太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔此其候也

太陽中風以火刼發其汗邪風被火熱血氣流溢失其常度兩陽相熏灼其身即發黃陽盛則欲衄陰虛小便難陰

陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出劑頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則譫語 羌詞也本作譫 甚者至噦手足躁擾循衣摸牀小便利者其人可療

陽明中風口苦而咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮緊若下之則腹滿小便難

陽明病若能食爲中風不能食爲中寒

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下之則悸而驚

太陰中風四肢煩疼其脈陽微陰澀而長者爲欲愈

少陰中風其脈陽微陰浮者爲欲愈

厥陰中風其脉微浮者為欲愈不浮為未愈（仲景傷寒論同出第七卷）

仲景傷寒論桂枝湯療太陽中風陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出嗇嗇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔方

桂枝　芍藥　生薑各三兩　甘草二兩炙

大棗十二枚擘

右五味切薑擘棗次切餘藥以水七升煮棗令爛去滓乃內諸藥水少者益之煮令微微沸得三升去滓服一升日三小兒以意減之初一服便得汗出者後服小小

闊其間如不得汗者小小促之令其藥勢相及汗出自護如服六物青散法若病重者晝夜服特須避風若服一劑晬時不解病證不變者當更服之至有不肯汗出服二三劑乃愈服此藥食頃亦當飲熱粥以助藥力若初得病甚便以火發汗火氣太過汗出不解煩躁不得寐因此湯加龍骨牡蠣各三兩減桂心生薑各一兩不用芍藥若虛勞裏急腹中痛者取前桂枝湯二升加膠飴一升適寒溫分再服若得大汗出者只用桂枝二兩發汗後重發汗亡陽譫語其脉反和者不死發汗已解半日許重發煩其脉浮數可復發汗宜桂枝湯方忌海藻生葱菘菜等（在上卷中出第二卷中千金翼集驗文仲備急范汪同）

又療傷寒頭疼腰痛身體骨節疼發熱惡風汗不出而喘麻黃湯方

麻黃二兩去節　桂心一兩　甘草一兩炙　杏人七十枚去皮尖兩人者

右四味切以水九升煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去滓服八合覆取微汗不須歠粥餘如桂枝法將息忌海藻菘菜生葱（臣億等按張仲景傷寒論此方治傷寒不主中風若中風但可服前桂枝湯）

又療太陽病項背強几几反汗不出惡風者葛根湯方

葛根四兩　麻黃三兩去節　甘草二兩炙　芍藥

桂心各二兩　生薑三兩　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗煮麻黃葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗出不須喫熱粥助藥發汗餘將息依桂枝法忌海藻菘菜生葱（並出第三卷中張仲景傷寒論治中風汗出用桂枝此證云汗不出者用之所以異也）

小品萎蕤湯療冬溫及春月中風傷寒則發熱頭眩痛喉咽乾舌強胷內疼心胷痞結滿腰背強方

萎蕤二兩　石膏三分碎綿裹　白薇二兩　麻黃二兩去節

獨活二兩　杏人二兩去皮尖兩人　芎藭二兩　甘草二兩炙

青木香二兩無可以麝香一分代之

右九味切以水八升煮取三升分三服取汗若一寒一
熱者加朴消一分及大黃三兩下之忌海藻菘菜出第六卷中古今錄驗同一方有葛根二兩
千金療傷寒中風五六日已上但胷中煩乾嘔栝樓實湯
方
栝樓實一枚 柴胡半斤 黃芩二兩 甘草三兩炙
生薑四兩切 大棗十二枚擘破
右六味切之勿令大碎吹去末以水一斗二升煮得六
升絞去滓更煎取三升適寒温服一升日三服忌海藻
菘菜出第十卷中

千金翼療中風發熱六七日不解而煩有表裏證欲飲
水飲水而吐此為水逆五苓散主之方
豬苓三分 澤瀉五分 茯苓三分 桂心二分 白朮三分
右五味擣篩水服方寸匕日三多飲煖水汗出愈忌桃
李醋物生葱雀肉等
又傷寒中風醫反下之其人下利日數十行水穀不化腹
中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔心煩不能得安醫見心下痞
以為病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛
客氣上逆故使之堅甘草瀉心湯主之方
甘草四兩炙 黃芩三兩 大棗十二枚擘 黃連一兩

乾薑二兩 半夏半升洗
右六味切以水一斗煮取六升分六服忌海藻菘菜豬
羊肉餳此出第九卷中一方有人參三兩
古今錄驗療中風傷寒脈浮發熱往來汗出惡風頭頸強
鼻鳴乾嘔陽旦湯主之方
大棗十二枚擘 桂枝三兩 芍藥三兩 生薑三兩
甘草二兩炙 黃芩二兩
右六味㕮咀以泉水六升煮取四升分四服日三自汗
者去桂心加附子一枚炮渴者去桂加栝樓三兩利者
去芍藥桂加乾薑三兩附子一枚炮心下悸者去芍藥
加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦主之煎得二升內膠
飴半升分為再服若脈浮緊發熱者不可與也忌海藻
菘菜生葱等物千金同

又大青龍湯療太陽中風脈浮緊發熱惡寒身疼痛汗不
出而煩躁方
麻黃六兩去節 桂枝二兩 甘草二兩炙 石膏如雞子大碎綿裹
生薑三兩 杏人四十枚去兩人及尖皮 大棗十枚擘
右七味切以水九升先煮麻黃減二升去沫乃內諸藥
煮取三升去滓分服一升厚覆取微汗汗出多者温粉
粉之一服汗者不可再服若復服汗多亡陽遂虛惡風

瀋按以脉本是胎滑

煩燥不得眠也忌海藻菘菜生葱等物 並出第二卷中張仲景傷寒論

一云中風見傷寒脈者可服之

傷寒結胸方七首 二法一首

病源結胸者謂熱毒氣結聚於心胸也此由病發於陽而早下之熱氣乘虛而痞結不散也按之痛其脈寸口浮關上反自沉是也脈大不可下下之則死脈浮而大下之爲逆若陽脈浮關上細小沉緊而飲食如故時小便利者名爲藏結藏結病舌上白胎滑者爲難療不往來寒熱其人反靜舌上不胎者不可攻之 出第七卷中

張仲景傷寒論問曰病有結胸有藏結其狀如何答曰按

之痛寸脈浮關脈沉名結胸也問曰何謂藏結答曰如結胸狀飲食如故時時下利寸口脈浮關上小細而沉緊名藏結舌上白胎滑者爲難治藏結無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之 一作汗之 因作痞也所以成結胸者以下之太早故也

結胸證悉具煩躁者亦死

結胸證其脈浮大者不可下也下之則死

夫結胸病項亦強如柔痓狀下之則和宜大陷胸丸方

蜀大黃半斤 葶藶子半升熬 杏人半升去皮尖熬令赤黑色 芒消半升

右四味擣篩二味杏人合芒消研如泥和散合和丸如彈子大每服一丸用甘遂末一錢匕白蜜一兩水二升同煮取一升溫頓服之一宿乃自下如不下更服取下爲效 千金翼同

又太陽病脈浮動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛 一云頭痛 胃中空虛客熱動膈短氣煩躁心內懊憹陽氣內陷心下因堅則爲結胸大陷胸湯主之

若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃大陷胸湯方

蜀大黃六兩 甘遂末一錢七 芒消一升

右三味以水六升先煮大黃取二升去滓內芒消煮一兩沸內甘遂末溫服一升得快利止後服 千金翼同

又傷寒六七日結胸熱實脈沉緊心下痛按之石堅大陷胸湯主之方依前法

又結胸無大熱者此水結在胸脇也但頭微汗出者大陷胸湯主之方依前法

又傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯

大柴胡湯方

柴胡半斤 枳實四枚炙 生薑五兩 黃芩三兩

芍藥三兩 半夏半升洗 大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服一方加大黃二兩若不加大黃恐不名為大柴胡湯忌羊肉餳千金翼古今錄驗同

又太陽病二三日不能臥但欲起心下必結脈微弱者本有久寒也而反下之若利止者必作結胷未止者四日復下之此作協熱利也

又太陽病下之其脈促不結胷者此為欲解也若心下滿

鞕痛者此為結胷也大陷胷湯主之但滿而不痛者此為痞柴胡不中與之也宜半夏瀉心湯主之方

半夏半升洗 乾薑三兩 人參三兩 甘草三兩炙

黃連一兩 大棗十二枚擘 黃芩三兩

右七味切以水一斗煮取六升去滓溫服一升日三若須大陷胷湯服者如前法忌羊肉餳海藻菘菜豬肉冷水千金翼同一方半夏五兩

又小結胷病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷胷湯主之之方

黃連一兩上好者 栝樓實一枚大者破 半夏半升洗

右三味切以水六升煮栝樓實取三升去滓內諸藥煮取二升去滓溫分三服忌羊肉餳豬肉千金翼同

又病在太陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱却不得去彌更益煩皮上粟起意欲飲水而反不渴者服文蛤散若不差者與五苓散用前篇方士弱氏曰熱得冷水之氣斂退而後可也

又寒實結胷無熱證者與三物小陷胷湯方如前法白散亦可服

文蛤散方士弱氏曰簡安宗云無熱證者與三物白散小陷胷湯亦與白散亦寒書言乎

文蛤五兩

右一味擣篩為散以沸湯和一方寸匕服之湯用五合千金翼同

又白散方

桔梗三分 貝母三分 巴豆一分去心及皮熬令黑赤別研如脂

右三味擣篩更於臼內擣之以白飲和服強人半錢匕羸人減之病在膈上則吐在膈下則利利不止飲冷粥一杯止忌豬肉蘆笋等並出第四卷中千金翼同

傷寒嘔噦方一十四首

病源傷寒病後胃氣不和此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥以下及飲冷水病折以後熱勢既退冷氣乃動故便心下堅牢噫噦食臭腹內雷鳴而泄利此由脾胃氣虛冷

故也出第八卷中

仲景傷寒論療嘔噦心下悸痞鞕不能食小半夏湯方

半夏洗一升　生薑八兩去皮

右二味切以水七升煮取一升半去滓分再服忌羊肉餳

又療嘔噦心下痞鞕者以膈間有水頭眩悸半夏加茯苓湯方

半夏洗一升　生薑八兩去皮　茯苓三兩

右三味切以水七升煮取一升半去滓溫分再服忌羊肉餳酢等物

又療胸內似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中憒憒然徹無聊賴者生薑汁半夏湯兼主天行方

生薑汁一升　半夏半升洗切

右一味以水三升煎半夏取一升內薑汁取一升半綿濾小冷分二服一日一夜服令盡嘔噦一服得止者停後服忌羊肉餳救急同

又療乾嘔噦若手足厥冷者小橘皮湯兼主天行方

橘皮四兩　生薑八兩去皮

右二味狹長切以水七升煮取三升去滓小冷服一升下咽則愈救急同出第十六卷中

深師療傷寒病噦不止甘草湯方兼主天行

甘草三兩炙　橘皮三兩

右二味切以水五升煮取一升去滓頓服之日三四服取差忌海藻菘菜崔氏同

又半夏散方

半夏洗焙乾

右一味末之生薑湯和服一錢匕忌羊肉餳等

又赤蘇湯方

赤蘇一把

右一味水三升煮取一升去滓稍稍飲之肘後同

又乾薑丸方

乾薑六分　附子四分炮

右二味擣篩以苦酒丸如梧子服三丸日三服酒飲下皆得忌猪肉肘後同

又療傷寒噦甘竹茹湯方

甘竹茹四兩　生白米一升

右二味以水八升煮之取米熟湯成去滓分服徐徐服療風熱氣噦甚神驗諸噦亦佳

又療傷寒嘔噦胃滿虛煩不安大橘皮湯方

橘皮一兩　甘草一兩炙　生薑四兩　人參二兩

右四味切以水六升煮取二升去滓分三服忌海藻菘
菜出第十四卷中
小品茅根橘皮湯療春夏天行傷寒胃冷變噦方
白茅根一升切 橘皮三兩 桂心二兩切
右三味切以水六升煮取三升去滓溫分三服數數服
之盡復合之噦止乃停取微汗有熱減桂心一兩忌生
葱文仲同出第六卷中 一方有葛根二兩
千金療傷寒後嘔噦及乾嘔不下食生蘆根飲方
生蘆根一升切 青竹茹一升 粳米三合 生薑二兩切
右四味以水七升先煮千里鞋底一隻取五升澄清下
藥煮取二升半去滓隨意便飲不差重作

又療傷寒後嘔噦通草湯方
通草三兩 生蘆根一升切 橘皮一兩 粳米三合
右四味切以水五升煮取二升去滓隨意便稍飲不差
更作取差止古今錄驗文仲同出第十卷中
千金療乾嘔吐涎沫而頭痛茱萸湯主之方
吳茱萸一升炒 大棗十二枚擘 生薑六兩切 人參三兩細剉
右四味以水五升煮取二升去滓分服七合日三仲景同出第十卷中此張仲景傷寒論方

傷寒咽喉痛方八首

病源傷寒病過經而不愈脈反沉遲手足厥逆者此為下
部脈不至陰陽隔絕邪客於足少陰之經毒氣上熏故喉
咽不利或痛而生瘡出第七卷中
仲景傷寒論少陰病咽喉痛者半夏散及湯主之方
半夏洗 甘草炙 桂心
右三味等分各擣篩畢更合擣之以白飲服方寸匕日
三服若不能服散者水一升煮七沸內散兩匕更煮三
沸下火令小冷少少含細嚥之半夏有毒不當散服之
忌羊肉生葱海藻菘菜餳千金翼同出第十六卷中
文仲療傷寒毒攻喉咽腫痛方兼主天行
切商陸炙令熱以布藉喉以熨布上冷復易之肘後同

又方
真閭茹爪甲大內口中以牙小齧汁以漬喉當微覺
異為佳亦主天行肘後同
又附子丸方
附子炮 藜蘆等分
右二味末之蜜和丸服如梧子一枚欲下含黃蘗亦佳
忌豬肉狸肉肘後出第二卷中
深師貼喉膏療傷寒舌強喉痛方
蜜一升 甘草四兩 豬膏半斤

右三味微火煎甘草豬膏令數沸去滓乃內蜜溫令銷
相得如棗大含化稍稍咽之忌海藻菘菜 出第十四卷中
集驗療傷寒熱病喉中痛閉塞不通烏扇膏方
生烏扇一斤切 豬脂一斤
右二味合煎烏扇藥成去滓取如半雞子薄綿裹之內
口中稍稍咽之取差忌酒蒜等物 張文仲千金翼同
又升麻湯方
升麻三兩 通草四兩 射干二兩 羚羊角二兩屑
芍藥三兩 生蘆根一升切
右六味切以水七升煮取二升半去滓分為三服徐徐

服 千金古今錄驗同 並出第二卷中
千金治傷寒熱病後口乾多唾咽痛乾棗丸方
乾棗二十枚 烏梅十枚
右二味擣合蜜和丸如杏核大綿裹含化嚥津自愈 出第十卷中
傷寒吐唾血及下血方三首
病源此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使熱
毒入深結於五藏內有瘀積故吐血 出第八卷中
仲景傷寒論吐血不止者柏葉湯主之方
青柏葉三兩 乾薑三兩切 艾三把

右三味以水五升煮取一升去滓別絞取新出馬通汁
一升相和合煎取一升綿濾之溫分再服馬通是馬屎
汁也 一方有阿膠無艾
又吐血下血黃土湯主之方
釜竈下黃焦土半斤綿裹 甘草三兩炙 乾地黃三兩
白朮三兩 附子三兩炮破 阿膠三兩炙 黃芩三兩
右七味切以水八升煮六味取二升去滓內膠令烊分
三服忌海藻菘菜蕪荑豬肉桃李雀肉等物 並出第十六卷中
古今錄驗蒲黃湯療傷寒溫病天行疫毒及酒客熱傷中
吐血不止面黃乾嘔心煩方

蒲黃 桑寄生 桔梗一作桔樓 犀角屑
甘草各二兩炙 葛根三兩
右六味切以水七升煮取三升去滓分三服徐徐服之
忌海藻菘菜豬肉 出第三卷中
傷寒衄血方四首
病源傷寒病衄血者此由五藏熱結所為也心主血肝藏
血熱邪傷於心肝故衄血也衄者鼻出血也肺主氣而開
竅於鼻血隨氣行所以從鼻出陽明病口燥但欲漱水不
欲嚥者此必衄衄家不可攻其表汗出額上陷急而緊直
視而不能眴不得眠亡血不可攻其表汗出則寒慄而振

脉浮緊發熱其身無汗自衄者愈 出第八卷中

肘後療傷寒大病差後小勞便鼻衄牡蠣散及丸方

左顧牡蠣十分熬　石膏五分

右二味擣末酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子大酒服十五丸 集驗千金翼同出第二卷中

小品芍藥地黃湯療傷寒及溫病應發汗而不發之內瘀有蓄血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血面黃大便黑者此主消化瘀血

芍藥三分　地黃半斤　丹皮一兩　犀角屑一兩

右四味切以水一斗煮取四升去滓溫服一升日二三

服有熱如狂者加黃芩二兩其人脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱不用黃芩

又茅花湯 療傷寒鼻衄不止主之方

茅花一大把

右以水八升煮取三升分三服即差若無茅花取茅根代之亦可

又麥門冬湯 療傷寒身熱衄血嘔逆主之方

麥門冬　石膏　寒水石各三兩　甘草二兩

桂心一兩

右五　切以水一斗煮取三升分三服

傷寒煩渴方九首

病源此由陰氣少陽氣勝故熱而煩滿也少陰病惡寒而踡時自煩欲去其衣被者可治也病脉已解而反發煩者病新差又強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈少陰病脉微細而沉但欲臥汗出不煩欲自吐五六日自利後煩躁不得臥寐者死發汗後下之脉平而少煩此新虛不勝穀氣故也又傷寒渴者由熱氣入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲 並出第七卷中

仲景傷寒論療傷寒汗出惡寒身熱大渴不止欲飲水二斗者白虎加人參湯主之方

知母六兩　石膏　粳米各一升　人參三兩

甘草二兩

右五味切以水一斗二升煮米熟去米內諸藥煮取六升去滓溫服一升日三忌海藻菘菜 出第十卷中小品同

又若脉浮發熱渴欲飲水小便不利者豬苓湯主之方

豬苓一兩去皮　茯苓一兩　阿膠一兩炙　滑石一兩碎綿裹

澤瀉一兩

右五味以水四升先煮四物取二升去滓內阿膠令烊銷溫服七合日三服忌醋物 千金翼同出第五卷中

范汪栝樓湯主渴飲方

栝樓根肉黄脉少者二兩

右一味切以水五升煮取一升分二服先以青淡竹瀝一升合水二升煮好銀二兩减半去銀先與病人飲之訖須臾後乃服栝樓湯其銀汁須冷服 出第二十卷中

千金療傷寒後結熱在内煩渴青葙子丸方

青葙子五兩　龍膽三兩　黄芩一兩　梔子人一兩

苦參一兩　黄檗二兩　栝樓一兩　黄連一兩

右八味擣篩為末蜜丸先食服如梧子七丸飲下日三不知稍增忌猪肉冷水 集驗同出第九卷中

深師黄芩人參湯療傷寒吐下後内外有熱煩渴不安方

黄芩　人參　甘草　桂心

生薑各一兩　大棗十五枚擘破

右六味切以水八升煮取二升分二服徐徐服忌菘菜海藻生葱等物

又療傷寒除熱止渴欲飲水栝樓根湯方

黄芩三兩　人參二兩　桂心二兩　大黄二兩

栝樓根四兩　芒消二兩　甘草二兩炙

右七味切以水八升煮取三升去滓飲一升須臾當下不下復飲一升得下止勿復飲湯藥力勢歇乃可食糜耳一方用生薑二兩忌海藻菘菜生葱油膩等物

又療傷寒下後除熱止渴五味麥門冬湯方

麥門冬去心　五味子　人參　甘草炙

石膏碎各一兩

右五味擣篩三指撮水一升二合煮令沸得四合盡服忌海藻菘菜 並出第十四卷中

古今錄驗黄龍湯療傷寒十餘日不解往來寒熱狀如溫瘧渴胸滿心腹痛方

半夏半升洗　生薑三兩　人參二兩　柴胡半斤

黄芩三兩　甘草三兩炙　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升

溫服一升日三服不嘔而渴去半夏加栝樓根四兩服如前忌羊肉餳海藻菘菜等物 出第三卷中一本仲景傷寒論方

又麥奴丸療傷寒苦渴煩滿欲死令極飲水法方

大黄二分　消石二分熬　釜底墨一分　竈突中墨一分

黄芩一分　梁上塵一分　竈中黄土一分　麻黄二分去節

梢介用芒消鍋黄土

右八味篩末蜜和如彈丸大取一丸著一盞水中盡用服之月自極飲水汗出得熱除矣一名黑奴丸一名駐車丸亦療溫瘧神良 並出第一卷中此方第一卷用下麥黑奴名黑奴丸

傷寒癖實及宿食不消方二首

病源此謂被下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛此爲胃中有乾糞挾宿食故也或先患寒癖因有宿食又感於傷寒熱氣相搏故宿食不消也（出第八卷中）

深師駃豉丸療傷寒留飲宿食不消一名續命丸方

黃芩（五兩） 大黃（五兩） 梔子人（十六枚） 黃連（五兩去毛）

豉（一升熬） 甘遂（三兩太山者） 麻黃（五兩去節） 芒消（二兩）

巴豆（一百枚去皮及心熬研）

右九味擣篩白蜜和丸如梧子服三丸以吐下爲度若不吐利加一丸一本有杏人七十枚忌豬肉冷水蘆筍肉（出第十四卷中范汪同）

古今錄驗續命丸療傷寒及癖實淡飲百病方

大黃（五兩） 黃連（一兩） 麻黃（五兩去節） 甘遂（三兩熬）

黃芩（二兩） 芒消（二兩研） 杏人（七十枚去皮尖熬） 巴豆（一百枚去心熬研）

豉（一升熬）

右九味擣篩蜜和丸得傷寒一日服一丸如小梧子大二日二丸至六七日六七丸但吐下得汗愈若未瘥及陵實服三五丸日一忌豬肉冷水蘆筍（范汪延年删繁同出第三卷中）

傷寒春冬欬嗽方三首

病源此由邪熱客於肺也上焦有熱其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽（出第八卷中）

小品射干湯主春冬傷寒秋夏中冷欬嗽曲拘不得氣息喉鳴啞失聲乾嗽無唾喉中如哽者方

射干（二兩） 半夏（五兩洗） 杏人（二兩去皮尖兩人） 乾薑（二兩炮）

甘草（二兩炙） 紫菀（二兩） 肉桂（二兩） 吳茱萸（二兩）

當歸（二兩） 橘皮（二兩） 麻黃（二兩去節） 獨活（二兩）

右十二味切以水一斗煮取三升去滓溫分三服始病一二日者可服此湯汗後重服勿汗也病久者初服可用大黃二兩初秋夏月暴雨冷及天行暴寒熱伏於內宜生薑四兩代乾薑除茱萸用枳實二兩炙忌羊肉海藻菘菜餳生葱（出第六卷中）

古今錄驗下氣橘皮湯療春冬傷寒秋夏冷濕欬嗽喉中鳴聲上氣不得下頭痛方

橘皮 紫菀 麻黃（去節） 杏人（去雙人尖皮）

當歸 桂枝 甘草（炙） 黃芩（各二分）

右八味切以水七升煮取三升分三服不差重合之忌海藻菘菜生葱（出第三卷中）

延年療傷寒骨節疼頭痛眼睛疼欬嗽知母湯方

知母（二兩） 貝母（三兩） 乾葛（三兩） 芍藥（三兩）

石膏（四兩碎） 黃芩（三兩） 杏人（一兩去皮尖及雙人） 梔子人（二兩擘）

右八味切以水七升煮取二升五合去滓分爲三服如

人行八九里再服忌蒜麪七日出第九卷中

傷寒攻目生瘡兼赤白瞖方六首

病源目者藏腑之精華肝之外候也傷寒熱毒壅滯熏蒸於肝上攻於目則令目赤腫痛若毒氣盛者眼生瞖膜又肝開竅於目肝氣虛熱乘虛上衝於目故目赤痛重者生瘀瞖白膜息肉出第八卷中

肘後療傷寒大病後熱毒攻目方

煮蜂房以洗之日六七度張文仲同

又方

冷水漬青布以掩目張文仲同

又療熱病後生瞖方

燒豉二七粒末內管中以吹之並出第二卷中文仲備急同

小品漏蘆連翹湯療傷寒熱毒變作赤色癰疽丹瘮腫毒及眼赤痛生障瞖悉主之方兼療天行

漏蘆二兩 連翹二兩 黃芩二兩 麻黃二兩去節

白歛二兩 升麻二兩 甘草二兩炙 大黃三兩切

枳實三兩炙

右九味切以水九升煮取三升去滓溫分三服相去二食頃更服熱盛者可加芒消二兩忌海藻菘菜等物千金同

又秦皮湯療毒病衝眼忽生赤瞖或白或腫膚起或赤痛不得視光痛入心肝或眼外浮腫如吹汁出生膜覆珠子方

秦皮二兩 前胡二兩 常山二兩 黃芩二兩

升麻二兩 芍藥二兩 白薇二兩 枳實二兩炙

大黃三兩 甘草二兩炙

右十味以水八升煮取三升分三服相去二食頃更服若盛熱者可加芒消二兩忌海藻菘菜生葱生菜出第六卷中一方加葳蕤一兩梔子人半兩

范汪文仲秦皮湯主傷寒病熱毒氣入眼生赤脈赤膜白膚白瞖者及赤痛不得見光痛毒煩惱者神効方

秦皮 升麻 黃連各一兩

右三味切以水洗去塵用水四升煮取二升半冷之分用三合仰眼以綿繞筋頭取湯以滴眼中如屋漏狀盡二合止須臾復用日五六遍乃佳忌豬肉冷水出第二卷中

傷寒口瘡方二首

病源夫傷寒冬時發其汗必吐利口中爛生瘡以其熱毒在藏心脾煩壅表裏俱熱熱不已毒氣熏於上焦故令口舌乾燥生瘡也出第七卷中

深師療傷寒熱病口瘡黃蘗蜜方

黃蘗削去上皮取裏好處薄切

右一味以崖蜜半斤極消者以漬蘗一宿惟欲令濃含其汁良久吐之更復如前若胷中熱有瘡時飲三五合尤良

又療傷寒口瘡爛者升麻湯方

升麻一兩　甘草一兩炙　竹葉五合切　麥門冬三分去心

牡丹一分　乾棗二十枚擘

右六味切以水四升煮取一升半去滓分五服含稍稍咽之爲度忌海藻菘菜胡荽等　並出第十四卷中

傷寒手足欲脫疼痛方七首

病源此由熱毒氣從內而出循經絡攻於手足也人五藏六腑井榮俞皆出於手足指故毒從藏腑而出也　出第八卷中

范汪療傷寒熱病手足腫欲脫方

生牛肉裹之腫消痛止　出第三十卷中深師同

甘氏療傷寒手足熱疼欲脫方

取羊屎煮汁以淋之差止亦療時疾陰囊及莖腫亦可煮黃蘗洗之　肘後深師集驗千金備急並同出第卷中

集驗療毒熱攻手足腫疼欲脫方

濃煮虎杖根適寒溫以漬手足入至踝上一尺　集驗天行范汪肘後千金同

又方

酒煮苦參以漬之　范汪千金集驗同並出第二卷中

千金療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方

煮馬糞若羊糞汁漬之豬膏和羊糞塗之亦佳　范汪集驗肘後同

又方

取常思草絞取汁以漬之一名蒼耳　范汪集驗肘後同出第卷中

備急療熱病手足腫欲脫者方兼主天行

以稻穰灰汁漬之佳　集驗千金肘後同出第一卷中

傷寒虛羸方四首

病源其人血氣先虛復爲虛邪所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭絕熱邪始散真氣尚少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生病焉　出第八卷中

集驗療傷寒虛羸少氣氣逆苦嘔吐方

石膏一斤碎綿裹　竹葉一把　麥門冬一升去心　人參二兩

半夏一升洗　生薑四兩　甘草二兩炙

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓內粳米一升米熟去米飲一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳　出第三卷中

又生地黃湯療傷寒有熱虛羸少氣心下滿胃中有宿食大便不利方

生地黃三斤 大黃四兩 大棗二十枚擘 甘草二兩炙
芒消二合
右五味合搗令相得蒸五升米下熟絞取汁分再服忌
海藻菘菜 出第二卷中
千金療傷寒虛羸少氣嘔吐竹葉石膏湯方
石膏一斤碎綿裹 竹葉一把 麥門冬一升去心 人參二兩
半夏半升洗 甘草二兩
右六味以水一斗煮取六升去滓內粳米一升煮米熟
去米飲一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳 此仲景傷寒論方

又文仲梔子豉湯療吐下後虛羸欲死方
梔子十四枚 豉四合綿裹
右二味以水五升先煮梔子取二升內豉又煮三四沸
去滓分再服 文仲同此出第二卷中集驗備急同名用梔子十四枚
傷寒不得眠方四首
病源夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥謂陽氣
盡陰氣盛則目瞑矣今熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛
陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也 出第八卷
中
仲景傷寒論療傷寒發汗若吐下後虛煩不得眠劇則反
覆顛倒心內苦痛懊憹者屬梔子豉湯證方
肥梔子十四枚擘 香豉四合綿裹
右二物以水四升先煮梔子取二升半去滓內豉更煮
取一升半去豉分溫再服得吐止後服
肘後療大病差後虛煩不得眠腹中疼痛懊憹烏梅豉湯
方
豉七合綿裹 烏梅十四枚擘
右二物以水四升先煮烏梅取二升半內豉更煮取一升
半去滓溫分再服無烏梅用梔子十四枚
又半夏茯苓湯方

半夏三兩洗 秫米一升 茯苓四兩
右三味切以千里流水一石揚之萬遍澄取二斗合煮
諸藥得五升去滓溫分五服忌羊肉餳酢等物 並出第一卷中
深師酸棗湯療傷寒及吐下後心煩乏氣晝夜不眠方
酸棗人四升 麥門冬一升去心 甘草二兩炙 知母二兩
茯苓二兩 芎藭二兩 乾薑三兩
右七味切以水一斗六升煮酸棗取一斗去棗內藥煮
取三升去滓溫分三服忌海藻菘菜大酢 出第十四卷中
傷寒小便不利方九首
病源傷寒發汗後而汗出不止津液少胃中極乾小腸有

伏熱故小便不通也 出第八卷中

仲景傷寒論少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣或欬或小便自利或下利或嘔者真武湯主之方

伏苓三兩 白芍藥三兩 附子二枚炮去皮破八片 白朮三兩

生薑三兩去皮

右五味切以水八升煮取三升去滓溫服七合日三若欬者加五味子半升細辛一兩乾薑一兩若小便自利者去伏苓若下利者去芍藥加乾薑二兩嘔者去附子加生薑足前成半斤忌酢豬肉桃李雀肉等 出第六卷中張仲景傷寒論同

天行大熱

又傷寒六七日已發汗而復下之胷脇滿結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此未解也屬小柴胡桂薑湯主之方

柴胡半斤 桂心三兩 黃芩三兩 牡蠣二兩熬

甘草二兩炙 栝樓根四兩 乾薑二兩

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三初一服微煩後汗出便愈忌生葱海藻菘菜 出第四卷中

又療傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵蔯湯主之方

茵蔯六兩 肥梔子十四枚擘 大黃二兩去皮酒洗破三片

右三味以水一斗二升先煮茵蔯減二升去滓內二物煮取三升去滓分溫三服日三小便當利尿如皂莢汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去 出第五卷中張文仲千金並同

又服桂枝湯或下之仍頭項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利者桂枝去桂加茯苓白朮湯主之方

芍藥 生薑切 白朮 茯苓各三兩

甘草二兩炙 大棗十二枚擘

右六味切以水八升煮取三升去滓溫服一升小便利則愈忌海藻菘菜酢桃李雀肉等

肘後療小腹滿不得小便方兼療天行

細末雄黃蜜和為丸如棗核內溺孔中令入半寸 出第二卷中 文仲同

千金翼療少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或洩利下重四逆散方

甘草十分炙 枳實十分炙 柴胡十分 芍藥十分

右四味擣細篩白飲和服方寸匕日三服欬者加五味子乾薑各五分并主下利悸者加桂心五分小便不利者加茯苓五分腹中痛者加附子一枚洩利下重

者先以水五升煮蕤二升取三升以散二方寸匕內湯
中煮之取一升半分再服忌海藻菘菜仲景范汪同出第十卷中
崔氏療傷寒熱盛小便不利滑石湯方兼療天行
滑石碎二兩 葶藶子一合熬
右二物以水二升煮取七合去滓頓服之
又方
擣生葱傅臍下橫文中燥則易之
又瞿麥湯方
瞿麥三兩 甘草三兩炙 滑石四兩 葵子二合半
石韋二兩去毛令盡

右五味切以水八升煮取二升半分三服忌海藻菘菜范汪第一卷中古今錄驗同
傷寒下痢及膿血黃赤方一十六首
病源傷寒病若表實裏虛熱氣乘虛而入攻於腸胃則下
黃赤汁若溫毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦或如爛
肉汁若寒毒入胃則腹滿身熱下清穀下清穀者不可攻
表汗出必脹滿表裏俱虛故也
傷寒六七日下利便發熱而痢其人汗出不止者死但有
陰無陽故也
下利有微熱其人渴脉弱者今自愈脉沉弦者下重其脉
大者為未止脉微數者為欲自止雖發熱不死少陰病八
九日而一身手足盡熱熱在膀胱必便血下利脉反浮數
尺中自濇其人必圊膿血少陰病下利若利自止惡寒而
欲蜷手足溫者可療陽明病下利其人脉浮大此皆為虛
弱強下之故也
傷寒下利日十餘行其人脉反實者死出第八卷中張仲景傷寒論陽明篇
下利溢不可下或有下下利其脉浮大者此皆為虛以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴當溫之與水即噦
仲景傷寒論傷寒本自寒下醫復吐之下之不解者寒格
更逆吐下食入還吐出者屬乾薑黃連人參湯主之方
乾薑 黃連 黃芩 人參各三兩

右四味切以水六升煮取二升去滓分再服之忌豬肉
冷水等出第六卷中
又太陽病桂枝證醫反下之利遂不止脉促者表未解也
喘而汗出者屬葛根黃連湯方
葛根八兩 黃連二兩金色者 黃芩三兩切 甘草二兩
右四味切以水八升先煮葛根減二升掠去沫內諸藥
煮取二升去滓溫分再服忌豬肉冷水海藻菘菜出第七卷
中
附後療傷寒若下膿血者赤石脂湯方
赤石脂二兩碎 乾薑二兩切 附子一兩炮破

右三味以水五升煮取三升去滓溫分三服後臍下痛者加當歸一兩芍藥二兩用水六升煮忌豬肉（范汪張文仲同）

又主下利不能食者兼療天行黃連丸方

黃連一兩　烏梅二十枚（炙燥）

右二味擣末蠟如棋子一枚蜜一升於微火煎令可丸如梧子一服十五丸日三忌豬肉冷水（出第一卷中）

又白通湯療傷寒泄痢不已口渴不得下食虛而煩方

大附子一枚（生削去黑皮破八片）　乾薑半兩（炮）　甘草半兩（炙）

葱白十四莖

右四味切以水三升煮取一升二合去滓溫分再服渴

微嘔心下停水者一方加犀角半兩大良忌海藻菘菜豬肉（范汪同出第十四卷中張仲景傷寒論白通湯唯主少陰下利厥逆無脈乾嘔而煩者白通加豬膽湯主之本無甘草仍不加犀角）

范汪療傷寒腹中微痛不止下利秦皮湯方

秦皮三兩　黃連四兩　白頭翁二兩　阿膠二兩

右四味㕮咀三味以水八升煮得二升絞去滓內膠令烊適寒溫先食飲七合日二服忌豬肉冷水

又豉薤湯療傷寒暴下及滯利腹痛方

豉一升　薤白一把（寸切）

右二物以水三升煮令薤熟漉去滓分為再服不差復

作

又蕙草湯療傷寒除熱止下利方

蕙草二兩　黃連四兩　當歸二兩

右三味切以水六升煮得二升適寒溫飲五合日三忌豬肉冷水等物

又療傷寒下利脈微足厥冷通草湯方

通草一兩　乾薑一兩　枳實四兩（炙）　人參一兩

附子一枚（炮令裂破）

右五味切以水六升煮取二升適寒溫飲五合日三不瘥稍加至七合忌豬肉（並出第二十卷中）

小品犀角湯療熱毒下黃赤汁及赤如腐爛血及赤滯如魚腦腹痛壯熱諸藥無效方

黃蘗一兩半　黃芩一兩半　白頭翁一兩　黃連二兩

當歸一兩　牡蠣一兩半（熬）　犀角半兩（屑）　艾葉半兩

石榴皮一兩　桑寄生一兩　甘草一兩（炙）

右十一味切以水八升煮取三升分三服忌豬肉冷水海藻菘菜（出第六卷中古今錄驗同）

集驗療傷寒後下利膿血蘗皮湯方

黃蘗二兩　黃連四兩　梔子人十四枚（擘）　阿膠一兩（炙）

右四味切以水六升煮三味取二升去滓內膠令烊溫

分三服忌豬肉冷水（范汪同出第二卷中）

千金療熱利下重白頭翁湯主之方

白頭翁（二兩）　黃蘗（三兩）　黃連（三兩）　秦皮（二兩切）

右四味切以水七升煮取二升去滓分服一升不愈更服忌豬肉冷水（范汪同出第十卷中張仲景傷寒論方）

范氏療傷寒後赤白滯下無數阮氏桃華湯方

赤石脂（八兩冷多白滯者加四兩）　粳米（一升）　乾薑（四兩冷多白滯者加四兩切）

右三味以水一斗煮米熟湯成去滓服一升不差復作熱多則帶赤冷多則帶白（千金翼方小同加減看刺傷寒論千金范汪同張仲景傷寒論煮湯和赤石脂末一方寸匕服）

又療傷寒熱利黃連丸方

黃連（三兩去毛）　當歸（二兩）　乾薑（一兩）　赤石脂（二兩）

右四味擣篩蜜和丸如梧子大服三十丸日三夜尚書以療熱痢見歲傳與東都當方諸軍營及夏口戍人發者數千餘人余序亦復用之亦皆得但昨用之不及諸湯速日當服百丸許乃斷忌豬肉冷水（並出第一卷中）

張文仲陶氏傷寒下利豉薤湯方

豉（一升綿裹）　薤白（一握）　梔子（十四枚擘破）

右三味以水五升煮取二升半去滓溫分三服小品云此方主溫毒及傷寒內虛外熱攻腸胃下黃赤汁及如爛肉汁并去赤滯下伏氣腹痛諸熱毒悉主之水四升先煮梔子薤白令熟內豉煮取二升分三服（千金備急方同）

又療傷寒下利惡血不止犀角湯方

乾薑（一兩）　犀角（一兩末）　地榆（一兩）　蜜（二合）

右四味切以水五升煮取一升半去滓下蜜更煮至一升分三服自愈此治熱毒蠱利（千金同並出第十五卷中）

傷寒䘌瘡方一十首

病源凡得傷寒及天行熱病日數較多腹內有熱又人食少腸胃空虛三蟲行作求食食人五藏及下部也䘌病之候齒斷無色舌上盡白甚者脣裏有瘡四肢沉重忽忽喜眠如此皆為蟲食其肛肛爛見五藏則死當數看其上脣內有瘡唾血脣內如粟瘡者則心內懊憹痛此蟲在上食其五藏下脣內生瘡者其人不寤此蟲食下部皆能殺人也（出第八卷中）

肘後若病人齒無色舌上白者或喜眠憒憒不知痛癢處或下利宜急療下部不曉此者但攻其上不以為意下部生蟲蟲食其肛肛爛見五藏便死

燒馬蹄作灰細末豬脂和塗綿以導下部日數度差

又桃人苦酒湯方

桃人（五十枚去皮尖雙兩人）　苦酒（二升）　鹽（一合）

右三味煮取六合去滓盡服之並出第一卷中

深師療䘌食下部桃皮湯方

桃皮二兩 槐子二兩 艾二兩 大棗三十枚擘一方用黃連

右四味切以水五升煮取三升去滓溫分三服之

又療䘌蟲食下部方

以泥作罌以竹筒如指沂横穿罌腹筒一頭內下孔中內如雞子艾燒之人就罌口吹之常令艾燒强人可益艾甚良千金同

又龍骨湯治傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡䘌者多下或張口吐舌呵吁咽爛口鼻生瘡吟語

不識人宜服此湯除熱毒止痢神方

龍骨半斤碎

右一味以水一斗煮取四升服之沉底令冷服五合餘漸漸進之恣意如飲尤宜老少無味稍如飲水亦斷下文仲備急千金同

又療傷寒及諸病之後內有瘡出下部煩者黃連犀角湯方

黃連一兩去毛 烏梅十四枚擘 犀角三兩 青木香半兩

右四味切以水五升煮取一升半分再服忌豬肉冷水等並出第十四卷中

范汪療傷寒心中懊憹下利穀道中爛傷當服懊憹散以納藥內穀道中懊憹散方

雚蘆十分 乾漆二分 萹蓄二分

右三味各異擣篩粉粥飲服一錢匕先食日再服千金同

又療䘌懊憹麝香散方

麝香一分研 雄黃一分研 丹砂一分研 犀角一分屑
羚羊角一分屑 青葙子一分 黃連一分 升麻一分
桃人一分熬 貝齒一分

右十味搗合下篩先食以小麥粥服錢五匕服之訖復以錢五匕綿裹以導穀道中食頃去之日二忌豬肉

冷水生血等物並出第三十三卷中

小品青葙子散療熱病有䘌下部生瘡方

青葙一兩 雚蘆四兩 狼牙三分 橘皮二分
萹蓄二分切之

右五味擣下篩粥飲和合服兩錢匕日三不知稍增之出第六卷中千金同有甘草一分

張文仲療傷寒病䘌瘡王叔和云其候口唇皆生瘡[illegible]上唇內有瘡如粟者則心中懊憹痛如此則此蟲在上乃食五藏若下唇內生瘡其人喜眠者此蟲在下食下部方

取雞子一枚扣頭出白與漆一合熟和令調如漆還

內殺中仰吞之食頃或半日或下蟲或吐蟲劇者再服乃盡熱除病愈凡得熱病腹內熱食少三蟲行作求食食人五藏及下部人不能知可服此藥不爾蠶蟲殺人 年驗千師 肘後同

又方

豬膽 一具

右一味漬苦半升苦酒中和之煎三沸三下三上藥成可放温空腹飲一滿口蟲即死有人經用之驗 崔氏出第二卷中 千金同

傷寒陰陽易方八首

病源傷寒陰陽易病者是男子婦人傷寒病新差未平復而與之交接得病者名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病新差未平復而男子與之交接得病者名陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽感動其毒度著於人如換易也其病之狀身體重小腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胷頭重不能舉眼內生瞧四肢拘急小腹疞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不能舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓枯竭便嘘嘘吸吸氣力轉少著牀不能動搖起止仰人或引歲月方死 出第八卷中

深師療婦人得温病雖差平復未滿一百日不可與交合交合爲陰易之病病必拘急手足拳皆死丈夫病以易婦人名爲陽易速當療之可差滿四日不可療也宜令服此藥方

乾薑 四兩

右一味擣末湯和一頓服温覆汗出得解止手足伸遂愈 范汪同出第十四卷中

范汪假鼠糞湯療傷寒病後男子陰易方

薤 一大把　假鼠糞 十四枚

右二味以水五升煑取二升盡飲之温臥汗出便愈亦理勞復 假鼠屎兩頭尖者是也肘後薤作韭

又丹米湯療傷寒病已後男子陰易方

丹米 三兩

右一味末以薄酒和盡飲之温覆汗出便愈亦隨人大小不必三兩自以意消息之

又療交接勞復卵腫腹中絞痛便絕死竹皮湯方

刮青竹皮 一升

右一味以水三升煑五六沸絞去滓頓服立愈 肘後同

又療陰陽易栝樓湯方

栝樓根 二兩

右一味以水五升煮取一升分二服先以青淡竹瀝一升合水二升煮好銀二兩減半去銀先與病人飲之訖須臾乃服湯小便利即差栝樓湯銀汁須冷服（與前療同方）

千金曰昔者有人得傷寒病已差未健詣華旉視脈旉曰雖差尚虛未復陽氣不足勿為勞事餘勞尚可御內即死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病口舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死有士蓋正者病愈後六十日已能行射獵以房室則吐涎而死及熱病房室名為陰陽易之病皆難療多死近者有士大夫小得傷寒差以十餘日能乘馬行來自謂平復以房室則小腹急痛手足拘攣而死醫者張苗說有婢得病後數十日有六人姧之皆死婦人得病易丈夫丈夫得病亦易婦人療之燒裩散方兼主溫病陰易也

取女人中裩近隱處燒取灰

右一物為散服方寸匕日三小便即利陰頭微腫此為愈矣女人病可取男子裩如前法酒水服（此本仲景方附後同）

又療交接勞復卵腫縮腹中絞痛便欲死者方

取交接婦人衣服以覆男子（附後同）

又方

取女人手足爪二十枚女人衣中裳一尺燒

右二味末以酒服亦可米汁飲服之（出第十卷中附後同）

傷寒勞復食復方二十五首

病源傷寒病新差津液未復血氣尚虛若勞動早更復成病故云復也若言語思慮則勞神梳頭澡洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脈沉緊者宜下之

又食復傷寒病新差及大病之後脾胃尚虛穀氣未復若食豬肉腸血肥魚及油膩物必大下利醫所不能治也必至於死若食餅餌粢黍飴餔炙膾棗栗諸果物脯脩及堅實難消之物胃氣虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之亦危皆難救也大病之後多坐此死不可不慎護也夫病新差後但得食糜粥寧可少食令飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁慎不可食豬狗等肉（並出第八卷中）

范汪療傷寒因食勞復頭痛壯熱梔子湯方

梔子（十四枚擘）　香豉（一升綿裹）　葱白（一握切）　粟米（三合）

雄鼠屎（二七枚燒令煙絕末）

右五味以水八升煮取二升三合去滓內鼠屎分三服服別相去如人行六七里須利內芒硝五分忌麪炙肉蒜等物（出第一卷中）

深師療勞復大青湯方

大青四兩　甘草二兩炙　阿膠二兩炙　香豉二兩

右四味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日五六欲盡復作常使有湯渴便飲無毒除熱止吐下傷寒一二日上至十數日困篤發汗熱不解吐下後熱不除止下痢甚良先煮大青甘草取四升去滓內膠豉膠消盡便漉去勿令豉壞當預漬膠令釋也忌菘菜海藻集驗後千金同

又方

取雞子空殼碎之熬令黃黑擣篩熱湯和一合服之溫臥取汗愈雞子殼悉服之肘後崔氏同

又方

取馬糞燒擣爲散冷酒服方寸匕良三炊頃便驗神良

又療傷寒差後勞復葵子湯方

葵子二升　粱米一升

右一味合煮作薄粥飲之多多爲佳取汗立差並出第十四卷中

范汪療傷寒病差語言書疏坐起行步勞復方

剉青竹皮多多煮之令厚濃服三升汁則愈

又傷寒已愈食飲多勞復大黃豉湯方

豉五合　甘草二兩炙　桂心二兩　大黃四兩

芒硝半斤

右五味㕮咀以水六升煮得二升去滓先食適寒溫飲一升日再忌海藻菘菜生葱等物

又療傷寒差已後飲食勞復梔子湯方

梔子十四枚　豉一升　桂心二兩　麻黃二兩

大黃二兩

右五味㕮咀以水七升先煮麻黃掠去沫內餘藥更煮取二升去滓溫服一升日再服當小汗及下利忌生葱並出第三十四卷中

千金療傷寒溫病後勞復或食飲或動作梔子石膏湯方

梔子人二七枚擘　石膏五兩碎　鼠屎尖頭者二十枚　香豉一升綿裹

右四味以水七升煮取三升分三服

又療勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復方

取洗手足汁飲之一合即愈

又方

取頭垢如棗核大吞一枚

又方

取飯燒爲末飲進一升肘後同

又療大病已差勞復者枳實梔子湯方

枳實三枚炙 梔子十四枚擘

右二味以酢漿一斗先煎取六升煮藥取三升內豉一升煎五六沸去滓分再服覆取汗如有宿食者內大黃如棊子一枚 范汪肘後集驗同出第十卷中張仲景傷寒論內大黃如博棊子五六枚

又療勞復垂死者方

煖湯三合洗四五歲女子陰取汁內口中服則愈男兒亦得起死人方

又療食勞方

麴一餅煮取汁服之

又療食勞方

杏人五十枚酢二升煎取一升服之取汗則差

又方

燒人糞灰水服之方寸匕

又療傷寒差後更頭痛壯熱煩悶者方

服黃龍湯三合日三服

又秋令病人不復者方

燒頭垢如棋子大服之 並出第十卷中

崔氏療傷寒勞復鼠屎湯方

梔子擘二七枚 豉五合 鼠屎兩頭尖者二七枚

右三味以漿水二升煮取一升去滓頓服數試異驗 出第二卷中

古今錄驗梔子湯療傷寒勞復方

梔子擘十四枚 麻黃去節二兩 大黃二兩 豉一升綿裹

右四味切以水七升煮取二升分為三服 深師肘後同

又療傷寒勞復鼠屎湯方

鼠屎二十一枚 豉一升綿裹 梔子七枚擘 大黃三兩切

右四味以水五升煎取一升七合分三服微取汗應小鴨溏下 千金同

又療病新差早起及食多勞復鼠屎豉湯方

鼠屎兩頭尖者二十一枚 香豉一升

右二味以水三升煮取一升盡服之溫臥令小汗 千金同

又療食不消勞復脈實者鼠屎梔子豉湯方

豉二升綿裹 鼠屎二十一枚 梔子七枚擘 麻黃三兩去節

右四味以水五升煮取二升分服七合汗微出日三服 千金麻黃作大黃

又療傷寒已愈食飲多復發者方

豉五合綿裹 甘草二兩炙 大黃四兩 芒消半兩

右四味切以水九升煮取三升去滓飲一升日再忌菘菜海藻等 范汪同

又療傷寒差令不復白芷散方

白芷十二分 白朮十分 防風八分 栝樓五分

桔梗四分 細辛三分 附子二分炮去皮 乾薑二分

桂心二分

右九味擣篩爲散以粳米粥清服一錢匕食已服二錢小兒服一錢常以鷄子作羹與粳米飯多少與病人食之亦未必常有鷄子羹粳米飯如服藥訖即扶起令行步仍櫛頭洗手面食輒服之勞行如前則不復浩云數用佳忌豬肉桃李雀肉胡荽蒜青魚鮓生葱生菜范汪同出第二卷中 一方有人參二分

傷寒百合病方七首

病源傷寒百合病者謂無經絡百脈一宗悉致病也皆因傷寒虛勞大病之後不平復變成斯病也其狀意欲食復不能食常默默欲得臥復不得臥欲出行而復不能行飲食或有美時或有不用聞飲食臭或如強健人而欲臥復不得眠如有寒復如無寒如有熱復如無熱至朝口苦小便赤黃百合之病諸藥不能療得藥則劇而吐利如有神靈所加也身形如和其人脈微數每尿輒頭痛其病六十日乃愈若尿時頭不痛淅淅然如寒者四十日愈若尿時快然但眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月日復見其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便硬三四日一大便時復小溏者病在中焦也六十三日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也四十三日當愈各隨其證以療之耳出第八卷中

仲景傷寒論療百合之病諸藥不能療若得藥則劇而吐痢如有神靈所加也身體仍和脈微數每尿時輒頭痛六十日乃愈尿時頭不痛淅淅然者四十日愈尿時快然但頭眩者二十日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日一月後見者悉療之

又發汗已更發者百合知母湯主之方

百合七枚擘 知母三兩

右二味以泉水洗先漬百合經一宿上當白沫瀉却其汁更以好泉水二升煮取一升去滓置之一處別以泉水二升煮知母取一升去滓二味汁相和煮取一升半分溫再服之小品千金同

又下之已更發者百合滑石代赭湯主之方

百合七枚擘以泉水漬一宿上當白沫出去之 滑石三兩碎 代赭如彈丸大一枚碎

右三味先以泉水二升煮百合取一升去滓置一廂又以泉水二升煮和二味取一升去滓合煎取一升半分

再服千金小品同
又吐之已更發者百合鷄子湯主之方
百合七枚
右一味依前法泉水二升煮取一升去滓扣鷄子一枚取中黃内百合湯中攪令調溫再服之千金同
又不吐不下不發汗病形如初百合生地黃湯主之方
百合七枚
右一味依前法漬以泉水二升煮取一升生地黃汁一升二味汁相和煮取一升半溫分再服一服中病者更勿服也大便當出惡沫千金小品並同

又百合病一月不解變成渴
以漬百合水洗身法其後千金方中一味見後服栝樓牡蠣散其次則是並出第十七卷中
小品凡百合病見於陰而以陽法攻之其陰不得解也復發其汗此爲逆其病難治見於陽而以陰法攻之其陽不得解也復下之其病不愈
千金百合病經一月不解變成渴者方
百合根切一升
右一味以水一斗漬一宿以汁洗病人身也洗身訖食白湯餅今餺飥也勿與鹽豉也渴不差可用栝蔞根並牡蠣等分爲散飲調方寸匕日三服小品張仲景方同
又療百合病變而發熱者方
滑石三兩 百合根一兩炙
右二味末之飲下方寸匕日三微利者止勿服之熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急
又百合病變腹中滿痛者方
但服百合根隨多少熬令色黃末之飲調方寸匕日三滿消痛止小品同並出第十卷中
傷寒狐惑病方四首
仲景傷寒論狐惑之病其氣如傷寒嘿嘿但欲臥目瞑不

得眠起臥不安蝕於喉咽者爲惑蝕於陰者爲狐狐惑之病並惡飲食不欲聞飲食臭其面乍赤乍黑乍白蝕於上部其聲嗄蝕於下部其咽乾蝕於上部瀉心湯主之蝕於下部苦參湯淹洗之蝕於肛外者熏黃熏之
又瀉心湯 兼療下利不止心中愊愊堅而嘔腸中鳴者方
半夏半升洗 黃芩三兩 人參三兩 乾姜三兩
黃連一兩 甘草四兩炙 大棗擘十二枚
右七味切以水一斗煮取六升分服一升日三服忌豬肉冷水菘菜海藻[illegible]傷千金同出第六卷中

又雄黃熏法　蕪主䘌病

雄黃一物研末以兩甌瓦合之燒以熏下部

千金療狐惑薰草黃連湯方

黃連四兩去毛　薰草四兩

右二味切以白漿一斗漬之一宿煮取二升去滓分為二服忌豬肉冷水 小品同

又其人脈數無熱微煩嘿嘿但欲臥汗出得之三四日眼赤如鳩眼者得之七八日其四眥黃黑能食者膿已成也療之方

以赤小豆三升漬之令生芽足復乾之加當歸三兩為末漿水服方寸匕日三 小品同出第十卷中此本仲景方

凡病形不可灸因火為邪散在血脈傷脈尚可傷藏則劇井輸穴腫黃汁自出經絡外爛肉筋為癰膿此為火瘡七居反醫所傷也凡微數之脈慎不可灸因火為邪即致煩逆追虛逐實血散脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難復也

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三卷目錄 天行二十一門

天行病發汗等方四十二首

天行嘔逆方七首 并仁則

天行嘔啘方七首

天行喉咽痛方二首

天行衄血方四首

天行口瘡及口乾苦方四首

天行欬嗽方五首

天行發斑方三首

天行發疱豌豆瘡方一十三首

天行虛煩方二首

天行狂語方三首

天行熱毒攻手足方五首

天行大小便不通脹滿澀方四首

天行熱痢及諸痢方四首

天行䘌瘡方八首

天行陰陽易方二首

天行虛羸方二首

天行後禁忌方二首

天行勞復食復方六首
天行差後勞發方五首許仁則

唐王燾先生外臺秘要方第三卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓
男能錫爲光父仝校

天行病發汗等方四十二首

病源夫天行時氣病者是春時應暖而反大寒夏時應熱而反大涼秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大温者此非其時而有其氣是以一歲之中病無長少率多相似者此則時行之氣也從立春節後其中無暴大寒又不氷雪而人有壯熱爲病者此屬春時陽氣發於冬時伏寒變爲温病也從春分以後至秋分節前天有暴寒者皆爲時行寒疫也一名時行傷寒此是節候有寒傷於人非觸冒之過也若三月四月或有暴寒其時陽氣尚弱爲寒所折病熱猶小輕也五月六月陽氣已盛爲寒所折病熱則重也七月八月陽氣已衰爲寒所折病熱亦小微也其病與温及暑病相似但治有殊耳然得時行病一日在皮毛當摩膏火炙愈不解者二日在膚可法鍼服解肌散汗出愈不解三日復發汗若大汗則愈不解者止勿復發汗也四日在胷服藜蘆丸微吐之愈若病固服藜蘆丸不吐者服赤小豆瓜蔕散吐之即愈視病者尚未了了復一法鍼之當

勿不愈者六日熱已入胃乃與利湯下之愈百無不如意
但當詳視節度與病耳若食不消病亦與時行病俱發熱
頭痛食病當速下之時行病當待六七日下之時行病始
得一日在皮二日在膚三日在肌四日在胸五日入胃入
胃乃可下也熱在胃外而下之則熱乘虛便入胃然病要
當復下去之不得留於胃中也胃若實熱致此為病三死
一生此輩皆多不愈胃虛熱入爛胃也其熱微者赤斑出
劇者黑斑出赤斑出者五死一生黑斑出者十死一生但
諸人有強弱病有難易功効相倍耳病者過日不以時下
之熱不得泄亦胃爛斑出矣若得病無熱但狂言煩躁不

安精采言語與人不相主當者勿以火迫之但以猪苓散
一方寸匕水和服之當以新汲冷水令強飲一升若一升
半可至二升益佳以指刺喉中吐之隨手愈不即吐者此
病輩多不善勿強與水水停即結心下也更當以餘藥吐
之皆令相主當者不爾必危若此病不急以猪苓散吐解
之者其死殆速矣亦可先以去毒物及法針之尤佳其湯
散鍼灸別有正方補養宜導今附於後
養生方導引法云清旦初起以左右手交互從頭上挽兩
耳舉又引鬢髮即流通令頭不白耳不聾又摩手掌令熱
以摩面從上下二七止去汗氣令面有光又摩手令熱從

體上下名曰乾浴令人勝風寒時氣寒熱頭痛百病皆愈
又時氣病一日太陽受病太陽為三陽之首主於頭項故
得病一日頭項腰脊痛
又時氣二日陽明受病陽明主於肌肉其脈絡鼻入目故
病二日內熱鼻乾不得眠夫諸陽為表表始受病皮膚之
間故可摩膏火灸發汗而愈
又時氣病三日少陽受病少陽脈循於脅上於頸耳故得
病三日胸脅熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏
故可汗之而愈
又時氣四日太陰受病太陰為三陰之首是知三日已後

諸陽受病訖即傳之於陰而太陰受病焉其脈主於咽嗌
故得病四日腹滿而嗌乾其病在胸膈故可吐而愈也
又云夫得病四日毒在胸膈故宜取吐有得病二三日便
心胸煩滿此為毒氣已入或有五六日已上毒氣猶在上
焦者其人有痰實故也所以復宜取吐也
又時氣病五日少陰受病少陰脈貫腎絡肺繫於舌本故
得病五日口熱舌乾渴而引飲其病在腹故可下而愈
又時氣病六日厥陰受病厥陰脈循陰器絡於肝故得病
六日煩滿而陰縮也此為三陰三陽俱受病毒氣入於腸
胃故可下而愈

又時氣病七日法當小愈所以然者陰陽諸經傳病竟故也今病不除者欲爲再經病再經病者謂陰陽諸經重受病也

又時氣病八九日以上不解者或是陰陽諸經重受於病或已發汗吐下之後毒氣未盡所以病不能除或一經受病未即相傳致使停滯累日病證不改者故皆當察其證候而治之 並出第九卷中王燾氏曰七日停經盡再傳經必七日蓋剝復之義也

廣濟天行壯熱煩悶發汗麻黃湯方

麻黃五兩去節　葛根四兩　梔子二七擘　蔥切一升

香豉一升綿裹

右五味㕮咀以水八升先煮麻黃葛根三兩沸去沫內諸藥煎取二升五合絞去滓分爲三服服別相去如人行五六里更進一服不利覆取汗後以粉粉身忌風及諸熱食 出第一卷中

删繁天行一二日麻黃解肌湯方

麻黃一兩去節　升麻一兩　甘草一兩炙　芍藥一兩

石膏一兩碎綿裹　杏人三十枚去尖皮兩人　貝齒三枚末

右七味細切以水三升煮取一升頓服覆取汗汗出則愈便食豉粥補虛也忌海藻菘菜 千金同

又方

麻黃二兩　黃芩　桂心各一兩　生薑三兩

右四味切以水六升煮取二升分二服忌生蔥 張文仲同

又葛根解肌湯方

葛根四兩　芍藥二兩　麻黃一兩去節　大青一兩

甘草一兩炙　黃芩一兩　石膏一兩碎　大棗四枚擘

桂心一兩

右九味切以水五升煮取二升分溫三服相次服之覆取汗差忌海藻菘菜生蔥炙肉等 張文仲同

又療二三日以上至七八日不解者可服小柴胡湯方

柴胡八兩　人參三兩　甘草三兩炙　黃芩三兩

生薑三兩　半夏半升洗　大棗十二枚擘

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升分三服微覆取汗半日便差如不除更服一劑忌海藻菘菜羊肉餳 范汪張文仲同此張仲景傷寒論方

又若有熱實得汗不解腹脹痛煩躁欲狂語者可服大柴胡湯方

柴胡半斤　大黃二兩　黃芩三兩　芍藥二兩

枳實四枚炙　半夏五兩洗　生薑五兩　大棗十二枚擘

右八味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三服當微利忌羊肉餳此方四首最第一

急疾須臾有幸可得藥處便不可不皆之保無傷死諸
小療爲以防窮極者耳忌羊肉餳 出第二卷中 同上
删繁療天行三日外至七日不歇內熱令人更相染著大
青消毒湯方
大青四兩 香豉八合熬綿裹 乾葛 梔子各四兩
生乾地黃一升切 芒消三兩
右六味切以水五升煮諸藥味取二升五合去滓下芒
消分三服忌蕪荑熱麪酒蒜等物 一方有石膏八兩
又療天行五日不歇未至七日皮肉毒熱四肢疼痛彊苦
參吐毒熱湯方

苦參八分 烏梅七枚 雞子三枚取白
右三味以苦酒三升煮二物取一升去滓澄清下雞子
白攪調溫去沫分再服之當吐毒熱氣出愈
又療天行七日至二七日藏腑陰陽毒氣天行病欲歇而
未歇或因食飲勞復心下脹滿煩熱生地黃湯方
生地黃一升切 黃芩三兩 桂心二兩 甘草二兩炙
竹葉一升切 香豉一升綿裹 葶心一升 芒消三兩
尖鼠屎二七枚 乾葛一兩 麻黃三兩去節 石膏八兩碎綿裹
右十二味切以水九升煮取三升去滓下芒消分三服
忌蕪荑海藻菘菜生葱等

又療天行二七日外至三七日不歇或寒或熱來去喻噏
四肢羸瘦飲食不能腹中虛滿熱毒不安生地黃湯方
生地黃汁一升 生麥門冬汁一升 赤蜜一升 人參二兩
白朮三兩 桂心一兩 甘草二兩炙 生地骨皮四兩
升麻三兩 石膏八兩碎綿裹 葶心一升
右十一味細切以水九升煮諸藥味取二升去滓下地
黃汁更煎三兩沸分溫五服晝四夜一服忌蕪荑生葱
海藻菘菜桃李雀肉等物
又療天行二七日至四七日勞痛不歇熱毒不止乍寒乍
熱乍劇乍差發動如瘧鼈甲湯方

鼈甲三兩炙 大青一兩 石膏八兩碎綿裹 牡丹皮一兩
烏梅肉一兩 常山二兩 竹葉切一升 牛膝根三兩
甘草一兩 香豉一升綿裹
右十味切以水九升煮取三升分溫三服日三忌生葱
生菜鯉魚海藻菘菜莧菜莽草 一方有生天門冬生地黃各切一升
千金療天行熱病五六日以上宜服苦參湯方
苦參二兩 黃芩二兩 生地黃八兩
右三味切以水八升煎至二升去滓溫服半升日再忌
蕪荑 出第九卷中
又凝雪湯療天行毒病七八日熱積胸中煩亂欲死起死

搨湯方

芫花一升

右一味以水三升煮取一升半漬故布薄胷上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆也（張文仲備急古今錄驗深師范汪並同出第十卷中 臣按搨音[illegible]也謂[illegible]也又揖也以故布用方漬而搭胸上也）

千金療疫天行脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表證仍在此當發其汗服藥已微除發煩目瞑劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也宜服麻黃湯方（千金翼同）方天行

麻黃三兩去節　桂心二兩　甘草一兩炙　杏人七十枚去尖皮兩人

右四味切以水九升先煎麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半分服八合取汗不須飲粥投此湯易得汗忌菘菜海藻生葱（深師同出第九卷中此張仲景傷寒論方）

崔氏療時行數日而大下熱痢時作白通諸藥多不得止吾思舊方多療傷寒後下痢耳未有尚在數日便兼除熱止下者也四順湯熱白通苦溫故吾思作此湯以救數十人兼主傷寒黃連龍骨湯方

黃連三兩止利除熱　黃蘗三兩止利除熱　熟艾如雞子一枚除熱毒止利

龍骨二兩止利除熱

右四味切以水六升煮取二升半分三服無不斷者忌猪肉冷水

又其年時行四五日大下後或不下皆患心中結滿兩脅痞塞胷中氣急厥逆欲絕心胷高起手不得近不過一二日輒便死殁諸醫用瀉心湯余用大小陷胷湯並不得療重思此或是下後虛逆而氣已不理而毒復上攻毒氣相搏結於胷中縱不下者毒已入胃胃中不通毒還衝上復搏於氣氣毒相激故致此病療之當先理其氣次下諸疾思與增損理中丸方

人參二兩　白朮二兩　甘草二兩炙　乾薑六分炮

栝樓根二兩　枳實二兩炙　茯苓二兩　牡蠣二兩熬

右八味末之以蜜和爲丸如彈子一丸熱水下不歇復服余時用此療效速下喉即折續復與之不過服五六丸胷中豁然矣用藥之速未嘗見此然渴者當加栝樓不渴除之下者當加牡蠣不下勿用余因以告領軍韓康伯右衞毛仲祖光祿王道豫靈臺郎顧君苗著作郎仲堪諸人並悉用之咸歎其應速于時枳實乃爲之貴難者曰傷寒熱病理中溫藥今不解之以冷而救之以溫其可論乎余應之曰夫今諸疾行始於項瘟劫色次於失眠發熱中於煩躁思水終於生瘡下痢大齊於此耳忌海藻菘菜酢物桃李雀肉等（深師方同）

又阮河南療天行七八日熱盛不解艾湯方

苦酒三升　葶藶子二合熬擣　生艾汁取一升無生艾以熟艾亦可用無艾可艾根擣取汁

右三味煎得一升頓服愈若有牛黃內一刀圭尤良此宜療內有大熱也阮河南曰療天行凡除熱解毒無過苦醋之物故多用苦參青葙艾葶藶苦酒烏梅之屬此其要也夫熱盛非苦醋之物則不能愈熱在身中既不時治治之又不用苦酢之藥如救火不以水必不可得脫免也又曰今諸療多用辛甜薑桂人參之屬此皆貴價難得常有比行求之轉以失時而苦參青葙葶藶子

艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝於向貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按常藥次也便以青葙苦參艾苦酒療之但稍與促其間耳無不解千金并發汗門皆出第一卷中

又茵蔯丸療瘴氣時氣及黃病痎瘧等方

茵蔯二兩　大黃五兩　豉五合熬令香　常山三兩

梔子人二兩　鼈甲二兩炙　芒消二兩　杏人三兩去尖皮熬

巴豆一兩去心皮熬

右九味擣篩蜜和爲丸初得時氣三日內平旦飲服一丸丸如梧子大如人行十里久或吐或利或汗如不吐及不利不汗更服一丸五里久不吐利汗則以熱飲投之老小以意量減黃病痰癖時氣傷寒瘧小兒熱欲發癇服之無不差者療瘴特神驗有人患赤白痢者服之亦差春初有宿熱依上法服之取吐利當年不憂熱病忌莧菜蘆笋野猪肉生葱生菜出第二卷中千金同

張文仲療天行若已五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食大黃湯方

大黃半兩　黃連半兩去毛　黃蘗半兩　梔子半兩擘

右四味切以水八升煮取六七沸內豉一升葱白七莖煮取三升分三服此許推然方神良又療傷寒已五六

日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌猪肉冷水小品皆同

又支太醫桃葉湯熏身法

水一石煮桃葉取七斗以薦席自圍衣被蓋上安桃湯於牀簀下取熱自熏停少時當雨汗汗遍去湯待歇速粉之并灸大椎則愈

又廪丘蒸法

經云連發汗汗不出者死可蒸之如中風法後以問張苗苗云曾有人疲極汗出臥單簟中冷但苦寒蹙四日凡八過發汗汗不出苗燒地排葉蒸之則得大

汗彼中傳粉極燥便差後用此法發汗得出療之猶急

方同

又療天行熱毒垂死破棺千金湯方

苦參一兩

右一味㕮咀以酒二升半舊方用苦酒煮取半升去滓

併服當吐如烊膠便愈神驗肘後同延年治天行四五日結胸滿痛壯熱身痛出第二卷中

又延年秘錄療天行頭痛壯熱一二日水解散方

麻黃四兩去節 大黃三兩 黃芩三兩 桂心二兩

甘草二兩炙 芍藥二兩

右六味擣篩為散患者以生熬湯浴訖以煖水和服方

寸七覆取汗或利則便差丁壯人服二方寸七忌海藻

生葱菘菜生菜古今錄驗同千金無黃芩芍藥

又梔子湯主天行一二日頭痛壯熱心中熱者方

梔子二兩 黃芩三兩 豉一升熬綿裹 葱白切一升

石膏四兩碎綿裹 乾葛四兩切

右六味切以水七升煮取二升六合去滓分溫三服如

人行八九里再服忌麪酒生冷等物

又解肌湯主天行病二三日頭痛壯熱者方

乾葛四兩 麻黃三兩去節 芍藥二兩 黃芩二兩

甘草一兩炙 大棗十二枚擘 桂心一兩

右七味切以水八升煮取二升半去滓分三服得汗愈

忌海藻菘菜生葱等許孝崇處

又療傷天行四五日熱歇後時來時往惡寒微熱不能

食者知母湯方

知母二兩 枳實三兩炙 梔子人三兩 豉一升熬綿裹

右四味切以水六升煮取二升半去滓分溫三服如人

行八里一服忌蒜麪

又療天行五日頭痛壯熱食則嘔者竹茹飲方

竹茹二兩 生薑三兩 黃芩二兩 梔子人二兩

右四味切以水五升煮取一升六合去滓分溫三服忌

蒜熱麪等五日

又療天行五六日頭痛骨節疼痛腰痛兼痢黃芩湯方

黃芩三兩 梔子人三兩 芍藥二兩 豉一升綿裹

右四味水六升煮取二升半去滓分三服忌如前

又柴胡湯天行五六日壯熱骨煩疼兼兩脅連心脇下氣

脹急硬痛不能食恐變發黃者方

柴胡三兩 枳實二兩炙 栝樓三兩 黃芩三兩

梔子人三兩 茵蔯三兩 龍膽二兩 大黃三兩切

右八味切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服忌

熱疫等並出第九卷中

又竹茹飲主病後得天行病頭痛三四日食即嘔吐者方

竹茹二兩　橘皮二兩　生薑四兩　人參二兩

蘆根一升切　粳米一合

右六味切以水六升煮取二升五合去滓分溫五六服中間任食忌熱麪生冷張文仲處

又療天行熱病七八日成黃面目身體悉黃心滿喘氣麤氣急者茵蔯丸方

茵蔯二兩　大黃五兩　梔子人二兩　黃芩一兩

鼈甲二兩炙　常山二兩　芒消二兩　巴豆一兩去皮心熬

升麻二兩　豉一合熬

右十味擣篩以蜜和爲丸如梧子大患者飲服二丸以得吐利則差忌莧菜生葱生菜野猪肉蘆笋出第十卷中

救急療天行熱氣頭痛骨肉酸疼壯熱等疾若初病一日在毛髮二日在皮膚三日在肌肉必未得取利且宜進豉尿湯方

豉一升　葱白一升切　小便三升童子者爲佳

右三味先熬豉及葱白令相得則投小便煮取一升飲病人及熱頓服或汗或利但差則得如未歇依前更進一劑[illegible]用有効

又如不除進柴胡湯方

麻黃二兩去節陳者　柴胡三兩　黃芩三兩　甘草二兩炙

乾葛三兩　石膏五兩碎綿裹　葱白根一升切勿令有青處青即熱白即冷

一作桑根皮　豉七合綿裹三沸出之

右八味切以水九升宿漬藥明旦先煮麻黃令沸掠去上沫然後并諸藥煮取一升七合分三服服別相去三食頃良久覆取汗汗出以粉拭之惡寒多加桂心一兩忌海藻菘菜等

又療天行病不即差經四五日渴引飲心上急强手不得近又不得眠荒亂此則是黃不必得待刺黃始服藥凡是

心强氣急不得眠臥服此湯吐即差瓜蔕散方

瓜蔕量一合熬令黃勿令焦　小豆一合小通疾小弱量者量人之强弱而加減也

右二味擣篩爲散凡有病如前候及天行病得四五日不歇皆宜服此方以漿飲五合和散一錢匕服之二食久必吐不吐更與半錢匕服吐畢即差中男以上量意斟酌服之

又天行病若大困患人舌燥如鋸極渴不能服藥者宜服乾糞湯一名破棺湯解大熱方

陳久乾人糞一大升

右一味以沸湯一大升沃此糞一食久澄清瀝取一升

頓服如湯不止者又依前法更服此宜灸從心厭骨向下一寸半名巨闕取患人中指節爲寸灸三十壯老無心厭骨則以中指節前量橫搭心上至歧骨上兩頭築著骨當橫量下以前一寸當中直下則是巨闕也七翁氏曰同身寸八心骨尾下至臍抒角

必効療天行一二日者方

麻黃一大兩去節

右一味以水四升煮去沫取二升去滓則著米一匙及豉爲稀粥取強一升先作生熟湯浴淋頭百餘椀然後服前粥則厚覆取汗於夜最佳

又療天行病經七日以上熱勢彌固大便澁秘心腹痞滿食飲不下精神昏亂恍惚狂言浪語脈沉細眾狀之中一無可救宜決計服此鼈甲湯方

鼈甲一兩炙 細辛二兩 桂心二兩 白朮二兩

生薑四兩 吳茱萸一兩 白鮮皮二兩 附子二兩炮

枳實二兩炙 茵蔯二兩 大黃三兩切

右十一味切以水八升煮取二升六合去滓分三服服別相去如人行五里進一服忌生葱生菜莧菜豬肉桃李雀肉等

又療天行十日以上腹微滿譫語或汗出而不惡寒體重短氣腹滿而喘不大便繞臍痛大便乍難乍易或見鬼者

大承氣湯方

大黃四兩 厚朴半斤炙 陳枳實五枚炙 芒消三合

右四味切先以水一斗煮二味取五升去滓內大黃復煮取二升去滓內芒消煎令三兩沸適寒溫分再服得下者止不下更服之並出第三卷中此張仲景傷寒論方

古今錄驗八毒大黃丸療天行病三四日身熱目赤四肢不舉產乳後傷寒舌黃白狂言妄語亦療溫病已後飛尸遁尸心腹痛膈上下不通癖飲積聚癰腫苦痛溫中摩痛上諸毒病方

藜蘆二分炙 大黃二分 朱砂五分 蜀椒四分

雄黃四分研 巴豆四分去皮熬 桂心四分

右七味搗篩蜜和爲丸如麻子大飲服二丸當下不差更服合藥勿令婦人雞犬見之忌生葱野豬肉蘆笋狸肉生血物

又牽馬丸療天行病四五日下部生瘡醫所不能療者方

附子一枚炮 藜蘆一兩炙 桂心一兩 巴豆一兩去心皮熬

右四味搗篩研巴豆如脂和散蜜丸如梧桐子空腹服二丸熱在膈上不下飲半升熱飲投吐之後下下部瘡自差神良病家嘗牽馬買藥因名牽馬丸老小半之以

意消息之忌野猪肉生葱狸肉蘆笋等物
又療若六七日熱盛心煩狂言見鬼者方
絞人糞汁飲數合服良 出第三卷中
近効療天行三日外若忽覺心上妨滿堅硬脚手心熱則變爲黄不療殺人秦艽湯方
秦艽一兩　紫草一兩　白鮮皮一兩　黄芩一兩
梔子一兩
右五味切以水一大升半牛乳一大升煮取七合分爲二服老小以意量之一劑不愈更與一劑誠有効
天行病方七首 此方兼療傷寒爲題云天行所以入天行部

許仁則云此病方家呼爲傷寒有二種有陰有陽陰傷寒者反於陽是也陽傷寒狀表裏相應心熱則口乾若肝熱則眼赤暈脾熱則穀道稍澀腎熱則耳熱赤肺熱則鼻乾爲胃熱則嘔逆大腸熱則大便秘澁小腸熱則小便赤少皮膚熱則脈洪數身體熱反此者乃陰傷寒夫傷寒者則爲寒所傷也寒生陰陰主殺凡人陰陽調則無病氣既爲寒所傷便致斯狀也
又論陰陽傷寒者則爲氣傷陰陽氣也人身中有陰陽之氣陰陽者則寒熱也本以陰爲陽所傷則不能流行陽熱獨王故天行多熱者也以病於諸病之中最難爲療陰陽二病陰尤可憂耳時聞有此病而多倉卒死者不少或由證候不能精審方藥未達指歸飲食乖宜寒温失節故致殞自心不全甄別他醫難得精妙與其療也寧可任之但能滋味適寒温將理中間令暖守過七日此最爲得計其中亦須服藥不可徒然者唯多日大便不通暫須一轉洩耳病初一二日覺身體壯熱頭痛骨肉酸楚背脊强口鼻乾手足微冷小便黄赤此是其候若如是宜先合煮桃柳等三物湯浴之方
桃枝五斗細切　柳葉五斗細切　酢漿水一斗
右藥先以水一石煮桃柳枝葉二物取七斗汁去滓内

醋漿水攪帶熱以浴浴訖拭身體令乾以粉摩之勿觸風則於合處刺頭眼後兩邊及舌下血斷以鹽末厭刺處則入被臥
又依服解肌乾葛等五物飲發覆取汗如病輕者因此或歇方
葛根切五合　葱白切一升　生薑切一合　豉心一升綿裹
粳米二合研碎
右藥切以水五升煮取豉心以上四味取三升半汁去滓内粳米屑煮令米爛帶熱頓喫候盡覆取汗無所忌

又依前浴等法不覺歇宜更作雞子湯重澳之方

新殼產雞子五枚

右各破頭瀉置一盞中別加一雞子水以筋攪令極渾別用水一升煮極沸則投雞子於湯中微攪纔似熱則瀉置椀中內少醬清似綾腸氣帶熱啜令盡覆使汗出

又依前雞子湯出汗汗澳當歇如不覺退合梔子等六味散以下之方

梔子三十枚擘　乾葛五兩　芍藥二兩　蜀升麻三兩

大黃五兩　芒消五兩

右藥切合搗爲散以飲服三方寸匕服之須臾當覺轉則利迅如經一兩食頃不利且以熱飲投又不利即斯須臾服一方寸匕還以飲投得利爲度後適寒溫將息更不須服此也

又依前梔子等六味散取利後不覺退加嘔逆食不下口鼻喉舌乾燥宜合生蘆根八味飲子細細服之方

生蘆根切一升　生麥門冬二升去心　生薑五兩　人參二兩

知母二兩　烏梅十顆　白蜜一合　竹瀝三合

右藥切以水八升煮取三升去滓內蜜瀝等攪令調細細飲不限遍數冷煖亦不限食前後服此飲子雖不能頓除熱病然於諸候不覺有加體氣安穩心腹不冷意

又欲得此飲任重合但依前服之如熱勢不退心腹妨滿飲食漸少心上痞結則不可重服之

又依前生蘆根等八味飲子飲之諸狀不歇嘴不下食心腹結硬不得手近有時觸著痛不可忍既是熱病體氣合熱骨肉疼痛脈合洪數口合苦爽食合嘔逆體氣反凉脈反沈細飯食反下反不知痛惱大小便秘塞心上如石痛不可近視瞻急鼻張手眼尋繹狂言妄語此由熱極將息歸冷飲食寢臥唯冷是求熱結在心無因通澳如有此者十不收二三更不可以常途守之當須作成敗計耳此非半夏等十味湯無奈之何其中有諸狀與此無別但加身

形黃眼白睛色如黃蘗此是急黃如有亦不可守常法還宜合後湯救之方

半夏五兩蒸削者湯洗去滑汁盡發焦字　乾薑三兩　吳茱萸二兩

桂心二兩　白朮二兩　細辛三兩　柴胡三兩

牡丹皮一兩　大黃五兩　芒消二兩

右藥切以水一斗煮取三升去滓內芒消攪令消盡分溫三服每服如人行十里久若服一服利後須伺候將息勿更進湯藥但研好粟米作汁飲細細與之如覺利傷多可以酢飯止稠酢漿粥亦得忌羊肉餳生葱生菜桃李雀肉胡荽等

又依前成敗計服半夏等十味湯後雖汗熱勢退而渴
不休體力漸弱宜合人參等五味散細細服之方
人參五兩 生犀角末二兩 烏梅肉熬二兩 生薑屑二兩
黃連一兩去毛無亦可以地骨四兩代之
右藥擣篩爲散以飲服一方寸匕日三服稍加至二匕
忌豬肉冷水等 吳昇同

天行嘔逆方七首

病源天行胃有熱穀氣入胃與熱相并氣逆則嘔或吐下後
本多胃虛冷亦爲噦也 出第九卷中
深師療天行惡寒壯熱食則嘔逆前胡湯方

前胡一兩 麥門冬三兩去心 竹茹二兩 橘皮一兩
甘草一兩炙 生薑一兩 生地黃四兩切
右七味切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服
服如人行六七里進一服忌海藻菘菜蕪荑熱麪豬犬
肉油膩 出第一卷中
張氏療天行數日或十許日而表不解心下有水熱毒相
搏遂噦仍復有欬者增損阮氏小青龍湯方
麻黃二兩去節 芍藥二兩 桂心一兩 甘草二兩炙
細辛一兩
右五味切以水六升煮取二升溫服七合阮本湯方等
分與未宜用嫌其太溫余增損其分兩以療十餘人皆
愈忌海藻菘菜生葱生菜等 出第一卷中
近効療天行壯熱嘔逆不下食橘皮湯方
橘皮三兩 生薑四兩 茯苓三兩
右三味切以水五升煮取一升五合去滓分溫五六服
中間任食一日服盡忌大酢蒜麪 李虔縱張文仲等並同出第九卷中
必効療天行嘔吐不下食方
取臘月兔頭并皮毛燒令煙盡擘破作黑灰擣羅之
以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令大耗
無所忌比用頻効 出第一卷中

救急療天行後嘔逆不下食食入則出方
取羊子肝如食法作生淡食不過三兩度則止 文仲同
又方
以雞子一枚於沸湯中煮三五沸則出水浸之外寒
內熱則吞之神効無所忌 並出第一卷中
集驗療天行後氣斷嘔逆不下食生蘆根湯方
燈心一分 生麥門冬十二分去心 人參四分切 生蘆根一大握切
右四味以水一大升煎取八合去滓分溫三服

天行嘔啘方七首

病源伏熱在胃令人胷滿胷滿則氣逆氣逆則噦若大下

後胃氣虛冷亦令致噦也出第九卷中

肘後療嘔宛不止橘皮甘草湯方

甘草一兩炙　橘皮三兩　升麻半兩　生薑三兩

右四味切以水三升煮取一升盡服之日三四作當止忌海藻菘菜文仲同出第二卷中

文仲近効療嘔逆麥門冬飲子方

麥門冬去心　蘆根　人參各二兩

右三味切以水六升煮取二升七合去滓分温五服徐徐服常用有驗

又方

飲生薑汁三二合大良

又方

枇杷葉去毛煮飲之作粥亦佳出第一卷中

又方

研油麻汁煮菉豆令爛取半升許以手掌大猬皮燒作灰篩之內豆中和食出第二卷中

救急療天行乾嘔若噦手足逆冷葱豉粥方

葱白一升切　香豉一升　白米四合

右三味以水一升煮豉一沸漉去滓下葱及米煮為稀粥進兩碗良

又療天行後噦欲死兼主傷寒小半夏湯方

半夏五兩洗去滑　生薑八兩切令薄細勿令經水浸者為好

右二味各以水三升別煮各取一升半去滓二汁相和一處共煮取二升分三服服相去如人行十里久當令下食其噦不過俄頃則止近二年及任理居中罷鐵得之明奉御來家説秘此方但止煮藥送來家與方耶中後乃方便得之大良劾忌羊肉餳傷寒論同並出第一卷中

天行喉咽痛方一首

病源陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏攻於喉咽或痛或生瘡也出第九卷中

又療天行毒病或下不止喉咽痛黃連馬通湯方

小豆一升　黃連一兩去毛　馬通汁三升　呉茱萸一兩

右四味以馬通汁令煮取一升盡服不差復作有効忌猪肉冷水出第十四卷中

古今錄驗青木香湯療春夏忽喉咽痛而腫兼下痢方

青木香二兩　黃連一兩去毛　白頭翁二兩

右三味切以水五升煮取一升半分温三服小兒若服之一服一合忌猪肉冷水出第二卷中

天行衄血方四首

病源天行衄血者五藏熱結所為心主於血邪熱中於手

少陰之絡客於足陽明之絡故衄血衄者血從鼻出也出第九卷中

深師療天行毒病鼻衄是熱毒血下數升者方

勿療自差亦無所苦亦可取好松烟墨擣之以雞子白和丸丸如梧桐子大水下一服十丸並無所忌

又黃土湯療鼻衄去五藏熱氣結所爲或吐血者方

當歸 甘草炙 芍藥 黃芩

芎藭各三兩 桂心一兩 生地黃一斤 釜月下焦黃土如雞子一枚碎綿裹 青竹皮五兩

右九味切以水一斗三升煮竹皮減三升去滓內諸藥

煮取三升分四服忌海藻菘菜生葱

又方

黃芩四兩

右一味切以水五升煮取二升分三服亦療婦人漏下血

又療脉浮大鼻中燥如此必去血鼻衄方

灸兩臂中脉取止取臂脉法以鼻嗅臂點其鼻尖所著處是穴兩臂皆爾出第十四卷中

天行口瘡及口乾苦方四首

病源發汗下後表裏俱虛而毒氣未盡熏於上焦故喉口生瘡也出第九卷中

深師療天行熱盛口中生瘡酪酥煎丸

酪酥三合 蜜三合 大青一兩

右三味合煎三沸稍稍傅口以差爲度

又口瘡方

取蛇莓五升擣絞取汁稍稍飲之並出第十四卷中

集驗療天行熱病口瘡升麻湯方

升麻二兩 通草四兩 射干二兩 羚羊角二兩屑

芍藥二兩 生蘆根切一升

右六味切以水七升煮取三升分爲三服如人行五里

更服古今錄驗同

又療天行熱病口苦下氣除熱喉中鳴石膏蜜煎方

石膏半斤碎 蜜一升

右二味以水三升煮石膏取二升乃內蜜復煎取一升去滓含如棗核許盡更含千金同並出第二卷中

天行欬嗽方五首

病源熱邪氣客於肺上焦有熱其人必飲水水停心下則上乘於肺故上氣而欬也出第九卷中

廣濟療天行壯熱欬嗽頭痛心悶前胡湯方

前胡 升麻各八分 貝母 紫菀各六分

石膏十二分碎綿裹 麥門冬八分去心 杏人三十枚去皮尖兩人 竹葉切一升

甘草炙三分

右九味切以水八升煮取三升五合絞去滓分溫三服相去如人行六七里進一服不吐利差忌海藻菘菜油膩猪魚等

又療天行肺熱欬嗽喉有瘡地黃湯方

生地黃切一升 升麻 玄參 芍藥

柴胡 麥門冬去心各八分 貝母六分 竹葉切一升

白蜜一合

右九味切以水九升煮取三升絞去滓內蜜再上火煎

三沸含咽其汁勿停中間不妨食不利忌蕪荑熱麪猪犬肉油膩

又療天行後乍寒乍熱昏昏不省覺脅下痛百節骨痛欬不能下食兼口舌乾生瘡柴胡湯方

柴胡八分 升麻六分 芍藥六分 黃芩六分

甘草五分 石膏十二分碎綿裹 生麥門冬六分去心 葱白半分

香豉六合綿裹 生薑六分 竹葉切一升洗

右十一味切以水九升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里進一服不吐不利差忌海藻菘菜熱麪油膩出第一卷中

集驗療天行病上氣欬嗽多唾黏涎日夜不定生薑煎方

生薑三兩去皮切碎如豆粒大

右一味以餳半斤和微煎令爛每日無問早晚少少含仍嚥其滓一時燕之

必効療天行病後因食酒麪肺中熱擁遂成欬不止方

桑白皮十二分 桔梗十分 肥乾棗二十一枚擘 麻黃六分去節

常州亭藶子十分熬令紫色別搗為膏

右五味切先以水四升煮桑白皮等四味可取一升半去滓下亭藶子膏更煎三五沸去滓分溫五服空心食後服或利勿怪忌猪肉油膩生冷果子等物

天行發斑方三首

病源夫熱病在表已發汗未解或吐下後熱毒氣不散煩躁謬語此為表虛裏實熱氣燥於外故身體發斑如錦文凡發斑不可用發表藥令瘡開洩更增斑爛表虛故也出第九卷中

肘後此歲有病天行發斑瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療劇者數日必死療得差後瘡瘢紫黑彌歲方滅此惡毒之氣也世人云以建武中於南陽擊虜所得仍呼為虜瘡諸醫參詳作療用之有効方

取好蜜通身摩瘡上亦以蜜煎升麻數數拭之亦佳

又方

以水濃煮升麻漬綿洗之若酒漬煮彌佳但燥痛難忍也並出第二卷中

文仲陶氏云天行發斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣方

云永徽四年此瘡從西域東流于海內但煮葵菜葉蒜齏啖之則止鮮羊血入口亦止初患急食之少飯下菜亦得出第二卷中

天行發瘡豌豆皰瘡方一十一首

病源夫表虛裏實熱毒內盛攻於藏腑餘氣流於肌肉遂

於皮膚毛孔之間結成此瘡重者匝遍其身狀如火瘡若根赤頭白則毒輕若色紫黑則毒重其瘡形如豌豆亦名豌豆瘡脈洪數者是其候也出第六卷中

千金療人及六畜天行熱氣病豌豆瘡方

濃煮黍穰汁洗之若是穄穰則不差瘡若黑者擣蒜封之又煮乾芸薹汁洗之

又方

真波斯青黛大如棗水服之差

又療病後發豌豆瘡方

黃連三兩去毛水二升煮取八合頓服之忌猪肉冷

水

又若赤黑發如疥大者方

煎羊脂摩傅之

又方

青木香二兩水三升煮取一升頓服之効

又方

小豆屑和雞子白傅之

又方

以月布拭之

又療豌豆瘡初發覺壯熱者方

煮大黃五兩服之延年同

又療瘡出煩疼者木香湯方

青木香二兩 丁香一兩 薰陸香一兩 白礬一兩

麝香二分

右五味以水四升煮取一升半分再服熱盛者加一兩生犀角如無犀角以升麻代之如病輕去礬石大神効

又方

瘡上以芒消和猪膽塗勿動痂落無瘢仍臥黃土末上良此病小便澀有血者中壞瘡皆黑靨不出膿死不療

又內發瘡盛方

臘四合大猪膽一具

右二味煎三沸一服一合日五服良驗 並出第十卷中

延年療天行壯熱病後發瘡如豌豆遍身大青湯方

大青三兩　梔子一七枚擘　犀角一兩屑　豉五合

右四味切以水五升煮取二升分三服服之無所忌

古今錄驗水解散療天行熱氣則生皰瘡疼痛解肌出汗方 出第[illegible]

麻黃四兩去節　黃芩三分　芍藥二分　桂心一分

右四味擣篩煖水解服二方寸匕覆令出汗日再服差

者藏之忌海藻菘菜生葱 延年同出第二卷中方有大黃三分甘草二分

天行虛煩方二首

病源夫天行病陰氣少陽氣多故身熱而煩其毒氣在於心腑而煩者則令人悶而欲嘔若其人胃內有燥糞而煩者則謬語時繞臍痛腹滿皆當察其證候也 出第九卷中

文仲療天行表裏虛煩不可攻者但當與竹葉湯方

竹葉二把　石膏一升碎綿裹　麥門冬一升去心　半夏半升洗

人參　甘草炙各二兩

右六味切以水一斗煮取六升去滓內粳米一升煮米熟去之分五服嘔者與橘皮湯湯方在上嘔噦篇中不

愈者重作此宜泰數用甚効若傷寒後虛煩亦宜服此方是仲景方忌羊肉海藻菘菜餳

又療虛煩不可攻方

青竹茹一升

右一味以水四升煎至三升去滓分溫五服徐徐服之

天行狂語方三首

病源夫病熱盛則弃衣而走登高而歌或至不食數日踰垣上屋所上非其素時所能也病反能者皆陰陽氣爭而外并於陽四肢者諸陽之本也陽盛則四肢實實則能登高而歌熱盛於身故弃衣而走陽盛故妄言罵詈不避親

疏大熱遍身狂言而妄見妄聞也 出第九卷中

千金水道散療天行病煩熱如火狂言妄語欲走方

白芷一兩　甘遂二兩熬

右二味擣篩以水服方寸匕須臾令病人飲冷水腹滿則吐之小便當赤也一名濯腹湯此方療大急者 出第十卷中 文仲范汪同

又五苓散主天行熱病但狂言煩躁不安精采言語與人不相主當方

猪苓二分　白朮三分　澤瀉五分　茯苓三分

桂心二分

右五味擣篩爲散水服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈忌大酢生葱桃李雀肉等 張仲景論深師同出第九卷中

古今錄驗療天行壯熱狂言譫語五六日者方

雞子三枚 芒消方寸七 井花水一杯

右三味合攪盡服之心煩下則愈 出第三卷中

天行熱毒攻手足方五首

病源熱毒氣從藏腑中出攻於手足則焮熱赤腫疼痛也人五藏六腑井滎輸皆出於手足指故此毒從內而出攻於手足也 出第九卷中

肘後療天行病毒熱攻手足疼痛赤腫欲脫方

鹽豉及羊肉一斤以來

右三味以水一斗煮肉熟以汁看冷煖漬手足日三度差 范汪同

又方

細剉黃蘗五斤許以水三斗煮漬之必効亦治攻陰腫

又方

作坎令深三尺大小容兩足燒坎中令熱以酒灌坎中著屐踞坎上衣壅勿令氣泄日再作之

又方

煮羊桃葉汁漬之加少鹽尤好 並出第二卷中

崔氏療天行熱毒攻手足方

猪蹄一具去毛剉碎合葱白一握切以水一斗煮熟去滓內少鹽以漬之 肘後同出第一卷中

天行大小便不通脹滿及澀方四首

病源天行大小便不通此由脾胃有熱發汗大過則津液竭津液竭則胃乾燥結熱在內故大便不通又汗後津液虛少其人小腸有伏熱故小便不通 出第九卷中

廣濟療天行熱氣惡寒頭痛壯熱大小便澀柴胡散方

柴胡八分 茵蔯十分 青木香十分 黃芩八分

土瓜根十分 白鮮皮八分 梔子人十分 大黃三十分

芒消十二分

右九味擣爲散平辰空肚以新汲水服五六錢匕少時當一兩行微利利後煮葱豉稀粥食之熱如未歇明辰更服四錢匕熱歇停藥忌熱食猪犬肉油膩等

又療天行惡寒壯熱頭痛大小便赤澀不下食飲柴胡湯方

柴胡七分 茵蔯七分 大黃十二分別漬 升麻七分

梔子四枚擘 芒消四分湯成下 芍藥七分 黃芩十二分

右八味切以水四升先漬藥少時猛火煮取一升五合

分溫三服服別相去如人行六七里與一服以快利爲度第二服則利更不須服之忌熱食炙肉蒜粘食（並出第一卷中）

近効主天行後兩脅脹滿方

熬鹽熨之如小便澀亦用鹽熨臍下如水𣹢以穀枝汁服愈大効

集驗療天行病腹脹滿大小便不通滑石湯方

滑石（十四分研）　葶藶子（一合紙上熬令紫色擣）　大黃（二分切）

右三味以水一大升煎取四合頓服兼擣葱傅小腹乾即易之効（崔氏同無大黃）

天行熱痢及諸痢方四首

病源此由熱氣在腸胃挾毒則下黃赤汁也又熱毒傷於腸胃故下膿血如魚腦或爛肉汁壯熱而腹絞痛此溫毒熱氣所爲也（並出第九卷中）

深師療天行毒病酷熱下痢七物升麻湯方

升麻　當歸　黃連（去毛）　甘草（炙）

芍藥　桂心　黃檗（各半兩）

右藥切以水三升煮取一升頓服之忌海藻菘菜猪肉冷水生葱等物

又天行諸下悉主黃連湯方

黃連（三兩去毛）　黃檗（二兩）　當歸（二兩）

右三味以水六升煮取三升去滓內蜜一合微火煎取二升半分三服良驗忌猪肉冷水（並出第十四卷中一方有龍骨一兩）

范汪療天行熱毒下痢赤白久下膿血及下部毒氣當下細蟲如布絲縷大或長四五寸黑頭銳尾麝香丸方

麝香（一分）　附子（二分炮）　雄黃　丹砂

乾薑（各二分）

右五味各擣下篩訖復更合治之蜜和爲丸如小豆大飲下一丸老少半之効驗忌猪肉生血等（出第三十三卷中）

甲乙方療天行熱病差後痢膿血不止方

龍骨（一兩）

右一味擣研爲末米飲下一錢不許時節日二服佳

天行𧏾瘡方八首

病源毒熱結在腹內穀氣衰毒氣盛三蟲動作食人五藏多令泄痢下部瘡痒若下唇內生瘡但欲寐者此蟲食下部也甚者肛爛見五藏（出第九卷中）

深師療天行下部𧏾爛方

烏梅（二七枚去核）　大蒜（一七枚）　屋塵（半升篩取細者）

右三味擣篩爲散苦酒一升同投於銅器中煎成丸作長挺內下部（范汪同出第十四卷中）

范汪療人下部中痒方

蒸蓼取汁以水銀熟研丸之令相得長二三寸以綿薄裹內大孔中蟲出差

又療穀道中瘡方

以水中荇葉細擣綿裹內下部日三 肘後同

又療天行䘌蟲食下部生瘡雄黃兌散方

雄黃半兩 青葙子三兩 苦參 黃連各三兩

桃人一兩半去皮尖及兩人熬

右五味合擣篩綿裹如半棗核大內下部亦可米汁服方寸匕日二服忌猪肉冷水及蒜麪炙肉蒜等物

又桂枝湯療天行䘌病方

桂心二兩 小蘗二兩

右二味㕮咀以水一斗煮取二升半內猪肝十兩去上膜細研着湯中和令相得臨時小溫若蟲悉在腹內盡服之在下部者三分藥中用一分竹筒內下部中服亦一時間當下細蟲如髮大五六升小兒半作之忌生葱 范汪同出第二十一卷中

又姚氏療天行病䘌下部生瘡方

濃煮桃皮煎如糖以綿合導下部中若口中生瘡含之 肘後范汪同出第二卷中

甲乙方療天行病有䘌蟲蝕下部生瘡青葙子散方

青葙子一兩 藋蘆二兩 狼牙一兩 橘皮一兩

苦參三兩

右五味擣篩爲散米飲和服方寸匕日三服未差更服以差爲度

又療天行痢膿血下部生䘌蟲黃連丸方

黃連三兩末生用 蠟一兩 烏梅肉三兩熬末

右三味鎔蠟和蜜爲丸如梧子大空心米飲下三十丸再服加至四十丸差忌猪肉冷水

天行陰陽易方二首

病源天行陰陽易病者是男子婦人天行病新差未平復而與交接得病者名爲陰陽易也其男子病新差未平復而婦人與之交接得病者名爲陽易其婦人新病差未平復男子與之交接得病者名爲陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度著於人如換易也其病狀身體熱衝胷頭重不能舉眼中生䁾四肢拘急小腹絞痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急氣上衝胷頭重不欲舉百節解離經脉緩弱血氣虛骨髓竭便嘘嘘吸吸氣力轉少著牀不能搖動起止仰人或歲月方死 出第九卷中

深師療丈夫得婦人陰易之病若因房室及諸虛勞少腹堅絞痛陰縮困篤欲死方

灸陰頭一百壯便差可至三百壯皆愈良無比後生子如故無妨 范汪同無所忌

又療陰陽易病方

取豚卵二枚溫令熱酒吞之則差 出第十四卷中

天行虛羸方二首

病源夫人榮衛先虛復爲邪熱所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭絕虛邪始散眞氣尚少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生衆病焉 出第九卷中

崔氏療煩躁而渴不止惡寒仍熱盛者竹葉湯常用亦佳不徒療天行凡虛羸久病及瘧後胸上痰熱者服之皆妙方

甘草二兩炙　棗十五枚擘　半夏一兩洗　芍藥三兩
前胡一兩　黃芩一兩　小麥五合　人參二兩
粳米一升　知母二兩　麥門冬四合去心　栝樓一兩
生薑四兩　竹葉一把 須以竹葉飲代水煮湯不用其葉

右十四味切以竹葉飲一斗五升煮取五升分三服若非天行而虛羸久病胸生痰熱亦可服之加黃耆二兩除黃芩減知母一兩除栝樓用之大効忌羊肉餳藻菘菜餳 出第十卷中 通按藥乃小竹即淡竹也

千金補虛大病後不足萬病虛勞同此方

取五歲以上七歲以下黃牛新生者乳一升以水四升煎取一升如人肌稍稍飲之不得過多十日不住服佳 出第十卷中

天行差後禁忌方二首

集驗云凡熱病新差及大病之後食猪肉及腸血肥魚油膩等必大下痢醫不能療也必至於死若食餅餌粢黍飴脯鱠炙棗栗諸果及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃中虛冷大利難禁不下必死下之復危皆難救也熱病之後多坐此死不可不愼也

病新差但得食糜粥寧可少食令飢愼勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁兎雉鹿肉愼不可食猪狗肉也新差後當靜臥愼勿令人梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞凡此皆令勞復故督郵顧子獻得病已差未健詣華旉視脉旉曰雖差尚虛未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內即死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病舌出數寸而死病新差未經百日氣未平復而以房室者略無不死也盎正疾愈後六十日已能行射

猶以房室則吐涎而死及熱病房室名為陰陽易之病皆難療多死近者有士大夫小得傷寒發汗已十餘日能乘馬行來自謂平復故以房室則小腹急痛手足拘攣而死（出第二卷中千金同）

深師說天行病未復（飽食黃花菜手足稍重一方云青花）天行病差（食鱣鱠必變成瘧又食蟹魚內結氣不化）天行病差（飲酒合陰陽復必死）天行病損未滿三月日（食吃蛋肉則復下血食鹽豉令人四肢不舉）天行病差（食諸菜有花者二年眼膚不充）天行病未好時（食生瓜茶二月流曠也）天行病差（食菜合陰陽復死出第十四卷中）又千金天行病差（復未滿五日食一切肉物者病更發困）天行病差（食芥[illegible]作疽）天行病差（新起飲酒及食瘥菜病更發）天行病新差（食生魚鮓下痢必不止）天行病差（食生菜顏色絕身不平復）天行病新汗解（飲冷水者損心包令人虛不復）天行病未損（食犬肉羊菊萎合食之後則死）天行病差者（食生棗及羊肉瘍上作熱蒸）天行新差（食大肉羊肉作骨中蒸熱）天行病差（食魚肉并瓜生菜令人身體）天行病差（食蒜膾者病發大困出第十卷中）

天行勞復食復方六首

病源夫病新差血氣尚虛津液未復因即勞動更成病焉若言語思慮則勞傷於神梳頭澡洗則勞於力未堪勞而強勞之則生熱熱氣既還入經絡復為病者名曰勞復又病新差脾胃尚虛穀氣未復若食肥肉魚膾餅餌棗栗之屬則未能消化停積在於腸胃使脹滿結實因更發熱復為病者名曰食復（並出第九卷中）

廣濟療患天行熱氣差後勞發頭痛如初病者鼠矢湯方

雄鼠屎（三七枚熬末湯成下） 乾葛（二兩） 梔子（十四枚擘） 葱白（一升）
豉（八合）

右五味切以水三升煮取一升七合去滓內鼠屎末分溫二服服別相去如人行六七里微汗內消不利忌如藥法

又療患數日復勞發者枳實湯方

枳實（炙三枚） 梔子（十四枚擘） 葱白（切一升） 香豉（一升）
鼠屎（二七枚）

右五味以水一斗煎取二升五合分溫三服服[illegible]如人行六七里進一服內消不利忌如藥法（並出第十一卷中）

深師竹葉湯療天行後虛熱牽勞食復四肢沉重或一臥一起氣力吸吸羸弱方

竹葉（一把） 小麥（一升） 甘草（一兩炙） 石膏（一兩碎）
茯苓（二兩） 半夏（一升洗去滑） 前胡（二兩） 知母（二兩）
黃芩（二兩） 人參（二兩） 生薑（四兩） 大棗（二十枚擘）

右十二味切以水一斗二升煮竹葉小麥減四升去滓內藥煮取三升分三服忌海藻菘菜醋物羊肉餳等物

備急療勞復方

以粉三升以暖飲和服厚覆取汗又以水和敷粉少

許服之亦佳 出第一卷中

延年葛根飲主熱病勞復身體痛天行壯熱煩悶葛根湯方

葛根一兩 葱白一握 豉半升 米一合

右四味先切葛根以水九升煮取七升則內葱白更煮取四升去葛及葱滓訖則內豉及少許米煮取三沸并濾去米等滓分四服當有汗出即差明旦又更作服忌豬肉蒜等 並出第九卷中

必効療天行勞復鼠矢湯方

雄鼠屎五枚兩頭尖者 豉一升 梔子二十枚擘 枳實三枚炙[illegible]

右四味以水五升煮取二升四合分四服相去十里久若覺大便澀加大黃二兩 出第一卷中

天行差後勞發方五首

許仁則云此病復發不但起動勞役或因飲食稍多或因言語過分或緣視聽不節或緣動轉不常皆致此復若復甚者乃至不救劇於初得病時不可以復發而云輕易勞復狀一如傷寒初有如此者宜合葱白等七味先服之漸覆取汗方

葱白連鬚切一升 乾葛切六合 新豉一合綿裹 生薑切二合 生麥門冬去心八合 乾地黃六合 勞水八升此水以杓揚之一千過

右藥用勞水煎之三分減二去滓分溫三服相去行八九里如覺欲汗漸漸覆之兼主傷寒忌蕪荑

又依前葱白等七味飲服之得可但適寒溫將息以取安穩若不覺可宜合葳蕤等五味飲子服之方

葳蕤切五兩 葱白切一升 豉心一升綿裹 粳米三合研碎 雄鼠屎七枚末之

右藥以水七升先煮豉以上取四升汁去滓內粳米屑煮米爛訖內鼠屎末攪調頓服覆被安臥取汗差

又凡天行病差後準常合漸健能行履遂過限不堪起動

體氣虛羸每覺頭痛唇口乾乍寒乍熱發作有時或雖能行動運轉然每作時節有前狀者名天行後不了了有此宜合地骨白皮等五味飲子白薇等十味丸方細細服之

地骨白皮三兩 知母三兩 麥門冬去心五兩 竹瀝一升 白蜜三合

右藥切知母以上和麥門冬然後以水六升煮取二升去滓內竹瀝蜜攪調分溫三服服相去如人行十里久如覺虛不能空腹頓盡欲間食服亦佳兼主傷寒

又若服前地骨白皮等五味飲子不可雖可不能全退宜合白薇等十味丸方

白薇三兩　知母四兩　地骨皮三兩　乾地黄六兩
麥門冬五兩去心　甘草四兩炙　蜀漆三兩　萎蕤三兩
橘皮二兩　人參三兩

右藥細切合擣篩綃羅爲散蜜和丸如梧桐子大初服以飲下十五丸日再服稍加至三十丸服經三數日後自候腹中若覺熱則食前服如不能以空飲下藥宜合烏梅等四味飲下前丸忌菘菜海藻蕪荑等

烏梅飲方

烏梅十枚　萎蕤五兩　生薑五兩　白蜜一合

右藥切以水六升煮三味取二升去滓内白蜜攪調細

細用下前丸多少冷煖以意斟酌縱不下丸但覺口乾渴則飲之吳昇同

右從事郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事趙子孟校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第三卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第四卷目録 温病及黄疸二十門

温病論病源一首
辟温方二十首
斷温令不相染方二首
温病噦方四首
温病渴方二首
温病發斑方七首
温病勞復方四首
諸黄方一十三首
急黄方六首

黄疸方一十三首
黄疸遍身方一十一首
癖黄方三首
黄疸小便不利及腹滿喘方二首
黄汗方二首
女勞疸方四首
黑疸方三首
酒疸方七首
穀疸方三首
許仁則療諸黄方七首

辨黃病方三首

唐王燾先生外臺秘要方第四卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓
男 聖錫 爲命 仁錫 爲恕 父仝校

溫病論病源二首

病源經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒觸冒之者乃爲傷寒耳其傷於四時之氣皆能爲病以傷寒爲毒者以其最爲殺厲之氣中而即病者名爲傷寒不即病者其寒毒藏於肌膚中至春變爲溫病至夏變

爲暑病暑病者熱極又重於溫也是以辛苦之人春夏多溫熱病者皆由冬時觸冒寒冷之所致（以上與傷寒論同）凡病傷寒而成溫病者先夏至日者爲病溫後夏至日者爲病暑故冬三月早臥晚起必待日光使志若伏若匿若有私意若已有得去寒就溫無泄皮膚使氣亟奪又因於寒欲如運樞故冬傷於寒春必病溫也又有冬時傷非節之暖名爲冬溫之毒與傷寒大異也有病溫者乃天行之病耳其冬月溫暖之時人感乖候之氣未遂發病至春或被積寒所折毒氣不得泄至天氣暄熱溫毒始發則肌肉斑爛也經曰虛邪賊風避之有時恬淡虛無眞氣從之

精神內守病安從來故曰人清淨則肉腠閉拒雖有大風
苛毒弗之能害又云四時陰陽者萬物之根本也是以聖
人春夏養陽秋冬養陰以從其根也從陰陽則生逆之則
死故曰精者身之本藏於精者春不病溫也有病溫汗出
輒復熱而脉躁疾不為汗衰狂言不能食病名為何曰病
名陰陽交交者死人所以汗出者皆生於穀穀生於精今
邪氣交爭於骨肉之間而得汗者是邪却而精勝也精勝
則當能食而不復熱熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而
輒復熱者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽
可立而傾也汗出而脉尚躁盛者死今脉不與汗相應此

不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三
死不見一生雖愈必死凡膚熱其脉盛躁者病溫也其脉
盛而滑者汗且出也凡溫病人三二日身軀熱脉疾頭痛
食飲如故脉直疾八日死四五日頭痛脉疾喜吐脉來細
十二日死此病不療八九日脉不疾身不痛目不赤色不
變而反利脉來牒牒按不彈手指時大心下硬十七日死
病三四日以下不得汗脉大疾者生脉細小難得者死不
治也下利腹中痛者死不治

辟溫方二十首

肘後屠蘇酒辟疫氣令人不染溫病及傷寒歲旦飲之方

大黃　桂心各十五銖　白朮十銖　桔梗十銖
菝葜　蜀椒十銖汗　防風　烏頭各六銖

右八味切絳袋盛以十二月晦日中懸沉井中令至泥
正月朔旦平曉出藥至酒中煎數沸于東向戶中飲之
屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家
飲一里無疫飲藥酒待三朝還滓置井中能仍歲飲可
世無病當家內外有井皆悉著藥辟溫氣也

又太乙流金散辟溫氣

雄黃三兩　雌黃六兩　礬石一兩半　鬼箭羽一兩半
羖羊角二兩燒

右五味治下篩三角絳袋盛一兩帶心前并掛門戶上
若逢大疫之年以月旦青布裹一刀圭中庭燒之溫病
人亦燒熏之

又雄黃散辟溫氣方

雄黃五兩　朱砂一作赤朮　菖蒲　鬼臼各二兩

右四味搗篩末以塗五心額上鼻人中及耳門

又斷溫疫轉相染著至滅門延及外人無收視者方

赤小豆　鬼箭羽　鬼臼　雄黃各三兩

右四味搗末以蜜和丸如小豆大服一丸可與病人同
床

又辟溫粉
川芎　蒼朮　白芷　藁本
零陵香各等分
右五味擣篩為散和米粉粉身若欲多時加藥增粉用之出第十卷中
千金辟溫虎頭殺鬼丸方
虎頭骨五兩炙　朱砂一兩半研　鬼臼一兩　雄黃一兩半研　皂莢一兩炙　雌黃一兩半研　蕪荑一兩
右七味擣篩以臘蜜和如彈丸大絳囊盛繫臂男左女右家中置屋四角月朔望夜半中庭燒一丸忌生血物

肘後同
又治瘴氣竹茹湯方
青竹茹二升
右一味以水四升煮取三升分三服
又辟溫病粉身散方
芎藭　白芷　藁本
右三味等分擣下篩內米粉中以粉塗身延年同
又斷溫疫朱蜜丸方
白蜜和上等朱砂粉一兩常以太歲日平旦大小勿食向東方立人吞三七丸如麻子大勿令齒近之并

吞赤小豆七枚投井泉水中終身勿忘此法
又治溫病不相染方
正旦吞麻子赤小豆各二七枚又以二七枚投井中肘後延年同
又方
新布盛大豆一升內井中一宿出服七枚肘後用小豆
又方
切松葉如粟米酒服方寸匕日三服辟五年溫
又方
常以七月七日合家吞赤小豆向日吞二七枚

又方
常以七月七日男吞大豆七枚女吞小豆七枚
又方
神仙教人立春後有庚子日溫蕪菁菹汁合家大小並服不限多少
又辟溫氣蒜豉湯方
蒜五十子并皮研之豉心一升
右二味以三歲小兒小便二升合煮五六沸頓服並出第九卷中
千金翼老君神明白散方

白朮二兩 桔梗一兩 細辛一兩 附子一兩炮

烏頭四兩去皮

右五味擣篩絳囊盛帶之所居閭里皆無病若有得疫癘者溫酒服一方寸匕覆取汗得吐則差若經三四日者以三方寸匕內五升水中煮令大沸分三服

又度瘴散方

麻黃去節 升麻 附子炮 白朮各一兩

細辛 防巳 乾薑 桂心

防風 烏頭炮 蜀椒去目出汗 桔梗各二分

右十二味擣篩爲末密封貯之山中所在有瘴氣之處旦空腹服一錢匕覆取汗病重稍加之並出第十卷中

古今錄驗許季山所撰干敷散主辟溫疫疾惡令不相染著氣方肘後作敷于抱朴子作敷于

附子一枚 細辛一分 乾薑一分 麻子研一分

柏實一分

右五味擣篩爲散正旦舉家以井華水各服方寸匕服藥一日十年不病二日二十年不病三日三十年不病受師法但應三日服歲多病三日一服之肘後抱朴子延年秘錄同同出第二卷中

又殺鬼丸去惡毒方

雄黃研五兩 朱砂研五兩 鬼臼五兩 鬼督郵五兩

雌黃研五兩 馬兜鈴五兩 皂莢炙五兩 虎骨炙五兩

阿魏五兩 甲香一兩 羚羊角屑一枚 桃白皮五兩

白膠香一兩 菖蒲五兩 羖羊角屑一枚 臘蜜八斤

石硫黃研五兩

右十七味擣篩十六味臘蜜和之丸如杏子將往辟溫處燒之殺鬼去惡毒氣若大疫家可燒并帶行與前肘後方九味同不同出第十卷中

延年秘錄辟溫方

正旦取東行桑根大如指長七寸以丹塗之懸著門戶上又令人帶之出第十卷中

辟溫不相染方二首

病源此病皆因歲時不和溫涼失節人感乖候之氣而生病則病氣轉相染易乃至滅門延及外人故須預服藥及爲法術以防之出第十卷中

千金斷溫疫主溫病轉相染著乃至滅門延及外人無收留者赤小豆丸方

赤小豆二兩 鬼臼二兩 鬼箭二兩 丹砂研二兩

雄黃研二兩

右五味末之以蜜和如小豆大服一丸可與病人同床

傳不也 出第九卷中

延年主辟溫疫疾惡氣令不相染易豉湯方

豆豉一升 伏龍肝三兩研 小兒小便三升

右三味用小便煎取一升五合去滓平旦服之令人不著瘴疫天行有瘴之處宜朝朝服 出第十卷中

溫病噦方四首

病源伏熱在胃令人胸滿胸滿則氣逆氣逆則噦若大下後胃中虛冷亦令致噦也 並出第十卷中

小品茅根湯療溫病有熱飲水暴冷噦者方

茅根 葛根各切半升

右二味以水四升煮取二升稍溫飲之噦止則停

又療溫病熱未除重被暴寒寒毒入胃熱蘊結不散變噦者方

單煮梓皮稍稍飲之佳溫病積飲冷冷結胃中熱入腎中發壯熱大噦者服梓皮溫噦得止也夫腎中有熱者病差後足心皮喜剝脫去頭髮禿落是其證也

又茅根橘皮湯療春夏天行傷寒溫病干胃冷變噦方

白茅根切一升 橘皮二兩 桂心二兩 葛根二兩

右四味切以水六升煮取三升分溫服三合數連服之盡復合噦止乃停耳微有熱減桂一兩 文仲古今錄驗同出第六卷中

古今錄驗療溫病有熱飲水暴冷噦枇杷葉飲子方

枇杷葉拭去毛 茅根各半升

右二味切以水四升煮取二升稍稍飲之噦止則停 出第三卷中

溫病渴方二首

病源熱氣入腎藏腎藏惡燥熱氣盛則腎燥腎燥則渴引飲也 出第十卷中

深師療溫毒病及吐下後有餘熱渴芍藥湯療方

芍藥六分 黃連四分 甘草二分炙 黃芩二兩

桂心二兩 栝樓 分

右六味切以水五升煮取三升分三服一日令盡 出第十四卷中

古今錄驗知母解肌湯療溫熱病頭痛骨肉煩疼口燥心悶者或是夏月天行毒外寒內熱者或已下之餘熱未盡者或熱病自得痢有虛熱煩渴者方

麻黃二兩去節 知母三兩 葛根三兩 石膏三兩

甘草二兩炙

右五味切以水七升煮取三升分為三服若已下及自得下虛熱未歇者除麻黃加知母葛根病熱未除因變噦者可除麻黃加白薇人參各二兩則止 小品同出第二卷中

温病發斑方七首

病源夫人冬月觸冒寒毒者至春始發病病初在表或已發汗吐下而表證未罷毒氣不散故發斑瘡又冬月天時温暖人感乖候之氣未即發病至春又被積寒所折毒氣不得泄至夏遇熱其春寒解冬温毒始發出於肌膚斑爛隱疹如錦文也 出第十卷中

肘後療温毒發斑大疫難救黑膏方

生地黄半斤 好豉一升

右二味以猪膏二斤合露之煎五六沸令三分減一絞去滓末雄黄麝香如大豆者內中攪和盡服之毒便從

皮中出則愈忌蕪荑 出第二卷中

小品葛根橘皮湯療冬温未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬温毒始發出肌中斑爛隱疹如錦文壯熱而欬心悶嘔但吐清汁宜服此湯則靜方 大効

葛根二兩 橘皮二兩 杏人二兩去尖皮 麻黄二兩去節

知母二兩 黄芩二兩 甘草二兩炙

右七味切以水七升煮取三升分温三服嘔悶吐當先定便且消息 古今録驗同 出第六卷中

華佗療肺熱藏熱暴氣斑點香豉湯方

香豉一升綿裹 葱鬚切四兩 石膏八兩 梔子人二兩

生薑八兩 大青二兩 升麻三兩 芒消三兩

右八味切以水六升煮七味取二升五合去滓然後下芒消分三服 出第十卷中

備急療温毒發斑赤斑者五死一生黑斑者十死一生大疫難救黑奴丸方

麻黄三兩去節 大黄二兩 芒消一兩 黄芩一兩

釜底墨一兩研 竈突墨一兩研 梁上塵二兩研

右七味擣末用蜜和如彈子大新汲水五合研一丸服之若渴但與水須臾當寒寒訖便汗則解日移五丈不覺更服一丸此療六日胷中常大熱口噤名壞病醫所

不療服此丸多差 胡洽小品同一名水解丸又一方加小麥黑勃一兩名爲麥奴丸范汪方同

古今録驗黄連橘皮湯療冬温未即病至春被積寒所折不得發至夏得熱其春寒解冬温毒始發出肌中斑爛隱疹如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡已自得下利宜服此方

黄連四兩去毛 橘皮二兩 杏人二兩去尖皮 枳實一兩炙

麻黄二兩去節 葛根二兩 厚朴一兩炙 甘草一兩炙

右八味切以水八升煮取三升分三服令盡且消息下當先止

又漏蘆橘皮湯療冬温未即病至春被積寒所折不得發

至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛隱疹如錦文而欬心悶嘔吐清汁眼赤口瘡下部亦生瘡方

漏蘆　橘皮　甘草　麻黄去節

杏人去皮尖　黄芩各二兩

右六味切以水九升煮取三升分四服得下爲佳下後餘外證未除更服葛根橘皮湯方在前小品方一方有知母枳實白薇升麻大黄甘草爲十二味出第三卷中

又發斑瘡方

黄連三兩去毛切

右一味以水二升煮取八合頓服之忌豬肉冷水

溫病勞復方四首

病源溫病勞復謂病新差津液未復血氣尚虛因勞動早更生於熱熱氣還入經絡復成病也

又凡得溫毒病新差脾胃尚虛穀氣未復若食犬豬羊肉并腸血及肥魚炙脂膩必大下痢下痢則不可復救又食餅餌炙鱠棗栗諸生果難消物則不能消化停積在於腸胃便脹滿結實大小便不通因更發熱復成病也非但雜食梳頭洗浴諸勞事等皆須慎之如桃李生葱生棗蘇孫萊雀肉等並在所忌並出第十卷中

千金論曰凡熱病新差及大病之後食豬肉及腸血肥魚炙膩必大下痢醫所不能療也必至於死若食餅餌粢黍飴脯炙鱠棗栗諸果及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃虛冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也病新差後但得食糜粥寧可少食令饑慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹汁雉兔鹿肉不可食豬狗肉也新差後當靜卧慎勿早起勿令人梳頭澡洗非但體勞亦不可多語言用心使意勞凡此皆令人勞復有人得病已差而未健詣華旉視脉曰雖差尚虛未復陽氣不足勿爲勞事餘勞尚可御內則

死臨死當吐舌數寸其妻聞其夫病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病舌出數寸而死病新差未滿百日氣力未平復而以房室者略無不死及熱病房室名陰陽易之病皆難療多死古今錄驗集驗同

又療重病新差早起勞及飲食多致復欲死方

燒鼈甲末服方寸匕忌莧菜肘後集驗文仲備急同

深師療溫病差愈食復病麻黄散方

麻黄十分去節　大黄十五分炙　附子一分炮　厚朴二分炙

苦參六分　石膏六分碎綿裹　烏頭六分炮

右七味擣篩以酒若米汁和服方寸匕日三夜二服第

十四卷中

古今錄驗療熱病後麻子湯吳正服効方

麻子一升　豉一升　壯鼠屎二十一枚

右三味以水五升煮取二升半分温三服立愈試之有効驗肘後同

又大黃丸方

大黃二兩蒸之二斗米下　巴豆五十枚去心皮熬　消石三分熬黑者以芒消代之

桂心二分　乾薑一分炮

右五味擣篩四味別擣巴豆令如泥合和以蜜更擣二千杵丸如梧子一丸湯服之但熱在膈上當吐在膈下當利隊作粥如服他吐下丸法服藥兩食頃不吐下以熱飲動之若不得吐下可更服一丸半能藥壯人可二丸此藥優於他下藥丸故宜大小下多冷粥解之若有療綿挺如指當和一丸塗挺頭上內瘡中羅出之不差更作温病不得大便服之得下住宿食不消亦服之飛尸遁尸欬服半丸日一瘧須臾止心腹脹滿痛服一丸瘧者依發日先宿勿食清晨服一丸下壯人服二丸得利下忌飢過發時乃食婦人産後血結中奔走起上下或絕産無子或月經不調面目青黃服半丸小兒淋瀝寒熱臚脹大腹不欲食食不生肌三四歲者如麻子服

一丸日一六七歲兒服二丸比三十日心腹諸病差兒小半之愈大良忌野猪肉蘆笋生葱出第三卷中

諸黃方一十三首

病源黃病者一身盡疼發熱面色洞黃七八日後結熱在裏有血當下去之如豚肝狀其人小腹滿急若其人眼睛澀疼鼻䶊疼兩膊及項強腰背急則是患黃大便澀但令得小便快則不慮死不用大便多多則心腹脹不好此由寒濕在表則熱畜於脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相搏鬱蒸不得消則大小便不通故身體面目皆變黃色凡黃候其寸口近掌無脉口鼻氣冷並不可療之必死出第十二卷中

仲景傷寒論諸黃猪膏髮煎主之方

猪膏八兩　亂髮大如雞子一枚

右二味内髮膏中煎之髮消盡研絞去膏細滓分二服病從小便去也肘後備急文仲千金古今錄驗深師范汪同五十太醫史脫家婢再病胃中乾糞下便差神驗出第十四卷中

刪繁療天行毒熱通貫藏腑沉鼓骨髓之間或爲黃疸黑疸赤疸白疸穀疸馬黃等疾喘息須臾而絕瓜蔕散方

瓜蔕二七枚　赤小豆二七枚　秫米二七粒

右三味擣篩爲散取如大豆粒吹於兩鼻之中甚良不差間日復服之千金范汪集驗同

又方

瓜蒂二七枚

右一味以水一升煮取五合作一服

又方

鹽一升

右一味紙裹濕燒之取通赤內三升水中攪令調手巾漉度爲一服已前二方服訖並吐出黃汁

崔氏療黃貧家無藥者可依此方

取柳枝三大升以水一斗煮取濃汁攝半升一服令盡

又療黃兼主心腹方

蔓菁子一大合揀令淨

右一味擣碎熟研以水一升更和研濾取汁可得一大盞頓服之少頃自當轉利或亦自吐腹中便寬亦或得汗便愈 備急文仲深師同並出第一卷中

延年秘錄療黃瓜蒂湯方

瓜蒂一兩 赤小豆四十九枚 丁香二七枚

右三味擣末以水一升煮取四合澄清分爲兩度滴入兩鼻中 出第十卷中

救急療三十六種黃方

蛇床子一顆并殼燒作灰研酢一合又温之攪和頓服身體眼暗極黃者不過三顆鼻中蟲出神効

又療諸黃開黃眼闇及大角赤黑黃先擲手足內黃患渴癖黃眼赤黃臍黃小便不通氣急心悶五色黃瓜蒂散方

丁香 瓜蒂 赤小豆各十枚

右三味細擣篩取漿水一雞子許和服大神驗 並出第十七卷中 深師同

必効療一切黃蔣九處得其父老使得黃服此極効茵陳湯及丸方

茵陳四兩 大黃三兩 黃芩二兩 梔子擘三兩

右四味切以水五升煮取三升分爲三服空肚服之不然擣篩蜜和爲丸飲服二十丸稍稍加至二十五丸量病與之重者作湯勝服丸日一服忌羊肉酒麪熱物等以差爲限小便黃色及身黃者並主之

又療諸黃眼已黃亦差瓜蒂散方

丁香一分 赤小豆一分 瓜蒂一分 一方加秫米一分

右三味擣末溫水食前頓服使盡則當利并吐黃水不差更服 並出第一卷中

千金療黃疸大黃丸方

大黃二兩 葶藶三兩

右二味擣篩為末蜜和為丸如梧子大未食服十丸日三服病差便止

又大黃丸方

大黃二兩　黃連三兩　黃芩　黃蘗各一兩　豉五合

右五味擣篩為末蜜和丸如梧子大食前服三丸日三服不知可至五丸忌猪肉冷水並出第十卷中

急黃方六首

病源脾胃有熱穀氣鬱蒸因為熱毒所加故卒然發黃心滿氣喘命在頃刻故云急黃也有得病即身體面目發黃

者有初不知是黃死後乃身面黃者其候得病但發熱心戰者是急黃也並出第十二卷中

廣濟療急黃身如金色瓜蔕散方

赤小豆二七枚　丁香二七枚　黍米二七枚　瓜蔕二七枚

麝香　薰陸香等分別研　青布二方寸燒為灰

右七味擣篩為散飲服一錢匕則下黃水其黃則定忌生冷熱麪粘食陳臭等一方止三味出第一卷中

必效療急黃疸內等黃大黃湯方

大黃三兩切　芒消二兩

右二味以水二升生漬大黃一宿平旦絞汁一升半內

通按穢神急發是神惡

芒消攪服須臾當快利差出第一卷中

延年秘錄療急黃心下堅硬渴欲得水喫氣息喘麤眼黃但有一候相當即須宜服此瓜蔕散吐則差方

瓜蔕二小合　赤小豆二合

右二味擣篩為散年大人煖漿水五小合和散一服滿一方寸匕一炊久當吐不吐更服五分匕水亦減之若輕病直吹鼻中兩黑豆粒大亦得當鼻中黃水出即歇并宜灸心厭骨下一寸名巨闕灸五七炷以來初小作炷在後漸大仍不得大如梧子

吐訖及灸了訖即渴仍服麥門冬飲子方

麥門冬四兩去心　栝樓三兩　竹葉一升　茯苓四兩

升麻二兩　生蘆根一升　甘草一兩炙

右七味切以水七升煎取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行八九里久服此飲渴即止出第十卷中

千金療急黃熱氣骨蒸兩目赤脈地黃汁湯方

生地黃汁八合　大黃末六分　芒消一兩

右三味合和一服五合日二服以利為度

近效療急黃方

取蔓菁子油一盞頓服之臨時無油則以蔓菁子擣取汁水和之喫亦得候顏色黃或精神急則是此病

韋給事就用之有効

黄疸方十三首

病源黄疸之病此由酒食過度藏府不和水穀相并積於脾胃復爲風濕所搏瘀結不散熱氣鬱蒸故食已如饑令身體面目爪甲及小便盡黄而欲安卧若身脉多赤多黒多青皆見者必寒熱身痛面色微黄齒垢黄爪甲上黄此黄疸也疸而渴者其病難療疸而不渴者其病可療發於陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而發熱出第十二卷中

仲景傷寒論黄癉麻黄醇酒湯主之方

麻黄一大把去節

右一味美清酒五升煮取二升半去滓頓服盡古今方云傷寒熱出表發黄疸宜汗之則愈冬月用酒春宜用水煮之良小品古今録驗張文仲經心録同

又黄疸茵蔯蒿五苓散主之方

茵蔯蒿末十分　五苓散五分

右二味和先食白飲和方寸匕服之日三深師范汪同

又五苓散利小便治黄疸方

猪苓三分去皮　白术三分　茯苓三分　澤瀉五分　桂心二分

右五味擣篩和合白飲和服一方寸匕日三多飲煖水

以助藥勢汗出便愈千金深師范汪同並出第十四卷中

肘後療黄疸方

燒亂髮服一方寸匕日三秘驗酒飲並得備急文仲同出第一卷中

范汪療黄疸散方

取瓠子白瓤及子熬令黄擣爲末服半錢匕日一服十日愈用瓠子數數有吐者當先詳之出第三十四卷中

集驗療黄疸百藥不差者方

驢頭一枚煮熟以薑虀啗之并隨多少飲汁備急崔氏張文仲古今録驗同出第二卷中

千金療黄疸方

取生小麥苗擣絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥苗穬麥苗亦得范汪云用小麥勝也備急文仲集驗並同出第十卷中

千金翼療黄疸目黄不除瓜丁散方

瓜丁細末如大豆許内鼻中令病人深吸取入鼻中黄汁出

又黄蒸湯方（過按黄蒸未詳）

黄蒸一升　麥麵一升　猪屎一升

右三味以水五升漬一宿煮取三升絞去滓頓服一升

覆取汗必効 同出第十八卷中

崔氏療黄疸年六十以上方

茅根一把　猪肉一斤

右二味合作羹盡一服愈當灸脐上下兩邊各一寸半一百壯手魚際白肉側各一灸隨年壯 備急范汪同

又療黄疸方

苦胡蘆瓤如大棗許

右一物以童子小便二合浸之三兩食頃取兩酸棗許汁分內兩鼻孔中餘節候與上方同比來常用乃勝瓜蔕散

近効療黄疸瓜蔕散方

瓜蔕二七枚　赤小豆二七枚　生秫米二七枚　丁香二七枚

右四味擣篩重者取如大豆二枚各著一枚鼻孔中痛縮鼻須臾鼻中瀝清黄水或從口中出升餘則愈病輕者如一小豆則可一與不盡間日復頻用効李暠用之立驗俗人或使人以竹筒極力吹鼻中無不死者慎之

又療男子女人黄疸病醫療不愈身目悉黄食飲不消胃中脹熱生黄衣在胃中有乾屎使病留方

以成煎猪脂一小升溫熱頓盡服之日三燥屎下去乃愈 備急崔氏同

黄疸遍身方一十一首

廣濟療黄疸遍身面悉黄小便如濃梔子汁茵蔯丸方

茵蔯四兩　黄芩三兩　枳實二兩炙　大黄三兩

右四味擣篩蜜丸空腹以米飲服如梧子二十丸日二服漸加至二十五丸微利爲度忌熱麪蒜蕎麥粘食陳臭物 一方有升麻三兩出第一卷中

肘後療黄疸者一身面目悉黄如橘柚暴得熱外以冷迫之熱因留胃中生黄衣熱熏上所致方

猪脂一升

右一味成煎者溫令熱盡服之日三燥屎當下下則稍

愈便止 集験近効方同備急崔氏同出第三卷中

小品療黄疸身目皆黄皮膚麴塵出三物茵蔯蒿湯方

茵蔯蒿一把　梔子二十四枚　石膏一斤 千金方加大黄三兩

右三味以水八升煮取二升半去滓以猛火燒石膏令正赤投湯中沸定取清汁適寒溫服一升自覆令汗出周身遍以溫粉粉之則愈若不汗更服一升汗出乃愈也 范汪同今録験千金翼同出第四卷中

集験療黄疸身體面目皆黄大黄散方

大黄四兩　黄連四兩　黄芩四兩

右三味擣篩爲散先食服方寸匕日三服亦可爲丸服

備急文仲千金同出第一卷中

删繁療黃疸者通身並黃茵陳湯方

茵陳四兩 柴胡四兩 升麻三兩 龍膽草二兩

黃芩 大黃各三兩

右六味切以水九升煮取三升分三服若身體羸去大黃加梔子人五六兩生地黃切一升古今錄驗千金同出第十卷中

千金翼論曰凡遇天行熱病多必内瘀著黃但用瓜丁散内鼻中令黃汁出乃愈即於後不復恐病黃矣常須用心警候病人四肢身面微似有黃氣則須用瓜丁散不得令散漫失候必大危矣特忌酒麪犯者死

又凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃麴塵出小便赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯餘熱不除久黃

苦參散方

苦參一兩 黃連一兩 葶藶子熬 瓜蒂

黃芩 黃蘗 大黃各一兩

右七味搗為散飲服方寸匕當大吐者日一服不吐日二亦得下服藥五日知可消息不知更服忌猪肉冷水

古今錄驗千金小品同出第十八卷中

瞿氏療黃疸身體面目盡黃茵陳湯太醫校尉史脫方

茵陳蒿三兩 黃連二兩 黃芩三兩 梔子十四枚

大黃一兩 甘草一兩炙 人參一兩

右七味切以水一斗煮取三升分三服千金同出第卷中

延年秘錄梔子湯療遍身黃如橘心肋滿急方

梔子人四兩 黃芩三兩 柴胡四兩 升麻三兩

龍膽草二兩 大黃三兩 栝樓三兩 芒消二兩

右八味切以水九升煮取二升八合去滓分溫三服相去四五里進一服出第十卷之

必效黃疸身眼皆如金色但諸黃皆主之方

取東引桃根細切如筋若釵股以下者一握取時勿令見風及婦人并雞犬等見之以水一大升煎取濶

一小升適寒溫空腹頓服服後三五日其黃離離如薄雲散唯眼最後差百日方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不則即差忌食麪猪魚等肉此方是張之才家秘方其姪珍藏竊用出第一卷中

近効療發黃身面眼悉黃如金色小便濃如煮黃蘗汁者衆醫不能療良驗茵陳湯方

茵陳四兩 黃芩二兩 梔子三兩 升麻三兩

大黃三兩 龍膽草二兩 枳實二兩炙 柴胡四兩

右八味切以水八升煮取二升七合分溫三服若身絕羸加生地黃一升梔子加至七兩去大黃如氣力不羸

依前著大黄取驗忌如法不差更作以差為限不過三
四劑差隔三五日一劑 經心錄同李高處得此方卿貞
瘀黄方三首
病源陽氣伏陰氣盛熱毒加之故但身面色黄頭痛而不
發熱名為瘀黄也 出第十二卷中
廣濟療瘀黄身面眼俱黄小便如豉汁色茵陳散方
茵陳四兩 白鮮皮三分 桔梗四分 黄芩三分
梔子四分 芍藥三分 青木香三分 柴胡三分
枳實炙三分 黄連三分 紫雪八分 土瓜根三分
大青二分 大黄十分

右十四味擣篩為散煮茅根飲待冷平旦空腹以茅根
飲服五錢匕一服少間當一兩行微利利後煮稀葱豉
粥食之利多以意漸減常取微溏利通一兩行為度差
止忌猪肉冷水魚蒜粘膩及諸熱食 出第一卷中
必効療瘀黄眼睛黄汗染衣涕唾黄方
好黄蒸一大升
右一味每夜以水二大升浸蝦煖令熱勿令沸銅器中
平旦絞取汁半升飲之餘汁須臾則飲冬日微煖服夏
冷飲每夜則浸依前服之亦得每夜小便中浸白帛片
取色退為驗兩方並極効忌麪羊肉猪魚

又療瘀黄汗染衣涕唾黄者方
取蔓菁子擣細末平旦以井花水和一大匙服之日
再漸加至兩匙以知為度每夜小便裏浸少許帛各
書記日色漸退白則差不過服五升以來必差李潤
州傳極効 備急肘後張文仲深師同出第一卷中
黄疸小便不利及腹滿喘方二首
仲景傷寒論黄家腹滿小便不利而赤身汗出者表和裏
實也宜下之大黄黄蘗皮梔子消石湯方
大黄四分 黄蘗四兩 梔子十五枚 消石四兩
右四味切以水六升煮三物得二升半去滓內消石更

煎取一升先食頓服盡 小品千金翼深師范汪並同
又黄疸小便色不變欲自利腹滿而喘者不可除其熱熱
除必噦噦者小半夏湯主之方
半夏五兩洗 生薑八兩
右二味以水六升煮取一升半去滓分温三服忌羊肉
餳 范汪同並第十四卷中
黄汗方三首
病源黄汗之為病身體洪腫發熱汗出而渴狀如風水汗
染衣色正黄如蘗汁其脉自沉此由脾胃有熱汗出而入
水中若浴水入汗孔得之 出第十二卷中

仲景傷寒論師曰黃汗爲病身體腫發熱汗出而渴狀如風水汗沾衣色正黃如蘗汁脉自沉也問曰從何得之師曰以汗出水入汗孔水從外入而得之宜黃耆芍藥桂心酒湯主之方

黃耆五兩　芍藥三兩　桂心三兩

右三味切以苦酒一升水七升和煮取三升去滓溫服一升正當心煩也至六七日稍稍自除其心煩不止者以苦酒阻故也（阻作）一　一方用美清醯代酒忌生葱（備急張文仲千金古今錄驗深師范汪經心錄同）

又凡黃汗之病兩脛自冷假令發熱此屬歷節食已則汗

出又身常夜臥盜汗出者此勞氣也若汗出則發熱者久久身必甲錯也發熱不止者必生惡瘡也若身重汗出已輙輕者久久必身瞤瞤則胷中痛又從腰以上必汗出下無汗腰髖弛痛如蟲在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利者名曰黃汗桂枝湯加黃耆五兩主之方

桂心二兩　芍藥三兩　甘草二兩炙　生薑三兩

大棗十二枚　黃耆五兩

右六味切以水八升微火煎取三升去滓溫服一升覆取微汗須臾間不汗者食稀熱粥一升餘以助湯力若不汗者更服湯也忌海藻菘菜生葱（古今錄驗范汪同出第十四卷中）

療黃疸身腫發熱汗出而渴狀如風水汗出著衣皆黃黃汗吳藍湯方

吳藍六分　芍藥　麥門冬去心　桑白皮

漢防己　白鮮皮　山梔子各六分

右七味各細切以水二升煎取八合去滓空腹分二服未效再合服（此方未詳所出）

女勞疸方四首

病源女勞疸之狀身目皆黃發熱惡寒少腹滿急小便難因大勞大熱而房室房室畢入水所致也（出第十二卷中）

仲景傷寒論黃家日晡發熱而反惡寒此爲女勞得之膀

胱急小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱因作黑疸大便必黑腹臚脹滿如水狀大便黑溏者此女勞之病非水也腹滿者難療消石礬石散主之方

消石熬黃　礬石燒令汁盡

右二味等分擣絹篩以大麥粥汁和服方寸匕日三重衣覆取汗病隨大小便去小便正黃大便正黑也大麥則須是無皮麥者千金方云消石二分熬令燥礬石一分熬令燥故注之（肘後小品崔氏文仲千金范汪深師並同出第十四卷中）

千金翼療黃疸之爲病日晡所發熱惡寒小腹急體黃額黑大便黑溏泄足下熱此爲女勞也腹滿者難療方

滑石五兩研　石膏五兩研

右二味為散以大麥粥汁服方寸匕日三小便極利則差（小品千金備急文仲並同出第十八卷中）

近效女勞疸黃家日晡發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱因作黑疸其大便必黑腹臚脹滿如水狀大便黑溏此女勞之病非水也療與黑疸同穀疸食則眩心忪怫鬱不安久久發黃為穀疸並以前茵陳湯主之方在遍身黃部中

必効女勞之黃氣短聲沉者宜服此方

取婦女月經布和血衣燒作灰以酒空腹服方寸匕日再服不過三日必差

黑疸方三首

病源黑疸之狀苦小腹滿身體盡黃額上反黑足下熱大便黑是也夫黃疸酒疸女勞疸久久變成黑疸（出第十二卷中）

肘後療黃疸變成黑疸者多死急治之方

取土瓜根汁服一小升平旦服至食時病從小便去則愈不忌先須量病人氣力不得多服力衰則起不得（千金并翼文仲集驗崔氏刪繁范汪並同出第卷中）

深師療黑疸身體及大便正黑赤小豆茯苓湯方

赤小豆三十枚　茯苓六銖　瓜蒂四銖　雄黃二銖

甘草半兩炙　女葳四銖

右六味切以水三升煮小豆茯苓取八合汁擣後四藥為散取前汁調半錢匕適寒溫服之須臾當吐吐則愈一方云療久黃疸忌大醋海藻菘菜（千金方名赤苓散千金翼同出第二十卷中）

千金翼茵陳丸主黑疸身體闇黑小便澀體重方

茯苓四分　茵陳一兩　枳實五分炒黃　白朮五分土炒

半夏三兩洗　甘遂一分　杏人三分去尖皮　蜀椒二升汗

當歸二分　葶藶子四分熬　大黃三分熬勿令焦　乾薑四分

右十一味擣篩蜜和丸如梧子空肚飲服三丸日三服忌羊肉餳酢桃李雀肉等（出第十八卷中）

酒疸方七首

病源夫虛勞之人若飲酒多進穀少者則胃內生熱因大醉當風入水則身目發黃心中憹痛足脛滿小便黃面發赤斑若下之久久變為黑疸目青面黑心中如噉蒜虀狀大便正黑皮膚抓之不仁其脉浮弱故知之酒疸心中熱欲嘔者當吐之即愈小便不利其候當心中熱足下熱是其證明也若腹滿欲吐鼻燥其脉浮者先吐之沉弦者先下之（出第十二卷中）

仲景傷寒論酒疸者心中懊憹或熱痛梔子枳實豉大黃

湯主之方

梔子七枚　枳實五枚　香豉一升　大黃一兩

右四味切以水六升煮取二升去滓溫服七合日三服

肘後千金同出第十四卷中

肘後療酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃飲酒面發赤斑黃黑由大醉當風入水所致黃耆散方

黃耆二兩　木蘭皮一兩

右二味爲散酒服方寸匕日三　備急文仲同

深師酒疸艾湯方

生艾葉一把　麻黃去節二兩　大黃六分　大豆一升

右四味切清酒五升煮取二升分爲二服　出第三十卷中

千金茵陳湯主黃疸酒疸酒癖身體面目盡黃方太醫校尉史脫處

茵陳三兩　大黃二兩一方一兩　梔子二七枚　黃芩二兩一方用一兩

人參半兩一方用一兩　黃連二兩一方用一兩　甘草一兩炙

右七味切以水一斗煮取三升分爲三服忌豬肉冷水海藻菘菜　文仲范汪同

又夫人病疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐酒疸心中熱欲嘔吐之即愈方

取千金翼苦參散吐良在上通身黃部中七味者是也

又肉疸飲少小便多白如泔色得之從酒寒水石散方

寒水石五分　白石脂五分　栝樓五分　菟絲子三分酒漬

知母三分　桂心三分

右六味擣篩麥粥服五分匕日三服五日知忌生葱　古今錄驗深師等並同

古今錄驗療酒癖及飲黃疸散方

芫花　椒目各等分

右二味擣下篩爲散平旦服一錢匕老少半服之藥攻兩脅則下便愈間一日復服使小減如前又與之使盡根源　深師同出第二十七卷中

穀疸方三首

病源穀疸之狀食畢頭眩心忪怫鬱不安而發黃由失饑大食胃氣衝熏所致陽明病脈遲食難用飽飽則發煩頭眩者必小便難此欲爲穀疸雖下之其腹必滿以其脈遲故也　出第十二卷中

范汪療穀疸茵陳湯方

茵陳四兩切以水一斗煮取六升以汁煎大黃二兩梔子七枚得二升分爲三服黃從小便去病出立愈

肘後同出第十四卷中

集驗療勞疸穀疸丸方
苦參三兩　龍膽草一兩
右二味下篩牛膽汁和丸先食以麥粥飲服如梧子大
五丸日三不知稍增（千金同出第二卷中）
删繁療勞疸穀疸苦參丸方（勞疸者以勞爲名也穀疸者因食而勞故曰穀疸）
苦參三兩　龍膽草二兩　梔子人三七枚
右三味擣篩爲散若病甚取猪膽和爲丸如梧子大一
服五丸日三四服以飲汁下之
許仁則療諸黃方七首
許仁則療急黃病此病始得與前天行病不多異五六日
但加身體黃甚者洟（音夷鼻液也下同）淚汗唾小便如蘗色眼白
睛正黃其更重狀與天行病候最重者無別如至此困自
須依前救天行最重半夏等十味湯救之若未至是者
宜依後法急黃狀始得大類天行病經三兩日宜合麻黃
等五味湯服之發汗以洩黃勢方
麻黃三兩去節　乾葛五兩　石膏八兩　生薑六兩
茵陳二兩
右藥切以水八升煮取二升七合去滓分溫三服服相
去十里久服訖當欲汗則覆被微取汗以散之
又依前麻黃等五味湯服之取汗汗出後未歇經三五日

又合梔子等五味湯以取利方
梔子二十枚　柴胡三兩　黃芩三兩　茵陳三兩
芒消六兩
右藥切以水八升煮四味取二升六合去滓內芒消攪
令消分溫三服如人行十里久更服之勿
又依前梔子等五味湯服之取利利後病勢不歇經六七
日又合秦艽牛乳二味湯服之方
秦艽六兩　牛乳二升
右藥切秦艽以牛乳煮之可三分減一去滓帶煖頓服
令盡極驗（文仲必効同西域法也）
又依前秦艽等二味湯藥服後不覺病退漸加困篤勢如
前天行最重狀則不可更服諸冷物冷物在心唯是病速
宜同前天行用半夏等十味湯以救之亦可合瓜蒂等三
味散吹鼻孔中并與之服方
瓜蒂七枚　丁香七枚　赤小豆七枚
右藥擣篩末取如大豆分吹兩鼻孔中須臾當出黃水
正如煮蘗汁及出黃蟲亦可以新汲水和一方寸匕與
患人服或利或吐吐利所出亦如煮黃蘗汁天行用此
療亦與崔氏同
又論云此病俗間亦有單煮瓜蒂汁灌鼻孔中者亦有單

服生麻油者
又療黃疸病此病與前急黃不同自外狀與平常無別但舉體正黃甚者眼色如蘗涕涎洟小便及汗悉如蘗汁食消多於尋常稍覺瘦悴乏力此病不甚殺人亦有經年累歲不療而差者此由飲酒多亦是積虛熱所致黃疸初得宜覺心中煩熱滿身黃色眼白睛黃對如此者宜合白鮮皮等七味湯以洩之黃連十味丸以壓之
白鮮皮三兩 乾葛五兩 黃芩三兩 鬱金三兩
豉五兩 梔子十枚 芒消六兩
右藥切以水八升煮取二升半去滓內芒消分溫三

服相去如人行二十里久更服此湯當得利利後將息一二日則合後黃連等十味丸服之
又黃連丸方
黃連五兩 黃芩五兩 苦參六兩 沙參五兩
乾地黃六兩 乾葛六兩 梔子人三兩 麥門冬一升去心
地骨白皮五兩 茯苓五兩
右十味擣篩爲末蜜和爲丸以米飲下初服十丸日三服稍稍加至三十丸如梧子大黃疸亦有單服豬脂得差者忌豬肉冷水大酢蕪荑等物吳昇同
雜黃疸方三首
千金黑疸之爲病始得之一身盡赤發熱面色黃黑七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如豚肝狀其小腹滿者急下之亦一身盡黃目黃腹滿小便不利礬石散方
礬石五兩 滑石五兩
右二味爲散大麥粥汁服方寸匕日三服當先食服便利如血者當汗出差 深師古今錄驗並同出第十卷中
古今錄驗九疸秦王散方
胃疸食多喜飲 梔子人主之
心疸煩心心中熱 葛根主之
腎疸其人唇乾 葶藶子主之

脾疸溺赤出少心惕惕若恐 栝樓主之
肺疸飲少小便多 秦椒汗瓜蔕主之 一云膏疸
舌疸渴而數便 石鍾乳主之
肉疸其人小便白 凝水石主之
髓疸目眶深多嗜卧 牡蠣澤瀉主之
肝疸胃熱飲多水激肝 白朮主之
右十一味名秦王散各等分隨病所在加二分擣合下篩飲服五分七日三稍加至方寸匕忌桃李雀肉等
膏疸飲少小便多秦椒散方
秦椒一分汗 瓜蔕二分

右二味擣下篩水服方寸匕日三服（深師千金同出第二十七卷中）

右從事郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事趙子孟校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第四卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方卷第五（瘧病十五門）

療瘧方二十一首
五藏及胃瘧方六首
温瘧方五首
山瘴瘧方一十九首
十二時瘧方一十二首
發作無時瘧方三首
痎瘧方五首
間日瘧方二首
久瘧方八首
勞瘧方三首
牡瘧方二首
一切瘧方四首
灸瘧法一十三首
禳瘧法六首
許仁則療瘧方四首

瘧今 一作日 二十二 五十六 日二十 二作 二日

唐王燾先生外臺秘要方第五卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓
男 賀鶴爲昂 坤鶴爲鼓 父仝校

療瘧方二十一首

病源夏日傷暑秋必病瘧瘧病之發以時者此由邪氣客於風府循膂而下衛氣一日一夜常大會於風府其明日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作此所以日作稍益晏者也其出於風府日下一節二十五日下至尾骶二十

六日入於脊內注於伏脊之脉其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早也其間日發者由邪氣內薄於五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日蓄積乃作夫衛氣每至於風府則腠理乃發發則邪氣入邪氣入則病作今衛氣日下一節則其氣之發也不當風府其日作者奈何曰此邪氣客於頭項循膂而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項者氣至頭項而病中於背者氣至背而病中於腰脊者氣至腰脊而病中於手足者氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣

瘧若 肉脫

之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也風之與瘧也相與同類而風獨常在也而瘧得以時休者何也由風氣留其處瘧氣隨經絡沉以內薄故衛氣應乃作陽當陷而不陷陰當升而不升爲邪所中陽遇邪則蹺陰遇邪則緊蹺則惡寒緊則爲慄寒慄相薄故名曰瘧弱則發熱浮乃汗出旦中旦發晚中晚發夫瘧其人形瘦皮必粟起問曰病瘧以月一日發當以十五日愈設不愈月盡解 出第十一卷中

廣濟療瘧常山散方

常山五分 升麻二分 蜀漆一分

右三味擣篩爲散一服二錢匕和井華水煮米半合頓

服少間則吐吐訖則差忌生葱生菜及諸菓子生冷油膩等物

又療瘧常山湯方

常山三兩

右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服之後微吐差止忌生葱生菜 近效療瘧隔日或夜發者張文仲備急同並出第一卷中

張仲景傷寒論辨瘧病師曰夫陰氣孤絶陽氣獨發而脉微者其候必少氣煩滿手足熱而欲嘔也名曰癉瘧若但熱不寒者邪氣在心藏外舍分肉之間令人消爍脫肉

[illegible]

又辨瘧脉夫瘧脉自絃絃數者多熱絃遲者多寒絃小緊者下之差絃遲者溫藥愈弦緊者可發汗針灸也浮大者吐之差脉絃數者風疾也以飲食消息之

又說瘧歲歲發至三歲發連日發不解者以脇下有痞也療之不得攻其痞但虛其津液先其時發汗其服湯已先小寒者漸引衣自覆汗出小便利則愈瘧者病人形瘦皮上必粟起

又問病瘧以月一日發當以十五日愈設不差者當月盡解也如期不差當云何師曰此結為癥瘕名曰瘧母宜急療之大鼈甲煎方

鼈甲十二分炙　烏扇三分　黃芩三分　柴胡六分

鼠婦三分熬　乾薑三分　大黃一分　芍藥五分

桂心三分　葶藶二分熬　石韋二分　厚朴三分炙

射干五分　瞿麥一分　紫葳三分　半夏一分洗

人參一分　䗪蟲五分熬　阿膠三分炙　蜂窠四分炙

赤消十二分　蜣蜋六分炙　桃人三分去皮尖熬

右二十三味末之取鍛竈下灰一斗清酒一斛五升浸灰候酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁下諸藥煎為丸如梧子大空心服七丸日三服忌莧菜生葱胡荽羊肉餳等物千金有海藻大戟䗪蟲無赤消鼠婦用鍛竈灰一斛

又瘧發渴者與小柴胡去半夏加栝樓湯方

柴胡八兩　黃芩三兩　人參三兩　大棗十二枚擘

甘草三兩炙　生薑三兩　栝樓根四兩

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓更煎取三升溫服一升日三忌海藻菘菜出第十五卷中

附後療諸瘧方

取青蒿一把

右一味以水一升漬絞取汁盡服之備急張文仲同

又方

鼈甲二兩炙

右一味擣末為服方寸匕至發時令服三服兼用火炙無不斷者忌莧菜

又方

牛膝莖葉一把切以酒三升漬一宿分三服令微有酒氣不即斷更作不過三服止並出第一卷中文仲集驗同

張師療瘧膈痰不得吐宜吐之常山烏梅湯方

烏梅半兩　桂心半兩　芫花半兩　豉五合綿裹

半夏半兩　常山半兩

右六味切以酒三升水四升合煮取二升分三服必得吐一方取三升忌生葱羊肉餳生菜一方無半夏常山

又療瘧丸神方

人參三分　鉛丹三分　天雄十分炮

右三味擣合下篩蜜和初服二丸如梧子臨發服二丸中當溫熱四肢淫淫痺爲知服藥忌飽飯食瘧斷後食如常萬不失一備急文仲同

又療瘧撩膈湯方

常山三兩　甘草二兩炙　松蘿二兩　烏梅十四枚　黄芩一兩　瓜蒂十四枚　梔子人十四枚擘

右七味切以酒二升漬一宿明旦以水四升煮取三升分二服忌海藻生葱生菜菘菜等

又瘧節實積熱煩擾迷冒寒熱從多絹撥因瘧常山大黄湯方

常山三兩　甘草二兩炙　前胡二兩　大黄二兩

右四味切以水一斗煮取三升半下大黄煎取三升分溫令冷初服七合中服八合比欲發服九合王文州大子因瘧危困服此皆愈忌海藻菘菜生葱生菜等

又療瘧醇醨湯方

生薑三兩　烏梅三七枚擘一方十四枚　甘草三兩炙　桂心二兩　常山三兩　蘘荷根三兩

右六味切以水六升煮取一升曰醇未發時須頓服更以水三升煮取一升曰醨至發不斷復頓服甚良別方說發日平旦服醨一升以醇著頭邊若欲發便服醇醨良二說不同也忌海藻菘菜生葱生菜出第二十二卷中

千金麻黄湯療瘧須發汗方

麻黄四兩去節　大黄四兩　栝樓四兩　甘草一兩炙

右四味切以水七升煮取二升半分三服未發前食頃服臨發更服服後皆覆取汗忌海藻菘菜集驗同出第十卷中

千金翼療瘧痎羸不能救者方

以繩量病人腳圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取所量得繩置項上著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸三十壯則定比至過發一炊久候之雖飢勿與食盡日此神驗男左足女右足出第十八卷中

崔氏療瘧會稽賴公常山湯方

常山三兩　石膏八兩碎綿裹　甘竹葉一把切　糯米百粒

右四味切以水八升明旦欲服今晚漬於銅器中露置星月下高淨處橫刀其上向明取藥於病人房門前於閤裏緩火煎取三升分三服日欲出一服臨發又一服若即定不須後服取藥滓石膏裹置心上餘四分置左右手足心甚驗忌生葱生菜出第四卷中

備急華佗常山桂心丸神良方
甘草炙　常山　大黃　桂心各四分
右四味末之蜜和平旦服如兎屎許欲發服六丸飲下
之欲服藥時先進少熱粥良忌海藻菘菜生葱生菜文仲
同出第二卷中
延年療瘧常山丸方裴右處延
常山四分　青木香兩分南者　蜀漆一分　牡蠣一分熬
大黃二分　烏梅肉一分熬　升麻二分　豉二分熬
知母二分　鼈甲二分炙　麻黃一分去節
右十一味擣篩蜜和爲丸丸如梧子未發前粥飲服五

丸至發時吐後須臾任食至欲發更服十丸忌莧菜生血
物生葱生菜油膩崔氏同
又療瘧丸方
常山三兩　甘草二分炙　知母四分
右三味擣篩蜜和爲丸丸如梧子未發前飲服十五丸
臨發服十五丸得快吐則愈忌海藻生葱生菜菘菜出
第五卷中
必効療瘧雞子常山丸方
取雞子一枚斷開頭出黃及白令盡置小瑺子中又
取常山細末坩滿前空殼又傾鐺子中又量白蜜還
令滿殼後傾鐺子中三味同攪微火煎之勿停手微
冷可丸則停丸如梧子如病人午時發巳時服三十
丸欲至發時又服三十丸用飲汁下欲吐任吐亦如
前服萬更不發者不須服服後忌脂膩油麪生菜瓜
果七日此方劾賜裔將軍服之立効小品崔氏文仲延年文家備急
並同
又療瘧不差虎骨常山丸方
虎頭骨炙　常山　甘草炙　鼈甲炙
烏梅熬　萎蕤　白薇　升麻
茯苓　石膏研　知母　麥門冬去心
豆豉熬　地骨白皮

右十四味各等分合擣蜜和丸如梧子大未發前日晚
空肚服二十丸至發日平旦服四十丸如人行十里食
白粥一椀飲發時亦服三十丸三日內慎生冷肉魚一
鋼不吐自若魏右史處得云奇効忌海藻菘菜大酢生
葱生菜莧菜
又療瘧常山酒方
常山一兩切　獨頭蒜一顆去根莖橫切　糯米一百粒
烏豆百粒　清酒一升
右五味病未發前一日以酒浸藥於碗內以白紙一張

覆之梳上横一刀欲發時三分飲一分如未吐更服一分得吐則差忌生菜生葱 並第一卷中

古今錄驗療瘧豉心丸方

香豉 五合熬令色變 常山 二兩 大黃 二分 附子 二分炮

右四味擣篩蜜和丸服如大豆十丸當勿食比至發來令服三十丸瘧不止亦可至四十丸瘧必止若膈上有停痰欲吐聽之若腹中實欲下亦無妨常有驗忌生葱生菜等 攝孔思方出第四卷中

又烏梅丸療瘧鬼間温瘧痰瘧悉皆主之方

烏梅肉 二兩 常山 二兩 鼈甲 二兩炙 香豉 二兩

蜀漆 二兩生用 人參 一兩 肉蓯蓉 二兩 桂心 二兩

知母 二兩 桃人 二兩去尖皮別擣如膏

右十味擣篩爲末蜜和丸如梧子空心以酒飲任下三十丸忌生葱生菜莧菜海藻菘菜 一方有升麻苦楝各二兩爲十二味

五藏及胃瘧方六首

病源肺病爲瘧者乍來乍去令人心寒寒甚則熱發善驚如有所見此肺瘧證也若人本來語聲清雄忽爾不亮拖氣用力方得出言而反於常人呼共語直視不應雖曰未病勢當不久此則肺病聲之候也察病觀疾表裏相應依源審療乃不失也

心病爲瘧者令人心煩甚欲得清水多寒少熱若人本來心性和雅而忽卒急反於常倫或言未竟便住以手剔腳爪此人必死禍雖未及呼曰行尸此心病聲之候也虛則補之實則瀉之不可療者明而察之

肝病爲瘧者令人色蒼蒼然氣息喘悶戰掉狀如死者若人本來少於悲恚忽爾嗔怒出言反常乍寬乍急言未竟以手向眼如有所思若不即病禍必至矣此肝病聲之候也其人若虛則爲寒風所傷若實則熱氣所損陽則瀉之陰則補之

脾病爲瘧者令人寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴已則汗出

若其人本來少於喜怒而忽反常嗔喜無度多言自笑不答於人此是脾病聲之候也不盈旬日禍必至矣

腎病爲瘧者令人悽悽然腰脊痛而宛轉大便澀身掉不定手足寒若人本來不喜不怒忽然謇而好嗔怒反於常性此腎已傷雖未發覺是其候也見人未言而前開口笑還閉口不聲舉手爪擦腹此腎病聲之候也虛實表裏浮沈清濁宜以察之逐以療之

夫瘧脈者自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者溫藥已若脈數而緊者可發汗針灸之脈浮大者不可針灸之凡瘧先發如食頃乃可以療之過之則失時

足太陽之瘧令人腰痛頭重寒從背起先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已刺郄中出血

足少陽之瘧令人身體解㑊寒不甚熱不甚惡見人見人心惕惕然熱多汗出甚刺足少陽

足陽明之瘧令人先寒洒洒淅淅寒甚久乃熱熱去汗出喜見日月光火氣乃快然刺足陽明跗上

足太陰之瘧令人不樂好太息不嗜食多寒熱汗出病至則善嘔嘔已乃衰則取之

足少陰之瘧令人悶吐嘔甚多寒熱熱多寒少欲閉戶而處其病難止

足厥陰之瘧令人腰痛少腹滿小便不利如癃狀非癃也數小便意恐懼氣不足腹中悒悒刺足厥陰

肺瘧者令人心寒寒甚發熱熱間善驚如有所見者刺手太陰陽明

心瘧者令人煩心甚欲得清水反寒多不甚熱刺手少陰

肝瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者刺足厥陰見血

脾瘧者令人病寒則腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰

腎瘧者令人洒洒腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰

胃瘧者令人且病也善飢而不能食食而支滿腹大刺足陽明太陰橫脈出血　並出第十一卷中

千金療肝邪熱為瘧顏色蒼蒼戰掉氣喘或熱久勞動如瘧積年不差烏梅丸方

烏梅肉四分　蜀漆四分　石膏八分研　鱉甲四分炙
常山六分　香豉一合熬　知母四分　甘草二分炙
細辛二分　苦參四分　萎蕤五分

右十一味擣篩蜜和丸如梧子大酒服十丸日再飲下亦得忌莧菜生菜生葱海藻菘菜

又療心瘧令人煩心甚欲得清水多寒少熱者常山湯方

常山四兩　淡竹葉切二升　梔子人三七枚擘　石膏五兩碎綿裹
烏梅三七枚擘　鱉甲四兩炙　甘草一兩炙　香豉一升綿裹
蜀漆三兩

右九味以水九升煮取三升分溫三服忌生葱生菜菘菜人莧海藻　[illegible]

又療脾熱或渴或不渴熱氣內傷不泄轉為脾瘧令人病寒則腹中痛熱則腸中鳴轉汗出常山丸方

常山三兩　甘草半兩炙　知母一兩　鱉甲一兩炙

右四味擣篩蜜和丸如梧子大未發前酒服十丸臨發又一服正發又一服忌生葱生菜莧藻菘菜人莧等

又療肺熱痰聚胷中來去不定轉為瘧其狀令人心寒甚即發熱熱間善驚如有所見常山湯方

常山二兩 秫米一百粒 甘草二分炙

右三味切以水七升煮取三升分三服至發時令三服盡忌生葱生菜海藻菘菜等刪繁同

又療腎熱發為瘧令人悽悽然腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒常山湯方

常山三兩 烏梅二七枚 香豉八合綿裹 淡竹葉一升切 葱白一握除青令盡

右五味切以水九升煮取三升去滓分溫三服至發後令盡忌生葱生菜等並出第十卷中

刪繁療胃腑瘧者令人善飢而不能食四肢脹滿氣喘藜蘆丸方

藜蘆一兩 皂莢一兩去皮子 常山一兩 巴豆二十枚去皮熬 牛膝一兩

右五味熬藜蘆皂莢色令黃合擣為末蜜丸如小豆旦服一丸未發前一丸正發一丸一日勿食飲忌野猪肉蘆笋生葱生菜貍肉等六腑瘧自有瘧不可別列故附於後千金同出第六卷中

溫瘧方五首

病源夫溫瘧與寒瘧安舍溫瘧得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪氣不能出因遇大暑腦髓鑠肌肉消釋腠理發泄因有所用力邪氣與汗偕出此邪氣先藏於腎其氣先從內出之於外如是則陰虛而陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧瘧先寒而後熱者此由夏傷於大暑汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之小寒寒迫之藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘧先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧夫病瘧六七日但見熱者溫瘧也出第十一卷中

甲乙經黃帝曰夫瘧皆生於風夏傷於暑秋為痎瘧

黃帝問瘧先寒而後熱何也岐伯對曰夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱也名曰寒瘧

又問曰先熱而後寒者何也對曰先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒也名曰溫瘧

其但熱而不寒者陰氣先絕千金作孤陽氣獨發即少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰癉瘧

又曰溫瘧者得之冬中於風寒寒氣藏於骨髓之中至春即陽氣大發邪氣不能自出因遇大暑腦髓鑠肌肉消釋腠

理發汗因有所用力邪氣與汗皆出此邪氣先藏於腎其氣先從內出之於外如是者陰虛而陽盛盛則病矣陽衰則氣復反入入則陽虛陽虛則復寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧

又曰癉瘧者肺素有熱氣盛於身厥氣逆上中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱不寒熱氣內藏於心外舍分肉之間令人消鑠脫肉故名曰癉瘧出次卷第七千金同

廣濟療溫瘧漸漸羸瘦欲成骨蒸常山湯方

常山三兩 車前葉一握 甘草二兩炙 獼猴骨三兩炙

烏梅肉二兩 天靈蓋一兩燒作灰末 驢糞汁二合

右七味切以水六升煮取二升去滓下糞汁天靈蓋末分三服微吐不利忌生葱生菜海藻菘菜熱麪食等

又療溫瘧常山丸方

常山 烏梅肉熬 天靈蓋燒各六分

知母 朱砂 蜀漆 大黃各四分

右八味擣篩蜜和丸如梧子空肚以溫酒下二十九至三十九日三服並未發前服不吐利忌生葱生菜生血等物並出第十卷中

千金論曰癉瘧者陰氣孤絕陽氣獨發其候也少氣煩滿手足熱欲嘔熱而不寒氣藏在心

又曰有溫瘧者其脈如平人無寒時熱其候骨節疼煩時嘔朝發暮解暮發朝解皆白虎加桂心湯主之方

知母六兩 甘草二兩炙 石膏一斤碎 粳米六合

右四味切以水一斗二升煮取米爛去滓加桂心三兩煎取三升分溫三服覆令汗先寒發熱汗出者愈忌海藻菘菜生葱傷寒論云用秈粳米不熟稻米是也出第十卷中

備急竹葉常山湯療溫瘧壯熱微寒溫瘧之候也壯熱後如覺微寒或癉瘧依時手足冷少時便壯熱亦有手足煩熱乾嘔者瘧瘧先大寒後大熱者並主之神効尤宜乳下小兒亦差方

常山三兩 淡竹葉一握 小麥一升

右三味以水五升漬一宿明旦煮取二升溫分三服忌生葱生菜文仲小品同出第二卷中

延年療溫瘧壯熱不能食知母鼈甲湯方

知母 鼈甲炙 地骨皮各三兩 常山二兩

竹葉一升切 石膏四兩碎

右六味切以水七升煮取二升五合去滓分三服忌蒜豬肉莧菜生葱小菜 出第十七卷中

山瘴瘧方一十九首

病源此病生於嶺南帶山瘴之氣也其狀發寒熱休作有時皆由挾溪源嶺瘴濕毒氣故也其病重於傷暑之瘧矣 出第十一卷中

小品療山瘴瘧陵鯉甲湯南方山嶺溪源瘴氣毒作寒熱發作無時痿黃腫滿四肢痺弱皆山毒所為也並主之方

陵鯉甲 十片炙千金用十四片 烏賊魚骨 去甲 鼈甲 炙各一兩

常山 三兩 附子 一枚炮

右五味切以酒三升漬之一夕先瘧發前稍稍服之勿絕藥味兼以塗身體斷雜人勿食飲過時乃得通人進飲食忌莧菜生葱生菜豬肉 千金文仲備急範汪同出第六卷中

千金療瘧或寒或熱或有或無山瘴瘧酒方

常山二兩 鼈甲炙 升麻 附子

烏賊魚骨二兩 去甲

右五味並切絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之一宿成一服一合比發可數服或吐忌豬肉生葱生菜莧菜 肘後療老瘧久不斷出第十卷中

備急夫瘴與瘧分作兩名其實一致或先寒後熱或先熱後寒嶺南率稱為瘴江北總號為瘧此由方言不同非是別有異病然南方溫毒此病尤甚原其所歸大略有四一山溪毒氣二風溫痰飲三加之鬼癘四發以熱毒在此之中熱毒最重故所用藥物須審病源患瘴瘧之後特須防瘴而發痢死不旋踵所以然者瘴體先虛虛不宜痢又瘴宜冷差痢宜溫斷斷痢則益瘴斷瘴則益痢大率如此不可不慎其直藥療亦須宜加將息取適若能用一色藥兼二種病冷而止痢溫而斷瘴故其妙也如不然先須斷痢然後療瘴瘴緩痢急故也仍率須作拔毒防之不得專醫其痢又服瘴藥皆在發前必須平旦空腹服服藥之後勿

洗手面漱口勿通外人勿與食勿勞力既過發時又小進糜粥如此將療無不即斷又當發熱之時慎勿多飲冷水及多服冷藥若心下冷結更足難療得差之後復成瘧痢亦有即發氣者死不救若熱悶者豉汁煖服取足得吐猶患水煮豉研犀汁與服兼時進生葛根汁其大熱盛者與紫雪如兩棗許大水和飲之并燒豬糞人糞作黃龍湯亦並各可服三二升又擣一大鼠絞汁與服大止熱毒瘴熱病服此但勿 其鼠并頭皮五藏等全擣若汁少著少許水和絞亦不難服常用立驗也

又療瘴瘧服藥後灸法

灸大椎三四十壯無不斷者先寒者將欲寒預前以

炭火安床下令背煖并灸鼈甲末一方寸匕煖酒和服至發時令得三服彼人過時無不斷此是陶氏法比欲寒時但以火炙其背亦乃佳差者縱發亦輕劾驗

又療瘧疾常山丸方

常山　黃連　豉各三兩　附子二兩炮

右四味擣篩爲末蜜和丸如梧子發前空腹服四丸欲發更服三丸飲下之自旦至暮乃食三日勿雜食豬肉魚肥膩及生冷生葱生菜桂廣州家傳已用有効此方兼痢者差

又麻黃散方

麻黃去節　常山　杏人去尖皮熬　人參

乾漆熬　甘草炙　鼈甲各二兩炙

右七味作散平旦空腹温酒三合服方寸匕日再宜七日連服服後七日不得食雜物此許仁則五方元比部云在嶺南服得力大驗年時常服一劑按此亦補虛藏者忌莧菜生葱生菜海藻菘菜

又若患瘧熱實兼吐痢者大黃湯方

大黃　常山　升麻　甘草炙各三兩

右四味切以水七升煮取二升半分三服發前盡服別取吐利此療家傳忌海藻菘菜生葱生菜

又若瘧熱兼痢苦渴者烏梅飲方

烏梅二十枚取好者擘破

右一味以水一大升煮取一大盞去梅和一匙蜜細細啜之近方驗並出第二卷中

延年蜀漆丸主嶺南瘴氣發作熱作寒積勞似瘧皆主之千金翼方云兼主瘖瘧連年不差方

蜀漆　知母　升麻　白薇

地骨皮　麥門冬各五分　烏梅肉　鼈甲炙

萎蕤各四分　石膏八分　甘草三分炙　常山六分

豆豉一合熬

右十三味擣篩爲末蜜和丸如梧子大飲下十丸日再服加至二十丸此方用無不差加光明砂一兩神良忌海藻菘菜人莧生葱生菜千金亦療勞瘧崔氏千金翼集驗並同出第十七卷中

又急療瘧瘴癘經百日或一年以上諸藥不能差進此方如不損者蜀漆湯方

白薇　蜀漆　知母　甘草炙

苦參　升麻　龍膽各二兩　常山

大黃別浸後下各四兩　鼈甲炙　石膏碎

茯苓　黃芩各三兩　香豉二合熬　獨蒜七顆切

淡竹葉一升切

右十六味切以水一斗漬之并春酒二升合煮取三升去滓分三服未發前一服欲至發時又一服皆溫之當發日勿見人在一靜處臥藥滓置病兒頭邊仍以藥汁塗手面過時任出忌肥膩腥臊滑物生冷海藻人莧大酢蕪荑生葱生菜

又朱砂丸方

朱砂光明者 牛膝 常山各等分

右三味擣篩爲末蜜和丸如梧桐子候瘧發日平明服七丸飲下欲覺發時更服七丸當日不斷更作一服即差忌生葱生菜生血物油膩牛肉等

又勑賜長孫祥極効常山湯方

常山六分 橘皮六分 牡蠣四分熬 桂心二分

右四味擣篩爲散發日平旦酒服一方寸匕臨發又一匕發後又一匕二日不得洗手面七日忌食雜物唯葱用酒餘皆斷或吐或不吐皆差忌生葱生菜

又方

取五六歲兒小便一升內白蜜二大匙攪使相得去白沫訖即頓服當大吐碧綠痰然後食若不得吐但數小便亦佳以前兩方吐碧痰外更吐白沫由後可喫食不然瘧氣終不除

又常山湯方

常山苗一握無苗取根五兩代之 獨蒜七顆 淡竹葉二握

豉一合裹 鼈甲三兩炙

右五味切以苦酒三升煎取一升臨發隨性多少服之盡服之訖當大吐便愈忌人莧生葱生菜

古今錄驗療瘧及嶂氣常山湯方

常山三兩細切

右一味擣碎虛弱者二兩蒜七瓣去皮中切以酒一小升半漬一宿旦去滓暖服盡須臾當吐令盡好過時食一日不得漱口及洗手面三七日慎生葱生菜生冷肉麪油膩若早發者半夜服要令吐 出第四卷中

近効療瘧疾孟補闕嶺南將來極効常山丸方

常山 豉熬 桃人去尖皮熬等分

右三味各擣末先以豉和桃人擣如泥然後下常山末細攪蜜丸如梧桐子候欲發前一食時酒下四十丸須臾更服二十丸如不差更服遠不過三服能信用者無不差忌生葱生菜

又兵跋涉江山防諸瘴癘及蠱毒等常服木香犀角丸方

青木香 犀角屑 羚羊角屑各六分 升麻

玄參 豬苓 檳榔各十分 鼈甲炙

甘草炙各八分　豉二十分熬
右十味擣篩為末蜜和丸如梧子酒飲服三十九日二三
服若觸熱即去甘草檳榔加大黄二十分忌海藻菘菜
又主瘧兼痢無問赤白水穀鮮血瘧皆差黄連犀角丸方
黄連　犀角屑　香豉熬各一兩　龍骨四兩
牡蠣熬二分
右五味擣篩為末蜜和丸如梧子米飲下三十九日三
服差止忌猪肉冷水油膩等
又瘧痢不差蜀漆丸方
蜀漆　青木香　升麻　鼈甲炙

牡蠣熬　朱砂　猪苓　香豉各四分
常山　大黄各八分
右十味擣篩為末蜜和為丸如梧子米湯下十二丸日
二服漸漸差至半年止忌人莧油膩陳臭生血等物
十二時瘧方一十二首
千金翼黄帝問岐伯曰瘧多方少愈者何岐伯答曰瘧有
十二種帝曰瘧鬼字何可得聞乎岐伯曰但得瘧鬼字便
愈不得其字百方不愈黄帝曰瘧鬼者十二時願聞之岐
伯曰
寅時發者獄死鬼所為療之

右以瓶人著路上灰火一周莫令人息即差
卯時發者鞭死鬼所為療之
右用五色衣燒作灰三指撮著酒中無酒用清水服之
辰時發者墮木死鬼所為療之
右令瘧人上木高危處以棘子塞木根間立差
巳時發者燒死鬼所為療之
右令瘧人坐師以周匝然火差
午時發者餓死鬼所為療之
右令瘧人持脂火於田中無人處燒脂香假拾薪去即差
未時發者溺死鬼所為療之

右令瘧人臨發時三渡東流水即差
申時發者自刺死鬼所為療之
右令瘧人欲發時以刀刺塚上使得姓名字呪曰若差我
與汝拔却即差
酉時發者奴婢死鬼所為療之
右令瘧人碓梢上捺上臥莫令人道姓字即差
戌時發者自絞死鬼所為療之
右令索繩繫其手腳腰頭即差
亥時發者盜死鬼所為療之
右以刀子一口箭一枝灰一周刀安瘧病人腹上其箭横著

底下差

子時發者寡婦死鬼所爲療之

右令瘧人脫衣東廂床上臥左手持刀右手持杖打令聲不絕瓦盆盛水著路邊即差

丑時發者斬死鬼所爲療之

右令瘧人當戶前臥頭東向血塗頭下即差 並出第十八卷中

發作無時瘧方二首

病源夫衛氣者陽氣也一日一夜大會於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作當其衛陰陽相并隨其所勝則生寒熱故動作皆有早晏若府藏受邪內外失守

邪氣妄行所以休作無時也 出第十一卷中

肘後療瘧發作無常心下煩熱者常山湯方

常山一兩 甘草一兩炙 豉五合綿裹

右三味切以水六升煎去滓取二升再服當快吐仍節飲食忌海藻菘菜生葱生菜 文仲同

又號了常山丸療諸瘧經服諸藥法術不斷發無復定時不可發斷者宜服此丸忌食物勿勞力即斷方

常山三兩

右一味擣篩爲散以雞子白和併手爲丸如梧桐子大令圓調丸訖分置銅鑼子中以湯煮銅鑼令熱取得雞

子涅氣即止以竹葉汁飲服三十丸欲吐但吐比至發時令得三服時早可食者斷若晚不可斷食者當作竹葉汁與食之忌生葱生菜 崔氏文仲同並出第一卷中

痎瘧方五首

病源夫痎瘧者夏傷於暑也其病秋則寒甚冬則寒輕春則惡風夏則多汗然其蓄作有時以瘧之始發先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則外內皆熱頭痛而渴唯欲冷飲何氣使然此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實而陽明虛陽明虛則寒慄鼓頷太陽虛則腰背頭項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則

骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此營氣之所舍也此令人汗出空疏腠理開因得秋氣汗出遇風乃得之及得以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝日行陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作其間日作者謂其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作 出第十一卷中

小品常山湯療痎瘧先寒戰動地寒解壯熱日日發及間日發並斷方

鼈甲一兩炙 淡竹葉切三升洗 常山二兩 甘草三兩炙

久酒三升

右五味切以酒漬藥刀置上覆頭安露地明旦以水七升煮取三升分五服比未發前令盡當吐吐極傷多不必盡劑但斷人禁飲食得吐過時乃佳忌人莧海藻菘菜生葱生菜 出第六卷中

集驗夫瘧必從四肢始療方

先其時一食頃用細左索繩緊束其手足十指過發時乃解之 千金同

又方

先作羊肉臛餅飽食之其進少酒隨所能令其欣欣有酒氣入一密室熾然炭火厚覆取大汗則差 燕國公說此方常見用有驗 並出第二卷中 方上弱日虛者得効實者彌甚

又療溫瘧勞瘧烏梅飲子方

烏梅七顆 桃柳心各七莖 葱白七莖 豆豉一合 甘草四分 柴胡四分 知母四分 大黃三分

右八味各細剉以童子小便兩茶椀宿浸明旦早煎三兩沸去滓頓服差未差更作服三服未差忌海藻菘菜

又療溫瘧痰瘧久不差黃連散方

宜州黃連二兩

右一味搗篩末以濃酒一盞調三錢空心頓服相次更服三錢更飲三兩盞酒任意醉却睡便過時方得食如渴祗實煎湯飲三日服差忌豬肉冷水

間日瘧方二首

病源此由邪氣與衛氣俱行於六腑而有時相失不相得故邪氣內薄五藏則道遠氣深故其行遲不能與衛氣俱出是以間日而作也 出第十一卷中

備急療間日瘧方

燒黑牛尾作灰酒服方寸匕日三服 出第十卷中

又桂廣州法醇醨湯方

大黃三分 甘草一分半炙 常山一分半

右三味以水三升煮取一升去滓更以水二升煮滓取一升未發服醨醨是後煮者相次服醇醇是前煮者差 忌生葱生菜海藻菘菜等 支云極驗文仲經心錄方無甘草用石膏三兩餘同一方有桂心一分半 出第二卷中

久瘧方八首

病源夫瘧皆由傷暑及傷風所為熱盛之時發汗吐下過度腑藏空虛榮衛傷損邪氣伏藏所以引日不差仍故休作也夫瘧歲歲發至三歲發連日發不解脅下有痞療之不得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服湯已先寒引

衣自覆汗出小便自利即愈也（出第十一卷中）

深師療久瘧難斷香豉丸方

香豉（熬）分　常山七分　蜀漆十分　附子一分（炮）

大黃二分（汗者）

右五味擣下篩蜜和發日早服五丸如梧子須臾又服五丸發晚者至發可三四服令其得吐為佳欲不即斷畏吐者但則長將久服無不差也忌生葱生菜豬肉

又療三十年瘧常山湯方

常山一兩　黃連三兩

右二味切以酒一斗宿漬之向曉以瓦釜煮取六升一

外臺秘要　五卷　元　經餘居

服八合比發時令得三服有熱當吐有冷當下服之者千百無一不差不可半合無服全劑者忌豬肉冷水生葱生菜（出第十二卷中）

千金梔子湯主瘧經數年不差者兩劑差一月以來一劑差方

梔子十四枚　常山三兩　車前葉二十枚（炙乾）　秫米十四粒

右四味切以水九升煮取三升分三服未發一服發時一服發後一服以吐利四五行為差不止冷飲止之忌生葱生菜（出第十卷中）

崔氏療瘧積久患者不過五六服以來亦差常山散方

常山三兩　乾漆三兩（熬）　牡蠣一兩半（熬）　桂心三兩

橘皮二兩　杏人二兩（去皮尖熬）

右六味擣篩為散一服方寸匕先發熱飲和服若先寒清酒和服之時取未發前一食頃服服藥日唯須晚食七日內慎如藥法忌生葱生菜（出第四卷中）

備急龍骨丸療久瘧不斷者方

龍骨一兩　常山三兩　大黃二兩　附子二分（炮）

右四味擣末以雞子黃丸如梧子大先發臨發各飲服五丸無不斷長將服之支云神驗療三十年瘧忌生葱生菜豬肉等（張文仲支方同）（出第二卷中）

外臺秘要　五卷　三十　經餘居

備急療瘧連綿積日不差常山散方

常山三兩　羚羊角三兩（炙）　烏梅肉三兩

黃芩二兩　甘草一兩半（炙）

右五味擣為散以竹葉煮飲取六七合飲及熱用調常山散三方寸匕未發前一服若差停不差臨飲發又進二方寸匕老小以意量之忌海藻菘菜生葱生菜

又療瘧無問年月遠近並差烏梅丸方

烏梅肉三兩（熬）　蓯蓉三兩　桃人三兩（去皮熬）　常山三兩（熬）

升麻二兩（炙）　桂心二兩　甘草二兩（炙）

右七味擣篩蜜和丸如梧子大未發時酒服二十丸欲

至發時更服二十九百無所忌唯觸之則難差欲服亦
得此藥或吐利或不吐利勿怪五六日頻進佳忌海藻
菘菜生葱生菜 並出第一卷中 方有豉一兩熬文仲備急同
近効療久難差瘧常山酒方
常山二兩 鼈甲二兩炙 鯪鯉甲一兩炙 烏賊魚骨一兩炙
烏梅肉七枚 桃人四十九枚去皮尖兩人搗如泥 竹葉一升切
豉三合熬 葱白一升切
右九味細切以酒三升漬經再宿空腹平朝溫服一
合良久服吐如不吐至齊午以來服之四服如不差隔
日更依前服必差差後十日內不得喫冷水粥滑人莧

生菜餘如常 崔氏同
勞瘧方三首
病源凡瘧積久不差者則表裏俱虛客邪未散真氣不復
故疾雖暫間小勞便發也 出第十一卷中
肘後療勞瘧鼈甲酒方
鼈甲二兩炙黃 常山三兩 蜀漆二兩 烏賊魚骨一兩炙
附子一兩 知母二兩 椒一升
右七味切以酒三斗漬一宿平旦服一合稍稍加至二
合日三 忌服莧菜生葱生菜豬肉 並出第一卷中
千金勞瘧積久不斷衆療無効此方療之

長生大牛膝一虎口切以水六升煮取二升分再服
第一服取未發前一食頃服第二服臨發服 張文仲肘後同
出第十卷中
集驗療一切瘧勞瘧無問年月深遠阿魏散及丸方
阿魏 安息香 蘿蔔子各二兩 蕪荑一合
右四味擣篩爲散以煖水服半錢如不能散服蜜丸熟
水下三十丸須更吐忌冷水如吐不止喫蒜虀餺飥仍
以貼子盛散一錢男左女右繫臂上立差 出第三卷中
牝瘧方二首
仲景傷寒論牝瘧多寒者名牝瘧牡蠣湯主之方

牡蠣四兩熬 麻黃四兩去節 甘草三兩炙
蜀漆三兩若無用常山代之
右四味切以水先洗蜀漆三過去腥以水八升煮蜀漆
及麻黃去沫取六升內二味更煎取二升去滓溫服一
升即吐勿更服則愈忌海藻菘菜
又療牝瘧蜀漆散方
蜀漆洗去腥 雲母 龍骨
右三味等分擣篩爲散先未發前一炊以清酢漿水和
半錢服臨發時更服一錢溫瘧者加蜀漆半分雲母炭
火燒之三日三夜用 雲母一作雲實 並出第十五卷中

一切瘧方四首

崔氏療一切瘧大黃丸方

大黃二兩 朴消二兩 巴豆一兩去皮熬令變色

右三味搗篩大黃朴消然後內巴豆以蜜和擣二千杵丸如梧桐子大米飲下兩丸日二服不斷再服即差忌蘆笋野豬肉等物

救急療一切瘧常山湯方

常山三兩 石膏八兩打碎綿裹 白秫米一百二十粒 淡竹葉一握

右四味以水八升煮一宿煮取二升五合去滓分温三服清旦一服欲發一服正發時一服三服訖靜室中臥莫共人語過時後洗手面與食七日禁勞生葱生菜肉久熱麪毒魚久瘧不過再劑一方加烏梅二七枚熬之

集驗療瘧常用日晚夜發出范大夫 出第一卷中

古今錄驗療一切瘧大有驗朱砂丸方

朱砂一兩 蜀常山三兩

右二味各擣下篩畢別取朱砂瓷器中細研可一日許如粉白蜜和章兒擣一萬七千杵訖作丸如梧子大一服三丸用清酒下行五十餘步隨意坐臥無酒以飲下亦得唯須暖將息病人氣力強仍不廢行動者則須於當發日服之如似日西發者臨發之日勿食平旦服三丸巳時服三丸午後更服三丸則差若不差必定須發更服則勞餘時發者準此日西一時任意消息其病人氣力微弱者不得臨發日服應預前一日服之如似明日發者今日平旦空腹服三丸至齋時食一碗粥至日西更服三丸至日暮後食一撓淡粥並不得飽食至一更盡更服三丸至平明食粥一撓至齋前更進三丸不得令至午時更進三丸必差差後三日以來唯得食稀粥仍藥忌生冷酢滑肱麪及飽食七日以來特忌生血物及葱生菜若後七日餘者漸食生冷二種須後日禁若如自日來患差後還須百日禁忌生冷乃至七日患者

差是後禁七日生冷患來雖經多年但得百日以來禁生冷過百日後得食無妨若不禁者必還重發患來日久極重者不過十服差近者三五服則差病人十五以上者一服三丸十五以下七歲以上者一服兩丸七歲以下者一服一丸如小者分此一丸丸作二小丸服之

出第四卷中

近効如痰瘵一切瘧無不効比用不過再服入口如神萬不一失秘人常山丸方

桃人二兩不拔病不去雙人尖皮 常山二兩 豆豉三兩

右三味各別擣五六百杵又和更擣六七百杵然後點

好酒如黑泥白成丸不飲酒事須酒下三十九如梧子未發前服臨發更服三十丸以手捧之於鼻下嗅取氣便定如不得平復更服三十丸或吐或微利勿怪亦有不吐利差者吐了仍不得漱口亦不得喫生葱生菜果子醉物油膩等都發則難差此來者不過再三服便差一服差者多其常山須蜀者始堪使用桃人須是毛桃人餘者卽無効或須揀美不用陳者渴者取烏梅三枚作漿稍稍咽二五咽其藥唯一人患則少合不堪預合無力不効今方有常山一兩桃人五七枚豉一合恬多者佳擣常山作散訖炙研桃人作泥別擣豉熟乃擣一

五百杵次一處和擣又六百人以來如法服之當人夏候極驗之

灸瘧法一十三首

千金療瘧灸法

灸上星及大椎（大椎穴在背從第一椎上節陷中是也）至發時令滿一百壯艾炷如黍粒俗人不解取穴務大炷

又法

覺小異則灸百會七壯若後更發又灸七壯極難愈者不過三灸

又法

以足蹋地以綖圍足一匝中折從大椎向百會灸綖頭三七壯炷如小豆許大

又法

灸風池二穴各三壯

又法

從手發者灸三間（穴在虎口第二指節根下一寸）三年瘧欲發慘慘則下火

又法

從頭項發者未發前預灸項大椎尖頭漸灸過時止

又法

從腰脊發者灸腎俞百壯（穴在第十四椎下兩傍各一寸半是）

又療一切瘧無問遠近法

正仰臥以綖量兩乳間中屈從乳向下灸度頭隨年壯男左女右灸

又療五藏瘧及一切諸瘧法

灸尺澤七壯（穴在肘中約紋動脈是也）

又療痎瘧法

上星主之（穴在鼻中央直入髮際一寸陷容豆是也）灸七壯

又痎瘧日西而發者法

臨泣主之（穴在目眥上入髮際五分陷者中是也）灸七壯

又瘵瘧多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔者法

崐崘主之 穴在足外踝後跟骨上陷中是也 灸三壯

又瘵瘧實則腰背痛虛則鼻衄法

飛揚主之 穴在外踝上七寸 灸七壯 並出第十卷中

療瘧法六首

千金療瘧法

未發前抱大雄雞一隻著懷中時時驚動令雞懷中作大聲無不差 肘後同出第十卷中

崔氏書瘧法

平旦日未出時閉氣書之先書額上則截九天次書兩手心作把九江又書背上從右胛骨下向左分作兩行書之一如後法南山有一木木下不流水水中有一魚三頭九尾不食五穀唯啖瘧鬼急急如律令

又書兩脚心下作履九江

右以前法既不損人又無不差者其有一度書不甚差可更書之書符必不得脫錯亦不可重點畫不成也又勿食五辛 書瘧法略州滿上人傳云妙不可述以下二法余用供効

又法

令所患人未發前正南北眠頭向南五心并額及舌上七處閉氣書鬼字則差隨意任東西 肘後同

又法

總書八行其下七行一準前行通而爲八山題子山題子山題子山題子準前計更有七行通前爲八行此符厭瘧鬼一去千里外急急如律令某年某月某州某縣某鄉某里姓名牒姓名則所患人也右以手把符勿開男左女右符過時久然後任開其符仍以火燒却

呪瘧法

候病者發日日未出時自執一石於水濱一氣呪云智智圓圓行路非難捉取瘧鬼送與河官急急如律令即投石沉於水中勿反顧而去 並出第五卷中

元希聲侍郎集驗書瘧法

額上書兩全字重負前書兩火字並背上書兩水字並兩手書木字單兩足下各書土字齊下作四口字

亞右含水閉氣用朱書未發前書之有驗

許仁則療瘧方四首

許仁則此病之候乃有數種亦有宿患痃癖飲食失宜因節氣初交亦生此病亦有痰癖積聚久不通散冷熱相攻亦生此疾亦有地居卑濕降屬暑熱內有宿病外感惡氣亦生此疾亦有盛夏蒸熱飲冷冷熱間隔秋夏時交亦生

此疾以要言之終由飲食失常寒暑乖宜上熱下冷將療之方吐下為本人有強羸病有輕重自須臨時斟酌不可一槩言之此病別有祈禱厭禳而差者自是人心妄識畏愛生病亦猶弓影成蠱耳必有不諳此法專意佈之亦任其從禳禱之道雖然必須資藥以救之比見用藥攻療無不差者以法療之則有不效者以此言之明知病在於內徒務於外耳此病之始與天行不多別亦頭痛骨肉酸楚手足逆冷口鼻喉舌乾好飲水毛聳腰脊強欲反拗小便亦但先寒後熱發作有時可不審察其發作日有準凡經七日以後先服鼈甲等五味散取快吐方

鼈甲三兩生用　常山二兩　甘草一兩炙　松蘿二兩

桂心一兩

右藥擣篩為散煮烏梅湯下初服一方寸匕日二服稍稍加之以得吐為限忌人莧生葱生菜海藻菘菜

又審其候若體力全強日再服每服皆取吐自覺氣力不甚強則每一服取吐晚不須服如全綿綴事須取吐則三兩日一服經五六度吐訖但適寒溫將息并食飲使體氣漸強若知病雖輕吐根本未似得除事須利之以洩病勢宜合當歸等六味散服之取利方

當歸五兩　白朮五兩　細辛四兩　桂心三兩

大黃五兩　朴消四兩

右藥擣篩為散平旦空肚以酒飲下初服一方寸匕日再服稍稍加之得利為度候氣力強羸取利多少一一如前取吐法忌桃李雀肉生葱生菜

又依前鼈甲等五味散取吐當歸等六味散利後雖經吐下其原尚在如更吐利又慮尫羸宜合鬼箭羽等十味丸服之方

細辛四兩　橘皮四兩　鬼箭羽折者之如金色者二兩

白朮五兩　桂心四兩　地骨皮四兩　蜀漆二兩

甘草三兩炙　當歸五兩　丁香三兩

右藥擣篩蜜和丸如梧子煮烏梅飲下之初服十五丸日再稍稍加至三十丸服經三五日後若覺熱甚每服藥後良久任喫三兩口粥飲壓之忌海藻菘菜桃李雀肉生葱

又療此病曾用釋深師一方大有効其方有巴豆皂莢藜蘆三味作丸服雖經困苦一服永斷只并同並出第一卷

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟

較

重訂唐王燾先生外臺秘要方第五卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方卷第六目錄 霍亂及嘔吐二十九門

霍亂病源論三首
霍亂吐痢方一十二首
霍亂臍上築方三首
霍亂腹痛吐痢方七首
霍亂不止及洞下泄痢方八首
霍亂後脈絕手足冷方四首
霍亂煩躁方八首
霍亂衆藥療不效方 首
乾濕霍亂及痰飲方五首
霍亂心腹痛方三首
霍亂煩渴方四首
霍亂乾嘔方五首
霍亂轉筋方一十四首
霍亂雜灸法二十六首
三焦脉病論二首
上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣方九首
中焦熱及寒洩痢方二首
下焦熱方六首
下焦虛寒方六首

許仁則療霍亂方三首
雜療霍亂方四首
乾嘔方六首
嘔吐方四首
噦方七首
嘔逆吐方八首
嘔逆不下食方八首
許仁則療嘔吐方四首
雜療嘔噦方二首
噫醋方七首

唐王燾先生外臺秘要方第六卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

門人鄭康宸黄乙父仝校

霍亂病源論三首

病源霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛者則先痢心腹並痛者則吐痢俱發挾風而實者身發熱頭痛體疼而復吐痢虛者但吐痢心腹刺痛而已亦有飲酒食肉好餐腥膾生冷過

度或居處不節或露卧濕地或當風取凉而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀不消化亦令清濁二氣相干脾胃虛弱便生吐痢水穀不消則令心腹脹滿皆成霍亂霍亂有三名一名胃反言其胃氣虛逆反吐飲食也二名霍亂言其病揮霍之間便致撩亂也三名走哺言其哺食變逆者也診其脈來代者霍亂又脈代而絕者亦霍亂也霍亂脈大可療微細不可療霍亂吐下脈微遲氣息劣口不欲言者不可療也養生方云七月食蜜令人暴下發霍亂 出第二十二卷中

千金翼曰原夫霍亂之爲病也皆因食飲非關鬼神飽食肫膾復餐乳酪海陸百品無所不啖眠卧冷席多飲寒漿胃中諸食結而不消陰陽二氣擁而反戾陽氣欲降陰氣欲升陰陽乖隔變成吐痢頭痛如破百節如解遍體諸筋皆爲迴轉論諸此小病之中最爲可畏雖臨深履危不足以諭之也養生者宜達其旨趣庶可免於夭橫者矣又凡霍亂務在溫和將息若冷即遍體轉筋凡此病定已後一日不食爲佳仍須三日少少喫粥三日以後乃可恣意食息也七日勿雜食爲佳所以養脾氣也 出第二十卷中

霍亂吐痢方一十二首

廣濟療霍亂吐痢扁豆湯方

扁豆葉切一升 香薷葉切一升 木瓜一枚 乾薑一兩

右四味以水六升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里進無所忌

又療冷熱不調霍亂吐痢宿食不消理中丸方

人參八分 白朮八分 甘草八分炙

乾薑六分 高良薑八分 桂心六分

右六味擣篩蜜丸空腹以飲下梧子大三十丸日二服漸加至四十丸老小以意減之忌生冷油膩生葱海藻菘菜桃李雀肉等物

又療霍亂冷熱不調吐痢高良薑湯方

高良薑五兩 木瓜一枚 杜梨枝葉三兩
右三味切以水六升煮取二升絞去滓空腹溫三服服
別如人行六七里無所忌范汪同出第四卷中
小品霍亂吐痢心煩亂髮湯主之方
亂髮一握燒焦 人參一兩 吳茱萸一升 甘草一兩炙
右四味切以水三升酒二升煮取二升絞去滓溫服五
合日三服亦療蛇
又療霍亂吐痢已服理中及四順湯不解者以竹葉湯方
竹葉一握 小麥一升 生薑十兩 甘草一兩炙
人參一兩 附子一兩炮 肉桂二兩 當歸二兩

芍藥一兩 白朮三兩 橘皮二兩
右十一味以水一斗半先煮小麥竹葉取八升汁去滓
內諸藥煮取二升半分三服吐痢後腹滿加厚朴二兩
炙上氣加吳茱萸半升差理中四順則大熱熱毒霍亂
宜竹葉湯忌生葱海藻菘菜猪肉桃李雀肉等千金古今錄驗
並同
又霍亂吐痢而汗出小便復利或下利清穀裏外無熱脈
微欲絕或惡寒四肢拘急手足厥逆四逆加猪膽湯主之
方
甘草二兩炙 乾薑三兩炮 附子一枚生 猪膽汁半合
右四味切以水三升煮取一升四合溫分再服無猪膽
以羊膽代之強人可與大附子一枚乾薑加至三兩若
吐之後吸吸少氣者及下而腹滿者加人參一兩諸藥
皆減為一兩如證者亦宜與理厥人參湯並忌海藻菘
菜猪肉刪繁千金經心錄同
又四順湯與前療同常用此方
人參三兩 乾薑三兩 甘草三兩 附子一兩
右四味切以水六升煮取二升絞去滓溫分三服若筋
肉今汗出煩躁者良忌海藻菘菜猪肉千金同刪繁范汪方云利甚者
加龍骨二兩炙

五白丸療霍亂嘔吐及暴痢良方
半夏二兩洗 附子四兩炮 乾薑四兩炮
人參三兩 桔梗二兩
右五味作散臨病和之若吐痢不止者以苦酒和之飲
服二丸如梧子不差復服酌藥者加之以意下者用粥
和丸亦得忌猪羊肉餳范汪同並出第四卷中
崔氏理中丸療三焦不通嘔吐不食并霍亂吐逆下痢及
不得痢悉主之方
人參二兩 乾薑二兩炮 白朮三兩 甘草三兩炙
右四味擣篩蜜和丸如梧子平旦取粥清服五丸日再

服一方乾薑三兩忌海藻菘菜桃李雀肉等 出第二卷中

延年理中丸療霍亂吐痢宿食不消方

白朮二兩　乾薑一兩炮　人參二兩

甘草二兩炙　大麥糵二兩熬黄

右五味擣篩蜜和爲丸以飲服十五丸如梧子大日再服稍加至二十丸忌海藻菘菜桃李雀肉等 出第六卷

必効理中散主霍亂及轉筋吐痢不止方

青木香六分　桂心八分炙　厚朴八分炙

甘草八分炙　白朮八分　乾薑十分炮

附子六分炮

右七味擣篩爲散飲服兩錢匕如人行五六里不定更服一錢匕差止忌海藻菘菜生葱猪肉桃李雀肉等

又方

若熱霍亂則渴心煩欲得冷水喫則宜恣意飲冷水及土漿取足定止

霍亂臍上築方三首

病源霍亂而臍上築悸者由吐下之後三焦五藏不和而水氣上乘於心故也腎主水其氣通於陰若吐下則三焦五藏不和故脾氣亦虚不能制水水不下宣與氣俱上乘心其狀起臍下上從腹至心氣築築然而悸動不定也 出第二十卷中

仲景論霍亂臍上築者腎氣動也先療氣理中湯去朮加桂凡方加朮者以内虚也加桂者恐作奔豚也理中湯方

人參二兩　甘草三兩炙　白朮三兩　乾薑三兩炮

右四味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三夜一若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩吐多者去朮加生薑三兩若下多者復用朮悸者加茯苓二兩若先時渴喜得水者加朮合前成四兩半若腹中痛者加人參合前成四兩半若惡寒者加乾薑合前成四兩半若腹滿者去朮加附子一枚炮去皮破六片服湯後一

食頃飲熱粥一升許汗微出自溫勿發揭衣被也忌海藻菘菜桃李雀肉等 千金備急文仲崔氏集驗范汪小品古今録驗同

又凡臍上築者以吐多故也若吐多者理中湯主之方如前去加減霍亂四逆吐少嘔多者附子粳米湯主之方

附子一枚炮　半夏半升洗　甘草一兩炙

大棗十枚　粳米半升

右五味切以水八升煮米熟去滓溫服一升日三忌羊肉餳海藻菘菜餳 一方有乾薑一兩小品千金同出第十七卷中

文仲療霍亂臍上築而悸茯苓理中湯方

茯苓二兩　甘草二兩炙　乾薑一兩炮

人參三兩　木瓜三兩

右五味㕮咀以水六升煮取三升去滓適寒溫分爲四

服忌海藻菘菜酢物出第四卷中

霍亂腹痛吐痢方七首

廣濟療霍亂腹痛吐痢方

取桃葉切三升以水五升煮取一升三合分溫二服

出第一卷中

范汪理中加二味湯療霍亂胸滿腹痛吐下方

人參三兩　乾薑三兩炮　甘草三兩炙

白术三兩　當歸二兩　芍藥二兩

右六味㕮咀以水七升煮取三升絞去滓溫服一升日

三服良忌海藻菘菜桃李雀肉等

又主霍亂腹痛吐下方

取枇杷葉冬取皮煎汁服一酒杯有効千金云濃煮汁一升服立止

出第四卷中

千金理中湯療霍亂吐下脹滿食不消心腹痛方

人參二兩　白术二兩　甘草三兩炙　乾薑三兩

右四味以水六升煮取三升絞去滓溫分三服不差頻

進兩三劑遠行防霍亂作丸如梧子服二十丸散服方

寸匕酒亦得若轉筋者加石膏三兩忌海藻菘菜桃李

雀肉等[illegible]一作學方同加減[illegible]備急集驗小品文仲[illegible]同出第二十卷中

備急療霍亂吐痢高良薑酒方

高良薑火炙令焦香每用五兩打破以酒一升煮取

三四沸頓服亦療霍亂腹痛氣惡崔氏延年同出第一卷中

崔氏療霍亂[illegible]逆不好則用此方主腹痛吐痢齊奇易方

生香薷一把　小蒜一升碎　厚朴六兩炙　生薑十兩

右四味切以水一斗煮取三升分三服得吐痢止每服

皆須溫如吐痢不止用後方

又蘆根湯方

生蘆根切一升　生薑一斤　橘皮五兩

右三味切以水八升煮取二升分二服服別相去以意

消息之並出第一卷中

霍亂不止及洞下泄痢方八首

病源霍亂而下痢者是冷氣先入於腸胃腸胃之氣得冷

則交擊而痛故霍亂若先腹痛者則先下痢也出第二十二卷中

廣濟療霍亂不止方

取薤漿水三升煮取一升五合內米粉一抄攪調分

二服服別相去如人行三四里出第四卷中

又療霍亂卒吐下不禁脈欲絕者人參爲主之方

人參二兩　茯苓二兩　葛根二兩　橘皮二兩

麥門冬二兩去心 甘草二兩炙
右六味切以水五升煮取二升絞去滓溫分三服忌海
藻菘菜酢物出第四卷中
删繁療霍亂洞泄不止臍上築築腎氣虚人參理中湯方
人參 乾薑 甘草炙各二兩 茯苓四兩
橘皮四兩 桂心二兩 黃耆一兩
右七味切以水九升煮取三升去滓分溫三服忌海藻
菘菜生葱酢物肘後云朮者宜實也出第四卷中
又療中焦虛寒洞泄人參湯補虛洩方
人參三兩 甘草二兩炙 黃芩二兩 當歸三兩

茯苓四兩 乾薑四兩 厚朴四兩炙 芎藭三兩
粟米二升
右九味切以水一斗五升煮米取熟去米澄取七升下
諸藥煎取三升分三服忌海藻菘菜大酢等物
又療中焦洞泄下痢或因霍亂後瀉黃白無度腹中虛痛
黃連湯方
黃連四兩 黃蘗三兩 當歸三兩 厚朴二兩
石榴皮四兩 乾薑三兩 地榆四兩 阿膠四兩
右八味切以水九升煮取三升去滓下阿膠更煎取烊
分三服忌猪肉冷水並出第四卷中

千金療霍亂洞下不止方
取艾一把水三升煮取一升頓服之備急同出第二十卷中
延年增損理中丸主霍亂下氣能食止洩痢方
人參六分 白朮六分 厚朴六分炙
茯苓六分 甘草六分炙 薑屑二分
右六味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服十丸飲下酒下
亦得加至十五二十丸忌生冷海藻菘菜桃李雀肉大
酢出第六卷中
必効療霍亂水痢腹中雷鳴無不差烏梅黃連散方
烏梅肉三兩 黃連三兩 熟艾葉三兩 赤石脂二兩

當歸三兩 甘草三兩炙 附子二兩炮 阿膠二兩炙
右八味擣篩爲散有患者飲服二方寸匕頻熱則飲之
頻冷則酒下忌海藻菘菜猪肉冷水出第二卷中
霍亂後脈絕手足冷方四首
病源霍亂而大吐下後其腸胃俱虛乃至汗出其脈欲絕
手足皆冷名爲四逆四逆者謂陰陽卒厥絕也出第二十二卷中
仲景論霍亂吐且痢而大汗出小便復利或下利清穀
裏寒外熱脈微欲絕或發熱惡寒四肢拘急手足厥逆者
四逆湯主之方
甘草二兩炙 附子一枚生 乾薑一兩半

右三味切以水三升煮取一升二合去滓溫分二服加減依後法忌海藻菘菜猪肉（千金同）

又吐已下斷汗出厥冷四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆湯主之方

甘草二兩（炙） 大附子一枚 乾薑三兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓溫分二服其脈即出愈若面色赤者加葱九莖若腹中痛者去葱加芍藥二兩若嘔者加生薑二兩若咽痛者去芍藥加桔梗一兩若利止脈不出者去桔梗加人參二兩病皆與方相應乃合服之若吐利止身疼痛不休者消息和其外

傷寒論中又有療諸發熱霍亂者審取之忌海藻菘菜猪肉（仲景傷寒論上證合用通脈四逆加猪膽湯又吐利止身痛不休者消息和解其外宜桂枝湯小和之並出第十七卷中）

小品扶老理中散并作丸長服亦得療羸老冷氣惡心食飲不化腹虛滿拘急短氣及霍亂嘔逆四肢厥冷心煩氣悶流汗悉主之方

人參五兩 乾薑六兩 白朮五兩 麥門冬三兩（去心）

附子三兩（炮） 茯苓三兩 甘草五兩（炙）

右七味作散隨病煮取三合白湯飲和方寸匕一服不効又服常將蜜丸酒服如梧子二十丸忌海藻菘菜猪肉桃李雀肉大酢（千金同出第四卷中）

千金四逆湯主多寒手足厥冷脈絕方

吳茱萸二升 當歸三兩 桂心三兩

芍藥三兩 細辛二兩 通草二兩

生薑八兩 甘草二兩（炙） 大棗十二枚

右九味切水六升清酒六升合煮取三升分溫四服舊方棗二十五枚今以霍亂法多痞故除之若除（一本作入）葛根二兩佳忌生葱生菜海藻菘菜（小品同仲景傷寒論此方名當歸四逆加吳茱萸生薑湯）

霍亂煩躁方八首

病源霍亂之後煩躁臥不安者由吐下之後腑藏虛極陰陽未理血虛氣亂故血氣之行未復常度內乘於腑藏故煩躁而不得安臥也（出第二十二卷中）

廣濟療霍亂後煩躁臥不安葱白大棗湯方

葱白二十莖 大棗二十枚

右二味以水二升半煮取一升去滓頓服之（文仲同）

又療霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

生薑（或乾薑）一小升

右一味㕮咀以水五升煮三沸頓服若不即愈可更作

又方

桂心屑半升以煖飲一升和之盡服忌生葱 肘後同並出第二卷中

文仲療霍亂煩躁方

濃煮竹葉飲五升令灼灼傍以淋轉筋處 肘後備急同

又方

服乾薑屑三兩方寸匕 肘後備急同

又方

小蒜一升㕮咀水三升煮取一升頓服之 肘後同出第二卷中

備急療霍亂煩躁方

黃粱米粉半升水一升半和攪如白飲頓服糯米亦得

又方

燒亂髮如雞子大以鹽湯三升和服之不吐復服 出一卷中

霍亂服藥療不効方二首

小品療霍亂諸藥不能療亂髮湯方

亂髮一握燒灰　小蒜十四枚　附子一兩炮　甘草二兩炙

右四味切以水六升煮取三升去滓溫分三服忌豬肉海藻菘菜 出第四卷中

千金人參湯療毒冷霍亂吐痢煩嘔轉筋虛冷汗出手足指冷脈欲急斷死絕語音聲不出百方不効脈不通者服此湯取差乃止隨吐者續更服勿住方

人參　附子炮　厚朴炙　茯苓
甘草炙　橘皮　當歸　葛根各二兩
桂心　乾薑炮各三兩

右十味以水七升煮取二升半分溫三服忌豬肉冷水海藻菘菜生葱大酢 出第二十卷中

乾濕霍亂及痰飲方五首

病源霍亂者多吐痢也乾霍亂者冷氣搏於胃使人不消但腹滿煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐痢名爲乾霍亂也 出第二十二卷中

救急療霍亂無問乾濕冷熱等木香湯方

青木香　檳榔三　高良薑二兩　豆蔻子二枚

右三味㕮咀以水一大升煮取半升頓服之則定

又方

取烏牛屎二兩以水二升煮濃絞濾頓服之大良

又生薑湯方

以東壁土一把生薑一大兩碎之

右二味用水一大升煮取半升澄清熱飲之如渴依前進之 出第一卷中

必効療上吐下痢者名爲濕霍亂方

黄牛屎半大升許取水一大升煮三兩沸和牛屎漉取汁服半升即止犁牛子屎亦佳無生濕者將乾者相瞪亦好用 備急并范汪同出第三卷中

又四神丸主霍亂冷實不除及痰飲百病無所不主方

乾薑一兩　桂心一兩　附子一兩炮　巴豆六十枚熬

右四味末之蜜和爲丸如小豆大飲服二丸取快下不下又服一丸忌生葱野猪肉蘆笋 胡洽同出第四卷中

霍亂心腹痛方三首

病源霍亂而心腹痛者是風邪之氣客於藏府之間冷氣

與真氣相擊或上攻心或下攻腹故心腹痛也 出第二十卷中

廣濟療霍亂心腹痛煩嘔不止厚朴人參湯方

厚朴四兩炙　橘皮二兩　人參二兩

高良薑一兩　當歸一兩　藿香一兩

右六味切以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生冷粘膩 出第四卷中

又療霍亂心腹絞痛不止方

鹽三累鼓二升合擣中分爲兩分手捻令如粉熬令灼灼爾更番以熨臍中取愈 並第一卷中

千金霍亂蠱毒宿食心腹痛冷氣鬼氣方

極鹹鹽湯三升一味霍亂心腹暴痛宿食不消積冷煩滿者熱飲一升以指刺口令吐宿食使盡不盡更刺吐訖復飲三吐乃住靜止此法大勝諸藥俗人以爲田舍淺近法鄙而不用守死而已凡有此疾即須先用之 備急崔氏集驗文仲並同出第二十卷中

霍亂煩渴方四首

病源霍亂而煩渴者由大吐逆上焦虛氣不調氣乘於心則煩悶也大利則津液竭津液竭則藏燥藏燥則渴也煩渴不止則引飲引飲則利亦不止 出第二十二卷中

又療霍亂吐下後大渴多飲則殺人方

黄粱米五升水一斗煮之令得三升汁澄清稍稍飲之勿飲餘飲 備急同糯米亦得出第二卷中

備急近効療霍亂不吐不下食氣急而渴方

木瓜一枚切以水四升煮取二升細細飲盡更作吐不止者亦差若渴唯飲此湯佳根莖亦可用此湯令人吐 崔氏張文仲同出第一卷中

必効霍亂渴方

糯米二升擣取滑飲訖則定若不渴不須一方渴者服之並當飽又云研糯米取白汁恣意飲之以差爲度 崔氏張文仲云奇効備主乾霍亂出第三卷中

又療霍亂後渴口乾腹痛不止者厚朴桂心湯方

厚朴四兩炙　桂心二兩

右二味切以水四升煮取一升二合絞去滓內分六合細細飲之服了如其渴欲得冷水盡意飲之長安傳少許常服忌生葱出第二卷中

霍亂乾嘔方五首

病源霍亂而乾嘔者由吐下之後脾胃虛極上焦不理氣痞結於心下氣時逆上故嘔嘔而乾嘔者謂欲嘔而無所出也若更遇冷冷折胃氣胃氣不通則變噦也出第二十二卷中

財後療苦嘔不息方

取蘼白一虎口切以水三升煮令得一升半服之不過一二度備急同

又乾薑茱萸湯方

乾薑切　茱萸各二兩熬

右二味以水二升煮取一升頓服之下不止手足逆冷者加椒百粒附子一枚炮水三升煮取一升頓服出第一卷中

删繁療霍亂後不欲食胃弱嘔吐不止厚朴湯方

厚朴四兩炙　乾扁豆葉二兩　茯苓三兩

白朮五兩　人參三兩

右五味切以水七升煮取二升分三服忌桃李大醋雀內等出第二卷中

千金療霍亂引飲後輙乾嘔方

生薑五兩水五升煮取二升半分二服又煮高良薑飲之大佳延年秘錄備急小品崔氏張文仲同出第十卷中

經心錄療霍亂後煩嘔厚朴湯方

厚朴二兩炙　生薑三兩　枳實三兩炙

右三味切以水六升煮取二升分三服出第二卷中

霍亂轉筋方一十四首

病源霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也足之三陰三陽之筋起於足指手之三陰三陽之筋起於手指並循絡於

身大霍亂大吐下之後陰陽俱虛血氣虛極則手足逆冷而榮衛不理冷搏於筋則筋為之轉冷入於足之三陰三陽則腳筋轉入於手之三陰三陽則手筋轉隨冷所入之筋筋則轉轉者由邪冷之氣擊動其筋而移轉也又轉筋者由榮衛氣虛風冷搏於筋故也手足之三陰三陽之筋皆起於手足指而並絡於身若血氣不足陰陽虛者風冷邪氣中其筋隨邪所中之筋筋則轉轉者謂其轉動也經云足太陽下血氣皆少則喜轉筋若踵下痛者是血氣少則陽虛虛而風冷乘之故也診其左手關上肝脈也沉爲陰陰實者肝實也苦肉動轉筋左手尺中名神門以後脈

足少陰經也浮為陽陽虛者病苦轉筋其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云覆臥傍兩脚兩手外踵者相向令鼻內氣自極七息除兩膝寒脛骨疼轉筋又云覆臥傍視立兩踵伸腰以鼻內氣去轉筋又云張脛兩足指號五息止令人不轉筋極自用力張脚痛挽兩足指號言寬大去筋節急攣躄痛久行身開張又云覆臥傍視立兩踵伸腰以鼻內氣自極七息除脚中弦痛轉筋脚疼一本云療脚弱 出第二十一卷中

廣濟療霍亂吐痢轉筋欲入腹高良薑湯方

高良薑四兩　桂心四兩

右二味切以水七升煮取二升去滓分三服如人行四五里一服忌生冷生葱

又療霍亂轉筋不止茱萸湯方

吳茱萸一升　甘草二兩炙　乾薑二兩炮

蓼子一把　亂髮一兩燒　桂心二兩

右六味切以水七升煮取二升三合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里忌生葱海藻菘菜生冷粘膩等

又療轉筋方

取故綿多取釅醋甑中蒸及熱用裹病人脚冷更易

勿停差止 千金同並出第四卷中

肘後療兩臂脚及胸脅轉筋者方

取鹽一升半水一斗煮令熱灼灼爾漬手足在胸者以湯洗之轉筋入腹中倒擔病人令頭在下腹中平乃止若劇者引陰陰縮必死猶在倒擔之可與活耳

又方

煮苦酒三沸漬紙裹轉筋上令少熱尤佳又以綿纏膝下至足 [illegible]氏[illegible]備急同

又若轉筋入腹中轉者方

取雞屎白一方寸匕水六合煮三沸溫頓服勿令病者知 仲景經心錄備急集驗文仲同

又若霍亂注痢不止而轉筋入腹欲死者方

生薑三兩擣碎以酒一升煮三四沸頓服之 肘後小品備急同出第二卷中

刪繁療舌強筋縮牽陰股引留以腹痛霍亂黃龍藤湯方

黃龍藤切一升 此樟木上藤也取以吹氣從中貫度者好也

右一味以水四升煮取八合為一服一劑不止更至二劑良驗文仲云不問霍亂或乾霍亂或吐痢不止或不吐痢並悉療之 出第三卷中

千金霍亂轉筋入腹不可奈何方

極鹹作鹽湯於槽中暖漬之則差（小品集驗同）

又方

以醋煮青布搨脚膝冷復易之（備急文仲崔氏小品集驗救急同）

又方

蓼一把去兩頭以水二升煮取一升頓服（小品文仲集驗備急同並出第二十卷中）

救急霍亂脚轉筋絕四肢已冷殘氣絕心上微暖猶可救之方

取朱砂二兩熟研蠟三兩和之爲丸作冷苦火藏中如棗衣被厚覆勿令煙泄兼牀下著火令腹微暖微

良久當汗則漸氣通便活忌生血物（出第一卷中）

必效主霍亂脚轉筋及入腹方

以手拘所患脚大母指灸當脚心下急筋上七壯

又方

木瓜子根皮合煮湯服之（並出第三卷中）

霍亂雜灸法二十六首

肘後霍亂先腹痛者法

灸臍上十四壯名太倉在心厭下四寸更度之（千金備急崔氏古今錄驗同甄權銅人經中管一名太倉在臍上四寸胃募也）

又療先洞下者法

灸臍邊二寸男左女右十四壯甚者至三十四十壯名大腸募也（千金備急崔氏古今錄驗同）

又療轉筋者法

灸脚心下名湧泉穴

又灸當足大母指聚筋上六七壯（神驗）

又灸足大指下約中一壯（千金及翼同）

又灸轉筋入腹痛者法

令四人捉手足灸臍左二寸十四壯

又灸股中大筋上去陰一寸

又療苦噦方法

灸手腕第一約理中七壯名心主當中指

又療下痢不止者法

灸足大指本節內側一寸白肉際左右七壯名大都（千金同甄權銅人經大都二穴在足大指本節後陷中）

又療吐且下痢者法

灸兩乳連黑外近腹白肉際各七壯可至二七壯

又療苦煩悶急滿法

灸心厭下三寸七壯名胃管（文仲同）

又法

以鹽內臍中灸上二七壯（文仲千金翼同）

人療苦撓臍痛急者法

灸臍下一寸三七壯名關元良 文仲同

又療先吐者方

灸心下一寸十四壯又并療下痢不止上氣灸五十壯名巨闕正心厭尖頭下一寸是也 千金與文仲從且諸本同通按銅人經巨闕在鳩尾下一寸心之募也

又療霍亂神秘起死灸法

以物橫度病人口中屈之從心鳩尾度以下灸度下頭五壯橫度左右復灸五壯此三處併當先灸中央畢更橫度左右也又灸脊上以物圍令正當心厭又夾脊左右一寸各七壯是腹背各灸三處也 崔氏文仲同

又華佗療霍亂已死上屋喚魂者又以諸療皆至而猶不差者法

捧病人覆臥之伸臂對以繩度兩肘尖頭依繩下夾背脊大骨空中去脊各一寸灸之百壯無不活者所謂灸肘椎已試數百人皆灸畢即起坐佗以此術傳其子孫世世皆秘之不傳 千金崔氏備急同並出第一卷中

千金凡得霍亂灸之或時雖未立差終無死憂不可逆灸或但先腹痛或先下後吐當隨病灸之

又療霍亂灸法

灸穀門穴在臍傍二寸男左女右一名大腸募灸二七壯不止又灸如前數 通按甲乙經天樞一名長谿一名穀門又臍兩傍各二寸陷者中

又療吐下不禁兩手三陰三陽脈俱疾數者法

灸心厭骨下三寸又灸臍下三寸各六七十壯

又療乾嘔者法

灸間使穴在手掌後三寸兩筋間左右各灸七壯不差更灸如前數 文仲肘後同

又療手足逆冷者法

灸三陰交穴在足內踝直上三寸廉骨際陷中左右七壯不差更灸如前數 肘後古今錄驗同

又療轉筋不止者法

灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈

又療走哺轉筋者法

灸踝白肉際左右各二十一壯

又灸小腹下橫骨中央隨年壯

又療轉筋入腹者法

灸兩乳根黑際各一壯

又療轉筋在兩臂及胸中法

灸手掌白肉際七壯又灸膻中中府巨闕胃管尺澤

以上并療筋拘頭足攣急背愈

又療轉筋不止者法

若是男子手挽其陰牽之女子挽其乳近左右邊

又療轉筋欲死者方

令四人手持足灸臍上一寸十四壯自不動勿復持之

又療霍亂泄痢所傷煩欲死者方

灸慈宮各二十壯慈宮在橫骨兩邊各二寸半橫骨在臍下橫門骨是也甄本出第二十卷中通按甲乙經作衝門一名慈宮上去大橫五寸在橫骨兩端約中動脈是

救急療霍亂心腹痛脹吐痢煩悶不止則宜灸之方

令病人覆卧伸兩臂膊著身則以小繩正當兩肘骨尖頭從背上量度當脊骨中央繩下點之去度又取繩量病人口至兩吻截斷便中折之則以度向所點背下兩邊各依度長短點之三處一時下火灸絕便定神驗艾炷大稍加也

又療霍亂轉筋不止漸欲入腹凡轉筋能殺人起死之法無過於灸灸法唯三處要穴第一承筋穴在腨股下際取穴法

以繩從脚心下度至脚踵便截斷度則廻此度從脚跟緩量向上盡度頭當腨下際宛宛中是穴灸三七壯則定

又不止則灸涌泉在足心下當足大指中節後一寸半正當大筋上是穴又灸足跟後黑白肉交際當中央此二處要穴灸之不過二三七壯必定並出第一卷中

三焦脉病論二首

刪繁論曰夫三焦者一名三關也上焦名三管反射中焦名霍亂下焦名走哺合而爲一有名無形主五藏六腑往還神道周身貫體可聞不可見和利精氣決通水道息氣腸胃之間不可不知也凡上焦三管反射者通三焦名中

清之腑也別號玉海水道出屬膀胱合者雖合而不同上中下三焦同號爲孤之腑也而榮出中焦衛出上焦榮者是絡脈之氣道也衛者是經脈之氣道也上焦如霧霧者霏霏起上也起於胃上管並咽以上貫膈布胸中走腋循足太陰之分而行還注手陽明上至舌下注足陽明常以榮衛俱行於陽二十五度行陰亦二十五度爲一周日夜五十周身周而復始大會於手太陰手少陽也主心肺之病內而不出人有熱則飲食下胃其氣未定汗則出或出於面或出於背或出於身半皆不循衛氣之道而出者外傷於風內開腠理毛蒸理泄衛氣走之故不得循其道此氣慓悍滑疾見開而出故不得

其道名曰焦泄其病則肘掌痛食先吐而後下氣不續胸膈間厭悶所以飲食先吐而後下也寒則精神不守泄下便利語聲不出若實則上絕於心若虛則引氣於肺 出第四卷中千金同

千金論曰三焦病者腹脹氣滿少腹尤堅不得小便窘急溢則為水留則為脹候在足太陽之外大絡在太陽少陽之間亦見于脈取委陽少腹病腫痛不得小便邪在三焦約取太陽大絡視其絡脈與厥陰小絡結而血者三焦脹者氣滿在皮膚殼殼然而不堅手少陽之脈是動則病耳聾煇煇焞焞嗌腫喉痺是主氣所生病者汗出目銳眥痛

頰痛耳後肩臑肘臂外皆痛小指次指不用為此諸病寒則留之熱則疾之陷下則灸之不盛不虛以經取之盛者人迎一倍於寸口虛者人迎反小於寸口 出第二十卷中

上焦熱及寒吐痢腸鳴短氣方九首

刪繁療上焦實熱飲食下胃其氣未定汗出面背身中皆熱名曰漏氣通脈瀉熱澤瀉湯方

澤瀉 二兩 生地骨皮 五兩 甘草 一兩炙 半夏 二兩洗
石膏 八兩 柴胡 三兩 茯苓 三兩 生薑 三兩
竹葉 切五合 人參 二兩 桂心 一兩 蓴心 一升

右十二味切以水一斗煮取三升分三服忌海藻菘菜羊肉餳醋生葱 千金同

又療上焦熱腹滿而不欲食或食先吐而後下肘脣攣痛麥門冬理中湯方

生麥門冬 一升 生薑 四兩 白朮 五兩 甘草 二兩炙
人參 三兩 茯苓 二兩 橘皮 三兩 竹茹 一升
生蘆根 一升 蓴心 五合 萎蕤 三兩 廣米 一升

右十二味切以水一斗五升煮取三升分三服忌海藻菘菜大酢桃李雀肉等 千金同

又療上焦氣不續胸膈間厭悶所以飲食先吐而後下半夏理中續膈破寒湯方

半夏 一升洗 生薑 四兩 麻黃 三兩去節
前胡 三兩 澤瀉 三兩 竹葉 一升
細辛 二兩 枳實 二兩炙 杏人 三兩去皮尖

右九味切以水九升煮取三升去滓分三服忌羊肉餳生菜等物

又療上焦熱牽肘攣心痛喘欬短氣動而好唾潤肺止心痛大棗湯方

大棗 三十枚 杏人 三兩去皮尖 人參 三兩 紫菀 二兩
萎蕤 二兩 麥門冬 三兩去心 百部 三兩 通草 三兩
石膏 八兩 五味子 一兩 羊腎 三枚去膏 麻黃 三兩去節

右十二味切以水一斗煮取二升五合去滓下蜜三合生薑汁三合淡竹瀝三合更上火煎取三升分三服

又療上焦虛寒精神不守泄下便利語聲不出茯苓安心湯方

茯苓三兩 人參二兩 乾薑三兩 桂心一兩 遠志皮二兩 甘草二兩炙

右六味切以水九升煮取三升去滓分三服忌生葱酢物海藻菘菜等物

又療上焦虛寒腸鳴下利心下痞堅半夏瀉心湯方

半夏五兩洗 黄芩三兩 甘草三兩炙 人參三兩

乾薑三兩 黄連一兩 桂心三兩

右七味以水九升煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜餳羊肉生葱猪肉冷水 此仲景半夏瀉心湯方本無桂心有大棗十二枚出第四卷中

千金療上焦虛寒短氣語聲不出黄耆補中湯方

黄耆一兩 桂心二兩 丹參四兩一作人參 桔梗二兩 乾薑兩 五味子二兩 茯苓二兩 甘草一兩炙 杏人四兩去皮尖 芎藭二兩

右十味切以水九升煮取三升絞去滓溫分三服忌海藻菘菜猪肉生葱大酢熱麪同

又療上焦冷下痢腹內不安食好注下黄連丸方

黄連八兩 乾薑四兩 椶皮二兩 烏梅肉八兩 附子四兩炮 桂心一兩 芎藭三兩 黄蘗二兩 阿膠炙四兩

右九味搗末之白蜜和爲丸如梧子大飲下二十丸加至三十丸忌猪肉冷水生葱等熱麪同

又療上焦閉塞乾嘔嘔而不出熱少冷多好吐白沫清涎吞酸厚朴湯方

厚朴四兩炙 吳茱萸八合 人參二兩 茯苓四兩 桔梗三兩 生薑八兩 玄參三兩 芎藭四兩 白朮四兩 附子二兩 橘皮三兩去脉

右十一味切以水九升煮取三升絞去滓分三服忌猪肉桃李雀肉大酢熱麪同出第二十卷中

中焦熱及寒泄痢方三首

删繁論曰中焦如漚 漚者在胃中如漚也 起於胃中管在上焦之後此受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注於肺脉乃化而爲血奉以生身莫貴於此故獨得行於經隧名曰營氣主足陽明陽明胃之脉也出外踝上去踝八寸別走太陰絡諸經之脉上下擇大谷主腐五穀不吐不下實則生熱熱則閉塞不通上下隔絕虛則生寒寒則洞泄便痢霍亂主脾胃之病夫血與氣異形而同類衛是精氣營是神氣

血與氣異形而同類衛爲奪血無汗(此則氣奪)奪汗無血(此則榮氣)故
人有一死而無再生也俗精神之氣兩絕也若虛則補於
胃實則瀉於脾調其中和其源萬不遺一也(千金同)
又療中焦實熱閉塞上下不通不吐不下腹滿
彭彭喘急大黃瀉熱開關格通隔絕湯方
大黃(切別浸) 黃芩(二兩) 澤瀉(二兩)
升麻(二兩) 羚羊角(四兩) 梔子人(四兩)
生地黃汁(一升) 玄參(八兩) 芒消(三兩)
右九味切以水七升先煮七味取二升三合下大黃更
一兩沸去滓下消分三服忌蕪荑(千金同)

千金療中焦熱水穀下痢藍青丸方
藍青汁(三升) 黃連(八兩) 黃蘗(四兩) 白朮(三兩)
地榆(二兩) 地膚子(二兩) 阿膠(五分炙) 烏梅肉(三兩)
右八味下篩用藍汁和微火上煎爲丸如杏人大飲服
三丸日再七月七日合之良忌豬肉冷水
桃李雀肉等
又療中焦虛寒四肢不可舉動多汗洞痢方
灸大橫隨年壯大橫俠臍傍行相去兩邊各四寸五
分(內經同出第二十七卷中)
下焦熱方六首

刪繁論曰下焦如瀆(瀆者如溝水決泄也)起胃下管別迴腸注於膀
胱而滲入焉故水穀常并居於胃中成糟粕而俱下於大
腸主足太陽灌滲津液合膀胱主出不主入別於清濁上
肝腎之病也若實則大小便不通利氣逆不續吐嘔不禁
故曰走哺若虛則大小便不止津液氣絕人飲酒亦入胃
穀未熟而小便獨先下者何也蓋酒者熟穀之液也其氣
悍以清故後穀入而先穀出也所以熱則瀉於寒則補
之千金同
又療下焦熱大小便俱不通柴胡通塞湯方
柴胡(一兩) 黃芩(三兩) 橘皮(三兩) 澤瀉(三兩)
梔子人(四兩) 石膏(六兩) 羚羊角(三兩炙) 生地黃(一升)
芒消(三兩) 香豉(一升)
右十味切以水一斗煮九味取三升去滓下芒消分三
服忌蕪荑(千金同)
又療下焦熱氣逆不續吐嘔不禁名曰走哺止嘔人參湯
方
人參 生蘆根 梔子人 萎蕤
黃芩 知母 茯苓(各三兩) 白朮(四兩)
石膏(八兩) 橘皮(四兩)
右十味切以水九升煮取三升去滓分三服忌桃李雀

內醋等 千金同

又療走暍不止或喉嗌熱氣衝心蒸悶香豉湯方

香豉一升 生地黃一升 白朮三兩 甘草二兩炙

竹葉一升 石膏八兩 茯苓二兩 葱白一升

右八味切以水七升煮取二升五合去滓分三服須利下加芒硝三兩忌蕪荑海藻菘菜桃李雀肉酢物等

又療下焦熱毒痢血如雞鴨肝不止升麻湯方

升麻三兩 犀角三兩屑 地榆四兩炙

蘗草二兩 蘘荷根四兩 黃芩三兩

巴焦根切一升 桔梗二兩 梔子人二七枚

右九物切以水九升煮取三升去滓分三服忌豬肉

出第四卷中

千金療下焦熱或痢下膿血煩悶恍惚赤石脂湯方

赤石脂八兩 烏梅肉二十枚 梔子人十四枚 白朮三兩

乾薑二兩 粳米一升 升麻三兩

右七味切以水一斗煮米取熟去米取七升下諸藥煮取二升五合去滓分三服忌桃李雀肉等 刪繁同

又療下焦熱毒痢魚腦雜痢鮮血臍下少腹絞痛不可忍欲痢不出香豉湯方

香豉一升 梔子四兩 薤白一升

黃連三兩 黃檗一兩 黃芩四兩

地榆四兩炙 白朮三兩 茜根二兩

右九味切以水一斗煮取三升分三服忌豬肉冷水桃李雀肉等 刪繁同出第二十卷中

下焦虛寒方六首

刪繁療下焦虛寒大便洞泄不止蘗皮湯止痢方

黃蘗一兩 黃連五兩 人參三兩

茯苓四兩 厚朴四兩炙 艾葉一升

地榆三兩炙 櫸皮四兩炙 阿膠三兩

右九味切以水一斗煮取三升去滓下膠煎取二升分

三服忌豬肉冷水醋等 千金同

又療下焦虛寒津液不止氣欲絕人參續氣湯方

人參 橘皮去赤 茯苓 烏梅皮

麥門冬去心 黃耆 芎藭 乾薑各三兩

白朮四兩 厚朴四兩炙 桂心二兩 吳茱萸三兩

右十二味切以水一斗二升煮取三升去滓分三服忌桃李雀肉生葱醋物 千金同

又療下焦虛寒損腹中瘀血令人喜忘不欲聞人聲胸中氣塞而短氣茯苓丸方

茯苓八分 甘草七分炙 杏人五十枚 人參七分

厚朴五分炙　乾薑七分　黃耆六分　桂心四分
當歸八分　芎藭五分　乾地黃八分
右十一味擣篩下蜜和為丸如梧子初服二十丸加至三十丸日再服清白飲進之忌海藻菘菜生葱酢物蕪荑等

又療下焦虛寒損或先見血後便轉此為近血或利不利伏龍肝湯方

伏龍肝五合　甘草二兩炙　乾薑二兩　黃蘗二兩
黃芩二兩　牛膝根二兩　地榆二兩炙　燒頭髮屑二合
阿膠二兩

右九味切以水七升煮取三升去滓下阿膠更煎取膠烊下髮屑分三服忌海藻菘菜千金并翼有乾地黃五兩無黃蘗千金并翼同出第四卷中

千金療下焦虛寒損或先便轉後見血此為遠血或利下或不利好因勞冷而發續斷止利湯方

續斷二兩　當歸三兩　乾薑四兩　蒲黃三分
桂心一兩　甘草二兩炙　乾地黃四兩　阿膠二兩
右八味以水九升煮六味取三升五合去滓下阿膠更煎取膠烊盡下蒲黃分三服忌海藻菘菜生葱蕪荑

又療三焦虛損或上下發泄吐唾血皆從三焦因起或熱損發或虛寒損發或因勞發或因酒發當歸湯方

當歸三兩　白芍藥四兩　羚羊角三兩炙　伏龍肝一丸
黃芩二兩　乾地黃二兩　白朮四兩　青竹皮一升
柏枝三兩炙　小薊三兩　阿膠三兩炙　乾薑二兩
甘草二兩　蒲黃五合　亂髮一丸燒灰
右十五味切以水一斗二升煮十二味取三升五合去滓下阿膠煎取膠烊下髮灰蒲黃分三服忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉等刪繁同並出第二十卷中

許仁則療霍亂方三首

許仁則云此病有兩種一名乾霍一名濕霍乾霍死者多

濕霍死者少俱緣飲食不節將息失宜乾霍之狀心腹脹滿攪刺疼痛煩悶不可忍手足逆冷甚者流汗如水大小便不通求吐不出求痢不下須臾不救便有性命之慮濕霍之狀心腹亦攪痛諸候有與乾同但吐痢無限此病始得有與天行相似者亦令頭痛骨肉酸楚手足逆冷四體發熱乾霍大小便不通煩冤欲死宜急與巴豆等三味丸服之服取快利方

巴豆一百枚熬　乾薑三兩崔氏以甘草五兩代薑千金同　大黃五兩
右三味先擣乾薑大黃為散後別擣巴豆如膏和擣二千杵內擣令調細細下蜜丸以飲下初服三丸如梧子大

流數按肚令轉動速下利良久不通則以熱飲投之又良久不利更服一丸須臾當利利後好將息食飲寒温以意取適如渴者煮漿水粥少少啜之忌野猪肉蘆筍等物 張文仲處

又療泄霍亂吐痢無限宜合高良薑等三味飲子服之方

高良薑 二兩　豆蔻子 十二枚　桂心 二兩

右藥切以水四升煮取一升去滓細細啜之亦有於此方加乾薑人參二物忌生葱

又木瓜桂心二物飲之方

木瓜 一枚乾者亦得　桂心 二兩

右藥以水二升煮取七合去滓細細飲之亦有豆蔻子代桂心者亦有單煮木瓜汁飲之忌生葱 集驗同出第卷中

雜療霍亂方四首

小品療霍亂嘔吐氣厥不得[illegible]湯方

豉 一升　半夏 一兩洗　生薑 二兩

人參 一兩　柴胡 一兩　甘草 一兩炙

右六味切以水五升煮取二升半溫服七合忌羊肉餳海藻菘菜等 千金有桂心一兩

又療卒道中得霍亂無有方藥氣息危急醫視捨去皆云必死療之方

蘆蓬蕽一大把煮令味濃頓服二升則差已用有效食中魚鱠芴者服之尤良 蘆蓬蕽即蘆花是也備急集驗文仲范汪同並出第四卷中

删繁療霍亂食不消腸鳴腹痛熱不止桔梗湯方

桔梗 四兩　白朮 五兩　乾薑 三兩

茯苓 三兩　倉米 一升

右五物切以水八升煮倉米熟去米將汁煮藥取二升分三分服忌酢物桃李雀肉猪肉大酢

近效訶梨勒散療一切風氣痰冷霍亂食不消大便澁方

取訶梨勒三顆擣取皮和酒頓服三五度則差

乾嘔方六首

病源乾嘔者胃氣逆故也但嘔而欲吐吐而無所出故謂之乾嘔也 出第二十一卷中

肘後療卒乾嘔不息方

破雞子去白吞中黃數枚則愈 肘後備急張文仲同

又方

生葛根絞取汁服一升

又方

甘蔗汁溫令熱服一升日三服 一云甘草汁張文仲同並出第二卷中

集驗療人乾嘔方

取羊乳汁飲一杯 千金同

又療吐逆乾嘔生薑湯方

生薑（四兩）　澤瀉（三兩）　桂心（二兩）　橘皮（三兩）

甘草（二兩）　茯苓（四兩）　人參（一兩）　大黄（四兩）

右八味切以水七升煮取三升服五合日三服忌海藻菘菜酢物生葱（張文仲同第四卷中）

崔氏療噦嘔人參湯方

人參（二兩）　胡麻人（八合炒令香）　橘皮（二兩）　枇杷葉（半斤拭毛蜜炙）

右四味切以水一斗煮枇杷葉取五升汁內人參等三種煎取三升稍稍飲之（范汪張文仲千金同出第三卷中）

嘔噦方四首

病源嘔噦之病者由脾胃有邪穀氣不消所為也胃受邪氣逆則嘔脾受邪脾脹氣逆遇冷折之氣逆不通則噦也（出第二十一卷）

廣濟療嘔噦不止橘皮湯方

橘皮（二兩）　生薑（八兩）　甘草（炙二兩）　枇杷葉（四兩拭毛蜜炙）

右四味切以水五升煮取二升五合絞去滓分溫三服每服相去如人行六七里忌海藻菘菜（出第一卷中）

肘後療嘔噦方

又方

生藕莖絞斷之當汁出器承取飲一升生葛絞汁尤佳

枇杷葉一斤拭毛蜜炙水一斗煮取二升分再服（急）（同出第一卷中）

必效療嘔噦方

取蘆根五兩切以水五升煮取三升頓服兼以童子小便一兩合不過三服即差（出第三卷中）

噦方七首

病源脾胃俱虚受於風邪故令新穀入胃不能傳化故穀之氣與新穀相干胃氣則逆胃逆則脾脹脾脹則氣逆因遇冷折之則噦也右手關上脈沉而虛者病善噦也（出第十二卷中）

肘後療卒噦不止方

痛抓眉中夾間氣也

又方

以物刺鼻中若以少許皂莢內鼻中令嚏則差

又方

但聞氣抑引之

又方

好豉二升煮取汁服之（千金同）

又方

粢米粉二升井華水服之（並出第二卷中）

集驗療卒噦方

枳實三枚炙去核㕮咀之以三家乳一升以羊脂五兩煎枳實令沸復內乳令沸去滓含咽之范汪同出第六卷中

張文仲陶氏噦方

飲新汲井水數升佳肘後備急千金同出第六卷中

嘔逆吐方八首

病源嘔吐者皆由脾胃虛弱受於風邪所爲也若風邪在胃則嘔膈間有停飲胃內有久寒則嘔而吐其狀長大息心裏澹澹然或煩滿而大便難或溏泄並其候養生方云八月勿食薑一云被霜瓜向冬發寒熱及溫病食欲吐或

心中停飲不消或爲反胃其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云正坐兩手向後捉腕反向拓席盡勢使腹弦弦上下七左右換手亦然除腹肚冷風宿氣或胃口冷食飲進退吐逆不下又云偃卧展兩脛兩手左右蹻兩足踵以鼻內氣自極七息除腹中病食苦嘔又云坐直舒兩足以兩手挽兩足自極十二通愈腸胃不能受食吐逆以兩手直叉兩腳底兩腳痛舒以頭抵膝上自極十二通愈腸胃不能受食吐逆出第二十一卷中

仲景傷寒論嘔吐病在膈上後必思水者急與之思水與豬苓散方

豬苓去皮　茯苓　白朮

右三味各等分擣篩飲汁和服方寸匕日三服欲飲水者極與之本虛與水則噦攻其熱亦噦忌桃李雀肉醋物千金同出第十六卷中

必效小麥湯主嘔吐不止方

小麥一升　人參四兩　青竹茹二兩半　茯苓三兩

厚朴四兩炙　甘草一兩炙　生薑汁三合

右七味以水八升煮取二升分三服忌海藻菘菜酢物千金同

又凡服湯嘔逆不入腹者方

先單煮炙甘草三小兩以水三升煮取二升服之得吐但更服不吐益好消息定然後服餘湯則流利更不吐也忌海藻菘菜千金同並出第二卷中

延年人參飲主吐方

人參一兩　橘皮三兩　生薑一兩

右三味切以水四升煮取一升五合分溫三服出第六卷中

又麥門冬飲主風邪熱氣衝心心悶短氣吐不下食方

麥門冬二兩去心　人參一兩　橘皮一兩

生薑二兩　羚羊角一兩屑

右五味切以水五升煮取一升五合去滓分溫三服

又甘草飲主脾腎冷氣乘心痛悶吐利四肢逆冷或煩
方

甘草二兩炙 人參二兩 乾薑四兩
厚朴二兩炙 白朮二兩

右五味切以水五升煮取一升五合去滓分溫二服
如人行八九里忌海藻菘菜桃李雀肉等 出第六卷中

新附近効療嘔逆方

白油麻一大合以清酒半升煎取三合看冷熱得所
去油麻以酒頓服之立驗無忌

又方

麻人三合熬擣以水研取汁著少鹽喫立効 李諫議
用有効

嘔逆不下食方八首

廣濟療嘔逆不能多食方

訶梨勒三兩去核煨

右一味擣為散蜜和丸空腹服二十丸日二服以知為
度利多減服無所忌

又療嘔逆不下食腹中氣逆豆蔻子湯方

豆蔻子七枚碎 生薑五兩 人參一兩 甘草一兩炙

右四味切以水四升煮取一升五合去滓分溫二服相

去如人行五六里忌海藻菘菜

又療兩脅下妨悶嘔逆不下食柴胡湯方

柴胡八分 茯苓八分 橘皮六分 人參六分
厚朴八分炙 桔梗六分 [illegible]八分 生薑十八分
訶梨勒七枚去核煨 甘草五分炙

右十味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服
服別相去如人行六七里進一服不吐利忌海藻菘菜
醋物豬肉等

又療患身體煩疼頭痛喫食嘔逆不得食柴胡湯方

柴胡十分 茯苓八分 枳實八分炙 白朮八分
生薑八分 麥門冬八分去心 甘草八分炙

右七味切以水六升煮取一升三合絞去滓分溫三服
每服相去如人行六七里忌海藻菘菜酢物桃李雀肉
熱麪炙肉油膩

又療嘔逆不下食食則煩悶地黃飲子方

生地黃汁六合 蘆根一握 生麥門冬一升去心 人參八分
白蜜三合 橘皮六分 生薑八分一方生薑汁一合

右七味切以水六升煮取二升去滓下地黃汁分溫三
服如人行四五里進一服不利忌蕪荑生冷熱炙肉蒜
麪豬肉黏食

又療煩熱嘔逆不下食食則吐出麥門冬湯方

生麥門冬三兩去心　青竹茹三兩　茅根五兩

甘草一兩炙　生薑五兩　人參一兩

右六味切以水七升煮取二升五合去滓分溫三服如人行六七里進一服不吐利忌海藻菘菜並出第一卷中

備急療吐逆水米不下乾薑甘草湯方

乾薑二分炮　甘草一分炙

右二味切以水二升煎取一合去滓頓服則定少間與粥則不嘔神驗忌海藻菘菜張文仲同出第三卷中

延年人參飲主嘔不能食方

人參八分　厚朴六分炙　橘皮六分

白朮八分　生薑八分

右五味切以水四大升煮取一升五合分溫三服忌桃李雀肉等[illegible]出第六卷中

許仁則療嘔吐方四首

許仁則療此病有兩種一者積熱在胃嘔逆不下食一者積冷在胃亦嘔逆不下食二事正反須細察之必其食飲寢處將息傷熱又素無冷病年壯力強膚肉充滿此則是積熱在胃致此嘔逆如將息食飲寢處不熱又素有冷病年衰力弱膚肉瘦悴此則積冷在胃生此嘔逆若是積冷嘔逆將久急須救之不爾甚成反胃病積熱在胃嘔逆不下食宜合生蘆根五味飲服方

生蘆根切一升　生麥門冬二升去心　青竹茹一升

生薑汁五合　茯苓五兩

右藥切以水八升煮取二升半去滓加竹瀝六大合攪調分三服相去如人行十里久始服一[illegible]

又依前生蘆根等五味飲服之雖可然未能全除者宜合茯苓等五味丸服之方

茯苓五兩　人參三兩　麥門冬一升去心

生薑屑六兩　青竹茹一升

右藥搗篩蜜和為丸煎蘆根飲下之初服十五丸日二服稍稍加至三十丸丸如梧子大忌酢物

人積冷在胃嘔逆不下食宜合半夏等二味丸服之方

半夏一升洗　小麥麪一升

右搗半夏為散以水溲麪丸如彈子大以水煮令麪熟則是藥成初服四五丸日二服稍稍加至十四五丸[illegible]服亦佳忌羊肉餳[illegible]

又依前半夏等二味丸雖覺漸損然病根不除欲多合前丸又慮病藥不可久服欲不服藥又恐病滋蔓宜合人參等七味丸服之方

人參五兩　白朮五兩　生薑屑八兩　厚朴炙四兩
細辛四兩　橘皮二兩　桂心二兩
右藥擣篩為末蜜和為丸如梧子飲下之初服十丸日
二服稍稍加至二十丸欲與前半夏丸間服亦得忌桃
李雀肉生葱生菜　吳升同並出第一卷中

雜療嘔吐噦方三首

仲景傷寒論夫嘔家有癰膿者不可療也其嘔膿盡自愈
若先嘔後渴者為欲解也先渴後嘔者為水停在心下此
屬飲家
嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也此屬支飲　仲景
小半夏茯苓　一八六卷　平　並分房
見本方此證當用小半夏加茯苓湯方在支飲門中
嘔脈弱小便復利身有微熱見厥者難療四逆湯主之方
甘草二兩炙　附子一枚　乾薑一兩半
右三物㕮咀以水三升煮取一升二合去滓溫分再服
強人用大附子一枚乾薑三兩忌海藻菘菜豬肉
又嘔心下痞堅者大半夏湯主之方
半夏二升洗　人參三兩切　白蜜一升
右三味以泉水一斗二升并蜜和揚之二百四十遍煮
藥取二升半溫服一升日再服忌羊肉餳　本論亦文
又乾嘔下利黃芩湯主之方

黃芩三兩　人參二兩　桂心二兩
大棗十二枚　半夏半升洗　乾薑三兩
右六味切以水七升煮取三升溫分三服忌羊肉餳生
葱　出第十六卷中

療噫醋方七首

病源噫醋者由上焦有停痰脾胃有宿冷故不能消穀
不消脹滿而氣逆所以好噫而吞酸氣　出第二十一卷中
廣濟療吐酸水每食則變作酢水吐出方
檳榔十六分　人參六分　茯苓八分
橘皮六分　蓽撥六分
右五味擣篩為散平晨空腹取生薑五大兩合皮擣絞
取汁溫內散方寸匕攪調頓服之日一服漸加至一七
半若利多減以微通泄為度忌酢物生冷油膩豬魚等
又療常吐酸水脾胃中冷茯苓湯方
茯苓十二分　橘皮十二分　白朮八分
人參六分　桂心六分　甘草八分炙
紫蘇十分　生薑十二分　檳榔七枚
右九味切以水九升煮取二升半絞去滓分溫三服服
別如人行七八里[illegible]二兩日再服一劑[illegible]八取利
忌生葱酢物桃李雀肉海藻菘菜

又療嘔吐酸水結氣築心白术散方

白术八分 茯苓八分 吳茱萸四分

橘皮六分 蓽撥四分 厚朴八分炙

檳榔十分 人參六分 大黃十分

右九味擣篩爲散空腹煮薑棗湯服方寸匕日二服漸加至二匕半覺熱服少飲食二兩口 忌酢物桃李雀肉等

又療心頭結氣連胷背痛及吐酸水日夜不止茯苓湯方

茯苓四兩 厚朴四兩炙 橘皮二兩

白术二兩 生薑十兩

右五味切以水九升煮取二升七合絞去滓分溫三服每服相去如人行七八里須利加檳榔末一兩半湯欲熟時內之甚安穩三日服一劑頻服五六劑可則停忌酢物桃李雀肉等一方有吳茱萸人參各一兩並出第一卷中

延年療食訖醋咽多噫吳茱萸湯方

吳茱萸五合 生薑三兩 人參二兩 大棗十二枚

右四味切以水六升煮取二升絞去滓分爲三服每服相去十里久 [illegible]文仲備急千金並同[illegible]

又增損承氣丸療胷滿背上時有一答熱則痛[illegible]多噫醋咽氣道兩脅痛並主之方

前胡七分 枳實七分炙 桂心五分 乾薑五分

吳茱萸五分 茯苓四分 芍藥六分 厚朴十分炙

橘皮十分 大黃七分 杏人七十枚去皮尖

右十一味擣篩爲末內杏人脂中研調蜜和丸每服食後少許酒飲任性初服七丸加梧子以氣宣下泄爲度忌生葱大醋並出第十七卷中

必效理中散主食後吐酸水食羹粥酪劑方

乾薑二兩 食茱萸二兩

右二味作散酒服方寸匕日三溫服勿冷服之常酢水差千金同出第二卷中

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張 寔 校勘

外臺秘要方卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方卷第七 心痛心腹痛及寒疝三十二門

心痛方八首
九種心痛方三首
諸蟲心痛方一十八首
冷氣心痛方五首
惡疰心痛方三首
心痛癥瘕方二首
心背徹痛方四首
卒心痛方一十四首
中惡心痛方五首
多唾停飲心痛方二首
心下懸急懊痛方四首
心痛不能飲食方二首
久心痛方六首
雜療心痛方三首
腹痛方四首
卒腹痛方七首
心腹痛及脹滿痛方一十首
心腹脹滿及鼓脹方一十四首
卒心腹脹滿方六首

腹脹雷鳴方三首
腹內諸氣及脹不下食方一十一首
灸諸脹滿及結氣法二十二首
胸脅痛及妨悶方四首
脅肋痛方二首
胸膈氣方三首
寒疝腹痛方九首
寒疝心痛方三首
卒疝方三首
七疝方三首
寒疝不能食方四首
寒疝積聚方四首
心疝方四首

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓
門任林 雲來父仝校

心痛方八首

病源心痛者由風冷邪氣乘於心也其痛發有死者有不死者有久成疹者心爲諸藏主而藏神其正經不可傷傷之而痛爲眞心痛朝發夕死夕發朝死心有支別之絡脈其爲風冷所乘不傷於正經者亦令心痛則乍間乍甚故成疹不死

又心爲火與諸陽會合而手少陰心之經也若諸陽氣虛少陰之經氣逆謂之陽虛陰厥亦令心痛其痛引喉是也

又諸藏虛受病氣乘於心者亦令心痛則心下急痛謂之脾心痛也足太陰爲脾之經與胃合足陽明爲胃之經氣虛逆乘心而痛其狀腹脹歸於心而痛甚謂之胃心痛也腎之經足少陰是也與膀胱合膀胱之經足太陽是也此二經俱虛而逆逆氣乘心而痛者其狀下重不自收持苦泄寒中爲腎心痛也

診其心脈急者爲心痛引背食不下

寸口脈沉緊苦心下有寒時痛

關上脈緊心下苦痛

左手寸口脈沉則爲陰陰絶者無心脈也苦心下毒痛 出第十六卷中

備急療心痛方

桂心末溫酒服方寸匕須臾六七服乾薑依上法服之亦佳忌生葱 文仲集驗肘後同出第一卷中

延年療心痛茱萸丸方

吳茱萸一兩 乾薑一兩 桂心一兩 白朮二兩
人參一兩 橘皮一兩 附子一兩炮 蜀椒一兩出汗
甘草一兩炙 黃芩一兩 當歸一兩

右十一味擣篩爲散蜜丸一服五丸如梧子大日三服稍加至十五丸忌猪肉生葱海藻菘菜桃李雀肉等藥盡更合酒飲無拘食前後任意 肘後有桔梗一兩出第十五卷中

救急療心痛方

取驢糞絞取汁五六合及熱頓服立差 肘後同

又方

東引桃枝一握切以酒一升煎取半升頓服大効 肘後同出第八卷中

必効療心痛方

當歸末酒服方寸匕頓服 備急文仲同

又方

生油半合溫服差（肘後備急張文仲同並出第五卷中）

古今錄驗療心痛黃連湯方

黃連（八兩）

右一物㕮咀以水七升煮取一升五合絞去滓適寒溫飲五合日三忌猪肉冷水（肘後范汪同出第八卷中）

九種心痛方三首

廣濟療九種心痛蛔蟲冷氣先從兩肋胷背撮痛欲變吐當歸鶴蝨散方

當歸（八分） 鶴蝨（八分） 橘皮（六分） 人參（六分）

檳榔（十二分） 枳實（六分炙） 芍藥（六分） 桂心（五分）

右八味擣篩為散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服漸漸加至一匕半不利忌生葱生冷物油膩粘食（出第四卷中）

千金療九種心痛一蟲心痛二注心痛三氣心痛四悸心痛五食心痛六飲心痛七冷心痛八熱心痛九去來心痛悉主之幷療冷衝上氣落馬墮車附子丸方

附子（一兩炮） 巴豆人（一兩去心皮熬） 人參（一兩）

生狼毒（一兩炙令極香） 食茱萸（一兩） 乾薑（一兩）

右六味擣末蜜和空腹服如梧子三丸一日一服弱者二丸卒中惡心痛口不能言連年積冷流注心胷者亦服之好好將息神効忌野猪肉蘆笋（必効經心錄同）

又療九種心痛方

取當太歲上新生槐枝一握去兩頭水三升煮一升頓服之（並出第十三卷中）

諸蟲心痛方一十八首

廣濟療諸蟲心痛無問冷熱蛔蟲心痛檳榔鶴蝨散方

當歸 桔梗 芍藥 橘皮

鶴蝨（各八分） 人參（六分） 桂心（六分） 檳榔（十分）

右八味擣篩為散空腹煮薑棗湯服方寸匕漸漸加至二七不利忌猪肉生葱油膩小豆粘食等

又療蛔蟲心痛積年久不差方

取苦酒五合燒青錢二文令赤安酒中則取雞子白一顆去却錢瀉著酒子頓服之差無所忌

又主心腹撓結痛不止彷彿有蛔蟲者當歸湯方

當歸 橘皮 細辛 甘草（炙）

生薑（各四分） 大黃（八分別漬） 鶴蝨（二分）

右七味切以水六升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服不利未差三日更作服之忌海藻菘菜生菜（救急同出第四卷中）

小品溫中當歸湯療暴冷心腹刺痛面目青肉冷汗出欲

霍亂吐下脉沉細者及傷寒毒冷下清水變作青白滯下及白滯後還復下清水者悉主之此方可以調諸冷痛也

當歸　人參　乾薑　茯苓

厚朴炙　青木香　桂心　桔梗

芍藥　甘草炙各二兩

右十味切以水八升煮取三升分溫三服日三服不耐青木香者以犀角一兩代之忌海藻菘菜豬肉醋物生葱等

又凡厥心痛與背相引喜瘈瘲如物從後觸其心身傴僂者腎心痛也

厥心痛腹脹滿不欲食食則不消心痛尤甚者胃心痛也

厥心痛痛如錐鍼刺其心心痛甚者脾心痛也

厥心痛色蒼如死灰狀不得太息者肝心痛也　千金同

厥心痛臥若徒居痛間動作痛益甚色不變肺心痛也

真心痛手足清至節心痛甚旦發夕死夕發旦死

心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止腹中熱喜涎出是蚘蟲咬也　出甲乙經第一卷中

千金療心腹中痛發作腫聚往來上下痛有休止多熱喜涎出是蚘蟲咬也並宜溫中當歸湯服兩三劑後若不效有異宜改方增損湯其溫中當歸湯在前一品方中此是

增損湯方

芍藥六兩　黃芩四兩　厚朴四兩　桔梗四兩

柴胡四兩　當歸三兩　升麻三兩

右七味切以水八升煮取二升半分三服忌豬肉　出第十二卷中

張文仲療蚘蟲心痛鶴蝨散方

鶴蝨二分末溫酢一盞和服之蟲當出　備急千金同

又乾漆丸方

乾漆熬擣蜜和丸服十五丸日再　備急同

又方

取槐上木耳燒灰末如棗大正發和水服若不止飲熱水一升蚘蟲立出必效方云酒下　備急同

又方

發時取鹽一匙內口中水下立定蟲即出　備急同出第一卷中

延年療蚘蟲惡吐水心痛鶴蝨丸方

鶴蝨三兩擣篩蜜和為丸用蜜漿水平旦服二十丸日只一服　古今錄驗用十兩云韋雲患心痛十年不差令服此便愈

又鶴蝨丸療蚘蟲心痛方

鶴蝨六兩　吳茱萸五兩　橘皮四兩　桂心三兩

檳榔四兩

右五味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服二十丸蜜湯下
日二服加至三十丸以蟲出爲度忌生葱 出第十五卷中
救急療心痛不可忍似蛔者胡粉丸方
生眞胡麻一合　胡粉半合熬擣
右二味先以猪肉脯一片空腹啖嚥汁勿嚥肉後取胡
粉和胡麻拔作丸以少清酒使成頓服盡十歲以上斟
酌增減忌生冷猪肉魚雞蒜酢滑等七日若是蛔吐水
者是也 出第八卷中
必効療蛔心痛方 士蒴氏曰蛸井中小虫盖痛一處若小虫咬也
取鱓魚淡炙令熟與患人喫一二枚永差飽食爲佳

又方
熊膽如大豆和水服大効
又茱萸丸方
呉茱萸一升　桂心二兩　當歸二兩
右三味擣篩蜜和丸如梧子酒服三十丸日再服漸加
至四十丸以知爲度忌生葱
又丁香散方
丁香七枚　頭髮灰一棗許
右二味並末和酒服之
又鶴蝨檳榔湯方

鶴蝨二兩用一兩小兒　檳榔二七枚
右二味以猪肉汁六升煮檳榔取三升去滓内鶴蝨末
先夜不食明旦空腹頓服之須臾病下及吐水永差神
効七日禁生冷酢 並出第五卷中
冷氣心痛方五首
廣濟主冷氣心痛肋下鳴轉喉中妨食不消常生食氣每
食心頭住不下桔梗散方
桔梗　當歸　芍藥　茯苓
橘皮　厚朴炙　白朮各八分　蓽撥四分
荳蔻子四分　檳榔六分　桂心六分　訶梨勒皮六分炙

右十二味擣篩爲散空腹煮薑棗飲服方寸匕日二服
加至一匕半不利忌生葱猪肉酢物桃李雀肉等 有方
寅不用桔梗出第四卷中
深師療胸滿短氣心痛吐涎虛冷防風茯苓湯方
防風二兩　茯苓二兩　桂心六兩　甘草二兩炙
半夏四兩洗　乾薑四兩炮　人參三兩
右七味切以水一斗煮取三升絞去滓分三服忌酢
物生葱海藻菘菜羊肉餳 出第十六卷中
崔氏療心痛與冷氣痛者特相宜烏頭丸方
烏頭三兩炮　附子三兩炮　赤石脂三兩　蜀椒二兩出汗

桂心二兩　乾薑二兩

右六物擣篩蜜和爲丸痛發時温清酒服三丸如梧子覺至痛處痛則止若不止加至五六丸以知爲度若早朝服無所覺至午時又服三丸此方丹陽有隱士出山云得華佗法其療略同若久心痛每旦服三丸稍加至十丸盡一劑遂終身不發忌生葱豬肉范汪文仲備急同出第四卷中

延年療冷氣久刺心痛不能食方

當歸　桂心　桔梗　吳茱萸

人參　白朮　高良薑已上各六分　橘皮三分

右八味擣篩爲散蜜和爲丸如梧子大一服十丸酒下

日二服加至十五二十丸爲度忌生葱桃李豬肉雀肉等

又療心痛冷痛腹滿如錐針刺及蟲齧心痛當歸湯方

當歸三兩　桔梗二兩　吳茱萸三兩　桂心三兩

芍藥二兩　大黃二兩

右六味切以水六升煮取三升三合去滓內鷄蜜一兩更煎一沸分三服空腹服之微利爲度忌豬肉生葱出第十五卷中

惡疰心痛方三首

廣濟療惡疰撮肋連心痛當歸湯方

當歸八分　青木香六分　檳榔十顆碎　麝香一分研

右四味切以小便一大升半煮取六大合絞去滓下麝香末分温三服服別如人行四五里進一服微微利忌生冷熱麪豬犬肉粘食蒜陳臭物出第四卷中

崔氏療疰在心腹痛不可忍方

取東引桃枝削去蒼皮取白皮一握以水二大升煮取半升一服令盡則差如不定更依前服之無忌

又療心腹痛不可忍似疰病者或暴得惡疰搊刺欲死桃人大黃湯方

吳茱萸二兩　桃人六十枚去皮尖　芍藥四兩　鬼臼二兩去皮

橘皮一兩　當歸二兩　生薑五兩　桂心二兩

柴胡一兩　朱砂二兩研湯成下　麝香一分研湯成下　朴消二兩研湯成下

大黃三兩別浸

右十三味切以水九升急火煮取三升温分三服如人行相去六七里服但得快利三四行必差忌生葱生血物並出第四卷中

心痛癥塊方二首

廣濟療心痛癥塊硬築心氣欲絕當歸湯方

當歸　桔梗　芍藥各八分　厚朴十分炙

橘皮八分　人參六分　高良薑十分　桃人五十枚去皮尖

生薑八分

右九味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服别相去如人行六七里進一服不利忌豬肉生冷滑膩雞魚粘食小豆大蒜出第四卷中

張文仲療心下堅痛大如椀邊如旋柈音盤名為氣分水飲所結方

枳實七枚炙　白朮三兩

右二味切以水一斗煮取三升分三服腹中軟即當散也忌桃李雀肉等此張仲景傷寒論方備急肘後同出第一卷中

心背徹痛方四首

仲景傷寒論心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之方

烏頭二分炮去皮　附子一分炮去皮　赤石脂二分　乾薑二分　蜀椒一分汗

右五味擣篩蜜和丸先食服如麻子大一服三丸少少加之忌豬肉冷水千金必效文仲范汪經心錄等同出第十五卷中千金分兩小別

文仲蜀椒丸療胷中氣滿心痛引背方

蜀椒一升汗　半夏一升洗　附子一兩炮

右三味擣篩蜜和為丸如梧子大一服五丸日三忌豬羊肉餳出第三卷中

范汪療心下切痛引背胷下蓄氣胃中有宿食茱萸煎方

吳茱萸一升　蜀椒五升　甘草二兩炙

乾地黃一斤

右四味以清酒三升漬三宿絞取汁銅器中煎令沸麥門冬五升去心乾漆一斤內煎中色黃絞去之內石斛五兩阿膠一斤白蜜六升凡九味以[illegible]取如棗大含稍稍咽之日三甚者日五六服[illegible]加[illegible]少氣加麥門冬服藥五日愈當下痰忌[illegible]蕪荑等本草[illegible]試有驗

又芫花湯主卒心痛連背背痛徹心心腹并懊痛如鬼所射絞急欲死者方

芫花十分　大黃十分

右二味擣下篩取四方寸匕著二升半苦酒中合煎得一升二合頓服盡須臾當吐吐便愈老小從少起此療強實人良若虛冷心痛恐未必可服並出第八卷中

肘後療卒心痛方一十四首

卒心痛方

先煮三沸湯一升以鹽一升合攪飲之若無火以作湯仍可用水鹽或半升服之古今錄驗同

又方

吳茱萸二升　生薑四兩切　豉一升　酒六升

右四味煮取二升半分三服

又方

白艾成熟者三升以水三升煮取一升去滓頓服之

若爲客氣所中者當吐蟲物出 范汪同

又方

取竈下熱灰篩去炭分以布囊盛令[illegible]更番以熨痛上冷者更熬令熱

又桂心散方

桂心　當歸各一兩　梔子人十四枚

右三味擣爲散酒服方寸匕日三五服亦主久心痛發作有時節者忌生葱

外臺秘要八卷十三　經餘居

又桂心丸方

桂心一兩　烏頭一兩炮

右二味擣篩蜜和爲丸如梧子服三丸稍增之忌生葱猪肉

又療暴得心痛如刺苦參湯方

苦參二兩　龍膽二兩　升麻二兩　梔子人三兩

右四味切苦酒五升煮取一升分二服當大吐乃差 出第一卷中

集驗卒心痛梔子心湯方

桂心八兩

右一味以水四升煮取一升半分二服忌生葱 肘後范汪千金同出第一卷中

張文仲療卒心痛方

取敗布裝鹽如彈子燒令赤末以酒一杯和服之 肘後備急同出第五卷中

又方

閉氣忍之數十過并以手大指按心下宛宛中取差 肘後備急同

又方

苦酒一升破雞子一枚著中合攪飲之好酒亦佳 肘後備急范汪同

外臺秘要八卷十四　經餘居

又方

蒸大豆若煮之以囊盛更番熨心上冷復易之 肘後同並出第十卷中

救急療卒心痛不能起止方

井華水一大升　蜜半合

右二味相和婦人患令男子叟與飲男子患令婦人叟與飲必愈出第八卷中

必效療卒心痛人參湯方

人參　桂心　梔子　黃芩

甘草各一兩炙

右五味切以水六升煮取二升分三服則愈甯効忌海藻菘菜生葱 肘後同出第五卷中

中惡心痛方五首

廣濟療卒中惡心腹絞刺痛氣急脹奄奄欲絶瓜蒂散方

雄黃四兩研　赤小豆四分熬　瓜蒂三分

右三味擣篩爲散空肚温漿水服一錢七半當吐止不吐加至兩錢七忌生冷油膩粘食陳臭等

又療卒中惡心腹刺痛去惡氣麝香散方

麝香一分研　生犀角二分屑　青木香二分

右三味擣篩爲散空肚以熱水服方寸匕立愈未止更服之不利忌五辛 並出第四卷中

集驗療卒暴心痛或中惡氣毒痛不可忍方

大黃四兩　芍藥四兩　升麻三兩　黃芩三兩

鬼箭三兩　鬼臼二兩　桂心二兩　桔梗三兩

柴胡四兩　朱砂二兩別研　朴消二兩

右十一味切以水九升煮取二升七合分三服先分朱砂作三分一服内一分攪朱砂調服之此湯快利若痛不止宜服後方忌豬肉生葱生血物 千金云集氣卒客忤五藏人腹中淵

餘心痛方千金同

又方

赤芍藥六兩　桔梗五兩　杏人五兩去尖皮

右三味切以水六升煮取二升半分三服日三忌豬肉 千金同出第一卷中

千金療卒中惡心痛方

苦參三兩切　好醋一升半

右二味以醋煮苦參取八合強人頓服老小二服 出第十三卷中

多唾停飲心痛方二首

病源心痛而多唾者停飲乘心之絡故也停飲者水液之所爲也心氣通於口心與小腸合俱象火小腸心之腑也其水氣下行於小腸爲溲便則心絡無有停飲也膀胱與腎俱象水膀胱爲腎之腑主藏津液腎之液上爲唾腎氣下通於陰若腑臟和平則水液下流宜利若冷熱相乘致腑臟不調津液水飲停積上迫於心令心氣不宣暢故痛而多唾也 出第十六卷中

范汪療胸中寒熱心痛清唾滿口數數欲吐食不化乾薑丸方

乾薑一分　桂心一分　礜石一分炙令汁盡　半夏一分

蜀椒一分

右五味擣篩蜜和丸如大豆許服二丸日三不知稍加以知為度忌生葱羊肉餳 出第十八卷中

集驗療心痛唾多似蟲者方

取六畜心隨得生切作四臠刀縱橫各一割破之內少真朱砂著中平旦吞之蟲死愈矣若無朱砂可用雄黃麝香也 肘後云切作十四臠刀縱橫各割之以真丹一兩粉內割中旦悉吞之入雄黃麝香佳肘後經心錄同出第一卷中通按[illegible]云食果安否

心下懸急懊痛方四首

病源心與小腸合為表裏俱象於火而火為陽氣也心為諸臟主故正經不受邪若為邪所傷而痛則死若支別絡為風邪所乘而痛則經久成疹其痛懸急懊者是邪迫於陽氣不得宣暢壅瘀生熱故心如懸而急煩懊痛也 出第十六卷中

仲景傷寒論心下懸痛諸逆大虛者桂心生薑枳實湯主之方

桂心三兩　生薑三兩　枳實五枚炙

右三味切以水六升煮取三升去滓溫分三服忌生葱 范汪同出十五卷中

肘後薑附丸方

附子二兩炮　乾薑一兩

右二味擣篩蜜和丸如梧子服四丸酒飲並得日三服忌豬肉冷水 本方云治心肺傷動冷痛 出第一卷中

古今錄驗療人心痛懊憹悁悶築築引兩乳又或如刺困極桂心湯方 通按悁音悄躁急也

桂心半兩　茱萸二兩　芍藥三兩　當歸二兩

生薑半斤無生薑以乾薑五兩代之

右五味切以水一斗二升煮取四升服一升晝三夜一良有驗忌生葱 出第八卷中

千金心下痞諸逆懸痛桂心三物湯主之方

桂心二兩　膠飴半斤　生薑二兩

右藥切以水四升煮二味取三升去滓內飴分三服忌生葱 出第十三卷中

心痛不能飲食方二首

病源心痛而不能飲食者積冷在內客於脾而乘心絡故也心陽氣也冷陰氣也冷乘於心陰陽相乘冷熱相擊故令痛也脾主消水穀冷氣客之則脾氣冷弱不勝於水穀也心為火脾為土是母子也俱為邪所乘故痛復不能飲食也 出第十六卷中

廣濟療久心刺肋冷氣結痛不能食高良薑湯方

高良薑十分 當歸十分 橘皮八分 厚朴十分炙
桔梗八分 桃人五十枚去尖皮 吳茱萸八分 生薑八分
訶梨勒五分
右九味切以水八升煮取二升八合絞去滓分溫三服
服別相去如人行六七里再服忌猪肉生冷油膩粘食
小豆等出第四卷中
肘後療常患心痛不能飲食頭中疼重烏頭丸方
烏頭六分炮 椒六分汗 乾薑四分 桂心四分
右四味擣末蜜丸酒服如大豆四丸稍稍增之忌生葱
出第一卷中

久心痛方六首
病源心爲諸藏主其正經不可傷傷之而痛者則朝發夕
死夕發朝死不暇展療其人心痛者是心之支別絡爲風
邪冷氣所乘痛也故成疹不死發作有時經久不差也出第
十六卷中
廣濟療心痛三十年不差月上旬殺蟲雷丸鶴蝨散方
雷丸八分 鶴蝨八分 貫衆八分 狼牙八分
桂心八分 當歸八分 檳榔八分
右七味擣篩爲散空腹煮蜜水半雞子許服方寸匕日
二服若重不過三服則差不利忌生葱生冷油膩猪魚

小豆大蒜等出第四卷中
范汪療久心痛烏頭赤石脂丸方
赤石脂 乾薑 桂心 椒汗
烏頭炮
右五味等分末之蜜和丸如梧子服三丸日三以知爲
度赤石脂當取斑斑赤中者忌猪肉冷水生葱出第十八卷中
必効療三十年心痛方
桃人七枚去皮尖
右一味研湯水合頓服酒服亦良肘後經心錄同出第五卷中
古今錄驗療久心痛腹痛積年定不過一時間還發發甚

則數日不能食又便出乾血窮天下方不差甄立言爲處
犀角丸服之數日即差方
犀角二分屑 麝香二分碎 朱砂四分光明者研 桔梗二分
莽草二分炙 鬼臼二分 附子二分炮 桂心二分
貝齒五枚 甘草六分 芫花二分熬 巴豆二十枚去心皮
赤足蜈蚣二枚去足炙
右十三味擣篩蜜和丸如梧子飲服一丸日漸加至三丸
以利爲度忌生葱猪肉野猪肉蘆筍生血物一方無附子千金有
雄黃二分出第八卷中
療心痛如蟲嚙痛宛轉欲死不救方

又濃擣地黃汁和麵作冷淘不用鹽服一頓蟲即出
不出再服必出便差正元十年通事舍人崔抗女患
心痛垂氣欲絕忽記此方服便吐出一物可方一寸
以來狀如蝦蟆無目足彼似有口蓋被此物所蝕抗
云往年見親表患心痛因偶食地黃餺飥遂吐一蟲
猶動其時亦不謂地黃冷淘能害此蟲別盛於小竹
筒以斂並地黃冷淘投於竹筒中須臾視之巳化為
水蔡殼此冷淘殺蟲心痛無不永絕抗自得此方救
三四人皆如神効出手抄方
經心錄療四十年心痛不差方
黍米淅汁溫服隨多少出第一卷中

雜療心痛方三首
廣濟療心痛又心撮肋心悶則吐血手足煩疼食飲不入
桃人丸方
桃人八分去皮尖 當歸六分 芍藥八分 訶梨勒六分
甘草六分炙 延胡索四分 人參六分 檳榔十四枚
右八味擣篩蜜丸如梧子以酒空腹下二十丸漸加至
二十丸日再服取快利忌海藻菘菜生菜熱麵炙猪
犬肉粘食出第四卷中
古今錄驗療心痛證手足青至節心痛甚者旦發夕死夕
發旦死療心痛痛及巳死方
高其枕柱其膝欲令腹皮蹙柔灸其臍上三寸胃管
有頃其人患痛短氣欲令人舉手者小舉手問痛差
緩者止出第八卷中
救急療心痛冷熱方
取伏龍肝末煮水服方寸匕若冷以酒和服差范汪經心
錄同出第八卷中
腹痛方四首
病源腹痛者由腑臟虛寒冷之氣客於腸胃募原之間結
聚不散正氣與邪氣交爭相擊故痛其有冷氣搏於陰經

者則腹痛而腸鳴謂之寒中是陽氣不足陰氣有餘者也
診其寸口脈沉而緊則腹痛尺脈緊臍下痛脈沉遲腹痛
脈來觸觸者少腹痛脈陰弦則腹痛凡腹急痛此裏之有
病其脈當沉若細而反浮大故當愈矣其人不即愈者必
當死以其病與脈相反故也其湯熨針石別有正方補養
宣導今附於後養生方導引法云股脛手臂痛法屈一脛
臂中所痛者正偃臥口鼻閉氣腹痛以意推之想氣往至
痛上俱熱即愈又云偃卧展兩脛兩手仰足指以鼻內氣
自極七息除腹中弦急切痛又云偃卧口內氣鼻出之除
裏急飽咽氣數十令溫中寒乾吐嘔腹痛口內氣七十所

大振腹咽氣數十兩手相摩令熱以摩腹令氣下 出第十六卷中

張文仲當歸大黃療冷氣牽引腰背脅下腹內痛方

當歸三兩 芍藥八分 桂心三分 乾薑六分

茱萸五分 人參一兩 大黃一兩 甘草二兩炙

右八味切以水六升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘菜生葱 出第三卷中

范汪四物當歸湯主寒腹痛方

當歸 桂心 乾薑各三兩 甘草二兩炙

右切以水八升煮取三升一服一升日三服虛冷激痛甚者加黃耆芍藥各二兩忌海藻菘菜生葱 千金無甘草有附子一兩 出第十五卷中

小品療寒冷腹痛茱萸湯方

吳茱萸一兩 甘草炙 人參 桂心各一兩

生薑五兩 半夏一升 小麥一升 當歸二兩

右八味切以水一斗五升煮取三升分溫服一升日三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱 千金桂二兩生薑切一升 出第一卷中

古今錄驗芎藭湯療卒寒腹中拘急痛方

芎藭 當歸 桂心 芍藥

甘草炙各一兩 黃芩半兩 乾薑半兩 杏人三十枚去皮尖

右八味切以水五升煮取二升分再服忌海藻菘菜生葱 出第八卷中

卒腹痛方七首

肘後療卒腹痛方

粳米一升

右一味以水六升煮取六七沸飲之

又方

掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之 並出第一卷中

張文仲療卒腹痛方

令病人卧高枕一尺許柱膝使腹皮踧氣入胷令人爪其臍上三寸便愈能乾咽吞氣數十過者彌佳亦療心痛 肘後備急同

又方

灸兩足指頭各十四壯使火俱下良 備急肘後同並出第一卷中

千金療胷腹中卒痛生薑湯方

生薑一斤搗取汁 食蜜八兩 醍醐四兩

右三味微火上熬令相得適寒溫服三合日三 出第十六卷中

錄驗療卒腹痛葛氏方

桂末三七酒服人參上好乾薑亦佳忌生葱 肘後文仲同

又方

食鹽一大把多飲水送取吐 肘後張文仲同並出第一卷中

心腹痛及脹滿痛方一十首

病源心腹痛者由腑臟虛弱風寒客於其間故也邪氣發作與正氣相擊上衝於心則心痛下攻於腹則腹痛上下相攻故心腹絞痛氣不得息診其脈左手寸口人迎以前脈手少陰經也沉者為陰陰虛者病苦心腹痛難以言心如寒狀心腹痛痛不得息脈細小者生大堅疾者死心腹痛脈沉細小者生浮大而疾者死其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云行大道常度日月星辰清靜以雞鳴安身臥漱口三咽之調五臟殺蠱蟲令人長生療心腹痛 出第十六卷中

廣濟療心腹中氣時時痛食冷物則不安穩及惡水桔梗散方

桔梗　茯苓各八分　枳實炙　人參

厚朴炙　芍藥　橘皮各六分　桂心五分

檳榔八分　麥門冬八分去心

右十味擣篩為散空肚煮薑棗飲服方寸七日三服加至一七半熱以茶飲下不利忌豬肉酢物生葱生冷油膩小豆粘食熱麪炙肉等物

又療卒心腹痛氣脹滿不下食欲得瀉三兩行佳當歸湯方

當歸　茯苓　桔梗　橘皮

高良薑　檳榔各八分　生薑八分

右七味細切以水七升煮取一升三合絞去滓分溫三服服別相去如人行六七里服訖利三兩行宜停後服忌豬肉酢物生冷油膩魚蒜粘食小豆 並出第十五卷

肘後療心腹俱脹痛煩滿短氣欲死或已絕方

梔子十四枚　豉七合

右二味以水二升先煮豉取一升二合去滓內梔子更煎取八合絞去滓服半升不愈者盡服之 備急文仲同

又方

烏梅二七枚水五升煮一沸內青大錢二七文煮取一升半強人可頓服羸人分再服當下愈 文仲同

又方

茱萸二兩　生薑四兩切　豉三合

右三味酒四升煮取二升分三服即差

又療心腹相連常脹痛狼毒丸方

狼毒二兩炙　附子半兩炮

右二味擣篩蜜和丸服如梧子一日服一丸二日二丸三日三丸自一至三以為常服即差忌豬肉冷水

又方

吳茱萸一合 乾薑四分 附子二分炮 細辛一分
人參二分
右五味搗末蜜和丸如梧子服五丸酒飲並得日三忌
猪肉生菜等 並出第一卷中
張師療久寒冷胸脇滿心腹絞痛不能食忽忽少氣不足
前胡湯方
前胡一兩 羊脂二兩 大棗二十枚 當歸一兩
茯苓一兩 白朮一兩 芍藥六分 桂心一兩
半夏二兩 乾薑一兩 麥門冬六分去心 吳茱萸二兩
右十二味切以水八升煮取三升分三服相去如人行

十里進一服忌酢物生葱羊肉餳桃李雀肉等 出第十六卷中
小品當歸湯療心腹絞痛諸虛冷氣滿方
當歸二兩 乾薑四兩 甘草二兩炙 芍藥二兩
厚朴二兩炙 黃耆二兩 蜀椒一兩汗 半夏三兩洗
肉桂二兩 人參三兩
右十味切以水一斗煮取三升二合強人可一升羸人
服八合大冷者加附子一枚炮忌海藻菘菜羊肉餳生
葱 古今錄驗千金同
古今錄驗通命丸療心腹積聚寒中絞痛又心胸滿脅下
脹痛方

大黃 遠志去心 黃芩 麻黃去節
甘草炙已上各四兩 芒消三兩 杏人六十枚去皮尖 豉二合
巴豆五十枚去心皮熬別搗如脂
右九味搗合下篩蜜和丸如梧子大先食飲服三丸日
三忌野猪肉蘆筍海藻菘菜 出第八卷中
心腹脹滿及鼓脹方一十四首
病源心腹脹者藏虛而邪氣客之乘於心脾故也足太陰
脾之經也脾虛則脹足少陰腎之經也其脉起於小指
之下循行上絡膀胱其直者從腎上入肺其支者從肺出
絡於心藏虛邪氣客於二經與正氣相搏積聚在內氣并

於脾脾虛則脹故令心腹煩滿氣急而脹也診其脉遲而
滑者脹滿也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後
養生方導引法云伸右脛屈左膝內壓之五息引肺去心
腹寒熱胸臆邪脹依經為之引肺中氣出去心腹中寒
熱留臆中邪氣脹滿久行之無有寒熱時節之所中傷名
為真人之方 出第十六卷中
廣濟療心腹脹滿臍下塊硬如石疼痛不止芍藥丸方
芍藥 當歸 白朮 鱉甲炙各八分
訶梨勒十顆去核 乾薑 人參各六分 豆蔻
雄雀屎各四分 郁李人十分去皮

右十味擣篩蜜和爲丸如梧子大空肚以飲下二十丸
漸加至三十丸日再服不吐不利忌生菜熱麪蒜莧桃
李雀肉蒜粘食等物
又療鼓脹氣急衝心硬痛鼈甲丸方
鼈甲炙 芍藥 枳實炙 人參
檳榔各八分 訶梨勒 大黃各六分 桂心四分
橘皮四分
右九味擣篩爲末蜜和爲丸空肚以酒服如梧子大二
十丸漸加至三十丸日二服微利爲度忌生葱莧菜炙
肉蒜麪等

又療鼓脹氣急通草湯方
通草 茯苓 玄參 桑白皮
白薇 澤瀉各三兩 人參一兩 郁李人五兩
澤漆葉切一升
右九味切以水一斗煮取三升去滓分溫四服服別相
去如人行六七里進一服不利忌熱麪油膩酢物等
又療鼓脹上下腫心腹堅強喘息氣急連陰腫坐不得仰
下赤黑血汁日夜不停茯苓湯方
茯苓二兩 防己一兩半 橘皮一兩 玄參一兩
黃芩一兩半 澤瀉一兩半 杏人二兩去尖皮 白朮一兩

大豆一升 郁李人二兩半 桑白皮二兩半 澤漆葉切一升
豬苓一兩半
右十三味切以水一斗先煮桑白皮大豆澤漆葉取五
升去滓澄去下淀內諸藥煎取二升絞去滓分三服效
者加五味子二兩停一日服一劑忌酢物桃李雀肉熱
麪蒜炙肉粘食油膩等 茯苓一云茯神防己一云防風
又療患久心痛腹滿并痰飲不下食人參丸方
人參 白朮 枳實各六分 茯苓八分
厚朴六分炙 青木香六分 橘皮五分 大黃六分
檳榔六分

右九味擣篩蜜和丸空腹煮生薑棗湯下如梧子二十
丸日二服漸加至三十丸不利忌酢物桃李雀肉等
又療心腹脹滿柴胡厚朴湯方
柴胡 厚朴各十分炙 茯苓 橘皮
紫蘇各八分 生薑十二分 檳榔五分末
右七味切以水七升煮取二升五合絞去滓分溫三服
服別相去如人行六七里進一服微利忌酢物生冷油
膩粘食
又療心腹脹滿腹中有宿水連兩肋滿悶氣急衝心坐不
得郁李人丸方

郁李人八分 牽牛子六分熬 甘遂四分熬 防葵三分
菴蔄子 桑白皮 檳榔各四分 橘皮
澤瀉各二分 茯苓 澤漆葉炙 杏人去皮尖各三分
右十二味擣篩蜜和丸空肚飲服如梧子五丸日二服
服到十九微利爲度忌酢物生冷油膩熱麪炙肉蒜等
又療虛氣發心腹脹滿兩肋氣急紫蘇湯方
紫蘇一握 訶梨勒皮 當歸 生薑各八分
人參六分 檳榔十顆 生地黃汁半升
右七味切以水六升煮六味取二升絞去滓下地黃汁
分溫三服服別如人行四五里溫進一服利三兩行忌
蕪荑生菜熱麪炙肉魚蒜粘食陳臭等並出第二卷中

深師療腹脹滿彭彭逆害飲食熱不得臥虛汗厚朴湯方
厚朴炙 桂心 芍藥 半夏洗各三兩
枳實三枚炙 甘草二兩炙 麥門冬四兩去心 黃芩一兩
乾薑二兩
右九味切以水一斗煮取二升半絞去滓服八合日三
小便難加木三兩人參四兩忌生葱海藻菘菜羊肉餳
出第十六卷中
千金厚朴七味湯主腹滿氣脹方
厚朴半斤炙 甘草炙 大黃各三兩 大棗十枚

枳實五枚 桂心二兩 乾薑五兩
右切以水一斗煮取五升去滓內大黃取四升服八合
日三嘔者加半夏五合利者去大黃寒加生薑至半斤
忌海藻菘菜生葱羊肉餳張仲景傷寒論方並第十六卷中
集驗療留滿有氣心腹脹中冷半夏湯方
半夏一升 桂心四兩 生薑八兩切
右三味切以水七斗煮取二升絞去滓適寒溫飲七合
忌羊肉餳生葱等出第六卷中
古今錄驗消化丸療人腹脹心滿腸胃結食不消化嘔逆
頭痛手足煩疼此方出太醫院藥常用芫花丸方

芫花一兩熬 大黃 葶藶子熬 甘遂
黃芩各二兩 巴豆四十枚去心皮熬研 消石一兩
右七味擣合蜜和丸如梧子先食服三丸日再服一方
無消石忌野豬肉蘆筍等出第十卷中
必効青木香丸主氣滿腹脹不調不消食兼冷方
青木香六分 檳榔六分 大黃十二分 芍藥五分
訶梨勒五分 枳實五分炙 桂心四分
右七味擣篩蜜和丸如梧子飲服十五丸漸漸當加以
利爲度不限丸多少不利者乃至五十六十丸亦得忌
生葱蔣同識頻服大効古今常用

又療腹脹滿堅如石積年不損者方

取白楊東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃酒五升淋訖則以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三（並出第二卷中）

范汪療心腹脹滿方六首

肘後療卒心腹煩滿方

剉薏苡根濃煮取汁服三升

又方

黃芩一兩　杏人二十枚去尖皮　牡蠣一兩熬

右三味切以水三升煮取一升頓服之

又方

灸兩手大拇指內邊爪後第一文頭各一壯又灸兩手中央長指爪下一壯愈（肘後云方本治心下逆）此本在雜療中其病亦是痰飲霍亂之例兼宜依霍亂條中法療之人平居有患者亦少皆因他病兼為之耳或從傷寒未復或從霍亂吐下後虛躁或是勞損服諸補藥痞滿或觸寒熱邪氣或食飲協毒或服藥失度並宜各依其本源為療不得專用此法也（並出第一卷中）

備急療卒心腹煩滿又胸脅痛欲死方

熱煮湯令灼灼爾以漬手足冷則易之（肘後張文仲同）

又桂心散方

枳實炙　桂心

右二味等分下篩以米汁服一匕忌生葱（肘後張文仲同並出第一卷中）

救急療卒患心腹脹滿刺痛方

生薑大有功能速行宜將自隨煮汁服良患久痛虛損痞逆不下食見食則吐取一兩細切搗以取汁微緩煎少多蜜頓一服則下食大効（出第七卷中）

腹脹雷鳴方三首

范汪療腹中寒氣脹雷鳴切痛胸脅逆滿附子粳米湯方

附子一枚炮　半夏半升洗　甘草一兩炙　大棗十枚

粳米半升

右五味切以水八升煮米取熟去米內藥煮取三升絞去滓適寒溫飲一升日三忌海藻菘菜豬羊肉餳（仲景傷寒論同集驗小品並同出第十五卷中）

延年療患腹內氣脹雷鳴胸背痛方

丹參三兩　枳實炙各三兩　桔梗　白朮

芍藥各二兩　生薑四兩　檳榔七枚

右七味細切以水九升煮取二升七合去滓分溫三服忌豬肉桃李雀肉生冷油膩魚蒜等（出第十五卷中）

又丹參湯療腸鳴發則覺作聲方
丹參　茯苓各三兩　桔梗二兩　生薑四兩
細辛　厚朴炙　食茱萸各二兩
右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服每
服如人行七八里忌生菜豬肉酢物出第十卷中
腹內諸氣及脹不下食方一十一首
廣濟療腹內諸氣脹滿昆布散方
昆布　海藻　人參　玄參
橘皮　升麻各三兩　芎藭　桂心
乾薑各二兩　小麥一升半醋一升半漬之一宿出暴乾止

右十味擣篩為散別擣小麥作散合藥散一處更擣千
杵酒服方寸匕日三服漸加至二匕不利忌熱麪炙肉
生葱蒜粘食等物
又療冷氣薏苡人飯粥方
細發薏苡人炊為飯氣味欲勻如麥飯煮粥亦好
煮粥並任意無所忌
又療氣蘇子粥方
蘇子不限多少研如麻子作粥依食法著葱豉益佳
得無所忌
又療氣膀胱急妨宜下氣方

蕪荑擣和食鹽末令調以綿裹如棗大內下部久將
或下惡汁并下氣佳無所忌宜數數易之新者尤良之不得溫面炙肉也
又療氣昆布臛法
高麗昆布一斤白米泔汁浸一宿洗去鹹味以水一
斗煮令向熟擘長三寸闊四五分仍取葱白一握二
寸切斷擘之更合煮令昆布極爛仍下鹽酢豉糝
調和一依臛法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調
和宜食粳米飯粳米粥海藻亦依此法極下氣大効
無所忌
又療心頭冷硬結痛下氣檳榔湯方

檳榔十顆　生薑　青木香各三兩　橘皮
枳實炙　甘草炙　大黃各二兩
右七味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服服
別如人行四五里進一服取微利忌生菜熱麪炙肉海
藻菘菜等
又療一切氣妨悶不能食檳榔丸方
檳榔七個　芍藥五分　枳實七枚炙　人參五分
大黃十六分　青木香六分　桂心四分
右七味擣篩蜜和丸空腹服如梧子二十丸日再服漸
加至三十五丸微溏為度忌生菜熱麪炙肉蒜粘食生

葱等物

又療氣小芥子酒方

小芥子一升擣碎以絹袋盛好酒二升浸之七日空腹溫服三合日二服漸漸加之以知為度酒盡旋旋添之無所忌

又療久患氣脹烏牛尿方

取烏牛尿空心溫服一小升日一服氣散則止無所忌（並出第二卷中）

近効燒鹽通一切氣尤療風方

取鹽花以生麻油和之以燕布一片急裹以綫子繫

如打牆鎚許大置瓦子上以炭火四面燒望之如火氣訖更勿加炭待火盡冷訖吹扇去灰收取鹽擣破如患心腹脹滿氣膈不通取碁子大含嚥之立差如煮訶梨勒檳榔及茶湯用此鹽療一切病（韋特進用之極効驗）

又訶梨勒丸療氣脹不下食尤除惡氣方

訶梨勒　青木香

右二味等分擣篩融冰糖和眾手一時捻為丸隨意服之氣甚者每服八十丸日再稍輕者每服四五十丸則得性熱者以生牛乳下性冷者以酒下不問食之前後（禮部蕭郎中處得云自服大効）

灸諸脹滿及結氣法二十二首

千金療脹脅腹滿法

灸膈俞百壯三報穴在第七椎下兩傍各一寸半（翼同）

又療脹滿水腫法

灸脾俞隨年壯穴在第十一椎下兩傍各一寸半（翼同）

又療脹滿雷鳴法

灸大腸俞百壯三報穴在第十六椎下兩傍各一寸半（翼同）

又療脹滿氣聚寒冷法

灸胃管穴在心鳩尾下三寸灸百壯三報之（翼同）

又療脹滿繞臍結痛堅不能食法

灸中管百壯穴在臍上一寸一名水分（翼同）

又療脹滿瘕聚帶下疼痛法

灸氣海百壯穴在臍下一寸半忌不可針（翼同）

又療脹滿結氣如水腫狀小腹堅如石法

灸膀胱募百壯穴在中極臍下四寸（翼同）

又療脹滿腎冷瘕瘕泄痢法

灸天樞百壯（通按銅人經天樞二穴俠臍二寸）（翼同）

又療冷脹胸滿心腹積聚疼痛法

灸肝俞百壯穴在第九椎下兩傍各一寸半（翼同）

又療五藏六腑積聚脹滿羸瘦不能飲食法

灸三焦俞隨年壯穴在第十三椎下兩傍各一寸半翼同並出第十六卷中

又療結氣法

扁鵲曰第四椎下兩傍各一寸半名關俞主胸中膈氣灸隨年壯通按銅人當作第四椎兩旁一寸半乃膈俞也

又三心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食不消腸鳴泄痢法

灸太倉穴一名胃募在心下四寸胃管下一寸灸百壯

又主結氣囊裹針藥所不及法

灸肓募二穴在從乳頭邪度至臍中屈去半從乳下行度頭是灸隨年壯通按銅人腧穴依法量度乃得日月膽募之穴然主療別肝募期門穴在此穴上五分然主療與此雖同

又凡臍下絞痛流入陰中發作無時此冷氣療之法

灸臍下三寸名關元百壯

又療短氣不語法

灸肘後兩筋間名天井百壯

又方

灸大椎隨年壯

又方

灸肺俞穴在第三椎兩傍各一寸半百壯

又方

灸肝俞第九椎百壯

又方

灸尺澤百壯

又方

灸手十指頭各十壯

又方

灸小指第四指間交脈上七壯

又少年房室多短氣者法

灸鳩尾頭五十壯並出第十七卷中

胸脅痛及妨悶方四首

病源胸脅痛者由膽與肝及腎之支脈虛為寒氣所乘故也足少陽膽之經也其支脈從目銳眥貫目下行至胸循胸裏足厥陰肝之經也其支脈起足大指聚毛上循入腹貫膈布胸脅足少陰腎之經也其支脈起肺出絡心注胸中此三經之支脈並循行胸脅邪氣乘於胸脅故傷其經脈邪氣之與正氣交擊故令胸脅相引而急痛也診其寸口脈弦而滑弦則為痛滑則為實痛則為急實則為躍弦

濕相搏則胸脅拾息痛也
又卒苦煩滿又胸脅痛欲死候此由手少陽之絡脈虛爲風邪所乘故也手少陽之脈起小指次指之端上循入缺盆布膻中散絡心包風邪在其經邪氣迫於心絡心氣不得宣暢故煩滿乍上攻於胸或下引於脅故煩滿而又胸脅痛也若經久邪氣留連搏於臟則成積搏於腑則成聚也 出第十六卷中

廣濟療氣結築心胸脅悶痛不能喫食訶梨勒散方
訶梨勒四顆炮去核　人參二分
右二味擣篩爲散以牛乳二升煮三四沸頓服之分爲二服亦得如人行三二里進一服無所忌

又療胸脅不利腹中脹氣急妨悶半夏湯方
半夏一升洗　生薑一斤　桂心六兩　檳榔二兩末
右四味細切以水八升煮取二升四合絞去滓分溫五服服別相去如人行六七里進一服快利爲度忌羊肉餳生葱油膩小品有吳茱萸三十顆無檳榔餘並同

又療胸脅妨悶胃中客氣大便苦難大黃丸方
大黃六分　厚朴四分炙　枳實四分炙　芒消八分
杏人六分去皮尖　葶藶子四分熬
右六味擣篩蜜和丸空腹以飲服如梧子十丸日二服稍稍加以大便微調爲度忌生冷油膩粘食出第二卷中

千金療冷氣脅下往來胸膈痛引脅背悶當歸湯方
當歸　芍藥　吳茱萸　桂心
人參　大黃　甘草各二兩　茯苓
枳實各一兩　乾薑三兩
右十味細切以水八升煮取二升半一服八合日三服治尸注亦佳忌海藻菘菜生葱酢物等出第十六卷中

胸脅痛方二首

小品療脅下偏痛發熱其脈緊弦此寒也當以溫藥下之大黃附子湯方
大黃三兩　附子二枚炮　細辛二兩
右三味切以水五升煮取二升分三服若強盛人煮取二升半分爲三服服別如人行四五里進一服忌豬肉冷水生菜等 仲景同

又半夏茯苓湯療胸膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水鳴多唾口清水自出脅肋急脹痛不欲食此皆胃氣弱受冷故也其脈喜沉弦細遲悉主之方
半夏五兩洗　生薑五兩　茯苓三兩　旋復花一兩
陳橘皮　人參　桔梗　芍藥
甘草炙各二兩　桂心一兩

右十味切以水九升煮取三升分三服欲得利者加大黃須微調者用乾地黃病有先時常水下者加白朮三兩腹旋復花若大便不調宜加大黃及乾地黃皆用三兩忌羊肉餳酢物生葱猪肉蕪荑桃李雀肉等備急同出第一卷中

胸脇氣方三首

廣濟療胸脇氣脹滿喫食心下妨虛熱脚手煩疼漸羸瘦不能食四肢無力枳實丸方

枳實六分　犀角四分　前胡四分　青木香八分

麥門冬去心八分　赤茯苓八分　苦參六分　芍藥六分

右八味擣篩為末蜜和丸如梧子以飲空腹下二十丸漸加至三十丸日二服不利忌生菜熱麪油膩炙肉酢蒜

又療胸脇滿塞心背撮痛走注氣悶宜服此柴胡湯方

柴胡六分　當歸六分　青木香六分　犀角屑六分

檳榔十箇　甘草二分炙

右六味切以水七升煮取二升半絞去滓內麝香末分溫三服如人行四五里微利為度忌海藻菘菜生菜麪蕎麥猪魚蒜

又療胸脇悶伏氣不下食臍下滿柴胡湯方

柴胡三兩　枳實三兩　生薑三兩　白朮三兩

甘草一兩炙　檳榔七箇

右六味切以水六升煮取二升絞去滓分溫二服服別如人行六七里進一服小弱人微利禁生冷蒜腥海藻菘菜桃李雀肉等並出第一卷中

寒疝腹痛方一十二首

病源寒疝者此由陰氣積於內寒氣結搏而不散腑藏虛弱風冷邪氣相擊則腹痛裏急故云寒疝腹痛也出第二十卷中

廣濟療丈夫虛勞寒疝腹痛并主產後方

生乾地黃二兩　甘草二兩炙　茯苓二兩　人參二兩

當歸二兩　大棗十四枚　白羊肉去脂二斤

右七味切以水三斗先煮羊肉取一斗去羊肉內諸藥煮取五升內葱白一把煮取四升絞去滓分溫五服服別相去如人行十二三里微溏消進少食食消服藥忌蕪荑海藻菘菜酢物餘無忌出第四卷中

仲景傷寒論寒疝遶臍苦痛若發則白汗出手足厥寒若脉沉弦者二物大烏頭煎主之方

大烏頭十五枚　白蜜二斤

右藥以水三升煮烏頭取二升去烏頭內蜜煎令水氣盡得二升強人服七合弱人五合一服不差明日更服

日止一服不可再也忌猪肉冷水（千金同）
又寒疝腹滿逆冷手足不仁若一身盡痛灸刺諸藥所不能治者抵當烏頭桂枝湯主之方
秋烏頭（實中大者十枚） 白蜜（二斤一方一斤） 桂心（四兩）
右三味先以蜜微火煎烏頭減半去烏頭別一處以水二升半煮桂取一升去滓以桂汁和前蜜合煎之得一升許初服二合不知更服至三合又不復知更加至五合其知如醉狀得吐者為中病也忌猪肉冷水生葱等（范汪方同）
桂心（三兩） 芍藥（三兩） 甘草（二兩炙） 生薑（三兩切）
大棗（十二枚）
右五味切以水七升煮取三升去滓取五合和前烏頭蜜令得一升餘並同前法服（仲景傷寒論千金同）
又療寒疝腹中痛引脅痛及腹裏急者當歸生薑羊肉湯主之方
當歸（三兩） 生薑（五兩） 肥羊肉（一斤去脂）
右三味切以水一斗合煮取三升去滓溫服七合日三痛即當止若寒多者加生薑足前成一斤若痛多而嘔者加橘皮二兩朮一兩合前物煮取三升加生薑者亦加水五升煮取三升二合服之依前（忌　經心錄范汪同）

又療寒疝腹中痛者柴胡桂枝湯方
柴胡（四兩） 大棗（六枚） 黃芩（一兩半） 人參（一兩半）
甘草（一兩炙） 半夏（二合半洗） 桂心 生薑（各一兩半）
芍藥（一兩半）
右九味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服又云人參湯作如桂枝法加半夏柴胡黃芩復如柴胡湯法今著人參作卜劑忌海藻菘菜羊肉餳生葱（並出第十五卷中）
小品寒疝氣腹中虛痛及諸脅痛裏急當歸生薑等四味主之方
當歸 生薑 芍藥（各三兩） 羊肉（三斤）
右藥切以水一斗二升煮肉爛熟出肉內諸藥煎取三升分溫服七合日三數有効（古今錄驗經心錄范汪同出第一卷中）
集驗療寒疝氣來往衝心腹痛桂心湯方
桂心（四兩） 生薑（三兩） 吳茱萸（二兩）
右三味切以酒一大升煎至三合去滓分溫三服如人行六七里一服忌生葱
又療寒疝下牽少腹痛附子丸方
附子（二兩炮） 桃人（三兩去皮尖） 蒺藜子（一升去角尖熬）
右三味擣篩末蜜和丸梧子大空腹酒下十丸漸加至十五丸及二十丸日再服忌生菜熱麪炙肉蒜猪魚

出第六卷中
又療積年腹內宿結疝冷氣及諸癖癥等香豉丸方
香美好豉熬乾微熬令香即止
小芥子去土石微熬令赤即止各一升
右二味擣篩蜜和丸梧子大空腹酒服二十丸漸加至
三十丸日二服初服半劑以來腹中微絞痛勿怪之是
此藥攻病之候
又療疝瘕冷氣方
採鼠李子日乾九蒸九暴酒浸服三合日兩服漸加
至三服能下血及碎肉積滯物

古今錄驗楚王瓜子丸療心腹寒疝冒脅支滿食飲不化
寒中腹痛及嘔痢風痙頭項強急不得俛仰方
桂心五分　茱萸二兩　白薇一分　乾薑四分
烏頭炮二分　蜀椒汗五分　芎藭四分　防葵二分
白蔹二分
右九味擣下篩合蜜和爲丸如梧子先食服一丸日三不
知稍稍增之以腹中溫身中𤸰𤸰爲度忌生葱豬肉冷
水　方中無瓜子未詳方名范汪等同出第八卷中
寒疝心痛方三首
病源夫疝者痛也陰氣積結所生也陰氣不散則寒氣盛
寒氣盛則痛上下無常處冷氣上衝於心故令心痛也出第
二十卷中
范汪大茱萸丸療心腹寒疝胸中有逆氣時上搶心痛煩
滿不得臥面目惡風悸掉惕惕時驚不欲飲食而嘔變發
寒熱方
吳茱萸半升　細辛　芍藥　柴胡一方用前胡
旋覆花　黃芩　紫菀　人參
白朮　茯苓　乾薑　桂心
附子炮　甘草炙　半夏洗　當歸各半兩
右十六味擣篩以蜜和爲丸如梧子先食服三丸日三
不知稍加忌生葱羊肉餳酢物桃李雀肉豬肉生菜海
藻菘菜除此更無所忌一方有蜀椒無桂心又一方有
茲瓜葉無黃芩深師同出第十
四卷中

小品解急蜀椒湯主寒疝氣心痛如刺繞臍腹中盡痛白
汗出欲絕方
蜀椒二百枚汗　附子一枚炮　粳米半升　乾薑半兩
半夏十二枚洗　大棗三十枚　甘草一兩炙
右七味切以水七升煮取三升澄清熱服一升不差更
服一升數用療心腹痛困急欲死解結逐寒上下痛良
忌豬羊肉餳海藻菘菜　肘後古今錄驗范汪方經心錄同出第一卷中

古今錄驗療心痛寒疝牡丹丸方
牡丹去心 桂心各二兩 烏頭二枚炮
右三味末之以蜜和為丸如大豆旦起未食服三丸日二不知稍增之藥少急寧少服并治遁尸飛尸烏頭附子亦可用炮之忌胡荽豬肉冷水生葱出第八卷

卒疝方三首

集驗療卒疝暴痛方
灸大敦男左女右三壯立已穴在灸經圖上出第六卷
文仲療卒得諸疝少腹及陰中相引絞痛白汗出欲死方
搗沙參下篩酒服方寸匕立愈肘後備急同

又張仲景飛尸走馬湯方
巴豆二枚去心皮熬 杏人一枚去尖皮
右二味取綿纏搥令極碎投熱湯二合捻取白汁服之須臾差未差更一服老小量之通療鬼擊有尸疹者常宜畜此藥用驗忌野豬肉蘆笋備急同出第十卷中

七疝方三首

病源七疝候七疝者厥疝癥疝寒疝氣疝盤疝胕疝狼疝此厥逆心痛足寒諸飲食吐不下名曰厥疝也腹中氣滿心下盡痛氣積如臂名曰癥疝也寒飲食則脅下腹中盡痛名曰寒疝也腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝也腹中痛在臍旁名曰盤疝也腹中臍下有積聚名曰胕疝也少腹與陰相引而痛大便難名曰狼疝也凡七疝皆由血氣虛弱飲食寒溫不調之所生也出第二十卷中

文仲小品七疝丸主暴心腹厥逆不得氣息痛達背膂名曰尸疝心下堅痛不可手迫名曰石疝臍下堅痛得寒冷食輒劇名曰寒疝脅下堅痛大如手痛時出見若不痛不見名曰盤疝臍下結痛女人月事不時名曰血疝少腹脹滿引膀胱急痛名曰脈疝悉主之方范汪經心錄等有并七疝已載
椒四分汗 桔梗 芍藥 乾薑
厚朴炙 細辛 附子各二分炮 烏頭一分炮

右八味末之蜜和丸服如大豆三丸加至七八丸日三服忌豬肉冷水生葱出第一卷中

古今錄驗七疝丸療疝諸寒臍旁痛上支胸中滿少氣太醫丞奕之方
蜀椒五分汗 乾薑 厚朴炙 黃芩
細辛 芍藥 桂心各四分 桔梗二分
烏喙一分炮 柴胡一分 茯苓一分 牡丹皮一分
右十二味搗篩蜜和丸梧子大先餔以酒服七丸日三不知漸加以知為度忌豬肉冷水生葱生菜酢[illegible]

范汪同第十卷中

集驗疝氣桃人湯方

桃人去皮尖 吳茱萸 橘皮 海藻各三兩

生薑 茯苓 羌活 蒺藜子去角各三兩

右八味切以水三大升煮取九合分爲二服空心服忌酢物

寒疝不能食方四首

深師療虛冷心腹寒疝胷脅支滿飲食不消腹中痛久癖頸強芎藭丸方

芎藭七分 烏頭四分炮 防葵三分 蜀椒九分汗

白薇二分 桂心十分 白芷五分 茱萸六分

乾薑八分

右九味擣篩蜜和丸如梧子飲服二丸日三稍加至五六丸以知爲度忌猪肉冷水生葱范汪同

又主虛冷癥癖疝食不消心腹痛氣弱不欲食虛慢羸瘦吳茱萸丸方

吳茱萸十分 紫菀三分 白薇三分 烏頭十分炮

桂心六分 前胡 芍藥 細辛

芎藭 黃芩各五分

右十味下篩蜜和酒服如梧子五丸日三稍加之忌猪肉冷水桃李生葱生菜等深師原本有此方元欠五味按已有前胡芍藥用白朮恐後古今錄驗治寒疝積聚是全方出第十六卷中

范汪療手足逆腹中寒疝不能食飲數心腹痛十一物七熬飲後丸方

茯苓五兩 乾薑六兩今倍十二兩 大黃一斤今減十兩

芎藭七兩 蜀椒一兩汗 芒消一升今減六兩

杏人一升去皮尖 葶藶子一升熬 加桂心五兩 消石一兩

右藥乾薑茯苓不熬餘皆熬擣篩以蜜和丸如梧子飲服七丸日三龍朔元年三月十七日詔書十一物七熬方忌猪肉冷水酢物生葱等出第十四卷中又按陟釐丸有黃芩茯苓當歸丸熬今云七者以桂心附子蓋加之

集驗療寒疝不能食方

取馬藺子一升每日取胡桃許以麵拌煮吞之然後依常飯日再服服盡必愈亦除腹內一切諸疾消食肥肌仍將燒塼熱以羖羊毛作氈裹却置上熨之日一度尤佳

寒疝積聚方四首

病源夫積聚者由寒氣在內所生也血氣虛弱風邪搏於府藏寒多則氣澀氣澀則生積聚也積者陰氣五藏所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六府所

故無根本上下無所留止但諸藏腑受邪初未能爲積聚
邪氣留滯不去乃成積聚其爲病也或左右脅下如覆杯
或臍上下如臂或胃管間覆大如盤羸瘦少氣或灑淅寒
熱四肢不收飲食不爲肌膚或累累如桃李或腹滿嘔泄
寒則痛故云寒疝積聚也其脈駃所史反而緊積聚浮而牢
積聚牢強急者生虛弱急者死出第十卷中
深師破積丸療寒疝久積聚周走動搖大者如鱉小者如
杯乍來乍去在於胃管大腸脹滿不通風寒則腸鳴心下
寒氣上搶胃脅支滿芫花丸方
芫花一分 蜀椒一分汗 大黃六分 細辛六分

桔梗五分 烏頭四分炮 茱萸 芍藥
茯苓各三分 龍膽二分 半夏一分洗
右十一味擣篩蜜和丸如梧子大飲服五丸日三當下
如泥病愈忌豬羊肉餳酢物生菜等
又當歸丸療心腹勞強寒疝邪氣往來堅固結聚苦寒煩
悁於緣切同不得臥夜苦汗出大便堅小便不利流飲在腹
中食不生肌方
桔梗二分 葶藶子五分熬 藜蘆二分炙 厚朴五分炙
杏人五十枚去尖皮 附子五分炮 桂心 人參各二分
沙參三分 特生礜石一兩燒半日

右十味擣篩蜜和如梧子飲服三丸日三稍加之忌豬
肉生葱冷水出第二十二卷中
古今錄驗療久寒三十歲心腹疝瘕積聚邪氣往來厥
逆搶心痛久痺羸瘦少氣婦人產乳餘疾胸脅支滿不嗜
食手足煩疼月水不通時時便血名曰破積聚烏頭續命
丸方
食茱萸十分 芍藥五分 細辛五分 前胡五分一云柴胡
乾薑十分 烏頭十分炮 紫菀 黃芩
白朮 白薇各二分 芎藭 人參
乾地黃各五分 蜀椒十分汗 桂心十分

右十五味擣篩蜜和爲丸如梧子大先食服三丸日三
不知稍加至七丸忌生菜生葱豬肉冷水桃李雀肉蕪
荑等范汪同出第十卷中
集驗療腎冷及疼痛氣滯後灌方
鹽花一大合 漿水半大升
右二味和煖灌下部少閒即下膿日一度再灌之即止

心痛方四首

病源心痛者由陰氣積於內寒氣不散上衝於心故使心
痛謂之心痛也其痛也或如錐刀所刺或四肢逆冷或脣
口變青皆其候也出第二十卷中

范汪療心痛後繞臍痛上支胷心下痛方

芎藭　桔梗　細辛　蜀椒汗

桂心　乾薑各三分　附子一分炮

右七味末之合蜜和爲丸如梧子服七丸以酒下日二服忌猪肉冷水生葱生菜等

又療二十年心痛神方

真射罔纖好者　新好茱萸一名殺子

右二味等分擣篩蜜和丸服如麻子二丸日一忌勞事乃熱食良已用得差劉圖炙所秘

又主心痛方

灸兩足大指甲實之際甲實各半炷隨年壯良深按實當作肉

又心痛發時心腹痛欲死方

灸足心及足大指甲後横理節上及大指歧間白黑肉際百壯則止足心者在足下偏近大指本節際不當足心中央也並出第十八卷中通按足心在足下近大指本節卽湧泉穴也

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方卷第七終

重訂唐王燾先生外臺秘要方卷第八 痰飲胃反噎鯁等二十門

痰飲論二首
痰飲食不消及嘔逆不下食方九首
懸飲方二首
溢飲方三首
支飲方九首
留飲方二首
酒澼飲方三首
留飲宿食方七首
痰澼方二首

飲癖方二首
癖飲方七首
冷痰方四首
痰結實及宿食方三首
胸中痰澼方三首
痰厥頭痛方八首
風痰方五首
療諸痰飲方四首
胃反方二十首
脾胃弱不能食方三首

脾胃病日漸瘦困不食方 三首
胃實熱方二首
胃虛寒方七首
五膈方八首
七氣方三首
氣噎方六首
諸噎方一十二首
卒食噎方九首
五噎方三方
諸骨哽方三十五首
雜誤吞物方一十七首

唐王燾先生外臺秘要方第八卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

痰飲論二首

病源痰飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停在胸府結而成痰又其人素盛今瘦水走腸間漉漉有聲謂之痰飲其爲病也胸脅脹滿水穀不消結在腹內兩肋水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胸背痛甚則上氣欬逆倚息短氣不得臥其形如腫是也脈偏弦爲飲浮而滑爲飲其湯熨針石別有正方補養宣導今附于後養生方導引法云左右側臥不息十二通療痰飲不消右有飲病右側臥左有飲病左側臥又有不消氣排之左右各十二息療痰飲 出第二十卷中

千金痰飲論問曰夫飲有四何謂師曰有痰飲 一云留飲 有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲之證何以爲異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲飲後水留在脅下欬唾引痛謂之懸飲飲水過多歸於四肢當汗出而不汗出身體疼重謂之溢飲其人欬逆倚息短氣不得臥其形如腫謂之支飲凡心下有水者築築而悸短氣而恐其八

眩而癲先寒即為虛先熱即為實故水在於心其人心下堅築築短氣惡水而不欲飲水在於肺其人吐涎沫欲飲水水在於脾其人少氣身體盡重水在於肝脅下支滿嚔而痛水在於腎心下悸夫病人卒飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脉雙弦者寒也皆大下後喜虛耳脉偏弦者飲也肺飲不弦但喜喘短氣支飲亦喘而不能眠加短氣其脉平也留飲形不發作無熱脉微煩滿不能飲食脉沉滑者留飲病病有留飲者脅下痛引缺盆欬嗽轉甚一云輙已其人欬而不得臥引項上痛欬者如小兒掣瘲狀夫胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷

節痛心下有留飲其人背寒冷大如手病人胸息上引此皆有溢飲在胸中久者缺盆滿馬刀腫有劇時此為氣飲所致也膈上之病滿喘欬吐發則寒熱背痛惡寒目泣出其人振振身瞤劇必有伏飲病人一臂不隨時復轉移在一臂其脉沉細此非風也必有飲在上焦其脉虛者為微勞榮衛氣不周故也出第十八卷中通按形不發作謂表無病状也

痰飲食不消及嘔逆不下食方九首

病源夫痰水結聚在於胸腑膀胱之間久而不散流行於脾胃脾胃惡濕得水則脹脹則不能消食也或令腹裏虛滿或水穀不消化或時嘔逆皆其候也出第二十卷中

廣濟療心頭痰積宿水嘔逆不下食前胡丸方

前胡　白朮　甘草炙各五分　旋復花

白茯苓各三分　人參　麥門冬去心各六分

枳實炙　大黃各四分

右九味擣篩蜜和為丸如梧子大空肚以酒下二十丸漸加至三十丸日再服不利忌桃李雀肉海藻菘菜熱麪炙肉魚蒜粘食生冷等物

又療心胸中痰積氣噎嘔逆食不下方

柴胡　橘皮各六分　茯苓十分　人參

麥門冬去心　雞蘇各八分　生薑二十分　檳榔人四分末湯成下

右八味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服如別相去如人行七八里進一服未差三日更服一劑以利為度忌酢物生冷油膩粘食並出第一卷中

千金療痰飲飲食不消乾嘔湯方

澤瀉　杏人去皮尖　枳實炙　白朮各三兩

茯苓　柴胡　生薑　芍藥各四兩

旋復花　人參　橘皮　細辛各二兩

半夏洗四兩

右十三味切以水九升煮取二升七合分為三服忌桃李雀肉大酢生菜羊肉餳等物

又療胸中痰飲腸中水鳴食不消嘔吐水湯方

大檳榔四十枚 生薑八兩 半夏半升洗

杏人三兩去尖皮 橘皮二兩 茯苓五兩 白朮四兩

右七味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌羊肉餳大酢桃李雀肉等 古今錄驗同並出第十八卷中

范汪蜀椒湯主胸中積聚痰飲飲食減少胃氣不足欬逆嘔吐方

半夏三兩洗 生薑一升汁七合 桂心 附子炮

甘草炙 茯苓 桔梗各一兩 蜀椒二合汗

橘皮二兩

右九味切以水七升煮取二升半去滓內薑汁煎取四升半分三服服三劑佳若欲服大散并諸五石丸必先服此方及進黃耆丸輩必佳忌海藻菘菜羊肉餳生葱豬肉冷水酢物 千金翼同

又白朮茯苓湯主胸中結痰飲澼結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

白朮五兩 茯苓三兩 橘皮 當歸

附子二兩炮 生薑 半夏各四兩切 桂心四兩

細辛四兩一作人參一兩

右九味切以水一斗煮取三升分三服服三劑良忌羊肉餳桃李雀肉豬肉冷水生葱生菜酢物等 千金翼同

又旋復花湯主胸膈痰結唾如膠不下食者方

烏頭五枚去皮熬 旋復花 細辛 前胡

甘草炙 茯苓各一兩 半夏一兩洗 生薑八兩

桂心四兩

右九味切以水九升煮取三升分為三服忌羊肉餳海藻菘菜生葱酢物豬肉冷水等 並出第十六卷中

延年茯苓飲主心胸中有停痰宿水自吐水出後心胸間虛氣滿不能食消痰氣令能食方

茯苓三兩 人參二兩 白朮三兩 生薑四兩

枳實二兩炙 橘皮一兩半切

右六味切以水六升煮取一升八合去滓分溫三服如人行八九里進之忌酢物桃李雀肉等 仲景傷寒論同出第十七卷中

古今錄驗療胸膈痰飲食噉經日則併吐出食者不消出如初空腹一兩日聚食還復吐之極不便此由痰飲聚下過不通服此丸宜通下氣方

吳茱萸 澤瀉 芍藥 白朮

漢防己 赤茯苓各二兩 蜀大黃二兩炙

右七味擣篩蜜和為丸如梧子大飲服二十五丸忌桃李雀肉酢物 出第十九卷中

懸飲方一首

病源懸飲謂飲水過多留在脅下令脅間懸痛欬唾引脅痛故云懸飲出第二十一卷中

范汪大甘遂丸療久澼留水澼飲方

芫花熬 甘遂 葶藶子熬 大黃

苦參 大戟 芒消 貝母

桂心各一兩 杏人三十枚 巴豆三十枚去心皮熬 烏喙三分炮

右十一味擣篩其巴豆杏人擣如膏合以蜜和丸如大豆許服二丸日三服不知稍加以意將息之大佳療大水飲病忌食蘆筍猪肉生葱等出第十六卷中

千金療懸飲十棗湯方

芫花 甘遂 大戟

右三味等分擣篩以水一升五合煮大棗十枚取八合絞去滓內藥末強人取一錢匕羸人半錢匕頓服之平日不下者益藥半錢下後以糜粥自養此本仲景傷寒論方出第十八卷中

溢飲方三首

病源溢飲謂因大渴而暴飲水水氣溢於腸胃之外在於皮膚之間故言溢飲令人身體疼重而多汗是其候也出第二十卷中

范汪溢飲者當發其汗大青龍湯主之方

麻黃六兩去節 桂心二兩 甘草二兩炙 生薑三兩

石膏一枚如雞子 杏人四十枚去尖皮 大棗十枚

右七味㕮咀以水九升先煮麻黃減二升乃內諸藥煮取三升絞去滓適寒溫服一升溫覆令汗汗出多者溫粉粉之一服汗出者勿復服汗出多亡陽遂虛惡風煩躁不得眠脈微弱汗出惡風不可服服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆也忌海藻菘菜生葱此本仲景傷寒論方出第十六卷中

千金溢飲者當發其汗宜青龍湯方

麻黃去節 芍藥 細辛 桂心

乾薑 甘草炙各三兩 五味子半升 半夏半升

右八味切以水一斗先煮麻黃減二升乃內餘藥煮三升去滓溫服一升忌海藻菘菜羊肉餳生菜生葱此本仲景傷寒論小青龍湯也出第十八卷中

千金數大五飲丸主五種飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲水澼在兩脅下三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈上五藏間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫五飲者由飲酒後傷寒飲冷水過多所致方

遠志去心 苦參 烏賊魚骨 藜蘆

白朮 甘遂 五味子 大黃

石膏　桔梗　半夏洗　紫菀
前胡　芒消　栝樓　桂心
蓯蓉　貝母　芫花　當歸
人參　茯苓　芍藥　大戟
葶藶　黃芩各一兩　常山　甘草炙
山藥　厚朴　細辛各三分　附子炮三分
巴豆二十枚去皮心
右三十三味擣篩蜜和為丸如梧子大酒服三丸日三稍加之忌狸肉桃李雀肉豬肉羊肉餳生葱酢物生菜野豬肉蘆笋等胡洽同出第十九卷中

支飲方九首

病源支飲謂水飲停於胸膈之間支乘於心故云支飲其病令人欬逆喘息身體如腫之狀謂之支飲出第二十卷中

深師療心下有支飲其人喜眩一作苦冒澤瀉湯方
白朮二兩　澤瀉五兩
右二味切以水二升煮取一升又以水一升煮取五合合此二汁分為再服忌桃李雀肉等此本仲景傷寒論方

千金療支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯方
葶藶子熬令紫色擣為丸如彈丸大　大棗十二枚
右二味先以水三升煮大棗得汁二升內葶藶煎取一升頓服三日一劑可服三四劑此本仲景傷寒論方

又嘔家不渴者為欲解本渴今反不渴心下有支飲故也小半夏湯主之加茯苓者是也先渴却嘔此為水停心下小半夏加茯苓湯主之卒嘔吐心下痞膈間有水目眩悸

小半夏加茯苓湯方
半夏一升　生薑半斤　茯苓四兩
右三味切以水七升煮取一升五合分再服忌羊肉餳大醋仲景傷寒論茯苓三兩餘並同

又假令瘦人臍下有悸者吐涎沫而癲眩水也五苓散主之方

豬苓去皮　白朮　茯苓各三分　桂心去皮二分
澤瀉五分
右五味下篩水服方寸匕日三多飲水汗出愈忌桃李雀肉生葱醋物等此本仲景傷寒論方

又心下有痰飲胸脅支滿目眩甘草湯主之方
甘草二兩炙　桂心　白朮各三兩　茯苓四兩
右四味細切以水六升煮取三升去滓服一升日三小便當利忌海藻菘菜生葱桃李醋物等此本仲景傷寒論方

又夫酒客欬者必致吐血此坐以極飲過多所致也[illegible]脈虛者必冒其人本有支飲在胸中也支飲[illegible]

湯主之方

厚朴炙一兩　大黃六兩　枳實四兩炙

右三味細切以水五升煮取二升去滓分溫再服之[illegible]

此本仲景傷寒論方

[illegible]氣汗出而欬者此為飲也乾棗湯主之亦[illegible]下後不

[illegible]乾棗湯主腫及支滿澼飲方

大黃　大戟各一兩　芫花熬　[illegible]一兩

甘草炙　甘遂　黃芩各一兩　乾棗十枚

右八味切以水五升煮取一升六合分四服空心服以

快下為度忌海藻菘菜

又療膈間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑其脈沉緊得之

數十日醫吐下之不愈木防己湯主之方

木防己三兩　石膏三枚雞子大　桂心二兩　人參四兩

右四味以水六升煮取二升去滓分再服虛者即愈實

者三日復發則復與不愈者宜去石膏加茯苓芒消湯

方

木防己二兩　桂心二兩　人參　茯苓各四兩

芒消二合

右五味以水六升煮取二升去滓內芒消分溫再

服取微下利則愈忌生葱此本仲景傷寒論方深師同並出第十八卷中

留飲方二首

病源留飲者由飲酒後飲水多水氣停留於胸膈之間而

不宣散乃令人脅下痛短氣而渴皆其候也出第二十卷中

范汪療痰飲腹中留飲方

海藻　木防己　甘遂　蓯蓉

蜀椒去汗　芫花熬　葶藶子熬各一兩

右七味擣篩蜜和為丸如梧子服十丸不差當增之出第

十六卷中

千金療病者脈伏其人欲自利利者反快雖利心下續堅

滿此為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之方

甘遂大者三枚　半夏十二枚　芍藥一兩　甘草一枚如指大炙

右四味以蜜半升內藥汁及蜜合一升煎取八合頓

服之忌海藻菘菜羊肉餳此本仲景傷寒論方出第十八卷中

酒澼飲方二首

病源酒澼者因大飲酒後渴而引飲無度酒與飲俱不

散停滯在脅肋下結聚成澼時時而痛因即呼為酒澼

其狀脅下弦急而痛出第二十七卷中

深師消飲丸療酒澼飲酒停痰水不消滿逆嘔吐目視䀮

䀮耳聾腹中水聲方

乾薑　茯苓各三兩　白朮八兩　枳實四枚炙

右四味擣篩蜜和丸服如梧子五丸日三稍加之若下
去桂加乾薑二兩名為五飲丸忌桃李雀肉大酢生
葱之類人神驗

又白朮乾薑五飲酒癖方

白朮一斤 桂心 乾薑各半斤

右三味擣篩蜜和丸如梧子飲服一丸稍加之取下先
食服之忌桃李雀肉生葱

又溫脾丸療久寒宿食酒癖方

乾薑炮二兩 芍藥三兩 蜀椒汗二兩 小草一兩熬

芎藭 茯苓 桃人去皮尖 柴胡各三兩

大黃八兩切熬令黃黑

右九味擣篩蜜和更擣萬杵服如大豆許十九日三忌
大酢 並出第二十三卷中

留飲宿食方七首

病源留飲宿食者由飲酒宿食後飲水多水氣停留於脾
胃之間脾得濕氣則不能消食令人噫氣酸臭腹脹滿亦
壯熱或吞酸所以謂之留飲宿食也 出第二十卷中

深師通草丸療積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足
方

椒目 附子炮 半夏洗 厚朴炙各一兩

芒消五兩 大黃九兩 葶藶二兩熬 杏人三兩去皮尖

右八味擣篩為末別擣葶藶杏人令如膏合諸末以蜜
和丸擣五千杵服如梧子二丸忌豬肉羊肉餳等大効
方中無通草未詳其名 出第二十二卷中

范汪千金丸療心腹留飲宿食方

沙參 丹參 苦參 桂心各二分

石膏五分研 人參一分 大黃一分 半夏五分洗

乾薑九分 戎鹽一分 巴豆六十枚去皮心 附子一分炮

右十二味皆擣合以白蜜和如小豆吞一丸日再令人
先食服一丸不知稍益以知為度忌豬肉冷水羊肉餳
蘆笋生葱

又療留飲宿食桑耳丸方

桑耳二兩 巴豆一兩去皮

右二味擣和以棗膏丸如麻子先食服一丸不下服二
丸病下即止忌野豬肉蘆笋

又療留飲宿食芫花丸方

芫花一兩熬 大黃 甘遂 黃連

麻黃去節 杏人去皮尖 甘草炙 附子炮各一兩

巴豆五十枚去皮心

右九味擣篩杏人巴豆別擣如脂合和以蜜丸如小豆

先食服一丸日再不知稍增以知為度忌海藻菘菜豬
肉冷水蘆笋等
又順流紫丸療百病留飲宿食心下伏痛四肢煩疼男子
五勞七傷婦人產有餘疾等方
當歸　代赭各一分　茯苓　烏賊魚骨
桂心各三分　肉蓯蓉二分　藜蘆十分熬　巴豆六十枚去心皮
右八味擣篩白蜜和丸先食服如小豆一丸日再不知
稍之欲下倍服之別擣巴豆令如膏忌生葱狸肉酢物
野豬肉蘆笋並出第十六卷中
千金療留飲宿食不消腹中積聚轉下當歸湯方

當歸　人參　桂心　甘草炙
芒消　芍藥各二兩　大黃四兩　生薑
黃芩　澤瀉各三兩
右十味切以水一斗煮取三升分三服空心食後服忌
生葱海藻菘菜出第十八卷中
崔氏療久飲積聚嘔逆兼風虛勞瘀痛方
用皮茯苓蒼耳子擣汁一石先以武火煎減半卻以文
火煎徐動勿停手候可丸止空腹酒下梧子大三十丸
煎服亦得出第五卷中
痰飲方二首

病源痰澼者由飲水未散在於胸府之間因遇寒熱之氣
相搏沉滯而成痰也痰之停聚流移於脅肋之間有時而
痛即謂之痰澼出第二十卷中
延年療右肋下停痰澼飲結在兩脅脹滿羸瘦不能食食
不消化喜唾乾嘔大便或澀或利或赤或黃腹中有時水
聲腹內熱口乾好飲水漿卒起頭眩欲倒脅下痛旋復花
丸方
旋復花五分　大黃七分炙　茯苓三分　澤瀉四分
人參　桂心　皂莢去皮子炙　附子炮去皮各二分
芍藥四兩　蜀椒三分去目汗　乾地黃四兩　防葵取水中浮者

乾薑　枳實炙　杏人去皮尖　葶藶子熬四分
右十六味擣篩為末內杏人葶藶脂中碎研調篩蜜
和為丸每食後少時白飲服三丸如梧子日二服稍增
以微利為度禁食豬肉魚麪蒜生葱酢今既在肋下有
澼氣水飲結聚不散數發則悶刺心痛又未曾服如此
破澼下藥雖服補藥澼氣不除終是不損恐久積聚更
急飲食減少此方正與澼氣相當更有三兩種毒藥今
削除訖其方內有附子及別本續命丸有烏頭此並
破澼疾不得不用後聽臨時不如服烏頭丸澼氣得減
亦未必須服旋復花丸忌酢物生葱豬肉蕪荑出第十六卷中

集驗療痰澼心腹痛兼冷方

鼈甲炙　柴胡　赤芍藥各八分　甘草炙

枳實炙　生薑　白朮各六分　檳榔七箇

右八味切以水六升煮七味取二升半去滓內檳榔末分服八合當利忌海藻菘菜莧菜桃李雀肉等出第五卷中

飲澼方二首

病源飲澼者由飲水過多在於脅下不散又遇冷氣相觸而痛呼為飲澼也其狀脅下弦急時有水聲出第二十卷中

深師附子湯療氣分心下堅如盤邊如旋杯水飲所作此湯主之方

桂心三兩　生薑三兩　麻黃三兩去節　甘草二兩炙

細辛三兩　大附子一枚炮　大棗十二枚

右七味切以水七升先煮麻黃再沸掠去沫乃下諸藥煮取二升去滓分服七合當汗出如蟲行皮中即愈神驗忌海藻菘菜生葱豬肉冷水生菜等仲景傷寒論名桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯出第二十一卷中

又療心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作枳實白朮湯方

枳實七枚炙　白朮三兩

右二味切以水一斗煮取三升分三服腹中軟即散此出姚大夫方忌桃李雀肉等物此本仲景傷寒論方出第三卷中

痰飲方七首

病源此由飲水多水氣停聚兩脅之間遇寒氣相搏則結聚而成塊謂之癖飲在於兩脅下弦亙起按之作水聲也出第二十卷中

深師朱雀湯療久病癖飲停痰不消在胸膈上液液時頭眩痛苦攣眼睛身體手足十指甲盡黃亦療脅下支滿飲輒引脅下痛方

甘遂　芫花各一分　大戟三分

右三味為散以大棗十二枚擘破以水六升先煎棗取二升內藥三方寸匕更煎取一升一合分再服以吐下為知未知重服甚良無比出第二十一卷中胡洽按此即前十棗湯

千金中候黑丸療癖飲停結滿悶目闇方

巴豆八分去皮心熬　芫花二兩熬　桂心四分　桔梗五分

杏人五分去皮尖

右五味搗篩蜜和丸飲服如胡豆三丸日一稍增得快下為度忌豬肉蘆筍生葱等肘後同

千金半夏湯療痰冷癖飲胸膈中不理方

白朮三兩　半夏一升洗　生薑八兩　茯苓二兩

人參　桂心　甘草　附子炮各二兩

右八味切以水八升煮取三升絞去滓分溫三服忌羊肉餳桃李雀肉大酢生葱海藻菘菜豬肉冷水

又旋復花丸療停痰癖飲結在兩脅腹脹滿羸瘦不能食食不消化喜唾乾嘔大小便或澀或利水在腸胃動搖作水聲方

旋復花　桂心　枳實(炙)　人參(各五分)

乾薑　芍藥　白朮(各六分)　茯苓

狼毒(炙)　烏頭(炮)　礬石(熬各八分)　細辛

大黃　黃芩　葶藶子(熬)　厚朴(炙)

芫花(熬)　吳茱萸　橘皮(各四分)　甘遂(三分)

右二十味擣篩蜜和丸酒服如梧子五丸日再服加之以知為度忌桃李雀肉大酢豬肉生菜生葱等大驗(出並)第十八卷中

千金翼前胡湯主胸中久寒癖實宿痰膈塞胸痛不通利三焦冷熱不調飲食損少無味或寒熱體重臥不欲起方

前胡(二兩)　生薑(四兩)　黃芩(一兩)　人參(二兩)

吳茱萸(一兩)　大黃(二兩)　防風(一兩)　杏人(三十枚去皮尖)

當歸　甘草(各二兩炙)　半夏(三兩洗)　麥門冬(一兩去心)

右十二味切以水一斗煮取三升去滓分溫三服日三服三劑良深師云若胸下滿加大棗二枚利水亦佳忌海藻菘菜羊肉餳等

又半夏湯主痰飲癖氣吞酸方

半夏(三兩洗)　生薑(六兩切)　附子(一枚炮)　吳茱萸(三兩[illegible])

右四味切以水五升煮取二升半去滓分溫三服老小服半合日三忌豬羊肉餳

又薑附湯主痰癖氣方

生薑(八兩切)　附子(四枚)

右二味水五升煮取二升分再服亦主卒風大良忌豬肉冷水(深師同出第十九卷中)

冷痰方四首

病源冷痰者言胃氣虛弱不能宣行水穀故使痰水結聚停於胸膈之間遂令人吞酸氣逆四肢變青不能食飲(出第二十卷中)

千金療痰飲者當以溫藥和之療心腹虛冷遊痰氣上胸脅滿不下食嘔逆胸中冷半夏湯方

半夏(一升洗)　生薑(一斤)　橘皮(四兩)

右三味切以水一斗煮取三升分三服若心中急及心痛內桂枝四兩若腹痛內當歸四兩羸瘦老小者服之佳忌羊肉餳

又方

半夏一升湯洗　生薑一斤　桂心三兩　甘草三兩炙
右四味切以水七升煮取二升半分三服忌海藻菘菜
羊肉餳生葱並出第十六卷中
千金茯苓湯主胷膈痰滿方
茯苓四兩　半夏一升洗　生薑一斤　桂心八兩
右四味切以水八升煮取二升半分四服冷極者加大
附子四兩氣滿者加檳榔三七枚忌酢物羊肉生葱餳
出第十八卷中
千金翼論曰凡痰飲盛吐水無時節其源為冷飲過度遂
令痼冷脾胃氣羸不能消於食飲食飲入胃皆變成冷水

反吐不停者赤石脂散主之方
赤石脂三斤
右一味擣下篩服方寸匕日三酒飲並可稍稍加至三
匕服盡三斤則終身不吐水又不下利補五藏令肥健
有人久患痰飲諸藥不差惟服此一斤則愈出第十九卷中
痰結實及宿食方三首
病源此由痰水積聚在於胷腑遇冷熱之氣相搏結實不
消故令人心腹痞滿氣息不安頭眩目暗常欲嘔逆故言
痰結實出第二十卷中
驗療宿食結實及痰澼積實瓜蔕散方
瓜蔕一兩　赤小豆四兩
右二味擣篩溫湯三合以散一錢匕投湯中和服之須
臾當吐不吐更服半錢湯三合令吐如吐不止飲葱水
備急救急同出第四卷中
千金松蘿湯主胷中痰積熱皆除之方
松蘿二兩　烏梅　梔子各二七枚　常山三兩
甘草一兩炙
右五味切以酒三升漬一宿平旦合水三升煮取二升
半去滓頓服之亦可再服得快吐止忌海藻菘菜生葱
菜

又撩膈散療心上結痰實寒冷心悶方
瓜丁二十八枚　赤小豆二十枚　人參　甘草炙各一分
右四味擣為散酒服方寸匕日二忌海藻菘
菜並出第十八卷中
胷中痰澼方三首
肘後療胷中多痰頭痛不欲食及飲酒則瘀阻痰方
礬石一兩
右一味以水二升煮取一升內蜜半合頓服之須臾未
吐飲少熱湯
又方

杜蘅三兩 瓜蒂三七枚 松蘿三兩
右三味切以水酒一升二合漬之再宿去滓溫分再服
一服不吐晚更一服 千金同並出第一卷中
千金治胸湯主胸中痰澼方
常山三兩 甘草一兩 松蘿一兩 瓜蒂二七枚
右四味酒水各二升半煮取一升半分服七合取吐吐
不盡餘更分二服得快吐差後須服半夏湯在前冷痰
部中忌海藻菘菜生葱生菜 備急肘後同出第十八卷中

痰厥頭痛方八首

病源謂痰水在於胸膈之上又犯大寒使陽氣不行令痰

水結聚不散而陰氣逆上上與風痰相結上衝於頭即令
頭痛或數歲不已久連腦痛故云膈痰風厥頭痛若手足
寒冷至節則死 出第二十卷中
千金療卒頭痛如破非中冷又非中風其病是胸膈中痰
厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之則差方
但單煮茗作飲二三升許適冷煖飲三升須臾適吐
適吐畢又飲能如此數過劇者須吐膽汁乃止不損
人渴而差 集驗同出第十八卷中
千金翼葱白湯主冷熱膈痰發時頭痛悶亂欲吐不得方
葱白二七莖 烏頭二分炮 甘草二分炙 眞珠二分研

常山二分 桃葉一把
右六味切以酒四升水四升合煮取三升去滓內眞珠
服一升得吐止忌海藻菘菜豬肉冷水生葱生菜生血
等物 千金深師同
又療痰飲頭痛往來寒熱方
常山一兩 雲母粉二兩
右二味爲散熟湯服方寸匕吐之止若吐不盡更服忌
生葱生菜 深師云用雲母半兩鍊之備急同並出第十九卷中
備急葛氏主卒頭痛如破非中冷又非中風是胸膈中痰
厥氣上衝所致名厥頭痛吐即差療方

釜下墨四分 附子三分炮
右二味擣散以冷水服方寸匕當吐愈一方有桂心一
分忌豬肉冷水 文仲肘後同
又方
以鹽湯吐不吐撩出 張文仲同
又方
苦參 桂心 半夏洗
右三味等分爲末苦酒和以塗痛上則差忌生葱羊肉
餳 肘後同
又方

常山四分　甘草半兩

右二味切以水七升煮取三升服一升不吐更服亦可內蜜半升忌生葱生菜海藻菘菜千金肘後延年同

又方

烏梅三十枚　鹽三指撮

右二味以酒三升煮取一升一服當吐愈肘後同

風痰方五首

延年白朮丸主除風痰積聚胃中冷氣每發動令人嘔吐食或吐清水食飲減少不作肌膚方

白朮五分　白芷三分　乾薑　石斛各六分

五味子　細辛　橘皮　厚朴炙

桂心　防風　茯苓　甘草各四分

右十二味擣篩蜜和丸如梧桐子服十丸飲下日二加至二十丸忌桃李雀肉生葱海藻菘菜生菜酢物一方有人參五分十二味蔣孝璋處

又茯苓湯主風痰氣發即嘔吐欠呿煩悶不安或吐痰水者方

茯苓三兩　人參　生薑　橘皮

白朮各二兩

右五味切以水五升煮取一升五合去滓溫分三服中間任食忌大醋桃李雀肉等出第十七卷中

又木蘭湯主熱痰飲氣兩肋滿痛不能食者方

木蘭　枳實炙　黃芩　白朮各三兩

瓜蔞根　白斂　升麻　芍藥

桔梗各二兩　生薑　大黃各四兩

右十一味以水八升煮取二升六合分為三服如人行三四里進一服忌桃李豬肉雀肉一方有玄參二兩

又茯苓飲主風痰氣吐嘔水者方

枳實炙一兩　茯苓　白朮　人參各二兩

生薑四兩　橘皮一兩半

右六味切以水五升煮取一升半分三服中間任食忌桃李雀肉大醋張文仲處出第六卷中

又療風痰飲氣逆滿惡心不能食方

人參二兩　枳實炙　白朮各三兩　生薑四兩

桂心一兩半

右五味切以水五升煮取一升五合分溫三服忌桃李雀肉生葱張文仲處出第十七卷中

療諸痰飲方四首

廣濟療痰飲氣痰膈食則嘔吐方

茯苓八分　橘皮六分　甘草四分炙　生薑八分

雞蘇六分　人參四分

右六味切水五升煮取一升五合去滓分溫二服服別相去如人行六七里進一服不利忌海藻菘菜酢物出第十一卷中

千金療痰癖心腹積聚兩脅脹滿留飲痰癖大小便不利小腹切痛膈上寒方

代赭三分　烏賊魚骨炙三分　半夏三分

巴豆七分去心皮熬　桂心四分　石膏五分碎

右六味擣篩蜜和丸平旦服一丸如胡豆至一丸忌羊肉餳豬肉蘆筍生蔥出第十八卷中謹按此方見前癥癖中少當歸茯苓藜蘆多半夏石膏

延年前胡湯主胸背氣滿膈上熱口乾痰飲氣頭風旋方

前胡三兩　枳實炙　細辛　杏人去尖皮碎

芎藭　防風　澤瀉　麻黃去節

乾薑　芍藥已上各三兩　茯苓一作茯神　生薑各四兩

桂心　甘草炙各二兩

右十四味切以水九升煮取二升六合分三服微汗忌生冷油膩豬牛肉麪海藻菘菜生蔥生菜酢物出第七卷中

古今錄驗薑附湯療冷胸滿短氣嘔沫頭痛飲食不消化方

附子六分　生薑十二分

右二味切以水八升煎取三升二合分為三服忌豬肉冷水等出第九卷中

胃反方一十首

病源夫榮衛俱虛血氣不足停水積飲在於胃管則臟冷臟冷而脾不磨脾不磨則宿穀不化其氣逆而成胃反也則朝食暮吐暮食朝吐心下牢大如杯往來寒熱甚者食已則吐其脈緊而弦緊則為寒弦則為虛虛寒相搏故食已則吐名為反胃也出第二十一卷中

集驗療胃反不受食食已嘔吐大半夏湯方

人參一兩　茯苓四兩　青竹茹五兩　大黃六兩

橘皮　乾薑各三兩　澤瀉　甘草炙

桂心各二兩

右九味切以水八升煮取三升服七合日三夜一已利去大黃用泉水東流水尤佳忌海藻菘菜生蔥大酢千金備急與文仲同方中無半夏未詳其名

又療胃反吐而渴者茯苓小澤瀉湯方

茯苓　澤瀉　半夏各四兩　桂心

甘草炙各二兩

右五味以水一斗煮取二升半去滓服八合日三忌海藻菘菜羊肉餳生蔥酢物等千金加生薑四兩

又療胃反朝食暮吐食訖腹中刺痛此由久冷者方

橘皮一兩　白朮　人參各二兩　蜀椒一百二十粒汗

桂心一兩　薤白一握去青

右六味切以水二升漬一宿內豬肚中縫合三升水煮不盡出之決破去滓分三服忌桃李雀肉生葱千金用

又療胃反大驗方

前胡　生薑各四兩　阿膠一兩　大麻子人五合

吳茱萸五合　桂心二寸　甘草五寸炙　大棗十枚

右八物切以酒二升水三升煮取一升七合分再服忌生葱海藻菘菜等物一方有橘皮三兩

又療胃反吐食者方

擣粟米作粉水和作丸如梧子大七枚爛煮內醋中細細吞之得下便作麴亦得用之

又方

好麴十斤生地黃二斤二味擣日乾酒服若欲三方十七日三服千金云治酢咽通腹生地黃汁和食之殺蟲至去黑明如曲

又主胃反食則吐出上氣者方

灸兩乳下各一寸以差為度

又方

灸臍上一寸二十壯

又方

灸內踝下三指稍斜向前有穴三壯即差

又方

蘆根茅根各二兩

右二味切以水四升煮取二升頓服得下食千金同出第十六卷中

崔氏療食則吐或朝食夜吐名曰胃反或氣上不飲食皆效年氣削飲水亦同此方朱雀感録造

半夏六兩　人參三兩　生薑一兩　橘皮二兩

舂杵頭糠一升綿裹　牛涎一升　厚朴二兩炙

羚羊角二兩屑

右八味切以水八升煮取三升分温三服相去十里久欲須服者可至三劑氣噎病者胃閉不受食雖飲水水入吐出積年不差乃至於死人間多有此病此方救療有効忌羊肉餳粘食

又療胃及胃反為病朝食夜吐心下堅如杯往來寒熱吐逆不下食此為寒癖所作療之神効方

真珠　雄黃　丹砂各一兩以上研　朴消二兩

乾薑十累

右五味擣篩蜜丸先食服如梧子二丸小煩者飲水

解之忌生血物（一方有桂心一兩必效一[illegible]胃反爽病所作久變成噎療方備矣[illegible]）驗千金張文仲同並出第四卷中

救急療胃反方

昔在幼年經患此疾每服食餅及羹粥等物須臾吐出正觀中許奉御兄弟及柴蔣等家時稱名醫奉勑令療罄竭其所患終不能瘳漸羸憊候死朝夕忽有一衛士而云服溺小便極驗此日服食一二合然後食帶吐一半晡時又服一二合人定時食粥吐便即定迄至今日午時奏知之大內中有五六人患胃反同服用一時俱差此藥稍有毒服時不可過多承取尿及熱服二合病若深七日以來服之良後來療人並差（必効同出第六卷中通按鹽尿當亟隔）

人參湯主胃逆不消食吐不止方

人參　澤瀉　桂心各二兩　橘皮　甘草炙　黃耆各二兩　茯苓四兩　生薑八兩　麥門冬二升去心　半夏一升製　大黃一兩半

右十一味切以水一斗二升煮取三升二合服八合日三夜一服若羸人服六合已下去大黃忌海藻菘菜酢物生葱羊肉餳（千金同）

又療胃反朝食夜吐夜食朝吐諸藥療不差方

羊肉去脂膜作脯以好蒜虀空腹任意多少食之立見效驗

又療胃反吐水及吐食方

大黃四兩　甘草二兩炙

右二味切以水三升煮取一升去滓分（溫再服如得可）則隔兩日更服一劑神驗千金不傳忌（海藻菘菜此本仲景傷寒論方並出第二卷中）

古今方療脾飲食吐逆水穀不化此為胃反半夏飲子方

半夏八分製　厚朴炙　人參　白朮　生薑切　[illegible]各六分　粳米二合

橘皮四分

右八味細切以水二大升煎取一升去滓分溫四服空肚服二服忌羊肉餳（並出第一卷中）

脾胃弱不能食方三首

（病源脾者藏也胃者腑也脾胃二氣相為表裏胃為水穀之海主受盛飲食者也脾氣磨而消之則能食今脾胃二氣俱虛弱故不能食也尺脈浮滑速疾者食不消脾不磨也出第二十一卷中）

廣濟療脾胃氣微不能下食五內中冷時微下痢方

白朮八兩　神麴五兩末　甘草二兩炙　乾薑二兩

枳實炙二兩

右五味擣篩蜜和丸空腹溫酒服如梧子二十丸日二服漸加至三十丸腹中有痛加當歸二兩忌熱麪海藻菘菜桃李雀肉等 出第一卷中

延年人參飲主虛客熱不能食惡心方

人參　麥門冬去心　橘皮　白朮

厚朴炙各二兩　茯苓四兩　生薑切三兩　甘草炙一兩

右八味切以水八升煑取二升分爲三服日三忌海藻菘菜桃李雀肉等 蔣孝琬處大効

又厚朴湯療不能食腹內冷氣方

厚朴炙二兩　白朮　人參各二兩　茯苓三兩

生薑五兩　橘皮一兩

右六味切以水四升煑取一升二合分爲三服忌桃李雀肉酢物 蔣孝琬處出第六卷中

脾胃病日漸瘦困不食方三首

廣濟療脾胃中熱消渴小便數骨肉日漸消瘦方

黃連　麥門冬各十二分去心　苦參

栝樓　知母　茯神　土瓜根各八分

人參　甘草炙各六分

右九味擣篩蜜和丸每食後少時煑蘆根大麥飲服如梧子二十丸日二服漸加至四十丸不利忌海藻菘菜豬肉冷水酢等物

又主胃氣冷弱食則吐逆從朝至夜不得食食入腹則脹氣滿急大便出飯粒如故帶酸氣而羸計日漸困者方

吳茱萸二兩　白朮三兩　人參　乾薑二兩

甘草炙　五味子各二兩　麴末　麥糵各五合

厚朴一兩半　桂心一兩

右十味擣篩爲散空腹煑生薑湯服方寸匕一日三服漸加至一七忌生葱桃李雀肉海藻菘菜 出第一卷中

延年白朮丸療惡心數吐水不多能食少心力者方

白朮　乾薑　人參　厚朴炙

桂心各六分　細辛　茯苓　當歸

茯神　枳實炙　五味子　附子各六分炮

吳茱萸六分　遠志五分去心　旋復花四分　澤瀉五分

右十六味擣篩蜜和爲丸如梧子酒服二十丸日再服加至二十五丸忌桃李雀肉大酢生菜生葱豬肉冷水 出第十七卷中

胃實熱方二首

千金凡右手關上脈陽實者足陽明經也病苦頭痛一云腹中堅痛而熱汗不出如溫瘧脣口乾善噦乳癰缺盆腋下腫痛

曰胃實熱也

療胃實瀉胃熱湯方

梔子人二兩　芍藥四兩　白朮五兩　茯苓三兩

生地黃汁一升　射干三兩　赤蜜一兩　升麻三兩

右八味切以水七升煮六味取一升五合去滓下地黃

汁兩沸次下蜜煎取二升分三服老小以意加減之忌桃

李雀肉酢物蕪荑等

又方

灸臍下三寸兩腳三里穴各三十壯主胃中熱病

胃虛寒方七首

千金右手關上脈陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得臥

惡風寒洒洒目急腹中痛耳虛鳴時寒時熱脣口乾面浮

腫名曰胃虛冷也又療胃虛冷少氣口苦身體無澤補胃

湯方

防風　栢子人　細辛　桂心

橘皮各二兩　芎藭　吳茱萸　人參各三兩

甘草一兩炙

右九味切以水一斗煮取三升分溫三服忌海藻菘菜

生葱生菜等物

又補胃虛寒身枯絕骨諸節皆痛人參散方

人參　細辛　甘草各六分炙　桂心

當歸各七分　麥門冬七分去心　乾薑八分　遠志肉四分

蜀椒三分汗　吳茱萸二分

右十味為散食後服方寸匕溫清酒進之忌海藻菘菜

生葱生菜並出第十六卷中

范汪療胃氣虛不欲食四肢重短氣調和五臟并療諸病

調中湯方

薤白一升切　枳實六枚炙　橘皮三枚　大棗十二枚

粳米三合　香豉六合

右六味切枳實橘皮薤以水六升先煮薤得四升內諸

藥煮取一升半適寒溫服中分服之良　一方生薑五分　出第二十一卷中

刪繁療胃虛苦饑寒痛人參補虛湯方

人參　當歸　茯苓　桔梗

芎藭　橘皮　厚朴各二兩炙　桂心

甘草各二兩炙　白朮五兩　吳茱萸一兩　大麥蘗二升

右十二味切以水一斗二升煮取三升去滓分三服忌

海藻菘菜桃李雀肉生葱豬肉酢等物　出第十一卷中

又白朮乃茱等散方　與前療同

白朮　厚朴炙　人參　吳茱萸

麥蘗炒　茯苓　芎藭　橘皮各三兩

右藥擣篩爲散食前服方寸匕煖酒進之隨性服忌桃李雀肉大酢出第四卷中

延年療胃飲主胃氣虛熱不能食兼渴引飲方

茯苓四兩 人參二兩 橘皮一兩 生薑三兩

薤白一升切 豉五合綿裹 糯米二合

右七味切以水七升煑取二升去滓分温六服中間任食一日令盡忌酢物張文仲處出第一卷中

五膈方八首

病源五膈氣者謂憂膈恚膈氣膈寒膈熱膈也憂膈之爲病胷中氣結煩悶津液不通飲食不下羸瘦不爲氣力恚

膈之爲病心下苦實滿噫輒酢心食不消心下積結牢在胃中大小便不利氣膈之爲病胷脅逆滿咽塞胷膈不通噫聞食臭寒膈之爲病心腹脹滿欬逆腹上苦冷雷鳴繞臍痛食不消不能食肥熱膈之爲病藏有熱氣五心中熱口中爛生瘡骨煩四肢重脣口乾燥身體頭面手足或熱腰背疼痛胷痺引背食不消不能多食羸瘦少氣及癖也此是方家所說五膈形證也經云陽脉結謂之膈言憂恚寒熱動氣傷神而氣之與神並爲陽也傷動陽氣致陰陽不和而府藏生病結於胷膈之間故稱爲膈氣衆方說五膈互有不同但傷動之由有五故云五膈氣出第十二卷中

千金五膈中之患名曰膏肓湯丸徑過針灸不及所以作丸含之令氣勢得相熏染有五膈要丸方

麥門冬十分去心 椒六分汗 遠志 附子炮

乾薑 人參 桂心 細辛各六分

甘草十分炙

右九味擣篩以蜜和丸如彈子以一枚著牙齒間含稍稍嚥汁日三夜二主短氣胷滿心下堅冷氣此病有十許方率相似此丸最効五膈者謂憂膈氣膈恚膈熱膈寒膈也忌豬肉生菜海藻菘菜生葱千金肘後文仲同出第二卷中

文仲五膈丸方

吳茱萸 麴 杏人去皮尖 乾薑

蜀椒汗 好豉熬

右六味等分擣篩蜜和丸如梧子飲服七丸日三忌生冷此方出隱居効驗備急肘後同出第二卷中

延年秘錄凡憂膈氣膈食膈寒膈飲膈五病同藥常以憂恚思慮食飲而得之若寒食食生菜便發其病苦心滿不得氣息引脊痛如刺之狀食則心下堅大如粉絮大痛欲吐吐則差飲食不得下甚者乃手足冷上氣欬逆喘息氣短療以丸物五膈丸方

麥門冬去心 蜀椒汗各二兩 遠志去心一兩 甘草炙五兩

附子一兩炮 乾薑三兩 人參四兩 桂心三兩

細辛三兩 通按此即前五膈要丸一味不差

右藥擣篩蜜和微使淖置有蓋器中先食服大如彈子丸一丸置喉中稍稍嚥之喉中胷中當熱藥力稍盡復含一丸日三四夜一二服服藥七日愈二十日平復若不能含者可一大丸作二小丸盡服之唯夏月合乃益麥門冬甘草人參耳其餘不異神良椒當以銅器蒸於火上使極熱下置地內椒器中熱蒸之須臾汗出便擣合同處椒力有熱亦去其毒非令有熱也忌海藻菘菜豬肉冷水生葱生菜耳千金集驗同不能具於此方錄用之

古今錄驗大五膈丸療膈中遊氣上下無常處或有虛冷氣迫咽喉胷滿氣逆脅有邪氣食已氣滿羸瘦著牀骨立往來寒熱腹中不調或下痢嘔逆欬嗽骨肉銷盡服之令人能食長肌肉强筋骨利五藏好顏色補不足益氣力方

細辛 桂心 黃芩 吳茱萸

厚朴各三分炙 杏人三十枚去尖 乾薑 川椒汗

遠志各三分去心 小草 芍藥 附子炮

當歸各二分 黃連二分

右十四味擣篩蜜和服如梧子二丸日三不知加之以知為度忌豬肉冷水生葱菜等

又五膈丸療憂膈氣膈食膈寒膈飲膈異病同藥神方

人參 附子炮 遠志去心 桂心

細辛各四分 乾薑 蜀椒各五分汗

右七味擣篩以蜜和服如彈丸著牙下咬咀嚥之若病劇者日三夜再并療蠱癥風注氣腹中百病皆愈當得真藥好藥即可中病耳神秘妙方不傳忌生葱生菜豬肉冷水蕪荑物通按此方比前五膈丸少麥冬甘草二味

又療邪氣嘔逆氣五膈為病五藏俱虛則受風冷五藏有邪呼吸不足陰注於內陽結於外陰陽錯亂語言無常膈中否狀如結氣喉咽不利氣出不入此血氣衰微藏

冷氣成之服此丸安穀通氣溫藏五膈丸出僧深方

蜀椒汗一升 乾薑二兩 桂心一兩 芍藥一兩半

半夏洗 細辛 茯苓各一兩 前胡一兩半

右八物擣篩蜜和服如彈丸一枚喉中稍稍吞之可增至三丸或冷則加遠志一兩唯日再忌羊肉餳生葱生菜醋物

又療胷痛達背膈中煩滿結氣憂愁飲食不下藥悉主之宜丸方

製半夏一分 甘草炙 遠志去心各四分 乾薑

桂心 細辛 椒去目汗 附子炮各二分

右八味擣篩以蜜和爲丸先食酒若粳米飲服如梧子五丸日三稍增至十丸忌海藻菘菜羊肉餳豬肉冷水生葱生菜 並出第十八卷中

深師五膈丸療寒冷則心痛咽中如有物吐之不出咽中不下食飲少方

蜀椒一兩汗 麥門冬一兩去心 附子一兩炮 細辛二兩

乾薑一兩 遠志一兩去心 甘草一兩炙 人參二兩

食茱萸一兩 桂心二兩 延年方有蜀椒五兩方多食茱萸一兩

右十味蜜和爲丸如梧子服五丸日二忌豬肉冷水海藻菘菜生葱生菜 千金同出第二卷中

七氣方三首

病源七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣凡七種氣積聚堅大如杯若柈 蒲官切一作盤 在心下腹中疾痛欲死飲食不能時來時去每發欲死如有禍祟此皆七氣所生寒氣則嘔吐惡心熱氣則說物不竟言而迫 一云就 怒氣則上氣不可忍熱痛上搶心短氣欲死不得氣息恚氣則積聚在心下心滿不得飲食喜氣則不可疾行不能久立憂氣則不可劇作暮臥不安席愁氣則喜忘不識人語置物四方還取不得去處若聞急則四肢手足筋攣不能舉狀如得病此是七氣所生男子卒得飲食不時所致婦人則産中風餘疾 千金同出第十三卷中

千金七氣丸方

烏頭七分炮 紫菀 前胡 半夏洗

細辛 丹參 茯苓 芎藭

桃人去皮尖 吳茱萸 桂心 桔梗

石膏各三分研 人參 甘草 防葵各四分千金作防風

大黃七分 乾薑三分 蜀椒二分汗 菖蒲三分

右二十味擣篩爲末蜜和丸酒服如梧子三丸日三加至十丸一方去半夏加甘遂三分忌海藻菘菜羊肉餳豬肉冷水生葱大酢生菜 一方有芍藥無菖蒲

又七氣丸主七氣七氣者寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣此七氣爲病皆生積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時去時來發則欲死凡寒氣狀吐逆心滿熱氣狀恍惚眩冒失精怒氣狀上氣不可當熱痛上盪心短氣欲絕不得喘息恚氣狀積聚心滿不得食飲喜氣狀不可疾行久立憂氣狀不可苦作臥不安席愁氣狀平故怒氣善忘四肢胕腫不得舉止亦療産後中風餘疾方

大黃十分 椒二分 人參 半夏洗

芎藭 柴胡 甘草炙 桔梗

石膏 菖蒲 桃人去皮尖 吳茱萸

茯苓各三分　乾薑四分　細辛三分
右十五味擣篩蜜和丸如梧子酒服三丸日三加至十
丸忌羊肉餳生葱海藻菘菜豬肉生菜酢物
又七氣湯療虛冷七氣勞氣方
半夏洗一升　生薑十兩　人參　桂心
甘草炙各一兩
右五味切以水一斗煮取三升分爲三服日三忌羊肉
餳生葱海藻菘菜　並出第十七卷中
氣噎方六首
病源此由陰陽不和藏氣不理寒氣填於胷膈故氣噎塞

不通而謂之氣噎令人喘悸胷背痛也出第二十卷中
廣濟療噎胷脅氣滿妨食氣噎通氣湯方
半夏洗　生薑各六兩　橘皮　桂心各三兩切
右四味切以水八升煮取二升五合絞去滓分溫三服
服別相去如人行六七里服忌羊肉生葱餳等出第一卷中
深師療胷滿氣噎通氣湯方
半夏洗八兩　生薑六兩　桂心三兩　大棗三十枚
右四味切以水八升煮取三升分服五合日三夜一忌
羊肉餳生葱　千金同出第二十二卷中
集驗療氣噎煎方
蜜酥薑汁各一升
右三味合和微火煎五六沸攪如大棗二枚內酒中
飲之直抄服之亦好　千金古今錄驗同
又延氣噎湯方
半夏洗二兩　桂心三兩　生薑八兩　羚羊角二兩
右四味切以水八升煮取三升分服半升日再服忌羊
肉生葱餳　古今錄驗同並出第四卷中
必效療喉中氣噎方
半夏洗　柴胡　生薑各三兩　羚羊角屑二兩
犀角屑　桔梗　昆布　通草

甘草炙各二兩
右九味切以水八升煮取三升分三服忌羊肉餳豬肉
海藻菘菜等
古今錄驗羚羊角湯療噎氣不通不得下食方
羚羊角屑二兩　厚朴炙　吳茱萸　乾薑各二兩
通草　橘皮各二兩　烏頭十五枚炮
右七味切以水九升煮取三升分三服日三忌豬肉冷
水　深師千金同出第二十七卷中
諸噎方一十二首
病源夫陰陽不和則三焦隔絕三焦隔絕則津液不利故

令氣噎不調理也是以成噎此由憂恚所致憂恚則氣結氣結則不宣流使噎噎者噎塞不通也 出第二十卷中

深師療噎方

羚羊角屑　前胡　甘草炙各一兩　人參
橘皮各二兩

右五味切以水六升煮取二升分四服忌海藻菘菜

又方

鸕鷀喙

右一物當噎時以銜之則下 肘後同

又方

羚羊角

右一物多少自在末之飲服亦可以角摩噎上良 並出第十二卷中

廣利方療因食即噎塞如炙肉臠在咽中不下方

吳射干六分　升麻四分　桔梗四分　木通十二分
赤茯苓八分　百合八分　紫菀頭二十一枚

右七物切以水二大升煎取九合去滓分溫三服食後良久服忌猪肉酢物 出第四卷中

千金理噎方

常食乾粳米飯即不噎

又方

炭木細羅蜜丸如彈子大含少細細嚥津即下 集驗同 並出第十六卷中

集驗療噎方

取頭垢如棗大以粥若漿水和服之 肘後深師同 出第十卷中

必効主噎方

緻捺大椎盡力則下仍令坐之 通按縱捺未詳仍令坐之亦未詳

又方

以酢煮麪糊散之則差此只可一兩日差欲長久絕者取溲為丸如彈子酢中煮熟於水中淬却及熱則食二十九神驗不過三兩度則差大効

又半夏湯主噎方

生薑四兩　半夏一升洗　石膏碎四兩　小麥一升完用
吳茱萸一升　赤小豆二十顆　大棗二十顆　人參
甘草炙　桔梗　桂心各一兩

右十一味切以酒二升水八升煮取三升分三服忌猪羊肉海藻菘菜餳生葱等 古今錄驗有桔梗無桔梗名乾薑湯不用生薑

又方

杏人二兩去尖皮　桂心二兩

右二味末之蜜和丸含之如棗核許稍稍嚥之臨食先

今按劾忌生葱 千金同並出第二卷中

古今錄驗療噎方

蘆根三斤

右一味切以水一斗煮取四升分四服 出第二十七卷中

卒食噎方九首

病源此由藏氣冷而不理津液澀少而不能得行飲食故食入則噎塞不通故謂之食噎胷內痛不得喘息食不下是故噎也 出第二十卷中

肘後療卒食噎方

橘皮二兩

右一味切以水三升煮取一升頓服之

又方

舂杵頭糠置手巾角以拭齒立下 集驗深師千金同並出第五卷中

深師療卒噎法

傍人可緩解衣帶勿令噎者知則愈

又療卒噎方

與其食人當以手捉噎人頸問曰此等何物噎人當答言雞共食人亦噎下去則立愈

又療卒噎不下方

水一杯　刀一口

右二物先以刀横畫水已後盡飲之則下 出第二十二卷中

集驗療醋噎方

羌活五兩

右用水一升浸三宿每日空服五合差

又療氣噎不下食兼嘔吐方

半夏洗四兩　生薑三兩各切

右二味以東流水二大升煎取一升去滓溫服一合日二服忌羊肉餳 並出第五卷中

備急療卒食噎不下方

取蜜含之則下 千金集驗肘後同

又方

取老牛涎沫如棗核大置水中飲之終身不有噎 肘後深師千金同並出第三卷中

五噎方三首

病源夫五噎謂一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰勞噎五曰思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦隔絕津液不行憂恚嗔怒所生謂之五噎噎者噎塞不通也 出第二十卷中

古今錄驗五噎丸療胷中久寒嘔逆逆氣隔飲食不下結氣不消氣噎憂噎勞噎食噎思噎氣噎者心悸上下不通噎噦不徹胷脅苦痛憂噎者天陰苦厥逆心下悸動手足

逆冷勞噎者若氣隔脅下支滿胷中塡塞令手足逆冷不能自温食噎者食無多少唯胷中苦寒常痛不得喘息思噎者心悸動喜忘目視䀮䀮此皆憂恚嗔怒寒氣上逆胷脅所致療之方

乾薑　蜀椒汗　食茱萸　人參

桂心各五分　細辛　白朮　茯苓

附子炮各四分　橘皮六分

右十味擣篩以蜜和爲丸如梧子酒服三丸日再不知稍增忌桃李雀肉大酢猪肉冷水生葱生菜酢物出第二十七卷中

經心錄五噎丸主五種之氣皆令人噎方

人參　半夏　桂心　防葵一方用防風　小草各二兩

附子炮　細辛　甘草炙各一兩　食茱萸二合

紫菀　乾薑　芍藥　枳實炙

烏頭各六分炮

右十二味擣篩以蜜和爲丸如梧子大服五丸日三不知加至十五丸忌羊肉餳海藻菘菜猪肉生葱生菜千金同出第二卷中

集驗噎塞不通方

營實根十二分

右一味擣爲散酒下方寸匕日三服出第五卷中

諸骨哽方三十五首

肘後療食諸魚骨哽百日哽者方

用綿二兩以火煎蜜內一段綿使熱灼灼爾從外縛哽所在處灼瓠以熨綿上若故未出復煑一段綿以代前並以皂莢屑少少吹鼻中使得嚏哽出矣秘方不傳鄙語云魚去乙謂其頭間有骨如乙字形者哽人不肯出故也

又方

取捕魚竹笱鬚燒末飲之魚網亦佳

又療食諸肉骨哽方

白雄雞左右翮大毛各一枚燒末水服一刀圭也仍取所食餘者骨左右手反覆擲背後則下也文仲備急同

又方

燒雞足末服方寸匕酒下立出張文仲同

又方

生艾蒿數升水酒共一斗煑取三四升稍稍飲之集驗同

凡療病皆各以其類豈宜以鸕鷀療肉骨狸虎療魚哽耶至於竹篾薤白嚼筋綿蜜事乃可通爲諸哽用耳又有咒術小小皆須師解故不備載出第五卷中

療誤吞食魚骨哽方
搗魚網燒飲服刀圭七良是魚哽燒魚網服之良
又療哽及刺不出方
服薔薇灰末方寸匕日三亦療折箭刺入膿囊不出
堅燥及鼠撲服之十日哽刺皆穿皮出效
又療鐵棘竹木諸刺在肉中折不出及哽不下方
半夏洗二兩　白斂二兩
右二物搗篩酒服半錢七日三稍從少少起者半夏錢
人歌中故也忌羊肉餳等加乾薑一兩尤佳
又方

鼠腦厚塗瘡上則出亦可用墳鼠大効
又療哽方
螻蛄腦
右一物吞即下亦療刺不出塗刺瘡上
又療咽哽方
取魚尾著衣領令下推立下
又方
白斂白芷等分搗散飲服刀圭
又療食哽方
鷹糞燒灰存性

右一物下篩服方寸七虎狼鵰屎皆可服之佳
又療骨哽刺不得下飲食方
白雞翼翮大毛各一枚著銅器中燒之焦作灰飲服
一刀圭立下
又療哽方
半夏洗五兩　白芷五兩
右二物搗篩服方寸七則嘔出忌羊肉餳
又方
以東流水一杯東向坐以手指畫水中作龍字訖飲
水不自曉書令他人持手書良

又方
凡書文門天有門地有根諸家入口者皆當得吞集驗
同並出第二十二卷中
千金療哽方
取鹿筋漬之濡索之大如彈丸持筋端吞之候至哽
處徐徐引之哽著筋出集驗同
又方
掇吹之食骨鯁燒虎狼屎服
又方
末鹿骨若狸骨服方寸七集驗同

又方
服瞿麥末方寸匕 集驗同古今録驗兼主折箭不出
又方
呑猪膏如雞子大不差更呑差止 古今録驗同
又療諸哽方
作竹篾刮令滑綿纏內咽中令至哽處可進退引之哽即出 小品古今録驗深師同
又療諸哽方
鸕鷀屎末服方寸匕 集驗古今録驗同
又療魚骨哽方
口稱鸕鷀鸕鷀則下 並出第二十六卷中

張文仲療食諸魚骨哽方
以魚骨插頭上則立下陶云因豎刻則出 肘後備急同
又方
小嚼薤白令柔以繩繫之央持繩一端呑薤到哽處引哽當隨出 集驗古今録驗深師備急千金同
又療魚骨哽在喉中衆法不能去者方
取飴糖丸如雞子黄大呑之不去又呑此用得効也 肘後備急千金集驗小品同
又療食中呑髮哽不去繞喉者方
取梳頭髮燒灰飲服一錢匕 肘後備急集驗千金同
並出第三卷中
救急療哽方
好蜜以一匙抄稍稍嚥之令下良 文仲同
又療魚骨哽在喉中方
以少許硇砂口中咀嚼嚥之立下 並出第七卷中
必効療魚骨哽方
含水獺骨立出 小品同
又方
魚網覆頭立下千金云燒灰服半匕 小品同出第二卷中

古今録驗療魚哽骨橫喉中六七日不出方
取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出也未出更服之取出爲度 出第二十九卷中
雜誤呑物方一十七首
肘後療誤呑鉤方
若繩猶在手中者莫引之但益以珠璫若薏苡子輩就貫之著繩稍稍令推至鉤處小小引之則出
又方
以小羊喉以貫繩推至鉤處當退脱小引則出
又方

但大戾頭四向頤小引之則出
又方
常思草頭一把二升水漬濯之十餘遍而飲之
又療誤吞諸木竹釵並方
取布刀故鋸燒漬酒中以女人大指甲二枚燒末內
酒中飲之
又方
若是桃枝竹釵但數數多食白糖自消去
又療以銀釵簪筯擿吐因氣吸誤吞不出方
多食白糖漸漸至十斤當裹物自出此說與葛氏小
異並出第五卷中
外臺秘要 一八 八卷　三五　經餘居
深師療誤吞鉤方
虎珀珠
珀一物貫著鉤繩推令前入至鉤所又復推以牽引出
矣若水精珠亦無珠堅物摩令滑用之也出第二十二卷中
千金療誤吞環若指彄方
燒雁毛二七枚末服之鵝羽亦佳備急文仲同
又誤吞珠銅鐵而哽者方
燒弩銅牙令赤內酒中飲之立愈出第二十六卷中
張文仲療吞諸珠璫鐵而哽方
燒弩銅牙令赤內水中飲其汁立愈肘後備急同
又療誤吞錢方
擣火炭末服方寸匕則出肘後小品集驗千金備急深師同
備急葛氏誤吞釵方
取薤暴令萎煮令熟勿切食一大束釵即隨出生
麥菜若蘩蔞皆可用良効千金肘後同
又誤吞釘及箭金鍼錢等物方
多食肥羊肉脂及諸肥肉自裹出肘後千金文仲同並出第五卷中
古今錄驗療誤吞銀鐶及釵者方
取飴糖一斤一頓漸漸食盡多食之鐶及釵便出小品集驗千金同千金作白糖
外臺秘要 一八 八卷　三六　經餘居
又方
取水銀一兩分服之釵便下去也亦可以胡粉一兩
擣調之分再服食銀令如泥也若吞金銀物在腹中
皆服之令消烊出也
又療誤吞鍼方
取真吸鐵磁石末酒白飲服一方寸匕解曰磁石特
能吸取鐵雖石令吞鍼哽在喉中而服磁石末入腹
那若含磁石口中者或吸鍼出耳二理詳取其義焉
小品集驗千金同出第二十九卷中

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔

較勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第八卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第九卷　欬嗽十三門

欬嗽方三首
五嗽方四首
新久欬方三首
卒欬嗽方八首
暴熱欬方二首
冷欬方三首
欬失聲方四首
氣嗽方八首
呷欬方二首
熏欬法六首
療欬方一十四首
積年久欬方二十一首
久欬坐臥不得方二首
欬嗽短氣方七首
九種欬方一首
欬逆及厥逆飲欬方七首
十欬方七首
久欬欬上氣唾膿血及濁涎方五首
欬嗽膿血方一十一首

久欬嗽膿血方四首
欬嗽唾粘方二首
許仁則療欬方一十二首
雜療欬嗽方三首

唐王燾先生外臺秘要方第九卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

欬嗽方三首

病源欬嗽者由肺感於寒微者成欬嗽也肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六腑爲表裏皆禀氣於肺以四時更王五藏六腑皆有欬嗽各以其時感於寒而受病故以欬嗽形證不同五藏之欬者乘秋則肺先受之肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血乘夏則心先受之心欬之狀欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺乘春則肝先受之肝欬之狀欬則兩左一作脅下痛甚則不可轉側兩胠下滿乘季夏則脾先受之脾欬之狀欬則右脇下痛陰陰引於肩背甚則不可以動動則欬劇乘冬則腎先受之腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬逆此爲五藏之欬也五藏欬久不已傳與六腑脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬而嘔膽汁肺欬不已則大腸受之大腸欬之狀欬而遺矢心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣氣與欬俱出腎欬不已則膀胱受之膀胱欬之狀欬而

遷移久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又有十種欬一曰風欬欲語因欬言不得竟是也二曰寒欬飲冷食寒注入於胃從肺脈上氣內外合因之而欬是也三曰支欬心下堅滿欬則引痛脈反遲是也四曰肝欬欬而引脅下痛是也五曰心欬欬而唾血引手少陰是也六曰脾欬欬而涎出續續不止下引少腹是也七曰肺欬欬引頸項而唾涎沫是也八曰腎欬欬則耳聾無所聞引腰并臍中是也九曰膽欬欬而引頭痛口苦是也十曰厥陰欬欬而引舌本是也診其右手寸口氣口以前

脈手陽明經也其脈浮則為陽實陽實者病苦腹滿善喘欬脈微大為肝痺欬引少腹欬嗽脈浮大者生沉小伏匿者死又云脈浮直腎生沉硬者死欬且嘔腹脹且泄其脈弦欲絕者死欬脫形發熱脈小硬急者死欬且羸瘦[illegible]脈大硬者死欬而尿血羸瘦脈大者死 出第十四卷中

小品療欬嗽紫菀七味湯方

紫菀半兩　五味子一兩　桂心二兩　麻黃四兩去節

杏人七十枚去皮尖兩人碎　乾薑四兩　甘草二兩炙

右藥切以水九升煮取二升半去滓溫服七合日三服忌海藻菘菜生葱蕪荑腥膩 出第二卷中 經心錄古今錄驗同

延年紫菀飲主欬嗽方

紫菀　貝母　茯苓　杏人去皮尖兩人者

生薑各三兩　人參二兩　橘皮一兩去脈

右七味切以水五升煮取一升五合去滓分溫三服如人行七里更進一服忌葱蒜麪酢 張文仲處古今錄驗同出第五卷中

古今錄驗天門冬煎療欬嗽方

天門冬六兩去心　杏人三升去雙人皮尖碎　椒三升熬令汗出

桂心　厚朴炙　杜仲　苦參各三兩

附子六兩炮　乾薑六兩　烏頭二枚炮　人參六兩

蜈蚣一枚去頭足炙

右十二味別擣杏人其餘者合擣下篩以五斤膠飴和擣千杵服如大棗一枚日三忌冷水豬肉生葱鯉魚 出第九卷中

五嗽方四首

深師療五嗽一曰上氣嗽二曰飲嗽三曰燥嗽四曰冷嗽五曰邪嗽四滿丸方

乾薑　桂心　躑躅花　芎藭

紫菀　芫花根皮各二分　人參

細辛　甘草炙　半夏洗　鬼督郵各一分

蜈蚣一枚去頭足炙

右十二味擣篩蜜和服如大豆五丸米飲下日三不知加之至七八丸服此丸無不差方忌不得忌羊肉餳生葱生菜海藻菘菜

又方

特生礜石一兩泥包燒半日　款冬花一兩　豉三百粒熬令干研

巴豆十枚去皮心熬別搗如脂

右四味擣篩蜜和服如大豆米飲下二丸不知稍增至四五丸忌野豬肉蘆筍古今錄驗療三十年欬並出第十八卷中

備急華佗五嗽丸方

皂莢炙　乾薑　桂心

右三味等分擣篩蜜和丸如梧子服三丸酒飲俱得日三忌葱出第三卷中

古今錄驗四滿丸療五嗽一為氣嗽二為痺嗽三為燥嗽四為邪嗽五為冷嗽悉療之方

蜈蚣二枚炙　芫花根熬五分　躑躅花　乾薑　芎藭　桂心各四分　人參　細辛各二分

右八味擣篩蜜和為丸一服米飲下五丸如大豆許日三服增至十丸忌生葱生菜出第十九卷中

新久欬方三首

深師療新久欬嗽唾膿血連年不差晝夜肩息麻黃湯方

麻黃去節四兩　桂心二兩　甘草二兩炙　大棗十四枚擘

右四味切以水九升煮取三升去滓分溫三服日三數用有效忌海藻菘菜生葱等物

又療新久欬嗽前胡丸方

前胡六分　烏頭炮二分　桔梗　乾薑各二分　桂心八分　蜀椒汗八分

右六味擣篩蜜和如櫻桃大一丸含化稍稍嚥之日三又療久欬晝夜不得臥咽中水雞聲欲死者療之良忌豬肉冷水生葱並出第十八卷中

千金療新久欬嗽欵冬花煎方

款冬花　乾薑為末　芫花根熬為末各二兩　五味子　紫菀各三兩

右五味先以水一斗煮三味取三升半去滓內芫花乾薑末加白蜜三升合投湯中令調於銅器中微火煎令如飴可一升半服棗核大含之日三服食數用甚良忌莧菜腥膩並出第十八卷中

卒欬嗽方八首

肘後療卒欬嗽方

釜月下土一分　豉七分熬

右二味熬擣蜜丸如梧子大米飲服十四丸曾用有驗

又方

飴糖六分　乾薑末六分　豉一兩

右三味先以水二升煮豉三兩沸去滓內飴糖消後內乾薑末分為三服

又方

生薑汁　百部根汁

右二味合煎服二合並出第一卷中

張文仲卒欬方

百部根四兩

右一味酒一斗煮之再宿火溫服一升日再服之効附後同

又方

溫清酒一升　驢膏一升

右服之亦療上氣並出第三卷中

備急卒欬嗽方

芫花二兩熬

右一味水二升煮四沸去滓內白糖一斤服如棗大勿食醎酸物亦療久欬附後同

又方

爛中取餘屑一分　桂心一兩　皂莢二兩去皮子炙

右三味擣篩蜜和丸如梧子大人米飲下服十五丸小兒五丸日二服忌生葱附後同出第三卷中

深師療卒欬逆上氣肩息晝夜不止欲絕麻黃湯方

麻黃去節　細辛各二兩　甘草半兩炙

杏人二十枚去皮尖及兩人者研一本作杏人

右四味切以水七升煮取三升去滓分三服秘方忌海藻菘菜生菜出第十八卷中

暴熱欬方二首

千金療暴熱欬杏人飲方

杏人四十枚去皮尖兩人炒研　紫胡四兩　紫蘇子一升　橘皮一兩

右四味切水一斗煮取三升分三服常服飲之不妨本方無紫蘇子有乾棗出第十八卷中

延年貝母煎主暴熱欬方

貝母三兩　紫菀　五味子　百部根

杏人去皮尖兩人者研　甘草炙各二兩

右六味切以水五升煮取二升去滓和地黃汁三升生麥門冬汁一升白蜜五合好酥二合生薑汁一合先取地黃麥門冬汁及湯汁和煎減半內酥薑汁攪不停手又減半內蜜煎如稠糖煎成取如棗大含嚥之日三

夜再服忌海藻菘菜餳物（蔣孝璋同出第五卷中）

冷嗽方三首

深師療冷欬逆氣乾薑湯方

乾薑四兩　紫菀一兩　杏人七十枚去皮尖雙人熬

麻黄四兩去節　桂心　甘草二兩炙各　五味子一兩

右七味切水八升煮取二升七合分三服平旦人加射干一兩代乾薑忌海藻菘菜生葱等

又療冷飲欬芫花煎方

芫花二兩　乾薑二兩　白蜜二升

右三味擣篩二味內蜜中攪令相和微火煎令如糜服如棗核一枚日三夜一欲痢者多服（千金云療久欬嗽出第十八卷中）

千金療冷嗽方

乾薑末二兩　膠飴一斤

右二味攪令和調蒸五升米下令熱以棗大含化稍稍咽之日五夜三（出第十八卷中）

欬失聲方四首

蘇原療咽喉乾燥語無聲音桂心散方

桂心二兩　杏人三兩去皮尖雙人熬

右二味擣篩為散以蜜和綿裹如棗大含之嚥汁日三夜二忌生葱油膩（出第二卷中）

古今錄驗療卒中冷傷寒鼻塞喘欬喉中症塞失音聲者方

取芫花根一虎口切暴

右一味令病人以薦自縈就裹春芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆辣剌（郎達切）畢畢耳勿住令芫花根盡則止病必於此差

又療暴欬失聲語不出杏人煎方

杏人一升去皮尖兩人者熬　通草四兩　紫菀

五味子各三兩　貝母四兩　桑白皮五兩　蜜一升

汁糖一升　生薑汁一升

右九味切以水九升煮五味取三升去滓內杏人脂薑汁蜜糖和攪微火上煎取四升初服三合日再夜一稍稍加之忌蒜麫炙肉等（千金同）

又通聲膏方

五味子　款冬花　通草各二兩　人參一兩

杏人一升去尖皮兩人者熬　桂心　細辛

青竹皮　菖蒲　酪酥各二兩　棗膏三升

白蜜一升　薑汁一升

右十三味細切以水五升微火煎三上三下去滓內薑汁棗膏煎令調和酒服如棗二枚忌生菜生葱羊肉餳

千金同范汪深師崔氏各二方餘同　並出第十九卷中

氣嗽方八首

病源夫肺主氣候皮毛人有運動勞役其氣外泄腠理則開因乘風取涼冷氣卒傷於肺即發成嗽故爲暴氣嗽其狀嗽甚而少涎沫 出第十四卷中

古今錄驗療患氣嗽并下焦冷結方 後山方同蔡誕大夫郝係安方

紫菀　貝母　百部根　款冬花

五味子　半夏洗各五分　射干十分

芫花根皮四分熬令焦切　乾薑　橘皮各四分

杏人八分去皮尖兩人者熬　蘊子四分　白石英八分研

鍾乳十分研

右十四味擣篩以蜜和爲丸如梧桐子酒服十丸日再稍加至三十丸忌羊肉餳諸生冷等物

又方

乾地黃　桂心　山茱萸　五味子各二兩

茯苓四兩　蓯蓉　丹參　澤瀉

甘草炙　鍾乳研各二兩

右十味擣篩蜜和酒服十五丸如梧子大日增至三十丸忌海藻生葱醋物蕪荑

又酒方

丹參　乾地黃各五兩　芎藭　石斛

牛膝　黃耆　白朮　蓯蓉各四兩

防風　獨活　附子炮　秦艽

桂心　乾薑各三兩　鍾乳六分研

右十五味切以酒三斗漬七日初服一合日再稍稍加之忌食桃李雀肉生葱豬肉冷水蕪荑

又丸方

乾地黃四兩　防風　蓯蓉　澤瀉各三兩

山茱萸　丹參　五味子　茯神各二兩一方作茯苓

桂心一兩

右九味擣篩蜜和丸如梧子酒服二十丸日再稍加至三十丸忌醋物生葱蕪荑 並出第十九卷中

延年杏人煎主氣嗽方

好杏人一升去皮尖兩人者熬　糖一合　蜜五合

酥一合　生薑汁一合　貝母八合別搗末

蘇子汁一升以七合蘇子研水和濾取汁

右七味先擣杏人如泥內後六味藥合煎如稠糖取如棗大含嚥之日三但嗽發細細含之忌豬肉 蔣孝璋處

又療氣嗽煎方

貝母　紫菀　百部根炙　款冬花

甘草三兩炙各 桂心二兩

右六味切以水六升煮取一升五合去滓內後藥

生地黃汁三升 生麥門冬汁五合 生薑汁五合

白蜜五合 酥五合 白糖五合

杏人一合去皮尖雙人熬搗作膏

煎如糖一服一匙日二稍加至三匙頗定則停忌海藻菘菜蕪荑桃李醋鹹食豬肉等

又療氣嗽杏人方

杏人五合去皮尖兩人者熬 生薑汁二合 酥一合

蜜二合

右四味以水三升研杏人取汁內銅鐺中煎攪可減半內薑汁煎如稀糖內酥蜜煎令如稠糖一服一匙日三服夜一服稍加至兩匙忌豬肉

又杏人煎主氣嗽方

杏人一升去尖皮兩人者研濾取汁 酥二合 白蜜三合

右三味以水三升研濾杏人令味盡內銅鐺中煎可減半內酥蜜煎二十沸內貝母末四分紫菀末三分甘草炙末一分更煎攪如稀糖一服一匙日三夜一服以欬嗽止為度大驗忌菘菜豬肉並出第五卷中

呷欬方二首

病源呷欬者猶是欬嗽也其胸膈痰飲多者嗽則氣動痰上搏喉咽之間痰氣相擊隨嗽動息呼呷有聲謂之呷嗽其與欬嗽大體雖同至於投藥則應加消痰破飲之物以此為異耳出第十四卷中

崔氏三十年以來呷欬并療之方

莨菪子熬 南青木香 熏黃無石者

右三味等分擣篩為散以羊脂塗青紙一張以散藥著紙上卷裹之平旦空腹燒裹頭令烟出吸取十熏日中時復吸十熏日晚復吸十熏七日內禁生冷醋滑三日則差出第十六卷中

古今錄驗療呷欬書墨丸方大佛驗萬年縣令席君懿進

書墨二分 甘遂二分 葶藶子二分熬 前胡五分

大黃五分 巴豆二分去心皮熬

右六味擣篩為散巴豆葶藶別細研蜜和丸如梧子以白蜜粥清飲且空腹服三丸人弱服二丸則利水或吐三日以後更一服還如上法不過三服愈療三十年欬如利不止者以冷白飲止之吐利止後食禁生冷醋滑豬魚雞麪油酒冷水菘菜蘆筍此藥宜春夏服之有效之藥常從少起出第十九卷中

廣濟療欬嗽上氣喉中作水雞鳴

熏欬法六首

千金療欬熏法

細熟艾薄薄布紙上廣四寸後以石硫黃末薄布艾上務令調勻以荻一枚如紙長卷之作十枚先以火燒纏下去荻其烟從荻孔中出口吸取烟咽之取吐止明日復熏之昨日餘者後日復熏之三日止自然差徃得食白糜餘皆禁之古今錄驗同

又法

熏黃一兩研令細

以蠟紙并上熏黃令與蠟相入調勻卷之如前法燒

之亦如上法日一二止以吐爲度七日將息後羊肉羹補之

又法

爛青布廣四寸上布艾艾上又布青礬石末礬上布少熏黃末又布少鹽又布少豉末急卷之燒令著內燥罐中以紙蒙頭作小孔以口含取煙嚥之以吐爲度四時後息煙盡止日一二用三卷用不盡差三七日慎油膩並出第十八卷中

崔氏療久欬不差熏法

欵冬花

右一味鋪用取如雞子許用少許蜜拌花使潤內一升鐵鐺中又用一瓷椀合鐺椀底鑽一孔孔內插一小竹筒無竹葦亦得其筒稍長作椀鐺相合及插筒處皆泥之勿令漏氣鐺下著炭火少時欵冬煙自從筒中出則口含筒吸取煙咽之如覺心中少悶須暫舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏氣吸煙使盡止凡如是三日一度爲之待至六日則飽食羊肉餺飥一頓則永差出第八卷中

古今錄驗療欬嗽呼吸下闕分切煙法

鍾乳研 白石英研 人參 丹參研

雄黃各一分研 水銀二分 烏羊腎脂一具 淨紙十張

右八味各擣篩爲末以水銀投藥裹細研使入消藥羊脂熬取羅紙中令均平使厚一分散藥令周遍訖紙一頭作三分瘦弱婦人五日用半寸熏末服藥前齊五日張最後一百日忌五辛酒肉此一劑得療五十人上並皆愈忌生血物

又療欬腹脹氣上不得臥身體水腫長孫振熏法

蠟紙一張熟艾薄布遍紙上

熏黃六分 欵冬花二分

右三味并遍布艾上着一葦筒卷之寸別以繩繫之燒

下藥炒屋塵之亦可三十歲欲死則並效[illegible]一百
日除陰陽日一劑飲三寸三日盡一劑 出第十九卷中

療欬方一十四首

小品療欬方

巴豆 炮去殼勿傷肉

白飲吞下初日飲服二枚二日三枚良忌野豬肉蘆筍
千金同

又方

蜀椒 一合汗去目 杏人 去皮尖半合熬 豉 半合
款冬花 合

右四味搗蜜和爲丸晚間不食含一丸如彈丸大含一
丸則知效驗十年者五六日知良並出第十八卷中

小品療欬生薑五味子湯方

五味子 五合 生薑 八兩 紫菀 一兩 半夏 洗二兩
吳茱萸 一升 款冬花 半升 細辛 一兩 附子 炮一枚
茯苓 四兩 甘草 炙二兩 桂心 一兩

右十一味切以水一斗煮取五升分溫三服老人可服
五合忌海藻菘菜豬肉冷水羊肉餳生菜酢物生葱古今
錄驗方出第一卷中

范汪療欬方

杏人 一升去皮尖兩人者熬 紫菀 二兩

右二味先研杏人取汁使盡細切紫菀更煎少濃去滓
內蜜使稠細細飲之立定 出第三卷中

崔氏療欬方

杏人 一升去尖皮兩人熬 蘇子 一升五合 生薑汁 五合
蜜 一升 [illegible]

右四味先搗杏人作脂訖內諸藥和煎攪調三四沸藥
成含嚥如棗大日三四忌蒜麪 出第六卷中

延年紫菀飲主欬方

紫菀 十二兩 貝母 二兩 人參 一兩 橘皮 半兩

生薑 一兩 杏人 一兩半去皮尖兩人者研

右六味切以水二升五合煮取八合分三服欲再服亦
得忌鹹醋蒜麪 蒜麪並出第五卷中

必效療欬方

棗 一百二十枚去核 豉 一百粒 桃人 一百二十顆去皮尖兩人者熬令色黃

右三味合搗爲丸如棗大含之無不差

又方

雞子白皮 十四枚熬令黃 麻黃 三兩去節

右二味搗成散每服方寸匕日二食後飲下之無所忌

又方

麻黃二兩去節　紫菀二兩　貝母二兩去心

右三味擣篩蜜和丸如杏核綿裹含稍稍嚥汁盡更作日四五度

又方

杏人一百二十枚去皮尖熬　豉一百枚熬令乾　乾棗四十枚去核

右三味合擣如泥丸如杏核含嚥令盡日七八度盡更作出第一卷中

古今錄驗百部湯療欬晝夜不得眠兩眼突出方

百部根四兩　生薑半斤　細辛三兩　貝母三兩

甘草二兩炙　杏人四兩去皮尖兩人者　紫菀三兩

桂心一兩　白朮二兩　麻黃六兩去節　五味子一兩

右十一味切以水一斗二升煮取三升分三服忌桃李雀肉海藻菘菜生葱千金無杏人紫菀餘同

又療欬嗽散方

細辛　紫菀　天雄炮　石膏

款冬花　鍾乳各二分

右六味擣篩作散如大豆七聚以小竹筒吸服日三不得食生魚酱醋生菜但食糜七日欬愈乃止若大豆聚不知亦小益勿大多甚良忌生菜冷水豬肉千金同

又療欬麻黃五味子湯方

麻黃四兩去節　五味子五合　甘草二兩炙　半夏半升洗

乾薑五合　細辛一兩　桂心六兩　杏人一升去皮尖兩人者

右八味切以水一斗煮取四升去滓分溫五服日三夜二忌海藻菘菜羊肉餳生葱生菜

又療欬羊肺湯太醫史脫方

款冬花一兩　紫菀　乾薑　細辛各一兩

桂心　甘草炙各半兩　五味子半升　白前

分羊進冷　羊肺細切二升

右十味切以水八升合煮取三升去滓一服三合日三忌食鹹生菜海藻菘菜生葱並出第十九卷中

積年久欬方二十一首

病源肺感於寒微者則成欬嗽久欬嗽是連滯歲月經久不差者也凡五藏皆有欬嗽不已則各傳其府諸久欬不已三焦受之其狀欬而腹滿不欲食飲此皆寒氣聚於胃而關於肺使人多涕唾而變面浮腫氣逆故也出第十二卷中

深師療五藏欬積年劇則上氣不得臥喉中如有物醫所不療八愈丸方

桂心　細辛　乾薑　白前

甘草炙各二分　蜀椒汗　代赭　通草

款冬花　芫花熬各一分　伏龍肝　紫菀

牡蠣各二分熬

右十三味擣篩以飴糖和之擣令調和如棗核一丸含之稍稍嚥其汁盡復含令胸中熱爲候不知以意加之其久病重者晝夜二十餘丸若一歲欬者一月愈十歲欬者百日愈忌海藻菘菜生葱生菜等

又療三十年欬芫花煎方

芫花一兩 乾薑二兩末之

右二味以水五升煮芫花取三升去滓內薑末加蜜一升合煎之如糜一服如半棗日三不知加之一方不用乾薑取芫花汁蜜和煎令可丸服如梧子三丸日三

又療三十年欬氣奔上欲死醫所不療海藻丸褚仲堪方

海藻三分 麥門冬五分去心 昆布 乾薑

細辛 文蛤 桂心 蜀椒汗各二分

右八味擣篩蜜和服如杏人許夜臥一丸著舌上稍稍嚥汁盡更著一丸忌生葱生菜等

又療三十年欬嗽上氣短氣久冷五藏客熱四肢煩疼食飽則劇時有發甚不能行步夜不得臥多夢香豉丸

香豉四分熬 杏人二分去尖皮兩人熬 紫菀三分 桂心三分

甘草八分炙 乾薑二分 細辛三分 吳茱萸二分

右八味擣篩蜜和服如梧子四丸日三不知增之能含嚥汁亦佳忌海藻菘菜生葱生菜

又療三十年上氣欬嗽欵冬花丸方

欵冬花六分 桂心四分 紫菀六分 杏人四分去皮兩人熬

附子二兩炮 藜蘆四分 乾薑六分 甘草七分炙

細辛六分 防風八分 芫花六分熬 蜀椒八分汗

野葛四分去心

右十二味擣篩蜜和丸如梧子服三丸稍加日三服忌生葱辛鹹醋豬肉冷水海藻菘菜生菜狸肉等一方十四味此方忌醋有茯苓

又療三十年欬逆上氣咽喉如水雞鳴或唾膿血師藥不能瘥者方

香豉三升熬 蜀椒一升汗 乾薑一斤 豬肪三斤

右三味擣篩內肪中以水五升合豉等物熟煎毋以二合服之大効

又療三十年欬嗽七星散方

蜀椒汗 桑根白皮 芫花根皮 欵冬花

紫菀 代赭 細辛 伏龍肝各一兩

右八味擣爲散取作七星聚聚如扁豆大以竹筒口當藥上一一噏嚥之令藥入腹中先食訖即服藥日二服後三日不差復作七聚以一臠肉炙令熟以轉展藥䖃

上令藥悉在炙肉中仰臥咬咀炙肉汁令藥力歆歆皆毒徹咽中藥力盡吞肉前後所療皆不至食肉便愈若不愈復作如初法必愈乃止羊牛鹿肉皆可用勿用豬肉忌生菜 千金延年不同敵與芫花根餘同 並出第十八卷中

千金療三十年欬嗽方

蜜一斤 生薑二斤取汁

右二味先秤銅鐺知斤兩訖內蜜復秤知斤兩次內薑汁以微火煎令薑汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如棗大含一丸日三禁一切雜食

又療三十年欬方

紫菀二兩 款冬花三兩

右二味為散先食飲服一錢七日三七日愈 張文仲古今錄驗深師同

又療三十年欬方

百部根三斤

右一味擣取汁煎之如飴以溫粥飲服方寸匕日三服深師方白蜜二升更煎五六沸服三合有驗

又療久欬不差方

兎矢四十九枚 胡桐律一分 硇砂三分

右三味擣篩蜜和為丸服如梧子三丸令吐冷物盡則差並出第十八卷中

延年療久欬不差方

豬腎一具去脂膜 椒二十八顆開口者

右二味取腎一顆上作十四孔取椒內孔中兩腎總皆一十八顆了以水緩煮令熟割破細切頓食令盡有驗 張文仲同出第五卷中

崔氏療積年欬嗽中呀聲方

芫花根白皮六分熬令焦黑 貝母十二分 款冬花六分

百部根八分熬 杏人十分去皮尖熬 皂莢四分去皮子炙 五味子六分

蜈蚣一枚炙 桑白皮六分 麻黃八分去節 紫菀八分

右十一味擣篩蜜和為丸如梧子大一服五丸日再服加至十五丸煮棗汁送之 出第六卷中

必效療欬嗽積年不差者胸脇乾痛不利方

紫菀一大兩 杏人四十九枚去皮尖 酥一大合 蜜一大合

右四味紫菀及杏人各別擣先煮酥蜜攪令和內紫菀杏人研使調煎十餘沸藥成出瓷器中每日空腹服一匙丸細細含嚥之忌酒麪及豬肉等凌空道士得此方傳効不復可言

又方

莨菪子二分以水淘去浮者水煮令芽出焙乾熬令黃黑色 酥一雞子許 大棗七枚

右三味於中煎令可盞取其去皮食之日二

又方

生薑五兩 餳半升大

右二味取薑刮去皮如筭子切之置餳中微火煎熟使

細食使盡則差段侍御用之極效

又方

款冬花

右一味和蜜火燒含取煙嚥之三數度則差

又方

取莨菪子三指撮吞噙嚥之日五六度光祿李丞自

服之極神効 並出第一卷中

古今錄驗療人三十年寒冷欬逆上氣麻黃湯方

麻黃八分去節 蜀椒四分汗 細辛三分 藁本二分

杏人五十枚去皮尖兩人者碎

右五味切以水七升煮取三升分爲三服日三忌生菜

又許明療人久欬欲死方

取厚榆皮削如指大去黑刻令如鋸長尺餘內喉中

頻出入當吐膿血則愈

又香豉丸療上氣三十年欬氣久寒冷痺脾中客熱發

冷方

食茱萸一兩 甘草一兩 香豉一十枚 細辛

杏人去尖皮兩人者熬各一兩 紫菀二兩

右六味擣篩爲末別擣杏人如膏乃內末攪令勻蜜和

丸如梧子服三丸日二不知增之至五丸臥時含十

丸稍稍嚥中嚥之忌海藻菘菜生菜 出第十九卷中

久欬坐臥不得方二首

集驗療久患氣欬發時奔喘坐臥不得并喉裏呀聲氣欲

絕方

麻黃去節 杏人去尖皮兩人者碎四兩 紫菀各三兩

柴胡 橘皮各四兩

右五味切以水六升煮取二升半去滓分三服一劑不

差頻兩三劑從來用甚驗 張文仲同出第四卷中

備急療久欬奔喘坐臥不得并喉裏呀聲氣絕方

麻黃去節 乾蘇葉 橘皮各三兩 柴胡四兩

杏人四兩去尖皮兩人者碎

右五味切以水六升煮取二升半分三服服兩劑必差

甚効 張文仲同出第三卷中

欬嗽短氣方七首

病源肺主於氣候於皮毛氣虛爲微寒客於皮毛傷於肺

氣不足則成欬嗽夫氣得溫則宜和得寒則痞澀虛則氣

不足而爲寒所迫併聚於肺間不得宣發故令欬而短氣
也出第四卷中
深師療傷中欬嗽短氣腸中痛流飲咳逆宿食不消化寒
熱邪癖五內不調肉蓯蓉湯方
肉蓯蓉五兩 乾地黃四兩 大棗二十枚擘 烏頭一兩炮
甘草炙 桂心 紫菀 五味子各二兩
生薑 石膏碎綿裹 麥門冬二兩去心
右十一味切以水一十五升煮取七升去滓分爲七服
日四夜三一方用大棗五十枚水一斗二升煮取九升
忌海藻生葱菘菜蕪荑豬肉冷水

又療上氣咽喉窒塞短氣不得臥倚壁而息腰背苦痛支
脅滿不能食面色痿黃貝母飲方
貝母 石膏碎綿裹 桂心 麻黃去節
甘草炙各二兩 杏人三十枚去尖皮兩人者 生薑五兩
半夏洗五兩
右八味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻菘
菜羊肉生葱餳等
又療欬而不利胸中痞而短氣心中時悸四肢不欲動手
足煩不欲食肩背痛時惡寒海藻湯方
海藻四兩 茯苓六兩 半夏洗五合 五味子五合
細辛二兩 杏人五十枚去尖皮兩人者
右六味切以水一斗煮取三升分三服忌羊肉餳生葱
等物一方有生薑一兩千金同 出第十八卷中
古今錄驗五味子湯療逆氣欬嗽胸膈中寒熱短氣不足
方
五味子二兩 前胡六兩 紫菀 甘草炙
桂心 生薑各二兩 棗三十枚擘 山茱萸三兩
右八味切以水一斗煮取七升絞去滓服一升日三夜
三忌生葱海藻菘菜廣濟方用橘皮不用茱萸
又胡椒理中丸療欬嗽逆氣不能飲食短氣方

胡椒 蓽撥 乾薑 款冬花
甘草炙 橘皮 高良薑 細辛各四兩
白术五兩
右九味擣篩蜜和丸如梧子一服五丸日再忌桃李雀
肉生菜海藻菘菜
又寫肺湯療欬逆短氣方
人參三分 生薑四分 半夏洗五分 甘草炙一四分
橘皮十二分 竹葉二兩
右六味切以水六升煮取二升分三服此方亦療霍亂
忌羊肉餳海藻菘菜

又療欬嗽及短氣胷痛薑椒湯方

生薑　椒去目汗各一兩

右二味切以水五升煮取三升每服一合並出第十九卷中

九種欬嗽方一首

千金九種氣欬嗽欲死百病方

乾薑二分　半夏洗　細辛　紫菀

吳茱萸　芫花　茯苓　甘遂

防葵　甘草炙　人參　烏頭炮

大黃　葶藶子熬　巴豆去皮心熬　厚朴炙

杏人去皮尖兩人者熬各一分　五味子　遠志去心

枳實炙　皂角去皮子炙　當歸　桂心

前胡　菖蒲　大戟　蜀椒汗各半分

白薇三分

右二十八味擣合蜜丸先食服如梧子二丸日三以知為度不知增之忌海藻菘菜羊肉餳生葱酢物野豬肉蘆笋一方無巴豆有藺茹半分恐非出第十八卷中

欬逆及厥逆飲欬方七首

病源欬逆者是欬嗽而氣逆上也氣為陽流行腑藏宣發腠理而氣肺之所主也欬病由肺虛感微寒所成寒搏於氣氣不得宣胃逆聚還肺肺則脹氣上逆不下故為欬逆其狀欬而胷滿氣逆髆背痛汗出尻陰股膝踹脛足皆痛也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附于後養生方導引法云先以鼻內氣乃閉口欬還復以鼻內氣欬則愈向晨去枕正偃臥伸臂脛瞑目閉口無息極脹腹兩足再息頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微息定復為之春三夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六腑又云還向反望側望不息七通療欬逆胷中病寒熱出第十四卷中

深師療欬嗽短氣不得息發熱胷苦滿不得飲食五味子湯方

五味子二兩　桂心　甘草炙　細辛各一兩

乾薑一兩　紫菀二兩一方一兩　大棗二十枚擘　麻黃二兩去節

右八味切以水八升煮取三升分三服無乾薑生薑亦得忌海藻菘菜生菜生葱出第十八卷中

千金竹皮湯主欬逆下血不息方

生竹皮二兩　紫菀二兩　飴糖一斤　生地黃切一升

右四味切以水六升煮取三升分三服忌蕪荑深師同

又療大逆上氣喉咽不利止逆下氣麥門冬湯主之方

麥門冬去心一升　半夏洗一升　人參　甘草炙各二兩

粳米一合　大棗十四枚

右六味切以水一斗二升煮取六升服半升日三夜一

忌羊肉餳（海藻菘菜並出第十八卷中）

古今錄驗療厥逆藏氣有餘寒氣虛勞憂氣惑氣其人善噫脅中或寒上下無常多悲傷流四肢臍四邊常有核遊腫大便不利通氣湯方

厚朴（四兩炙） 人參 甘草（炙） 牡蠣（各二兩熬）

茯苓（四兩） 桂心 半夏（各一兩洗） 梔子（四枚）

生薑（八兩） 黃芩（三兩）

右十味切以水九升煮取三升半去滓分服七合日三夜再服若腹痛去黃芩加芍藥三兩良驗忌海藻菘菜生葱羊肉餳醋物等

又療欬逆上氣丸方

乾薑（四兩） 桂心 款冬花（各一兩） 附子（四枚炮）

五味子（二兩） 巴豆（六十枚去皮心熬）

右六味先擣上五味下篩別擣巴豆如膏內藥末以蜜和丸如梧子以一丸著牙上咬咽常暮臥時服亦可川服忌生葱豬肉蘆筍

又小胡椒丸療寒冷欬逆胸中有冷咽中如有物狀吐之不出方

胡椒（五分） 乾薑（六分） 款冬花（三分）

右三味擣篩蜜和丸如梧子大米飲下（一丸日再服以知為度禁如前法並出第十九卷中）

十欬方六首

千金問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有支欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰十欬之證何以為異師曰欲語因欬言不得竟謂之風欬飲冷食寒因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則支痛其脉反遲謂之支欬欬引脅下痛謂之肝欬欬而唾血引手少陰謂之心欬欬而涎出續續不止下引少腹謂之脾欬欬引頸項而唾涎沫謂之肺欬欬則耳無所聞引腰并臍中謂之腎欬欬而引頭痛口苦謂之膽欬欬而引舌本

謂之厥陰欬夫風欬者下之寒欬支欬肝欬灸足太衝心欬灸刺手神門脾欬灸足太白肺欬灸手太泉腎欬灸足大谿膽欬灸足陽陵泉厥陰欬灸手太陵留飲欬者其人欬不得臥引項上痛欬者時如小兒瘈瘲狀夫久欬為水欬而時發熱脉在九菽（一云卒）者非虛也此為胸中寒實所致也當吐之欬家其脉弦欲行吐藥當相人強羸無熱乃可吐耳（篇欲太泉疑太淵）

又欬家其人脉弦為有水可與十棗湯下之不能臥坐者陰不受邪故也

又夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至一百日一歲與

十棗湯方

芫花　甘遂　大戟（並熬等分）

右三味擣下篩以水一升五合煮大棗十枚取八合絞去滓內藥末強人取錢一錢羸人半錢匕頓服之平旦服而不下者明日再服藥半錢下後自補養（古今錄驗同此方仲景傷寒論方）

又欬而引脅下痛者亦十棗湯主之（用前方）

又夫酒客欬者必致吐血此坐久極飲過度所致也其脈沉者不可發汗久欬數歲其脈弱者可療實大數者死其脈虛者必苦冒也其人本有支飲在胸中故也治屬飲家

上氣汗出而欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗發汗出則厥逆冷

又欬逆倚息不得臥小青龍湯主之

麻黃（去節）　芍藥　細辛　桂心

乾薑　甘草（炙各三兩）　五味子（半升）　半夏（洗半升）

右八味切以水一斗先煮麻黃減二升去沫乃內諸藥煮得三升去滓服一升若渴者去半夏加栝樓根三兩微利者去麻黃加蕘花如雞子大熬黃若食飲噎者去麻黃加附子一枚炮去皮六片破小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘去麻黃加杏人半升去尖皮兩人者熬芫花不主利麻黃（止喘今語反之疑非仲景意）加減忌海藻菘菜生葱生菜（千金傷寒兩方此出第十八卷中）

青龍下已多唾口燥寸脈沉而尺脈微手足厥逆氣從少腹上衝胸咽手足痹其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者可與茯苓桂心甘草五味子等湯主之治其氣衝方

茯苓（四兩）　桂心（一兩）　甘草（炙三兩）　五味子（半升）

右四味切以水八升煮取三升去滓溫分三服忌海藻菘菜生葱（以下金匱之小龍湯方今於仲景方錄之）

衝氣即低而反更欬胸滿者與茯苓甘草五味子去桂心

加乾薑細辛以治其欬滿方

茯苓（四兩）　甘草（炙）　乾薑　細辛（各三兩）

五味子（半升）

右五味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘菜生菜醋等物

欬滿即止而復更渴衝氣復發者以細辛乾薑爲熱藥也服之當遂渴而渴反止者爲支飲也支飲法當冒冒者必嘔嘔者復內半夏以去其水方

茯苓（四兩）　甘草（炙）　乾薑　細辛（各三兩）

五味子（半升）　半夏（洗半升）

右六味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌
海藻菘菜生菜羊肉餳酢等
水去䐜則止其人形腫可內麻黃以其人遂痺故不內麻
黃乃內杏人也若逆而內麻黃者其人必厥所以然者以
其人血虛麻黃發其陽故也方
茯苓四兩 乾薑三兩 細辛三兩 五味子半升
半夏洗半升 杏人半升去尖皮兩人者 甘草炙二兩
右七味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三忌
海藻菘菜生菜羊肉餳酢等
若面熱如醉狀者此為胃中熱上衝熏其面令熱加大黃

利之方
細辛 甘草炙 乾薑各三兩 伏苓四兩
五味子 半夏洗 杏人各半升去皮尖 大黃三兩
右八味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服
忌海藻菘菜生菜餳酢羊肉 並出第十八卷中
久欬嗽上氣唾膿血及濁涎方五首
病源久欬嗽上氣者是肺氣虛極風邪停滯故其病積月
累年久不差則胷背痛面腫甚則唾膿血也 出第十四卷中
深師療肺氣不足欬逆唾膿血咽喉悶塞胷滿上氣不能
飲食臥則短氣補肺湯方

款冬花二兩 桂心二兩 鍾乳二兩 乾薑二兩
白石英二兩 麥門冬去心四兩 五味子三兩 粳米五合
桑白皮根一斤 大棗百枚擘
右十味切以水一斗二升先煮桑白皮棗令熟去滓內
諸藥取二升二合分三服忌生蔥等 千金同
又療欬逆上氣時時唾濁但坐不得臥皂莢丸方
長大皂莢一挺去皮子
右一味搗篩蜜和服如梧子一丸日三夜一以大棗膏
和湯下之 千金經心錄延年同此本仲景傷寒論方一
又療欬逆上氣吐膿或吐血胷滿痛不能食補肺湯方

黃耆一兩 桂心 乾地黃 茯苓
厚朴 乾薑 紫菀 橘皮
當歸 五味子 遠志去心 麥門冬去心各三兩
甘草炙 鍾乳 白石英各二兩 桑白皮根
人參各三兩 大棗二十枚擘
右十八味切以水一斗四升煮取四升分溫四服日三
夜一忌海藻菘菜生蔥醋物 千金同並出第十八卷中
古今錄驗療寒冷欬嗽上氣胷滿唾腥膿血四味石鍾乳
散方
鍾乳研 白石英 款冬花 桂心各一分

右四味擣合下篩以筒吸之如大豆許一匕聚安食日二不知稍增之數試有驗當作七聚遂吸之忌生葱生冷
集驗同出第十九卷中

必効療上氣唾膿血方

灸兩乳下黑白際各一百壯良千金同

咳嗽膿血方一十一首

病源咳嗽膿血者損肺傷心故也肺主氣心主血肺感於寒微者則成欬嗽傷於陰脈則有血血與氣相隨而行欬嗽極甚傷血動氣俱乘於肺以津液相搏蘊結成膿故欬嗽而有膿血也出第十四卷中

廣濟療瘦嗽欬吐膿損肺方

人參二分　瓜蒂三分　杜蘅五分

右三味擣篩為散平旦空腹以熟湯服方寸匕當吐痰水惡汁一二升吐已復煮白粥食淡水未盡停二日更與一服忌生冷油膩猪魚服後古今錄驗崔氏備急二分人參一分服一錢匕出第二卷中

深師療欬逆唾膿血雞子湯方

雞子一枚　甘草二分炙　甘遂一分　大黃二分

黃芩二分

右五味切以水六升煮取二升去滓內雞子攪令調盡飲之良忌海藻菘菜

又療傷肺唾血方

茅根

右一味擣篩為散服方寸匕日三亦可絞取汁飲之主熱渴出第四卷中

刪繁療肺偏損胸中應肺偏痛唾血氣欬欬冬花散方

欬冬花　當歸各六分　桂心　芎藭

五味子　附子七分炮各　細辛　貝母各四分

乾薑　乾地黃各八分　白朮　甘草炙

杏人去尖皮各五分　紫菀二分

右十四味擣篩為散清酒服方寸匕日二服忌生葱生菜桃李雀肉海藻菘菜猪肉蕪荑出第五卷中

千金百部丸主諸欬不得氣息唾膿血方

百部根二兩　升麻半兩　桂心　五味子

甘草炙　紫菀　乾薑各一兩

右七味擣篩蜜和丸如梧子服三丸日三以知為度忌生葱海藻菘菜等物

又療肺傷欬唾膿血腸澀背氣不欲食惡風目闇䀮䀮足脛寒湯方

乾地黃切半升　桑白皮切二升　芎藭切一升　白膠五兩

桂心二升 人參 紫菀各二兩 大棗二十枚擘
生薑五兩 飴糖一升 大麻人一升 大麥三升
右十二味切以水一斗五升煮麥減取一斗去滓內藥
煎取三升分三服忌生葱
又療肺病欬嗽膿血及唾涕血出不止方
好酥五十斤
右三遍鍊停經宿出醍醐服一合日三以差止
又方
三遍鍊酥如雞子黃適寒溫灌鼻中晝二夜一
又療欬嗽喘息喉中如有物唾血方
杏人一升去尖皮兩人者 猪脂二合 糖一升
生薑汁二升 蜜一升
右五味先以猪膏煎杏人黃黑出以紙拭令淨擣如膏合煎五物令可丸服如杏核日夜六七漸加之並出第十八卷中
古今錄驗瀉肺湯療肺中膿欬唾血氣急不安卧方
葶藶 麻黃去節 細辛 椒去目閉口汗
當歸各一兩
右五味切以水七升煮取三升分為三服日三微汗或唾膿血忌生菜 一方有生薑一兩
又羊肺湯療欬晝夜無間息氣欲絕肺傷唾血方

鍾乳三兩 牡蠣熬 桂心六兩 射干
桃人去皮尖 知母 橘皮 百部根
五味子各二兩 生薑六兩 白石英 半夏洗各五兩
款冬花 甘草炙 厚朴二兩各炙 羊肺一具
右十六味切先以水二斗三升煮羊肺取一斗去肺內諸藥煮取三升分四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳生葱出第十九卷中
又欬嗽膿血方四首
論曰夫欬嗽膿血者肺損於寒微則成欬嗽欬嗽極甚傷於經絡血液蘊結故有膿血氣血俱傷故連滯積久其血黯與膿相雜而出也出第十四卷中
廣濟療積年欬嗽膿血方
莨菪二升 大棗一百顆青州者
右二味以水三大升取馬糞燒火煎熬之候令汁盡取棗早晨服一枚日中一枚日暮一枚不覺漸加口乾胸熱則以為度不吐不利忌並如前法
療勞經年不差氣喘欲絕傷肺見血方
桑白皮切五合 白羊肺一具切 芍藥十分 款冬花六分
茯苓十二分 貝母十二分 麥門冬六分 杏人六分去尖皮熬為脂
升麻十二分 生地黃汁一升 黃芩十二分 蜜一升

右十二味切以水一斗煮取三升去滓內杏人脂生薑汁蜜等微火上煎如魚眼沸攪勿停手取二升二合煎成淨綿夾布濾每食後含一合日夜三四度老小以意減之微暖含之佳忌生冷油膩炙煎肉等出第二

深師療欬逆氣喘不息不得眠唾血嘔血短氣連年欬冬花丸方

欵冬花十八分 紫菀十二分 杏人八分去尖皮熬

蛤蚧十分 人參二分 甘草三分炙 蜀椒三分汗

天門冬六分去心 乾薑 桂心 乾地黃各二分

右十味擣篩蜜和如彈丸含稍稍嚥汁日四夜再[illegible]

良忌海藻菘菜生葱蕪荑鯉魚 出第十八卷中

近効療久欬兼唾血方

白前三兩 桑白皮 桔梗各二兩 甘草一兩炙

右四味切以水二大升煮取半大升空腹頓服若重者十數劑忌豬肉海藻菘菜李子等方

欬嗽唾粘方二首

廣濟療肺熱欬嗽涕唾多粘甘草飲子方

甘草六分炙 欵冬花七分 豉心一合 生麥門冬八分去心

葱白一握 檳榔子七顆合碎 桔梗六分 地黃汁半升

右八味切以水六升煮取二升絞去滓下地黃汁分溫三服如人行四五里進一服不利忌生菜熱麪炙肉海藻菘菜豬肉蕪荑 出第二卷中

延年紫菀飲主欬嗽氣喘涕唾粘之風虛煩發無時呂宜服此方

紫蘇 貝母各二兩 紫菀一兩 麥門冬一兩去心

棗五枚擘 葶藶子一兩熬令黃別擣 甘草一兩炙

右七味切以水六升煮取二升分為四服每服如人行七里忌豬魚肉蒜海藻菘菜 出第五卷中

許仁則療欬嗽方一十二首

許仁則論欬嗽病有數種有熱嗽有冷嗽有肺氣嗽有飲

氣嗽熱嗽者年少力壯體氣充滿將息傷熱積熱所成故有此嗽此但食飲取冷兼以藥壓之自歇冷嗽者年衰力弱體氣虛微如復寢食傷冷故成冷嗽此亦但將息以溫藥退温藥則當平復肺氣嗽者不限老少宿多上熱後因飲食將息傷熱則常嗽不斷積年累歲肺氣衰便成氣嗽此嗽不早療遂成肺痿若此將成多不救矣飲氣嗽者由所飲之物停澄在胷水氣上衝衝入於肺肺得此氣便成嗽久而不除漸成水氣若作此病亦難療之熱嗽之狀更無其餘但遇於熱便發此者宜合生地黃等七味湯服之方

生地黃切一升 生薑切二合 桑白皮根切一升

射干切二兩 乾葛切六合 紫蘇三合 竹瀝一升

右藥細切七味以水一斗煮取三升去滓內竹瀝攪調

每食後良久則服之分一劑作四服若極者則宜合服

之病輕者三數劑則差忌蕪荑

又依前生地黃等七味飲雖得暫差於後又發宜合紫菀

等十味丸方

紫菀五分 桑白皮六合 射干四兩 百部根五兩

麻黃去節二兩 乾葛五兩 地骨皮 升麻各四兩

乾地黃六兩 芒消六兩

右藥擣篩蜜和丸如梧子以竹瀝下之初服十五丸日

再服稍稍加至三十丸忌蕪荑

又冷嗽之狀但遇諸冷此疾便發有如此者宜合大棗等

七味湯主之方

大乾棗三十枚擘 桂心四兩 杏人一百枚去尖皮兩人研

細辛五兩 吳茱萸 當歸各三兩

右藥切以水八升煮取二升六合去滓溫分三服每服

如人行十里久服一劑覺得力至三四劑亦佳隔三四

日服一劑此湯元欠一味忌生葱生菜

又依前大乾棗湯服之雖可未能斷其根遇冷便發宜合

當歸等十味丸服之方

當歸切 細辛 甘草炙各五兩 桂心

吳茱萸 人參各三兩 蜀椒三合汗 橘皮

乾薑各四兩 桑白皮八兩

右十味搗篩蜜和丸煮乾棗飲下之初服十丸日再服稍

稍加至二十丸如梧子服此丸經三五日覺益氣嗽瘥後

長服之數口粥食壓之忌海藻菘菜生葱生菜

又肺氣嗽經久將成肺痿其狀不限四時冷熱晝夜欬常

不絕唾白如雪細沫稠粘喘息氣上乍寒乍熱發作有時

脣口喉舌乾焦亦有時唾血者漸覺瘦悴小便赤顏色青

白毛聳此亦成蒸有此狀者宜合白前等七味湯服之兼

有麻黃等十味丸桑白皮等十味煎

又肺氣嗽經久有成肺癰者其狀與前肺痿不多異但唾

悉成膿出無多少有此病者於白前湯中加半夏五兩黃

耆一兩以水一斗煮取二升八合於麻黃丸中加黃耆五

兩苦參六兩芍藥三兩於桑白皮煎中加黃耆切三升共

桑白皮地骨皮同煎又加水三升同煎忌羊肉餳

白前湯方

白前三兩 桑白皮三兩 生地黃一升 茯苓三兩

地骨皮四兩 麻黃去節二兩 生薑六兩

右藥切以水八升煮取二升六合去滓加竹瀝五合分
溫四服食後服之晝三夜一每得力重合服五六劑
隔三日服一劑忌醋蒜麪炙

又依前白前等七味湯服覺可根本未除宜合麻黃等
十味丸服之方

麻黃去節一兩　白前二兩　桑白皮六兩　射干四兩
白薇二兩　百部根五兩　乾地黃六兩　地骨皮五兩
橘皮二兩

右藥搗篩蜜和丸煮桑白皮飲下之初服十丸日再服
稍稍加至十五丸丸如梧子大本欠一味忌蕪荑

又凡病在胸膈上者宜飽滿而在夜肺臟居上此是病在
上已盡服丸夜無憑準宜合桑白皮汁等十味煎夜含
咽之方

桑白皮一升切　地骨皮三升切
二味用水七升熟煎取三升汁去滓澄清
生地黃汁五升　生麥門冬汁二升　生薑汁一升　竹瀝三升
生葛根汁一升　白蜜一升　牛酥三合　大棗膏一升

右九味先以上取生地黃汁以下生薑汁及上和
煎減半次內桑白皮等二物汁和煎之三分減一入酥
蜜棗膏攪之勿停手得如稠餳狀煎成訖器貯別

服之每夜欲卧時取一胡桃大含之細細咽汁稍加至
雞子大欲盡日間夜服亦得忌蕪荑

又欬氣嗽經久不已漸成水病欬亦不限日晚夜嗽
不止遇諸動嗽物便氣困漸甚者乃至浸眠喘氣即欲
閉汗出大小便不利吐痰飲涎沫無復窮限氣上喘急
肩息每旦眼腫不得平眠有如此者宜合細辛等八味湯
葶藶子十五味丸服之

細辛　半夏洗　桂心　桑白皮各五兩
乾薑　當歸各四兩　芒消六兩　杏人六合去皮尖兩人者

右藥切以水九升煮取三升去滓內芒消分溫三服每

服如人行十里久當得快利後好將息經三四日合丸
服之忌生葱生菜羊肉餳

丸方

葶藶子六合熬　細辛　五味子各五兩　乾薑
當歸各四兩　桂心　人參　丁香
大黃　商陸根各三兩　橘皮四兩　桑白皮六兩
鼈甲炙二兩　大腹檳榔十枚　麻黃二兩去節

右藥搗篩蜜和丸煮桑白皮飲下初服十丸日再服稍
加至十五丸如梧子大若利則減秘則加以大便通滑
為度所將得暢湯亦佳忌生葱生菜

又依前細辛等八味湯葶藶子等十五味丸不覺可漸成
水病餘一如前說更加大小便秘澀頭面身體浮腫宜合
大棗等三味丸服之方
大棗六十枚擘去核　葶藶子一升熬　杏人一升去尖皮兩人者熬
右葶合擣令如膏可作丸如硬燥不相著細細下蜜作
丸依前以桑白皮飲下之初服七八丸日再服稍稍加
之以大便通爲度病重者時令鴨溏佳亦有以前二味
作湯服之
又依前大棗等三味丸服雖覺氣發欬然病根深固藥力
微弱且停服大棗丸合巴豆丸五味細細服之蕩滌宿病

方
巴豆人二十枚去心皮熬　杏人一百顆去尖皮兩人者熬　牽牛子五合熬
葶藶子六合熬　大棗六十枚擘去核
右藥合擣一如前大棗丸法還以桑白皮飲下之服三
四丸日再服如利即減秘即加常以大便調爲候病甚
時時取鴨溏亦佳忌蘆筍野豬肉　吳昇同出丁卷中

雜療欬嗽方三首

古今錄驗療六腑皆令人欬肺居外而近上合於皮毛
皮毛喜受邪故肺獨易爲嗽也邪客於肺則寒熱上氣喘
汗出欬動肩背喉鳴甚者唾血肺欬經久不已傳入大腸
其狀欬則遺矢腎欬者其狀引腰背痛甚則欬涎腎欬經
久不已傳入膀胱其狀欬則遺汗肝欬者其狀左脅痛甚
者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出
心欬者其狀引心痛喉中介介如鯁狀甚者喉痺咽腫心
欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脅
下痛陰陰引肩背甚者不得動動便欬劇脾欬經久不已
則傳入胃其狀欬即嘔甚則長蟲出久欬不已則三焦受
之三焦欬之狀欬而腹滿不能食飲此皆聚於胃關於肺
使人多涕唾而面浮腫氣逆也又非時有風寒冷人觸冒
解脫傷皮毛間入腑臟爲欬上氣如此也又非時忽然暴

寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或胸脅叉痛欬唾有血
者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰
也因欬服溫藥欬尤劇及壯熱吐膿血汗出惡寒是也天
有非時寒者急看四時方也
又療欬嗽上氣時時嘔白唾沫數十歲者方
吳茱萸　五味子　大黃　桂心
甘草炙　細辛　人參　紫菀
款冬花各一兩　大戟　竹茹各三分
右十一味切以水一斗煮取三升分爲三服亦療陰令
欬至良忌海藻菘菜生菜生葱　深師同出第十九卷中

深師療諸欬心中逆氣氣欲絶杏人煎方

杏人（四兩去皮尖） 猪膏二斤 白蜜二升 生薑汁三升

右四味著銅器中於微火上先煎薑汁次内蜜膏令如餳置器著地乃内杏人末復令得一沸煎成服如棗大一丸含之日三不知稍稍增之

又療氣上逆滿或氣不通病悶喘嘔蘇子湯方

蘇子一升 乾薑三兩 半夏四兩洗 桂心 人參各一兩 橘皮 茯苓各三兩 甘草一兩炙

右八味切以水八升煮取二升半分為三服若虛熱去乾薑用生薑六兩加黄芩二兩忌海藻菘菜羊肉餳生

葱酢等物並出第十八卷中

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元校正

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔

覆勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第九卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十卷目録（肺痿肺氣上氣 凡一十八門）

肺痿方一十首
肺氣客熱方二首
肺熱兼欬方七首
肺虛寒方三首
肺氣不足口如含霜雪方四首
肺脹上氣方四首
肺氣積聚方二首
肺癰方九首
大腸論二首
大腸熱實方三首
大腸虛寒方三首
皮虛實方二首
上氣方九首
卒上氣方六首
久上氣方四首
上氣胸滿方二首
上氣欬身面腫滿方四首
上氣喉中水雞鳴方一十二首
因食飲水上氣方四首

卒短氣方四首

上氣及氣逆急牽繩不得臥方八首

欬嗽上氣方八首

欬逆上氣嘔吐方四首

上氣欬嗽多唾方三首

上氣欬方一首

久欬嗽上氣方三首

欬逆上氣方五首

雜療上氣欬嗽方四首

唐王燾先生外臺秘要方第十卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進
新安後學程衍道敬通父訂梓
男能錫爲光父全校

肺痿方一十首

千金論曰寸口脈數其人病欬口中反有濁唾涎沫出何也師曰此為肺痿之病肺痿之病何從得之師曰病熱在上焦因欬為肺痿或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難被駃藥下利重亡津液故得肺痿又寸口脈不出而反發汗陽脈早索陰脈不澀三焦踟蹰入而不出

身體反冷其內反煩多唾唇燥小便反難此為肺痿傷於津液便如爛瓜亦如豚腦但坐發汗故也其病欲欬不得欬欬則出乾沫久久小便不利甚則脈浮弱肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者上虛不能制下故也此為肺中冷必眩師曰肺痿欬唾咽燥欲飲水者自愈自張口者短氣也出第十七卷中

仲景傷寒論療肺痿吐涎唾不欬者其人不渴必遺溺小便數所以然者以上虛不能制下故也此為肺冷必眩多涎唾

乾薑湯主之以溫其臟方

甘草四兩炙　乾薑二兩

右二味切以水三升煮取一升半分温二服服湯已小
温覆之若渴者服消渴忌海藻菘菜
又療肺痿涎唾多心中温温液液者炙甘草湯方
甘草四兩炙 生薑三兩去皮 人參二兩 地黄一斤
阿膠三兩炙 大麻子人半升 大棗四十枚 麥門冬半斤去心
桂心二兩
右九味切以美酒七升水八升相和先煮八味取四升
絞去滓內膠上微火烊銷温服七合日三夜一並出第八卷中
肘後療肺痿欬嗽吐涎沫心中温温咽燥而渴者方一云不渴
生天門冬擣取汁一升 酒一升 飴糖一斤 紫菀四合末
右四味合銅器中於湯上煎可丸服如杏人一丸日三

忌鯉魚范汪經心録同並出第一卷中
又療肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴方一云不渴
生薑五兩 人參三兩 甘草二兩炙 大棗十二枚擘
右四味切以水五升煮取一升半分再服忌海藻菘菜
仲景傷寒論備急范汪千金經心録同
又療肺痿欬嗽涎沫心中温温咽燥而渴方一云不渴
生薑五兩 甘草一兩炙 大棗十二枚擘
右三味切以水五升煮取一升半分再服一方乾薑三
兩代生薑忌海藻菘菜文仲千金古今録驗同深師去温脾湯范汪亦同

又療肺痿時寒熱兩頰赤氣急方
童子小便每日晚取之去初末少許小便可有五合
取上好甘草量病人中指節男左女右長短截之炙
令熱破作四片內小便中置於閑淨處露一宿器上
横一小刀明日平旦去甘草頓服之每日一劑其童
子勿令喫五辛忌海藻菘菜熱麪並出第四卷中
刪繁療虚寒喘鳴多飲逆氣嘔吐半夏肺痿湯方
半夏一升洗 母薑一斤 橘皮一斤 白朮八兩
桂心四兩
右五味切以水九升煮取三升去滓分温三服忌羊肉
餳桃李雀肉生葱一方有桑白皮切一升

又療凡虚寒肺痿喘氣乾地黄煎方
乾地黄五兩 桑根白皮切二升 芎藭五兩 桂心
人參各二兩 大麻人一升炒
右六味切以水九升先煮五味取三升去滓內大麻人
煎數沸分三服忌生葱蕪荑並出第二卷中
千金療肺痿涎唾多出心中温温液液甘草湯方
甘草二兩炙
右一味切以水三升煮取一升半分温三服忌海藻菘
菜范汪同

又療肺痿吐涎沫桂枝去芍藥加皂莢湯方

桂心三兩 甘草二兩炙 大皂莢一挺去皮子炙 生薑三兩

大棗十二枚擘

右五味切以水七升微火煮取三升分三服忌生葱海藻菘菜范汪經心錄同並出第十七卷中

肺氣客熱方二首

延年百部根飲主肺氣客熱暴傷風寒嗽不安方

百部根一兩 天門冬二兩去心 紫菀一兩 貝母一兩

乾葛 白前 橘皮各一兩 生薑一兩

葱白一切三合 豉三合

右十味切以水六升煮取一升七合去滓分溫三服如人行

嗽任情亦可分為四服徐徐食亦得禁生冷熱麵魚蒜出第五卷中

古今錄驗療肺客熱并肝心家氣人參湯方

桂心 甘草炙各二兩 人參 乾薑

防風各二兩 白朮一兩

右六味切以水八升煮取三升分三服日三宜溫忌桃李雀肉生葱海藻菘菜出第二十一卷中

肺熱兼欬方七首

删繁療肺熱氣上欬息奔喘橘皮湯方

橘皮 杏人四兩去尖皮 柴胡 麻黃去節各三兩

乾蘇葉二兩 母薑四兩 石膏八兩

右七味切以水九升先煮麻黃兩沸除沫下諸藥煮取三升去滓分三服不差甘服出第五卷中母薑千金云宿薑千金同

千金療肺熱悶不止胸中喘急驚悸客熱來去欲死不堪服藥泄胸中喘氣方

桃皮一斤 芫花一斤

右二味以水四斗煮取一斗去滓以故布手巾內汁中薄胸溫四肢不盈數日即歇

又凡右手寸口氣口以前脈陰實者手太陰經也病苦肺脹汗出若露上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀名肺熱實也

又療肺熱實胸憑仰息泄氣除熱湯方

枸杞根皮二升 白前三兩 石膏八兩碎綿裹 杏人三兩去尖皮研

橘皮 白朮各五兩 赤蜜七合

右七味切以水七升煮取二升去滓下蜜更煮兩三沸分三服忌桃李雀肉等

又療肺熱言音喘息短氣好唾膿血方

生地黃切二升 石膏八兩 淡竹茹如雞子大一枚

杏人四兩去皮研 羚羊角屑三兩 芒消三兩 赤蜜一升

麻黃五兩去節 升麻三兩

右九味以水七升煮取二升去滓下蜜杏酥湯分三服忌蕪荑古今錄驗第十七卷中

延年天門冬煎主肺熱兼欬聲不出方

生天門冬汁一升 橘皮二兩 生地黃汁五升 白蜜五合

牛酥三合 白糖五兩 杏人一升去尖皮 貝母

紫菀 通草各三兩 百部根 白前

甘草炙 人參各二兩

右十二味切以水六升煮貝母等藥取二升五合去滓內天門冬地黃汁煎可減半內酥蜜生薑等煎令可丸稍稍取如雞子黃大含嚥之日四五度忌鯉魚蕪荑海

藻菘菜等 蘇文仲處

又地黃麥門冬煎主肺熱兼欬方

生地黃汁二升 生麥門冬汁三升 生薑汁一合 酥二合

白蜜二合

右五味先煎地黃麥門冬薑汁等三分可減一分內酥蜜煎如稀餳內貝母末八分紫菀末四分攪令調一服一匙日二服夜一服忌蕪荑

又天門冬煎主肺間熱欬咽喉塞方

天門冬二兩去心 麥門冬二兩去心 款冬花一兩 貝母一兩

紫菀一兩 茯苓二兩 升麻二兩 生薑汁三升

蜜一升 酥一合 地黃汁二升

右十一味切以水八升煮七物取一升去滓內生薑汁地黃汁煮取一升內蜜酥於銀器中加湯上煎令成丸一服如彈丸一枚含嚥日夜三五丸忌醋物蕪荑鯉魚等

蘇仁楚處

又羚羊角飲主肺熱胸背痛時時乾欬不能食方

羚羊角二兩 貝母 生薑 茯苓各二兩

橘皮 人參 芍藥各二兩

右七味切以水五升煮取一升八合去滓分溫三服每服如人行八九里久更服禁生冷蒜麵醋出並第五卷中

肺虛寒方三首

刪繁療肺虛寒癘風所傷聲音嘶塞氣息喘憊欬唾酥蜜膏酒止氣欬通聲方

酥 崖蜜 飴糖 生薑汁

生百部汁 大棗肉研為脂 杏人去皮尖

甘皮末五具

右八味合和微火煎常攪三上三下約一炊久薑汁并百部汁各減半停下溫清酒一升服方寸匕細細嚥之日夜三千金同出第六卷中

千金療肺虛寒癘風傷語音嘶塞氣息喘憊嗽唾方

猪脂三具 大棗一百枚去核 好酒五升

右三味以酒漬二味秋冬七日春夏三日生布絞去滓二七日服盡忌鹽無猪脂以羊脂代肘後張文仲備急同出第十八卷中

又凡右手寸口氣口以前脉陰虛者手太陰經也病苦少氣不足以息嗌乾不津液病名曰肺虛寒也

又療肺虛寒則聲嘶傷語言用力戰掉緩弱虛瘠風入肺防風散方

防風 獨活 芎藭 秦椒汗

黃耆各七分 附子炮七分 乾薑七分 石膏研

天雄炮 甘草炙 山茱萸 麻黃去節

五味子各六分 秦艽 桂心 山藥

杜仲 人參 防己各五分 貫衆二枚

紫菀 菊花各四分 細辛五分 當歸五分

右二十四味擣篩爲散酒服方寸匕日再忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜一方無石膏當歸出第十七卷中

肺氣不足口如含霜雪方四首

廣濟療肺氣不足寒從背起口如含霜雪語無聲音劇者唾血苦寒五味子湯方

五味子三兩 大棗五十枚擘 桑根白皮一升 藁本二兩

鍾乳三兩 款冬花二兩 雞蘇二兩

右七味切以水九升煮取三升分溫三服每服如人行七八里進一服忌猪魚炙肉熱麪陳臭等物自方甚良

又療肺氣不足逆氣胸滿上迫喉咽閉塞短氣連唾相屬寒從背起口如含霜雪語無音聲劇者唾血腥臭或歌或哭乾嘔心煩耳聞風雨聲皮毛悴面白紫菀湯方

紫菀 五味子 生薑六分 白石英研綿裹

款冬花 桂心 人參各二兩 鍾乳研綿裹

麥門冬去心 桑根白皮各一兩 大棗十枚擘 粳米一合

右十二味切以水一斗五升先煮桑根白皮粳米取九升去滓內諸藥煎取三升去滓分溫三服每服相去如人

行七八里久忌生葱熱麪炙肉并出第二卷中千金無紫菀人參

深師療肺氣不足逆滿上氣咽喉中閉塞短氣寒從背起口中如含霜雪語言失聲甚者吐血補肺湯方

五味子三兩 乾薑二兩 款冬花二兩 桂心一兩

麥門冬一升去心 大棗一百枚擘 粳米二合 桑根白皮一斤

右八味切以水一斗二升先煮棗并桑白皮粳米五沸後內諸藥煮取三升分三服忌生葱千金同出第十八卷中

集驗補肺湯療肺氣不足欬逆短氣寒從背起口中如含霜雪語無音聲而渴舌本乾燥方

五味子 白石英研綿裹 鍾乳同上 桂心

橘皮　桑根白皮各二兩　[illegible]一合　茯苓
竹葉　款冬花　紫菀各二兩　大棗十五枚
杏人五十枚去兩人尖皮　蘇子一升　生薑五兩　麥門冬四兩去心
右十六味切以水一斗三升先煮桑白皮[illegible]去
滓內諸藥煮取四升分二服日再夜一忌大酢生葱
[illegible]卷中

肺脹上氣方四首

集驗療肺脹氣急欬嗽喘麤眠臥不得極重恐氣欲絕
紫菀湯方
紫菀六分　甘草八分炙　檳榔七枚　茯苓八分
葶藶子三合熬湯成下

右五味切以水六升煮取二升半絞去滓分溫三服每
服如人行四五里久進之以快利為度忌生葱菜熱麵
海藻菘菜大醋蒜粘食出第二卷中
仲景傷寒論肺脹者欬而上氣煩躁而喘脈浮者以心下
有水宜服小青龍湯加石膏主之方
麻黃三兩去節　五味子半升　石膏綿裹　乾薑
芍藥　細辛各三兩　桂心　甘草各三兩炙
半夏半升洗
右九味切以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮
取二升半去滓溫服強人一升瘦人及老小以意減之
日三夜一忌生葱生菜海藻菘菜羊肉餳等
又肺脹者病人喘目如脫狀脈浮大也肺脹而欬者越婢
加半夏湯主之方
大棗十五枚擘　半夏半升洗　生薑三兩　麻黃六兩去節
甘草二兩炙　石膏半斤
右六味切以水六升先煮麻黃三二沸去沫內諸藥煮
取二升去滓溫服八合日三不知更作之忌海藻菘菜
羊肉餳並出第十八卷中
深師療欬而上氣肺脹其脈浮心下有水氣小青龍湯加
石膏二兩設若有實者必躁其人常倚伏小青龍湯方用前

仲景方
千金療肺脹欬嗽上氣咽燥脈浮心下有水麻黃湯方
麻黃去節　芍藥　生薑五兩　細辛
桂心各三兩　半夏半升洗　石膏四兩　五味子半升
右八味切以水一斗煮取三升分三服忌生葱羊肉餳
等集驗同出第十七卷中
肺氣積聚方二首
救急療肺氣積聚心脇下滿急發即欬逆上氣方
麻黃三兩去節　杏人去雙人尖皮　柴胡　生薑

半夏湯洗十　葶藶子熬研如脂各四兩　杏人去皮尖兩仁者熬研

右八味切以水一斗煮取二升八合去滓分温三服每服相去如人行八九里久七日忌食生冷猪魚羊肉此方服一劑訖將息滿七日則服後方忌羊肉餳

又方

茯苓　乾蘇葉　橘皮　麻黃去節各三兩

杏人去皮尖兩仁者　柴胡　生薑各四兩

右七味切以水一斗煮取二升七合去滓分温三服每服如人行八九里久禁酢物蒜熱麪猪肉五日服一劑

並出第六卷中

肺癰方九首

千金論曰病欬唾其脈數實者屬肺癰虛者屬肺痿欬而口中自有津液舌上胎滑此為浮寒非肺痿也若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰也問曰病者欬逆師脈之何以知此為肺癰當有膿血吐之則死後終吐膿死其脈何類何以別之師曰寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肺其人則欬口乾喘滿咽燥不渴唾而濁沫時時振寒熱之所過血為凝滯蓄結癰膿吐如米粥始萌可救膿已成則難治寸口脈數趺陽脈緊寒熱相搏故振寒而欬趺陽脈浮緩胃氣如經此為肺癰趺陽脈浮緩少陰微緊微為血虛緊為微寒此為鼠乳其病屬肺也問曰振寒發熱寸口脈滑而數其人飲食起居如故此為癰腫病醫反不知而以傷寒治之應不愈也何以知有膿膿之所在何以別知其處師曰假令在胸中者為肺癰其脈數欬唾設膿未成其脈自緊數緊去但數膿為已成也出第十七卷中

仲景傷寒論欬胸中滿而振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者肺癰也桔梗白散主之方

桔梗三分　貝母三分　巴豆一分去皮心熬研作脂

右三味擣篩強人飲服半錢匕羸人減之若病在膈上者必吐膈下者必利若利不止者飲冷水一杯則定忌猪肉蘆筍等出第十八卷中

集驗療胸中滿而振寒脈數咽燥而不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥是為肺癰桔梗湯方

桔梗二兩下今古今方云用一兩　甘草二兩炙

右二味切以水三升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差范汪文仲千金備急古今錄驗范汪同此本仲景傷寒論方出第四卷中

千金療欬有微熱煩滿胸心甲錯是為肺癰黃昏湯方

黃昏手掌大一枚即合歡木皮

右一味切以水三升煮得一升分再服范汪同

又肺癰喘不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之兼療胸脇脹滿一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭酸辛欬逆上氣喘鳴迫塞方

葶藶二兩熬令色紫

右一味擣令可丸以水三升煮擘大棗二十枚得汁二升內藥如彈丸一枚煎取一升頓服小品云分再服仲景傷寒論范汪同並出第十七卷中

備急療腸癰肺癰方

升麻　白歛　漏蘆　芒消各二兩　黃芩　枳實炙　連翹　蛇銜各三兩　梔子二十枚擘　蒴藋根四兩

右十味擣令細以水三升漬經半日以豬脂五升煎令水氣竭去滓傅之日二若交急合水煎出第四卷中

古今錄驗療肺癰方

薏苡人一升　醇苦酒三升

右二味煮取一升溫令頓服有膿血當吐范汪經心錄同

又療肺癰葦莖湯方

剉葦一升　薏苡人半升　桃人五十枚去尖皮兩人者　瓜瓣半升

右四味㕮咀以水一斗先煮葦令得五升去滓悉內諸

藥煮取二升分再服當吐如膿仲景傷寒論葦莖切二升先以水二斗煮取五升千金范汪同千金

又療腸癰經時不差桔梗湯方

桔梗二兩　白朮二兩　當歸一兩　地黃二兩　甘草炙　敗醬　薏苡人各二兩　桑白皮切一升

右八味切以水一斗五升煮大豆四升取七升去豆內清酒三升合諸藥煮之取三升去滓服六合日三夜再忌豬肉蕪荑桃李雀肉海藻菘菜等

又療腸癰生地黃汁湯方

生地黃汁一升　當歸　甘草炙　白石英綿裹　人參各一兩

附子一分炮　白小豆二十顆　白雞一頭男用雌女用雄如食法一作鵝

右八味切以水一斗五升煮雞取七升汁去滓內地黃汁諸藥等煮取二升去滓分服六合日三夜二忌蕪荑海藻菘菜冷水豬肉等並出第十一卷中

大腸論一首

論曰大腸腑者主肺也鼻柱中央以為候也肺合氣於大腸大腸者為行道傳瀉之腑也號監倉掾重二斤十二兩長一丈二尺廣六寸當臍右迴疊積還反十二曲貯水穀一斗二升主十二時定血脈和利精神又曰肺前受病移於大腸肺欬不已惟大腸受之大腸欬則遺失便

利肺應皮皮厚即大腸厚皮薄即大腸薄皮緩腹裏大者大腸緩而長皮急者大腸急而短皮滑者大腸直皮肉不相離者大腸結 刪繁同

又病源云人腸絕不療何以知之泄痢無度痢絕則死實即腸熱熱則脹滿不通口為生瘡食下入腸則腸實而胃虛下胃則胃實而腸虛所以實而不滿乍實乍虛乍來乍去虛則傷寒寒則腸中雷鳴泄青白之痢而發邪氣水根在大腸大腸有寒鶩溏有熱便腸垢人腸有宿食寒慄發熱有時如瘧狀大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感於寒則泄當臍而痛不能久立與胃同候腸中雷鳴氣上

衝胸喘不能久立邪在大腸也大腸脹鳴而痛腸寒即泄食不化 出第十八卷中

大腸熱實方三首

千金凡右手寸口氣口以前脉陽實者手陽明經也病苦腸滿善喘欬面赤身熱喉咽中如核狀名曰大腸實熱也

又療大腸實熱腹脹不通口為生瘡生薑泄腸湯方

生薑 橘皮 青竹茹 白朮
黃芩 梔子各一兩 桂心一兩 生地黃十兩
茯苓 芒消各二兩 大棗十四枚擘

右十一味切以水七升煮取三升去滓下芒消分三服

忌生葱蕪荑海藻菘菜酢物桃李雀肉等 出第十八卷中

刪繁療肺脉厥逆大於寸口主大腸熱欬上氣喘鳴心煩麻黃湯方

麻黃六兩去節 芍藥 生薑 半夏洗十遍
細辛 五味子各三兩 桂心二兩 石膏八兩

右八味切以水九升先煮麻黃七八沸去沫次下諸藥煎取三升去滓分三服忌羊肉餳生葱生菜等

又療大腸[illegible]胸滿[illegible]中熱淡竹葉飲泄熱氣方

淡竹葉切三升 橘皮二兩 乾葛葉 白朮二兩 甘草一兩炙
葱白切一升 桂心一兩 石膏六兩碎 杏人六十枚去皮尖熬

右九味切以水一斗二升先煮竹葉取一斗去滓澄清取九升下諸藥煮取三升去滓分三服若須利下內芒消三兩忌海藻菘菜桃李雀肉生葱 並出第二卷中

大腸虛寒方三首

千金凡右手寸口氣口以前脉陽虛者手陽明經也病苦胸中喘腸鳴虛渴脣乾目急善驚泄白名曰大腸虛也

又療大腸虛冷痢下青白腸中雷鳴相逐黃連補湯方

黃連四兩 茯苓三兩 芎藭三兩 [illegible]
地榆五兩 伏龍肝如雞子大一枚

右六味切以水七升煮五味取二升五合去滓下伏龍[illegible]

肝腑擁調分三服忌猪肉冷水大酢 出第十八卷中

删繁療大腸虛寒欠呿欬氣短少腹中痛款冬花丸方

款冬花七分 桂心 五味子各六分 乾薑

芎藭 甘草炙各五分 附子炮四分 桔梗四分

蘇子五合熬 蜀椒一升 百部汁七合 白蜜一升

乾棗五十枚去皮 薑汁一升

右十四味細擣為末將薑蜜汁和微火上煎取為丸如梧子飲服溫酒下三十丸加至四十丸日再忌海藻菘菜猪肉冷水生葱 出第二卷中

皮虛實方二首

删繁論曰夫五藏六腑者內應骨髓外合皮毛膚肉若病從外生則皮毛膚肉關格強急若病從內發則骨髓疼痛然陰陽表裏外皮內髓其病源不可不詳之也皮虛者寒皮實者熱凡皮虛實之應主于肺大腸其病發於皮毛熱即應臟寒即應腑 千金同出第三卷中

千金療皮虛主大腸病寒氣關格蒴藋蒸湯方

蒴藋根葉切三升 桃皮葉剉三升 菖蒲葉剉二升

細糠一斗 秫米五升

右五味以水一石五斗煮取米熟為度大盆器貯於上作小竹牀子罩盆人身坐牀中四面周迴將席薦障風身上以衣被蓋覆若氣急時開孔對口洩氣取通身接汗可作兩食久許如此三日若盆裝不過熱盆下安炭火也非但療寒但是皮膚一切勞冷並皆療之忌羊肉餳 出第三卷

又療皮實主肺病熱氣梔子煎方

梔子 枳實炙 大青 杏人去尖皮兩人

柴胡 芒消各二兩 生地黃切一升 石膏八兩

淡竹葉切一升 生玄參五兩

右十味切以水九升煮取三升下芒消分三服忌蕪荑 出第十八卷中

上氣方九首

廣濟療上氣方

葶藶子五合熬紫色別擣如泥 桑根白皮切 大棗二十枚擘

右三味以水四升煮取一升絞去滓內葶藶子泥如棗大煮之三分減一頓服以快利為度忌如藥法 出第二卷中

肘後療上氣方

灸從大椎數下行第五節下第六節上空間郎灸一處隨年壯秘方 并療千金翼文仲同出第三卷中

千金療上氣方

上酥一升 獨頭蒜五顆去皮先以酥煎蒜黃出之 生薑汁一合

右三味同煎候熟空腹服一寸七溫服之忌熱麪

又方

芥子一升

右一味末之蜜和爲丸寅時井華水服如梧子七九日二服散亦佳禁如藥法尤忌油麪等並出第十七卷中

必効療上氣方

半夏洗 茯苓各四兩 橘皮 白朮各三兩

生薑十兩 檳榔十四枚

右六味切以水一斗漬一宿煮取二升七合分三服更加甘草二兩 人參二兩 前胡三兩 紫菀一兩 忌羊肉餳桃李雀肉酢物出第一卷中

古今錄驗溫中湯療上氣方

甘草炙三兩 桂心四兩 生薑一斤

右三味切以水七升半煎取三升分五服忌生葱海藻菘菜

又昆布丸療胷滿上氣方

大黃 消石 海藻洗 水銀各一兩

昆布洗三兩 苦瓠瓣四十枚 葶藶熬半升 通草二分

桃人五十枚熬

右九味擣篩以蜜和爲丸如梧子許先食服三丸日再服

又巳試鯉魚湯療上氣方

杏人熬 貝母 桂心各一兩 橘皮

人參 甘草炙 厚朴炙 麻黃去節

茯苓 胡麻 白前各二兩 鯉魚五斤

生薑六兩 半夏洗五兩

右十二味切先以水二斗煮魚得一斗二升去魚內藥煎取三升分爲三服日二夜一忌酢物桃李雀肉羊肉餳生葱等物

又上氣一物散本司馬大將軍方

麻黃一斤去節 杏人一百枚

右藥各別擣合和下篩爲散上氣發時服方寸匕可至三方寸匕以氣下爲候不必常服深師療上氣兼欬並同並出第十九卷中

卒上氣方六首

深師療卒上氣胷心滿寒半夏蘇子湯方

半夏洗五兩 蘇子一升 生薑五兩 大棗四十枚擘

橘皮 桂心各三兩 甘草二兩

右七味切以水七升煮取二升七合分三服氣即下忌海藻菘菜羊肉餳生葱

又療卒急上氣胷心滿竹葉下氣湯方

生甘竹茹各一兩 石膏一兩 生薑 橘皮各二

甘草三兩炙

右五味切以水七升煮竹茹取四升半去滓內諸藥煮取二升分二服此方療卒上氣不止者服兩三劑差忌海藻菘菜 並出第十八卷中

備急葛氏療卒上氣鳴息便欲絕方

桑根白皮切一升 生薑切半升 吳茱萸半升

右三味切以酒五升煮三沸去滓盡令服之入口則愈 千金翼方

又方

麻黃去節 甘草炙各二兩

右二味切以水三升煮取一升半分三服前今餘驗用水八升煮取二升八合忌海藻菘菜差後微令不發者更取二味并熬杏人五十枚擣篩蜜和丸服四五丸日三 文仲肘後延年同

又療卒上氣氣不復報偏息方

莨菪一兩㕮咀

右一味以酒一斗漬服一升日三服

又方

麻黃二兩去節 桂心 甘草一兩炙各 杏人四十枚去皮尖如法

右四味切以水六升煮取二升分三服此二方名小投杯湯有氣[illegible]嘔者加半夏三兩忌海藻菘菜生蔥 出第三卷中

久上氣方四首

千金療積年上氣不差垂死者方

莨菪子熬令色變 熟羊肺薄切暴乾末

右二味各別擣等分以七月七日神麴和令相着夜不食空腹服二方寸匕須臾拾針兩食間以冷漿白粥二口止之隔日一服永差一十日內得煮飯汁作蕪菁羹食之以外一切禁斷 文仲肘後同

又療上氣三十年不差方

大棗一百枚去核 豉一百二十粒 杏人一百枚去皮尖 椒二百粒去汗

右四味先擣杏人令極熟後內棗椒豉更擣作丸如棗核大含稍稍咽之日三夜一 並出第十七卷中

必效療久上氣氣急臥不得方

紫蘇葉二兩 生薑 麻黃去節 杏人各二兩

赤茯苓 桑根白皮 葶藶子熬各二兩 橘皮一兩

右八味切以水八升先煮麻黃去沫下諸藥和煮取二升七合絞去滓分三服每服如人行七八里久溫服之畢服後丸

又丸方

葶藶子六兩熬令紫色

右一味擣如泥丸如梧子大飲食後以棗飲下十丸日二服乾棗十顆擘碎以水一升煮取五合去滓用下丸甚効

上氣胷滿方二首

古今錄驗胡椒丸療欬上氣胷滿時復噫沫方

胡椒　蓽撥　乾薑各三兩　白朮二兩

桂心　高良薑　人參　款冬花

紫菀　甘草炙各二兩

右十味擣篩蜜和丸如梧子一服五丸日二服不知增之以知為度忌生冷酢滑魚肉蒜桃李雀肉生葱海藻菘菜　出第十九卷中

救急茯苓人參散療上氣胷脅滿悶益心力除瘳忘永不霍亂能飲食此方功力諸藥不逮有人年四十時因患積痢瘦憊不能起止形狀如七十老人服此藥兩劑平復如舊久服延年益壽方

茯苓二斤去黑皮擘破如棗大清水漬經一日一夜再易水出於日中暴乾為末　人參擣七兩　甘草炙切五兩　牛乳七升　白沙蜜一升五合

右五味以水五升內甘草煮取二升除甘草澄濾內茯苓末火煎令汁盡次內白蜜牛乳次內人參緩火煎令令汁盡勿住攪藥令調勿許焦成日中暴乾擣篩為散以紅盆之汁和及蜜湯和喫並得亦不限多少夏月水和當甚忌海藻菘菜大酢並是大斗大升大秤兩也此方極驗合散者方効　出第六卷中

上氣咳身面腫滿方四首

千金療中風而欬上氣喘急不得坐臥身面腫不下食消腫下氣止欬立驗方

葶藶子一升熬　貝母六分　杏人十二分熬　紫菀六分

茯苓　五味子各六分　人參　桑白皮各八兩

右八味擣篩蜜和丸如梧子一服十丸日二服甚者夜一服漸漸加至二三十丸煮棗汁送之若歷氣虛者宜服此藥若小便不利者宜服後方忌酢物

又方

葶藶子二十分熬　杏人十二分　茯苓六分　牽牛子八分熬

右四味擣篩蜜和為丸如梧子許每服八九日再夜一漸漸加至二十丸煮棗汁送之大忌酢物

又療上氣咳嗽長引氣不得臥或水腫或遍體氣腫或單面腫或足腫並主之方

葶藶子三升微熬

右一味搗篩爲散以清酒五升漬之春夏三日秋冬七
日初服如胡桃許大日三夜一冬日二夜二量其氣力
取微利爲度如患急困者不待日滿亦可以絹絞
卽服其草紫莖向上葉兩兩角角處且短又有一種
枝莖葉葉頭下葉生作細長根時必須分別前件
大腹病狀發者不問始終至困並歸於水但人腹內
有塊及兩邊有不有及當心有塊稍肚大者並是水病
但此藥必須得好新熟無灰清酒者始可用經日多者
惡不堪用前件病皆是熱服藥唯須飲酒並生冷豬
魚肉大困及不得卽入口則定老少任意量力必須好

差平復始可停藥此方神驗服藥如傷多悶亂者作土
漿飲卽定並出第六卷中

必効療上氣欬嗽腹滿體腫方

取根葉二升

右一味煮三十沸去滓煎堪作丸如小棗子以竹筒內
下部立愈出第一卷中

上氣喉中水雞鳴方一十二首

深師療久逆上氣胷滿喉中如水雞鳴投杯湯方

小麥一升 麻黃四兩去節 厚朴五兩 石膏如雞子
杏人五合

右五味以水一斗煮取小麥熟去麥內藥煮取三升分
三服欬嗽甚者加五味子半夏洗各半升乾薑三累經
用甚良

又療上氣脈浮欬逆咽喉中水雞鳴喘息不通呼吸欲死
麻黃湯方

麻黃八兩去節 射干二兩 甘草四兩炙 大棗三十顆

右四味切以水一斗先煮麻黃三沸去上沫內諸藥煮
取三升分三服忌海藻菘菜等

又療欬逆上氣胷中塞不得息臥不安牀牽繩而起咽中
如水雞聲投杯湯方

款冬花四分 杏人四十枚 甘草一兩炙 大棗二十枚
桂心 麻黃四兩去節 生薑 半夏各二兩洗
紫菀 細辛各二兩

右十味切以水八升煮取二升頓服之一方分再服則
令汗出食粥數口勿飽食神良忌海藻菘菜羊肉餳生
葱生菜

又療欬逆上氣喘嗽冷嗽晝夜甚喉中水雞鳴鍾乳丸方

鍾乳 人參 桂心 乾薑各八分
附子炮 款冬花 細辛各六分 紫菀十分
杏人四分

右九味擣篩蜜和酒服如小豆二丸日二不知稍稍加
之忌猪肉冷水生葱生菜等物
又療上氣欬嗽喉中水雞鳴唾膿血腥臭麻黃湯方
麻黃六兩去節 桂心一兩 甘草炙 杏人去尖皮各二兩
生薑一方用乾薑三兩
右五味切以水七升煮取三升半分五服已用療欬唾
膿血喉中腥臭得力後長將丸服忌海藻菘菜生葱
又療久欬上氣喉中鳴晝夜不得卧貝母散方
貝母三兩 麻黃去節 乾薑各二兩 桂心
甘草炙各二兩

右五味擣篩平旦酒服方寸匕日二不知增之至二七
大劑可至再服酒隨飲多少忌海藻菘菜生葱等
又療久欬逆上氣體腫短氣脹滿晝夜倚壁不得卧喉常
作水雞聲白前湯方
白前二兩 紫菀 半夏洗各三兩 大戟切七合
右四味切先以水一斗漬之一宿明旦煮取三升分三
服忌羊肉餳此方四味千金方見水腫欬上氣中千金古今錄驗同並出第十八卷中
小品療上逆欬中如水雞聲貝母湯方
貝母 甘草炙各二兩 麻黃去節 桂心各四兩
半夏洗 乾薑各三兩 杏人六十枚

右七味切以水二斗三升先煮麻黃得十沸內藥煮取
三升溫服七合日三忌海藻菘菜生葱羊肉餳古今錄驗同
又療欬而上氣咽中如水雞聲射干麻黃湯方
射干十二枚 麻黃去節 生薑各四兩 紫菀三兩
款冬花三兩 細辛三兩 五味子半升 半夏洗八枚
大棗七枚
右九味切以東流水一斗二升煮取三升分三服忌羊
肉餳生菜出第一卷中本仲景傷寒論方千金古今錄驗同並出
必效療病喘息氣急喉中如水雞聲者無問年月遠近方
肥皂莢兩挺 好酥一兩

右二味於火上炙去火高一尺許以酥細細塗之數翻
覆令得所酥盡止以刀輕刮去黑皮然後破之去子皮
筋脉擣篩蜜和爲丸每日食後服一丸如熟豆日一服
訖取一行微利如不利時細細量加以微利爲度日止
一服忌如藥法出第一卷中
古今錄驗沃雪湯療上氣不得息卧喉中如水雞聲氣欲
絕方
麻黃四兩去節 細辛二兩 五味子半升 桂心
乾薑各一兩 半夏八枚洗去滑一方四兩
右六味切以水一斗煮取三升絞去滓適寒溫服一升

投杯則臥一名投杯麻黃湯令人汗出不得臥勿怪亦可從五合不知稍增曰再凡煮麻黃先煎二沸去上沫又內餘藥忌生葱生菜羊肉餳集驗經心錄范汪同

又投杯湯療久欬嗽上氣胷中寒冷不得息食臥不安席每牽繩而起咽中如水雞聲方

款冬花四十枚　細辛一兩　紫菀三兩　甘草炙
桂心　麻黃去節　乾薑各二兩　五味子半升
杏人四十枚　半夏半升洗

右十味切以水一斗煮取二升分再服即汗出即愈忌海藻菘菜生葱生菜羊肉餳並出第九卷中

因食飲水上氣方四首

古今錄驗宮泰說李將軍兒得病喘息甚難并數上氣呼吸療之不差遂亡本由食餅後乃飲水得之服五味湯不差此輩皆死是後乃有婢得之行極而渴飲水多此爲所以起同與五味湯亦不差然後小差泰因此與三物備急散半錢吐下得差由此思惟病之所由以冷水入肺及入胃寒熱不消化結聚逼迫於胃口故令其呼吸乏氣息不得下過胃脘而上氣息數也宜吐下之亦可與三物瓜蒂散吐之

三味備急散本療卒死感忤宮泰以療人卒上氣呼吸氣不得下喘逆差後已爲常用方

巴豆　乾薑　大黃

右藥各等分巴豆小熬去心皮合擣下篩服半錢七得吐下則愈忌野猪肉蘆笋范汪同

又三味吐散宮泰以療上氣呼吸喘逆方

瓜蒂三分　杜蘅三分　人參一分

右藥擣篩爲散以溫湯服一錢七老小半之范汪同並出第十九卷中

許後療大走馬奔走喘乏便飲冷水冷飲因得上氣發熱方

竹葉三斤　橘皮三兩切

右二味以水一斗半煮取三升去滓分爲三服三日服一劑良集驗用竹葉三兩文仲備急范汪等同

又方

葶藶子一兩熬搗　乾棗四十顆

右二味以水三升先煮棗取一升內葶藶子煎取五合大人分一二服小兒分三四服並出第一卷中

肘後卒短氣方

卒短氣方一首

搗韭取汁服一升立愈文仲備急千金同出第一卷中

又療卒短氣方

枸杞葉二兩　生薑二兩切

右二味以水三升煮取一升頓服之

又方

生薑五兩切　小麥一升

右二味以水七升煮取一升頓服之

又方

紫蘇莖葉切一升　大棗二七枚

右二味以酒三升煮取一升半分再服水亦得又方加橘皮半兩並出第十七卷中

上氣及氣逆急牽繩不得卧方八首

廣濟療肺氣欬上氣急及欬方

柴胡五兩　五味子　橘皮　紫菀

貝母　杏人各三兩　麻黃四兩去節　甘草炙

黃芩　麥門冬各二兩

右九味細切擣令極碎每服取麥門冬一兩去心生薑三兩切竹葉一兩半以水二升五合先煮麥門冬生薑竹葉取一升五合內散二兩煎取一升二合絞去滓分二服平旦空肚服之一服日晚食消後服之每日作一劑忌油麪猪大肉小豆粘滑酢鹹海藻菘菜出第三卷

肘後療欬上氣喘息便欲絕方

末人參服之方寸匕日五六出第一卷中

深師療欬上氣及諸逆氣補肺白前湯方

白前五兩　紫菀　杏人　厚朴炙各三兩

半夏洗　麻黃去節各四兩　生薑一斤一方用八兩

人參　桂心各二兩　甘草炙一兩　大棗十四枚

右十一味切以水八升煮取二升半分三服忌海藻菘菜羊肉生葱餳

又療上氣不足欬逆上氣牽繩而坐吐沫唾血不能食飲補肺湯方

蘇子一升　桑白皮五兩　半夏洗六兩　紫菀

人參　甘草炙　麻黃去節　五味子

乾薑　杏人去尖各二兩　細辛一兩　桂心三兩

欵冬花一兩　射干一兩

右十四味切以水一斗二升煮取三升分五服日三夜再忌海藻菘菜羊肉餳生葱生菜千金同

又療諸欬病上氣胸滿晝夜不得卧困篤鍾乳丸方

鍾乳八分　乾薑六分　欵冬花　細辛

桑白皮　半夏洗各四分　貝母　射干各五分

蜀椒汗三分　芎藭四分　紫菀八分　杏人二分

右十二味擣篩蜜和服如大豆二丸日三忌冷食酢

内傷生藥　並出第十八卷中

千金療上氣不得臥神秘方

橘皮　生薑　紫蘇　人參

五味子(各二兩)

右五味切以水七升煮取三升分三服(一方有桔梗無五味子出第十七卷中)

古今錄驗療病後暴上氣因爲投杯湯方

石膏(四兩)　甘草(二兩炙)　五味子(二升)　大棗(二十枚)

人參　桂心　半夏(洗)　杏人(去皮尖各一兩)

麻黃(去節)　生薑(四兩)

右十味切以水一斗煮取三升一服六合日三夜一忌羊肉餳海藻菘菜生葱等

又療上氣呼吸牽繩肩息欲死投杯湯方

麻黃(去節四兩)　甘草(炙)　乾薑　桂心

貝母(各一兩)

右五味切以水八升煮取二升分再服則愈有人先有氣疾發有時遇熱取冷當風飲酒房室體虛未春因天行病至夏內虛有風熱未除兼藥石勢過傷於胃氣因復欬嗽坐卧氣息不利因自下後變四肢腫遊走輒定小便不通積服利藥忽吐逆不下食藥嗽甚動百脈狀如嚥噏積日乃變上氣服此方加杏人二兩與兩劑上氣得止忌海藻生菜菘菜(范汪經心錄同出第十七卷中)

欬嗽上氣方七首

病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒微則成欬嗽肺主氣氣有餘則喘欬上氣此爲邪搏於氣氣壅滯不得宣發是爲有餘故欬嗽而上氣也其狀喘欬上氣多涕唾面目浮腫則氣逆也(出第十四卷中)

深師療上氣欬嗽蘇子煎方

蘇子(一升)　生薑(汁二升)　白蜜(二升)　生地黃(汁二升)

杏人(二升)

右五味擣蘇子以地黃薑汁澆之絹絞取汁更擣以汁澆復絞如此六七過令味盡去滓熬杏人令黃黑擣令如脂又以向汁澆之絹絞取汁往來六七過令味盡去滓內蜜和置銅器中於重湯中煎之令如飴煎成一服方寸匕日三夜一忌蕪荑(千金同)

又療欬嗽上氣射干煎方

射干(八兩)　紫菀(半兩)　膠飴(五兩)　細辛(半兩)

乾薑(末五兩)　生竹瀝(一升)　芫花根(半兩)　桑根白皮

款冬花(各八兩)　附子(炮半兩)　甘草(炙半兩)　白蜜(一升)

右十二味先切射干合竹瀝汁煎五六沸絞去滓次內紫菀以水一升四合漬一宿煎之七上七下去滓乃合飴薑末煎令如餔服如棗一丸許日三夜一不知稍增之忌海藻菘菜豬肉冷水生菜 千金同

又療欬上氣中寒冷鼻中不利杏人煎方

杏人五兩 五味子三合 甘草四兩炙 麻黃一斤去節

款冬花三合 紫菀 乾薑各三兩 桂心四兩

右八味切以水一斗煮麻黃減二升掠去沫乃內諸藥煮取四升絞去滓又內膠飴半斤白蜜一斤合內汁中攪令相得湯中煎如飴成先食服如半棗日三不知稍

加之忌海藻菘菜生葱 千金同出第十八卷中

崔氏療上氣暴欬方

紫蘇莖葉二升 大豆一升

右二味以水四升煮大豆次下紫蘇煮取一升五合分為三服晝二夜一忌醋鮓鹹酸油膩等 出第六卷中

必効主上氣腹脹心胸滿并欬不能食方 侯明府云極効

枇杷葉一握去毛炙 檳榔三七顆 生薑二分 高良薑二兩

蜜二合 酥二合

右六味切以水二大升煮取一大升湯成後內酥蜜更煮三五沸分溫三服每服如人行八九里久甚重者三兩劑任意食之 出第一卷中

救急療上氣欬肺氣胸痛方

杏人一大升 白蜜一大升 牛酥二大升

右三味杏人去皮尖於瓷盆中研取汁五升淨磨鐺勿令脂膩先傾三升汁於鐺中刻木記其深淺又傾二升以緩火煎減至於所記處即內白蜜及酥還至木記處藥乃成貯於不津瓷器中每日三度以暖酒服一大匙不能飲酒和粥服亦得服一七日唾色變白二七日唾稀三七日欬斷此方非但療欬兼療虛損去風冷兼悅肌膚白如處女婦人服之更佳 延年秘錄同出第六卷中

古今錄驗療上氣兼欬蘇子湯方

蘇子一升 五味子五合 麻黃去節 細辛

紫菀 黃芩 甘草炙各二兩 人參

桂心 當歸各一兩 半夏洗三兩 生薑五兩

右十二味切以水九升煮取三升分二服上氣病亦挾風者蘇子及生蘇葉冬天煮乾枝莖葉亦佳忌海藻菘菜羊肉餳生蔥生菜 出第十九卷中

欬逆上氣嘔吐方四首

病源五臟皆稟氣於肺肺感微寒則成欬嗽也寒搏於氣氣聚還肺而邪有動息邪動則氣奔逆上氣上則五藏傷

動動於胃氣者則胃氣逆而嘔吐也此是肺欬逆滯氣動
於胃而嘔吐者也又有季夏脾王之時而脾氣虛不能王
有寒氣傷之而欬嗽者謂之脾欬其狀欬則右脅下痛陰
陰引肩背甚則不可動動則欬發脾與胃合脾欬不已則
胃受之其狀欬嗽而嘔嘔甚則長蟲出是也凡諸欬嗽其
既嘔吐各隨證候知其臟腑也 出第十四卷中
深師療欬嗽上氣喉咽中腥臭虛氣搶心頭痛眼疼耳中
嘈嘈風邪毒注天行食不生肌胸中隔塞嘔逆多唾惡心
心下堅滿飲多食少療疰并淋通氣丸方
膠飴五斤 蜀椒二升汗 烏頭七分炮 桂心六分

大附子五枚炮 乾薑 人參各四分 杏人一升
天門冬十分 蜈蚣五節去頭炙
右十味末之擣杏人作膏稍稍內藥末擣千過烊膠飴
乃內藥中攪令調和合如半棗一枚日六七夜二三服
令胸中溫為度若夢與鬼神交通及飲食者全用蜈蚣
食不消者加杏人五合有虛氣少腹急腰痛加天門冬
杜仲有風加烏頭二枚附子一枚立夏後勿加也有留
飲加葶藶子一兩熬末之忌豬肉冷水生葱鯉魚等物
千金同
又療上氣欬逆口乾手足寒心煩滿積聚下利嘔逆若傢

瘀血上氣胸脅脹滿少氣腸鳴飽食傷中裏急婦人乳
飲瘀下有邪濕陰不足大小便不利股節皆痛消石丸
方
消石一斤 乾薑 前胡 大黃各一斤
杏人一升
右五味擣篩蜜和飲服如梧子三丸日再五日後心腹
諸疾隨大小便去月經絕則通下長蟲數十亦利血及
令然易行汁殺殺毒惡去之藥利以意消息
又療上氣煩悶嘔逆不得飲食厚朴湯方
厚朴一兩炙 人參一兩 半夏四兩洗 生薑八兩

茯苓 甘草炙 橘皮 桂心各二兩
枳實二兩炙
右九味切以水八升煮取三升分三服忌海藻菘菜羊
肉餳生葱酢物 並出第十八卷中
必效療上氣欬嗽嘔逆不下食氣上方
橘皮 紫菀各三兩 人參 茯苓
柴胡 杏人去皮尖
右六味切以水六升煮取二升分為三服思冷加生薑
二兩思熱加麥門冬三兩去心不能食加白朮二兩厚
朴二兩炙忌酢物桃李雀肉等 出第一卷中

上氣欬嗽多唾方三首

范汪療上氣肺熱欬嗽多涕唾方

白前四分　生麥門冬十分去心　貝母

石膏　甘草炙　五味子　生薑各四分

黃芩五分　杏人四十顆　淡竹葉切一升　白蜜一匙

右十一味切以水七升煮取二升七合絞去滓內白蜜更上火煎三沸分溫三服每服如人行五六里須利三兩行欲成後宜加芒消八分忌熱麪炙肉油膩醋食海藻菘菜出第二卷中

古今錄驗小紫菀丸療上氣夜欬逆多唾濁方

乾薑　甘皮一作甘草　細辛　款冬花各二分

紫菀三分　附子二枚炮

右六味擣篩以蜜和爲丸如梧子先食服三丸日再以知爲度忌冷水豬肉生菜等物

又療欬氣上多涕唾杏人煎方出徐王

杏人一升

右一味擣碎研取大升三升汁以水和研之煎取一大升酒服一匙日三忌豬雞魚肉胡荽等物並出第十九卷中

上氣欬方一首

古今錄驗療欬逆上氣胸滿多唾太醫令王叔和所撰已更出服甚良効方

乾薑三分　礬石一分燒半日泥裹　蜀椒五分汗

細辛二分　烏頭一分炮去皮　杏人一分　吳茱萸四分

菖蒲一分　紫菀二分　皂莢一分去皮子炙　款冬花三分

麻黃四分去節

右十二味擣篩蜜和丸如梧子夜臥吞一丸日二不知加之禁二十年欬不過二十九便愈御察秘在石室不傳忌猪羊肉餳生菜冷水一方有菖蒲二分無麻黃千金同出第十九卷中

久欬嗽上氣方三首

肘後療久欬上氣十年二十年諸藥療不差者方

豬胰三具　乾棗百顆

右二味以酒三升漬數日服二三合至四五服愈服盡此用差千金同出第三卷中

深師療久上氣欬麻黃散方司馬大傅故常將此服愈

麻黃一斤去節　杏人一百枚　甘草二兩炙　桂心一兩

右四味擣篩別擣杏人如脂內諸末合令調臨氣上發時服方寸匕氣下止食頃氣不下更服一匕可至三匕氣發便服即止忌海藻菘菜生葱千金古今錄驗同

又療久上氣欬亦療傷寒後欬嗽方

甘草二兩炙　大棗二十枚

右二味以水七升煮取二升分再服數用驗忌海藻菘

菜等古今錄驗名延胡湯並出第八卷中

欬逆上氣方五首

病源肺虛感微寒而成欬欬而氣還聚於肺肺則脹是為欬逆也邪氣與正氣相搏正氣不得宣通但逆上喉咽之間邪伏則氣靜邪動則氣奔上煩悶欲絕故謂之欬逆上氣也第十四卷中

深師療欬逆上氣支滿息欲絕氣結於胸中心煩躁不安一合湯方

芫花熬二分　桂心　乾薑各五分　甘草炙
細辛各四分　蕘花二分

右六味切以水三升煮取一升先食服一合日三夜一又云合湯亦得分六七服一日盡便愈一方有菖蒲四分無蕘花忌海藻菘菜生葱生菜等

又療欬逆上氣腹中有堅痞往來寒熱令人羸瘦不能飲食或時小痛或腹中如絞在臍上下關痛氣上腸使然為病有氣痛逆蜀椒散方

蜀椒五合去目汗　桂心　甘草各一兩炙
通草　半夏各三兩洗

右五味擣篩飲服方寸匕日三夜一忌海藻菘菜羊肉餳生葱並出第十八卷中

古今錄驗麥門冬丸主氣逆上氣方

乾薑六分　麥門冬十分去心　昆布洗　海藻各六分洗
細辛　海蛤　蜀椒汗　桂心各四分

右八味擣篩蜜和丸如梧子以飲服十丸漸加至二十丸日三有人患風虛得冷輒胸中上氣喉中常如吹管聲欬嗽唾清沫將此丸服得差若散服方寸匕日三忌生葱生菜等心上同

又鯉魚湯療欬逆上氣喉中不利方

生鯉魚一尾　熟艾一升　白蜜一升　紫菀
牡蠣熬各二兩　款冬花一升　杏人二十枚　豉半升
射干二兩　細辛三兩　飴八兩　菖蒲二兩

右十二味以蜜藥和內魚腹中置銅器中蒸之五斗米飯下藥成服一升日三夜一忌生菜羊肉餳等

又杏人煎療欬逆上氣方

杏人一升　石斛　乾薑各四兩　桂心
甘草炙　麻黃去節五兩　五味子各　款冬花
紫菀各三兩

右九味擣八味下篩以水一斗先煮麻黃取八升去滓內藥末膠飴半斤蜜一升攪令相得未食服如棗大一枚日三忌生葱海藻菘菜等並出第二十九卷中

雜療上氣欬嗽方四首

廣濟療上氣欬嗽喘水氣癖氣方

葶藶子熬　貝母　桔梗　鼈甲炙

防葵各六分　白朮　茯苓　大戟

枳實炙　紫菀　旋復花　杏人

橘皮各四分　芫花二分　大黃十分　皂莢一分炙去皮子

右十六味擣篩蜜和爲丸空腹以飲服如梧子五丸日二服漸漸加至十丸以微利爲度忌桃李雀肉莧菜醋物猪肉陳臭等　出第二卷中

深師療上氣搶心胷奄奄不得息腹中脹滿食輙吐蘇子湯方

蘇子一升　大棗二十顆　半夏三兩洗　橘皮

生薑　桂心各一兩　蜀椒二分汗

右七味切以水七升煮取二升分三服忌羊肉餳生葱　出第十八卷中

古今錄驗半夏湯療上氣五藏閉塞不得飲食胷中脅下支服乍去乍來虛氣結於心中伏氣住胃管脣乾口燥肢體動搖手足疼冷夢寐若見人怖懼此五藏虛乏諸勞氣不足所致并療婦人方

當歸　防風　黃耆各二兩　柴胡半斤

細辛　麻黃去節　人參各一兩　杏人五十枚

桂心二兩　半夏一升洗　大棗二十枚　生薑五兩

黃芩一兩

右十三味切以水一斗先煑麻黃一沸去上沫更入水一升及諸藥煑取五升分爲五服日三夜二忌羊肉生葱生菜餳等　出第十九卷中

近効療上氣腹內脹滿飲食不消欲作霍亂及欬嗽紫蘇子丸方

紫蘇子　橘皮各二兩　高良薑　桂心

人參各一兩

右五味擣篩蜜和爲丸每服十五丸酒飲任下若食瓜膾等物有生熟氣擬似霍亂者即半棗栗許大細細嚼取汁令消盡瘥時立愈常有此藥永不患霍亂甚神効也忌生葱猪肉陳臭等物

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙孟較勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十卷終

消渴方一十七首
近効祕要消渴方二首
近効極要熱中小便多漸瘦方四首
渴利虛經脉澀成癰膿方一十一首
消渴口乾燥方三首
消中消渴腎消方八首
睡中尿床不自覺方六首
渴後小便多恐生諸瘡方二首
渴後恐成水病方三首
虛勞小便白濁如脂方四首
強中生諸病方六首
消渴不宜破灸方一十首
卒消渴小便多太數方八首
近効祠部李郎中消渴方二首
將息禁忌論一首
敘魚肉等一十五件
敘菜等二十二件
敘米豆等九件 茶酒附

唐王燾先生外臺秘要方第十一卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

消渴方一十七首

病源夫消渴者渴而不小便是也由少服五石諸丸散積久經年石勢結於腎中使人下焦虛熱及至年衰血氣減少不能制於石石勢獨盛則腎爲之燥故引水而不小便也其病變者多發癰疽此坐熱氣留於經絡經絡不利血氣壅澀故成癰膿也診其脉數大者生細小浮者死又沉小者生實牢大者死有病口甘者名爲何何以得之此五氣之溢也名曰脾癉夫五味入於口藏於胃脾爲之行其精氣溢在於脾令人口甘此肥美之所發也此人必數食甘美而多肥肥令人内熱甘者令人中滿故其氣上溢爲消渴也厥陰之爲病消渴氣上衝心中疼熱飢不欲食甚者則欲吐下之不肯止養生法云人睡臥勿張口久成消渴及失血也赤松子云臥閉目不息十二通治飲食不消其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後法云解衣惔臥伸腰膜少腹五息止引腎去消渴利陰陽解衣者使無罣礙使臥者無外想使氣易行伸腰者使腎無逼蹙膜者

大努使氣滿少腹者搦腹牽氣使五息即止之引腎者引
水來咽喉潤上部去消渴枯槁病利陰陽令饒氣力也出第
五卷中
千金論曰夫消渴者凡積久飲酒無有不成消渴病者然
則大寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以加脯炙鹽
鹹此味酒客多嗜不離其口三觴之後制不由己飲啖無
度咀嚼鮓醬不擇酸鹹積年長夜酣興不解遂使三焦猛
熱五藏乾燥木石猶且焦枯在人何能不渴治之愈否屬
在病者若能如方節慎旬月而瘳不自愛惜死不旋踵方
書醫藥實多有効其如不慎者何其所慎者有三一飲酒

二房室三鹹食及麪能慎此者雖不服藥而自可無他不
知此者縱有金丹亦不可救深思慎之深思慎之凡消渴
之人愈與未愈常須思慮大癰何者消渴之人必於大骨
節間忽發癰疽而卒所以戒在大癰也當預備癰藥以防
之宜服麥門冬丸除腸胃熱實兼消渴方

麥門冬八分去心　茯苓八分白者　黃連八分　石膏八分碎
萎蕤八分　人參六分　龍膽六分　黃芩六分
升麻四分　栝樓十分　枳實五分炙　生薑屑分
地骨皮六分　茅根一升切　粟米三合

右十五味以水六升煮茅根及粟米令爛餘十三味搗
下篩蜜和丸如梧子以前茅根粟米汁作飲服十丸日二
若渴則與此飲至足大麻亦得忌豬肉酢物

又栝樓湯方

栝樓五兩切　麥門冬三升去心　生薑五兩切　茅根三升切
蘆根二升切

右五味以水一斗煮取三升分為三服忌如藥法

又胃腑實熱引飲常渴茯苓湯瀉熱止渴方

茯苓五兩　栝樓五兩　知母四兩　小麥二升
麥門冬五兩去心　大棗二十枚擘　生地黃六兩　萎蕤四兩
淡竹葉三升切

右九味切以水三斗先煮小麥竹葉取九升去滓內諸
藥煮取四升分四服不問早晚隨渴即進非但正治胃
渴通治渴病熱即服之忌蕪荑酢物

又豬肚丸療消渴方

豬肚一枚治如食法　黃連五兩去毛　栝樓四兩　麥門冬四兩去心
知母四兩　茯神四兩　粱米五兩

右七味搗為散內肚中線縫安置甑中蒸之極爛熟接
熱及藥木臼中搗可堪丸若硬加少蜜和丸如梧子飲
汁下三十丸日再服漸加至四五十丸渴即服之忌豬肉

又栝樓散方

栝樓八分 麥門冬去心六分 甘草炙六分 鉛丹八分

右四味擣爲散以漿水服方寸匕日三服忌海藻菘菜 方有茯苓六分

又黃耆湯方

黃耆三兩 茯神三兩 栝樓三兩 甘草炙三兩

麥門冬去心三兩 乾地黃五兩

右六味切以水八升煮取二升半分三服忌蕪荑酢物海藻菘菜日進一劑服十劑訖服丸藥後腎消門中宜補丸是

又方

取七家井索近桶口結處燒作灰

右一味以井華水服之不過三服

又方

飲豉汁任性多少差止

又方

濃煮竹根汁飲之取差止 肘後同

又方

煮青粱米汁飲之差止 肘後同

又消渴陰脉絕胃反吐食方

茯苓八兩 澤瀉四兩 白朮三兩 生薑三兩

桂心二兩 甘草炙一兩

右六味切以水一斗煮小麥二升取五升去滓內茯苓等煮取二升半一服八合日再 翼同

又方

取屋上瓦三十年者破如雀頭三大升以東流水兩石煮取二斗

乾地黃八兩 生薑八兩 橘皮三兩 甘草炙三兩

人參三兩 黃耆三兩 桂心二兩 遠志去心三兩

當歸二兩 芍藥二兩 大棗二十枚 白朮八兩

右十二味切內瓦汁中煮取三升分溫四服單瓦汁亦佳 千金方無牛膝

又療熱病後虛熱渴四肢煩疼方

葛根一斤 人參一兩 甘草炙一兩 竹葉一把

右四味切以水一斗五升煮取五升渴則飲一升日三夜二忌海藻菘菜

又虛熱渴無不効填骨煎方

茯苓三兩 菟絲子三兩 山茱萸二兩 當歸三兩

大豆黃卷一升 石韋去毛二兩 牛膝三兩 巴戟天二兩

麥門冬去心三兩 天門冬去心五兩 五味子三兩 人參二兩

遠志去心二兩 桂心二兩 附子炮二兩 石斛一兩

右十六味先擣篩別取生地黃十斤生栝樓十斤擣絞取汁於火上煎之減半便作散分內藥汁中白蜜二升牛髓一升微火煎之令如膏飲如雞子黃大日三亦可飲服之佳忌醋物鯉魚生葱豬肉冷水一方有肉蓯蓉四兩

又方

栝樓如彈丸含之咽津甚佳本方療渴小便利復非淋

又方

蠟如雞子大醋一升煮兩沸適寒溫頓服之本方療渴小便利後非淋按小便利而且長不比淋症之滴瀝也故曰復非淋

又方

水和栝樓散服方寸匕亦可蜜丸如梧子服三十丸日再服無所忌並出第二十一卷中

近効極要消渴方二首

近効極要論消渴舊來以為難療古方有黃連湯牛膠丸為勝亦不能好差自作此方以來服者皆差服多者餌時水豈有更渴之理

又療消渴麥門冬丸方

麥門冬去心五兩 乾地黃三兩 蜀升麻五兩 黃芩五兩

栝樓七兩 苦參八兩 人參三兩 黃連五兩

黃耆五兩

右九味末之以牛乳和眾手捻作丸子曝乾以飲服二十丸日二加至五六十丸忌蕪荑豬肉冷水

又方

黃連五兩 苦參一斤 知母五兩 栝樓五兩

麥門冬去心五兩 牡蠣粉熬五兩 人參五兩 黃耆五兩

乾地黃五兩

右九味末之以牛乳丸清漿服二十丸日二服加至五十丸忌豬肉冷水蕪荑

近効極要熱中小便多漸瘦方四首

近効極要論熱中雖能食多小便多漸消瘦方

地骨皮五升 麥門冬去心三兩 黃連一兩 小麥八合

人參一兩

右五味切以水九升煮取三升八合去滓分為三服間食服之如不能多服分作四五服亦得忌豬肉

又方

人參五兩 麥門冬去心八分 牡蠣粉八分 乾地黃十分

知母八分 苦參二十分 黃連八分 栝樓八分

右八味末之以生牛乳為丸如梧子清漿服十五丸日再加至四十丸食後服忌蕪荑豬肉冷水

又療小便多或不禁方

兎絲子二兩　蒲黃三兩　黃連三兩　消石三兩
肉蓯蓉二兩
右五味兼雞膍胵中黃皮三兩為散服方寸匕日三服如行五里久又一服未有不差者忌豬肉千金名九房散
又療小便數多不足日便一二斗或如血色方
麥門冬八兩去心　蒺藜子三兩　甘草一兩炙　乾薑四兩
桂心二兩　乾地黃八兩　續斷二兩
右七味切以水一斗煮取二升五合分為三服忌海藻菘菜生葱蕪荑古今錄驗療腎消脚瘦細小便數赤色似血虛冷者同
消利虛經脉澀成癰膿方一十一首

病源夫消利者隨飲小便是也由少服乳石石熱盛時房室過度致令腎氣虛耗下焦生熱熱則腎燥腎燥則渴然腎虛又不能傳制水液故隨飲小便也其病變多發癰疽以其內熱而小便利故也小便利則津液竭津液竭則經絡澀經絡澀則榮衛不行榮衛不行則熱氣留滯故成癰膿也出第五卷中
千金療下焦虛熱注脾胃從脾注肺好渴利方
小麥一升　竹葉二升　麥門冬四兩去心　茯苓四兩
甘草三兩炙　大棗三十枚去核　生薑五兩　栝樓五兩
地骨皮一升

右九味切先以水三斗煮小麥取一斗去滓澄清取八升去上沫取七升煮藥取三升分三服忌海藻菘菜酢物
又療渴利虛熱引飲不止消熱止渴茯神湯方
茯神四兩　石膏八兩碎　地骨皮一升　竹葉三升
栝樓五兩　萎蕤四兩　麥門冬一升去心　知母四兩
生地黃一升　宿薑四兩
右十味切以水一斗二升下大棗三十枚幷藥煮取四升分為四服忌蕪荑
又消渴利方

生栝樓根三十斤
右一味切以水一石煮取一斗半去滓以牛脂五合煎取水盡以煖酒先食後服如雞子大日三服
又方
葵根五升盤大兩束切
右一味以水五升煮取三升宿不食平旦一服三升
又療渴小便利復非淋方
榆白皮二斤去黑皮切
右一味以水一斗煮取五升一服三合日三服
又方

小豆藿一把擣取汁頓服日三（肘後文仲同）

又渴利方

栝樓粉和雞子日暴乾更擣水服方寸匕日三丸服亦得

又療虛熱四體羸瘦渴熱不止茯神消渴[illegible]丸方

茯神（四兩） 石斛（八兩） 栝樓（五兩） 甘草（[illegible]）

五味子（三兩） 蓯蓉（四兩） 知母（三兩） 黃連（八兩）

丹參（五兩） 人參（三兩） 當歸（三兩） 小麥（二升）

萎蕤（四兩）

右十三味擣篩為散服三寸匕以水三升煮取一升絹袋貯煮之日再一煮為一服忌豬肉醋物海藻菘菜（出第二十一卷中）

崔氏療消渴瘦中焦熱渴方

苦參（一大斤） 黃連（六分） 栝樓（五兩） 知母（五兩）

牡蠣粉（五兩） 麥門冬（五兩去心）

右六味各擣篩為散以牛乳和併手捻為丸如梧子大暴乾日再服飽食訖以漿水下之服二十丸如微利減十丸如食熱麪酒等即加服五丸忌豬肉（出第三卷中）

廣濟療脾胃中虛熱消渴小便數骨肉日漸消瘦方

麥門冬（十二分去心） 苦參（八分） 栝樓（八分） 知母（八分）

茯神（八分） 土瓜根（八分） 甘草（六分炙） 人參（六分）

右八味擣篩蜜和丸食後少時煮蘆根大麥飲服如梧子二十丸日再漸加至三十丸忌海藻菘菜豬肉大酢（一方有黃連十二分出第一卷中）

肘後療消渴脫肉羸瘦或虛熱[illegible]衛不能自止小便數方

栝樓（六分） 黃連（六分） 漢防己（六分） 鉛丹（六分）

右四味擣篩為散每食後取酢一合水二合和服方寸匕日三服當強飲水須臾惡水不復飲矣（崔氏廣濟文仲同千金翼同分兩小別出第十卷中）

消渴口乾燥方三首

廣濟療口乾數飲水腰腳弱膝冷小便數用心力即煩悶健忘方

麥門冬（十二分去心） 牛膝（六分） 龍骨（八分） 土瓜根（八分）

狗脊（六分） 茯神（六分） 人參（六分） 黃連（十分）

牡蠣（六分熬碎） 山茱萸（八分） 菟絲子（十二分酒漬一宿）

鹿茸（八分炙）

右十一味擣篩為末蜜和丸每服食後煮麥飲服如梧子二十丸日二服漸加至三十丸忌生菜熱麪豬牛肉蒜粘食陳臭酢物等

又療消渴口苦舌乾方

麥門冬(去心五兩) 茅根(一升) 栝樓(切二兩) 烏梅(去核十個)

小麥(三合) 竹茹(一升)

右六味以水九升煮取三升去滓細細含咽分爲四五服忌熱麪炙肉(並出第一卷中)

千金口含酸棗丸療口乾方

酸棗(一升五合去核) 石榴子(五合乾之) 葛根(三兩) 烏梅(五十顆去核)

麥門冬(四兩去心) 茯苓(三兩半) 覆盆子(三兩) 桂心(一兩六銖)

石蜜(四兩半) 栝樓(三兩半)

右十味擣篩蜜和爲丸含如酸棗許大不限晝夜常令口中有津液出爲佳忌大酢生葱(眞同出第二十一卷中)

消中消渴腎消方八首

病源內消病者不渴而小便多是也由少服五石熱結於腎內熱之所作也所以服石之人小便利者石性歸腎腎得石則實實則消水漿故利利多則不得潤養五藏藏衰則生諸病焉由腎盛之時不惜眞氣恣意快情數使虛耗石熱孤盛則作消中故不渴而小便多也(出第五卷中)

千金論曰夫內消之爲病當由熱中所作也小便多於所飲令人虛極短氣又內消者食物皆消作小便而又不渴正觀十年梓州刺史李文博先服白石英久忽然房道強盛經月餘漸患渴經數日小便大利日夜百行以來百方療之漸以增劇四體羸惙不能起止精神恍惚口舌焦乾而卒此病雖稀甚可畏也利時脈沉細微弱服枸杞湯即効若恐不能長愈服鉛丹散立効其間將服除熱宜補丸

枸杞湯方

枸杞枝葉(一斤) 栝樓根(三兩) 石膏(二兩) 黃連(三兩)

甘草(二兩炙)

右五味切以水一斗煮取三升去滓分溫五服日三夜二服困重者多合渴即飲之忌海藻菘菜豬肉

又鉛丹散主消渴止小便數兼消中悉主之方

鉛丹(二分熬別研入) 栝樓根(十分) 甘草(十分炙) 澤瀉(五分)

胡粉(二分熬研入) 石膏(五分研) 白石脂(五分研入) 赤石脂(五分)

右八味擣研爲散水服方寸匕日三服少壯人一匕半患一年者服之一日差二年者二日差渴甚者夜二服腹中痛者減之丸服亦佳一服十丸以差爲度不要傷多令人腹痛此方用之如神已用經今二十餘載矣忌海藻菘菜文仲云腹中痛者宜漿水飲汁下之亦得又備急云不宜酒下用麥汁下之亦得丸服者服十丸日再服合一劑救數人得愈古今錄驗云服此藥了經三兩日宜爛煮羊肝肚空腹喫之或作羹亦得宜湯與食之候小便得鹹苦卻宜服後花蓯蓉丸兼煮散將息

又療腎消渴小便數宜補丸方

黃耆二兩 栝樓三兩 麥門冬三兩去心 茯神三兩

人參二兩 甘草三兩炙 黃連三兩 知母三兩

乾地黃六兩 石膏六兩研 菟絲子三兩 肉蓯蓉四兩

右十二味末之以牛膽汁三合共蜜和丸梧子大以茅根汁服二十丸日漸加至五十丸一名[illegible]丸千金同

又療腎氣不足虛損消渴小便數腰痛宜[illegible]湯方

羊腎一具去脂膜切 遠志二兩去心 人參二兩

澤瀉一兩 乾地黃二兩 桂心二兩 當歸二兩

龍骨二兩 甘草二兩炙 麥門冬一升去心 五味子五合

茯苓一兩 芎藭二兩 黃芩一兩 生薑六兩

大棗二十枚

右十六味切以水一斗五升煮羊腎取一斗二升內藥取三升分三服忌海藻菘菜生葱酢物蕪荑集驗同

又阿膠湯療久虛熱小便利而多或服石散人虛熱多因汗出當風取冷患腳氣喜發動兼消渴腎消脈細弱服此即立減方

阿膠二兩炙 乾薑二兩 麻子一升 遠志四兩去心

附子一兩炮 人參一兩 甘草三兩炙

右七味切以水七升煮取二升半去滓內膠令烊分三

服說云小便利多白日夜數十行至一石令五日服之甚良忌海藻菘菜豬肉冷水

又腎消夜尿七八升方

鹿角一具炙令焦

右一味擣篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

又黃耆湯主消中虛勞少氣小便數方

黃耆二兩 芍藥二兩 生薑二兩 當歸二兩

桂心二兩 甘草一兩 大棗二十枚 麥門冬一兩去心

乾地黃一兩 黃芩一兩

右十味切以水一斗煮取三升去滓空腹溫分三服忌

海藻菘菜生葱蕪荑

古今錄驗論消渴病有三一渴而飲水多小便數有脂似麩片甜者皆是消渴病也二喫食多不甚渴小便少似有油而數者此是消中病也三渴飲水不能多但腿腫腳先瘦小陰痿弱數小便者此是腎消病也特忌房勞若消渴者倍黃連消中者倍栝樓腎消者加芒消六分服前件鉛丹丸得小便鹹苦如常後恐虛憊者並宜服此花蓯蓉丸方

花蓯蓉八分 澤瀉四分 五味子四分 紫巴戟天四分去心

地骨皮四分 磁石六分研水淘去赤汁乾之研八 人參六分

赤石脂六分研入 韭子五分熬 龍骨五分研入 甘草五分炙
牡丹皮五分 乾地黃十分 禹餘粮三分研入 桑螵蛸三分炙
栝樓四分

右十六味擣篩蜜和丸如梧子以牛乳空腹下二十丸日再服忌海藻菘菜胡荽蕪荑等物

又服前丸渴多者不問食前後服煮散方

桑根白皮六分 薏苡人六分 通草四分 紫蘇莖葉四分
五味子六分 覆盆子八分 枸杞子八分 乾地黃八分
茯苓六分 菝葜十二分 黃耆二分

右十一味擣以馬尾羅篩之分為五貼每貼用水一升八合煎取七合去滓溫服忌酢物蕪荑 出第二十六卷中

睡中尿牀不自覺方六首

病源夫人有於眠睡中不覺尿出者是其稟質陰氣偏盛陽氣偏虛則膀胱腎氣俱冷不能溫制於水則小便多或不禁而遺尿膀胱足太陽也為腎之府腎者足少陰也為臟與膀胱合俱主水凡人之陰陽日入陽氣盡則陰受氣至夜半陰陽大會氣交則卧睡小便者水液之餘也從膀胱入於胞為小便夜卧則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發水下不禁故於眠睡而不覺尿牀也 出第十四卷中

删繁療少小睡中遺尿不自覺方

取鵲巢中蓐燒水服一錢匕即差 文仲方千金同

又方

雄雞肝 桂心

右二味等分擣丸服如小豆一枚日三服

又方

雄雞屎白熬 桂心

右二味等分末酒服方寸匕日二亦可除桂心

又方

礬石熬令盡 牡蠣熬

右二味等分末之以粟米粥飲服方寸匕日二

又方

雄雞喉嚨及矢白膍胵裹黃皮燒末麥粥清盡服之亦可以赤雞翅燒末酒服三指撮日三

又方

薔薇根隨多少剉擣以酒飲之 並出第二卷中

渴後小便多恐生諸瘡方二首

病源渴利之病隨飲小便也此謂服石之人房室過度腎氣虛耗故也下焦生熱熱則腎燥腎燥則渴然腎虛又不能制水故小便利也其渴利雖差熱猶未盡發於皮膚皮膚先有風濕濕熱相搏所以生瘡也 出第五卷中

近効恐腎虛熱渴小便多除風濕理石毒止小便去皮膚
痛調中方
升麻四分　玄參五分　甘草四分炙　知母五分
茯苓三分　牡蠣六分　漏蘆五分　枳實六分炙
菝葜四分　黃連六分
右十味擣篩飲汁服方寸匕日再服以差為度忌豬肉
海藻菘菜酢物
又方
栝樓八分　茯苓八分　玄參四分　枳實六分炙
苦參三分　甘草二分炙　橘皮三分

右七味擣篩每空腹以漿水服方寸匕日再服忌海藻
大酢菘菜
渴後恐成水病方三首
病源五藏六府皆有津液若腑藏因虛實而生熱者熱氣
在內則津液竭少故渴也夫渴數飲其人必眩背寒而嘔
者因利虛故也診其脉心脉滑甚為善渴其久病變或發
癰疽或為水病　出第五卷中
近効渴後數飲嘔逆虛羸恐成癰疽水病方
茯苓五分　栝樓六分　升麻四分　麥門冬六分去心
桑根白皮八分　橘皮三分

右六味擣篩為散清水服一方寸匕日再服忌酢物
又方
人參三分　豬苓三分　通草五分　黃連六分
麥門冬八分去心　栝樓八分
右六味擣為散漿水送方寸匕日再服以差為度忌豬
肉冷水生冷等物
又若已覺津液竭身浮氣如水病者方
漢防己六分　豬苓六分　栝樓八分　茯苓四分
桑根白皮十二分　白朮三分　杏人六分去皮尖熬
郁李人六分　葶藶子十二分熬紫色

右九味擣篩蜜和丸如梧子空腹漿水服三十丸日一
服勝消小便快下為度忌酢物桃李雀肉等
又葶藶丸療消渴成水病浮腫方
甜葶藶炒熬　栝樓人　杏人去皮尖雙人炒黃
漢防己兩各一
右四味為末蜜丸擣二三百杵如梧子大服三十丸食
前茯苓煎湯送下日三四服
又瞿麥湯療消渴欲成水氣面目并足脛浮腫小便不利
方
瞿麥穗　澤瀉　滑石各一兩　防己二分

黃芩 大黃各一分 桑螵蛸四枚炒

右七味切每服三錢匕水三升煮一升去滓空心溫服良久再服

虛勞小便白濁如脂方四首

病源此由勞傷於腎腎氣虛冷故也腎主水而開竅在陰陰爲尿便之道胞冷腎損故小便白而如脂或如麩片也出第四卷中

崔氏治水不知休小便中如脂舌乾渴方

黃連五兩 栝蔞五兩

右二味擣末以生地黃汁和丸併手丸每食後牛乳下

五十九日再服之忌猪肉

近効消渴肝肺熱焦枯消瘦或寒熱口乾日夜飲水小便如脂不止欲死方

水飛鐵粉二兩絕細者別研入 雞膍胵五枚陰乾末入

牡蠣二兩熬別研如粉入 黃連三兩

右四味擣篩三五度鍊蜜和丸飲汁下如梧子大五十丸重者不過食時輕者手下差勿傳忌猪肉

又主消渴口乾方

黃連 豉暴令乾

右二味一處擣令成丸食後飲服四十丸日再丸稍大

如常藥丸常服有効忌猪肉

又消渴能飲水小便甜有如脂麩片日夜六七十起方

冬瓜一枚 黃連十兩

右截瓜頭去瓤入黃連末火中煨之候黃連熟布絞取汁一服一大盞日再服但服兩三枚瓜以差爲度一方云以瓜汁和黃連末和如梧子大以瓜汁空肚下三十丸日再服不差增丸數忌猪肉冷水

經驗用大牡蠣不計多少以臘日端午日將黃泥裹煆通赤放冷取出爲末用活鯽魚煎湯調下一錢

強中生諸病方六首

病源夫強中病者莖長興盛不痿精液自出是也由少服五石石熱住於腎中下焦虛熱少壯之時血氣尚豐能制於石及至年衰血氣減少腎虛不能制精液也若精液竭則諸病生矣出第五卷中

千金論曰夫人生放恣者衆盛壯之時不自慎惜快情縱慾極意房中稍至年長腎氣虛竭百病滋生又年少慮不能房多服石散眞氣既盡石氣孤立唯有虛耗脣口乾焦精液自泄或小便赤黃大便乾實或渴而且利日夜一石以來或渴而不利或不渴而利所食之物皆作小便此皆由房室不節之所致也又強中之病者莖長興盛不痿精

液自出也消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎薺苨湯制腎中石熱又將服白鴨通丸便差

猪腎薺苨湯方

猪腎一具去脂膜　大豆一升　薺苨三兩　人參二兩

茯神二兩　磁石二兩碎　知母二兩　葛根二兩

黃芩二兩　栝樓二兩　甘草二兩炙　石膏三兩

右十二味切以水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗以下去滓內諸藥煎取三升去滓分溫三服渴乃飲之下焦熱者亦合一劑病勢漸歇即停忌海藻菘菜酢物

又平人夏月喜渴者由心王也心王便汗出汗出則腎中

虛燥故令渴而小便少也冬月不汗出故小便多而數也此皆是平人之候名曰腎渴但小便利而不飲水者名腎實也經曰腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人其於小便利者石性歸腎腎得石則實實則能消水漿故利利多則不得潤養五藏藏衰則生諸病也張仲景曰若熱結中焦則為堅熱也熱結下焦則為溺血亦令人淋閉不通明知不必悉患小便利信矣內有熱氣者則喜渴也除其熱則止渴兼虛者須除熱而兼宜補虛則病愈

又療嶺南山瘴氣兼風熱毒氣入腎中變成寒熱腳弱虛滿而渴方

黃連多少不限　生栝樓汁　生地黃汁　羊乳無即用牛乳及人乳亦得

右四味取三般汁乳和黃連末任多少衆手捻為丸如梧子大參飲服三十丸漸加至四十丸五十丸日三服輕者三日愈重者五日愈若藥苦難服即煮麥飲汁下亦得文仲云黃連丸一名羊乳丸肘後同出第十二卷中

又療消渴浮萍丸方

乾浮萍　栝樓根等分

右二味擣以人乳汁和為丸如梧子麥飲服二十丸日三服三年病三日差肘後文仲同主虛熱甚佳

又療面黃咽中乾燥手足俱黃短氣脈如連珠除熱止渴

利補養地黃丸方

生地黃汁二升　生栝樓汁二升　生羊脂三升牛脂亦得

好蜜四升　黃連末一斤

右五味擣合銀鍋中熬成煎可丸如梧子飲汁送五丸日三服加至十丸若苦冷而渴差即令別服溫藥忌猪肉蕪荑肘後同

又療渴小便數散方

知母六分　栝樓一斤　茯苓四分　鉛丹一分

雞脞胵中黃皮十四枚

右五味為散飲服方寸匕日三禁酒生菜肉差後去鉛

丹以蜜和之以麥飲長服勿絕更忌酢物（出第□卷中）

消渴不宜針灸方一十首

千金論曰凡消渴病經百日以上者不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿水不歇遂成癰疽羸瘦而死亦忌有所誤傷皮肉若作針孔許大瘡者所飲之水皆於瘡中變成膿水而出若水出不止者必死慎之慎之初得患者可依後方灸刺之為佳孫氏云消渴病百日外既不得灸刺所飲之水皆化為膿水不止者皆死特須慎之又云仍不得誤傷皮肉若有小瘡亦云致死既今亦得消渴且未免飲水水入瘡即損人今初得日豈得令其灸刺致此誤傷之禍極

將未顯其理且取百日以上為能未悟初灸之說故不錄灸刺凡灸刺則外洩其氣消渴皆是宜疾灸刺特不相宜經絡氣宜即灸之是以不取灸穴者耳又有人患消渴小便多而數發在於春經一夏專服栝樓及豉汁得其力渴漸定然小便猶多甚晝夜二十餘行常至三四升極差不減二升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦喉口乾燥吸吸少氣不得多語心煩熱兩腳酸食乃兼倍於常而不為氣力者然此病皆由虛熱所為耳療法栝樓汁可長服以除熱牛乳杏酪善於補此法最有益（出第二十一卷中）

文仲療消渴熱中加減六物丸方

栝樓根八分 麥門冬六分去心 知母五分 人參四分 苦參四分 土瓜根四分

右藥搗篩以牛膽和為丸如小豆服二十丸日三服麥粥汁下未知稍加至三十丸咽乾者加麥門冬舌乾加知母脅下滿加人參小便難加苦參小便數加土瓜根隨患加之一分（肘後同）

又黃連丸主消渴方

黃連一斤去毛 生地黃十斤

右二味搗絞地黃取汁漬黃連出暴之燥復內之令汁盡乾搗之下篩蜜和丸如梧子服二十丸日三服亦可散以酒服方寸匕日三服盡更令作即差止忌豬肉蕪荑（肘後集驗千金廣濟同出第八卷中）

千金栝樓粉散療消渴秘方

深掘大栝樓根厚削皮至白處

右一味寸切以水浸一日一易經五日出取爛搗碎之以絹袋濾擺之一如出粉法水服方寸匕日三四亦可作粉粥乳酪中食之不限多少取差止（出第二十一卷中）

肘後主消渴方

秋麻子一升以水三升煮三四沸取汁飲之無限不過五升差（文仲同出第二卷中）

庾濟療消渴兼氣散方

栝樓三兩　石膏三兩研　甘草三兩　甘皮二兩

右四味擣篩為散食後煮大麥飲服方寸匕日二夜一服漸加至二七忌熱麵海藻菘菜

又療消渴麥門冬湯方

蘆根一升切　茅根一升切　石膏六分碎　生薑五兩

栝樓五兩　小麥一升　生麥門冬一升去心

右七味切以水一斗煮取六升去滓一服一升渴即任意飲未差更作　並出第一卷中

范氏療患無消渴常服有驗方

豉心三兩以酸醋拌蒸乾如此者三度令微黃　黃連二兩

右二味擣篩蜜和為丸日再空腹服二十五丸食後又服二十丸又取烏梅十顆以水二小升煎之數沸取湯下前件丸藥如無烏梅以小麥子二升煮取汁亦得

又方

黃連一升去毛　麥門冬五兩去心

右二味擣篩以生地黃汁栝樓根汁牛乳各三合和頓為丸如梧子一服二十五丸飲下日再服漸漸加至三十丸若不頓為丸經宿即不相著也消渴及小便多者是虛熱但冷將息即差前件三方崔氏本方中並虛消小右一方用栝樓黃連者故云前件三方並是冷補空腹服恐少腹下冷常喫少許食服之大好忌豬肉蕪荑

又療消渴無比方

土瓜根八兩　苦參粉三兩　黃連五兩去毛　乾薑二兩

栝樓二兩　雞腸草二兩　牡蠣五兩熬　人參三兩

甘草炙二兩　黃芩二兩　桑螵蛸一枚炙　肉蓯蓉五兩

雞肶胵黃皮三十具熬

右一十三味擣篩為散一服六方寸匕日再服夜一服以後藥下之

竹根十兩　麥門冬四兩去心　石膏四兩　甘李根白皮三兩

右四味以水一斗二升煮取三升五合以下前件散藥如難服可取此藥汁和丸一服六十丸仍還用此藥下之忌豬肉海藻菘菜　並出第四卷中

千金加減巴郡太守奏三黃丸療男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者方

春三月黃芩四兩　大黃三兩　黃連四兩

夏三月黃芩六兩　大黃一兩　黃連七兩

秋三月黃芩六兩　大黃二兩　黃連三兩

冬三月黃芩三兩　大黃五兩　黃連二兩

右三味隨時合擣下篩以蜜和爲丸如大豆服五丸日三不知稍增七丸服一月所愈久服走及奔馬近曾試驗忌猪肉 出第二十一卷中

卒消渴小便多太數方八首

房後卒消渴小便多方

多作竹瀝飲之恣口數日差忌麪炙 近效恣口者再多飲出第十一卷恣飲也

又方

酒煎黃蘗取汁飲之 近效蘗飲者若人并驗卷同少飲也

又方

熬胡麻令變色研淘取汁飲半合日可三四服不過

五升即差

又療日飲水一斛者方

桑根白皮新掘入地三尺者佳炙令黃黑色切以水煮之無多少但令濃隨意飲之亦可內少粟米勿與鹽 集驗云宜蒸飲之

又小便卒太數復非淋一日數十過令人瘦方

未中水猪脂如雞子一枚炙承取肥汁盡服之不過三劑差

又方

羊肺一具作羹內少肉和鹽豉如食法任意進之不過三具差 千金同

又方

豉一升內於鹽中綿裹之以白蘗好者半斤置綿上令蒸之三斗米許時即下白蘗得消入豉中出暴乾擣末服方寸匕

又小便數猪肚黃連丸方

猪肚一枚洗大者 黃連末一斤 內猪肚中蒸之一石米熟即出之暴乾擣丸如梧子服三十丸日再服漸漸加之以差爲度忌猪肉 出第二卷中

近效祠部李郎中消渴方一首

論曰消渴者原其發動此則腎虛所致每發即小便至甜醫者多不知其疾所以古方論亦闕而不言今略陳其要按洪範稼穡作甘以物理推之淋餳醋酒作脯法須臾即皆能甜也足明人食之後滋味皆甜流在膀胱若腰腎氣盛則上蒸精氣氣則下入骨髓其次以爲脂膏其次爲血肉也其餘別爲小便故小便色黃血之餘也臊氣者五藏之氣鹹潤者則下味也腰腎既虛冷則不能蒸於上穀氣則盡下爲小便者也故甘味不變其色清冷則肌膚枯槁也猶如乳母穀氣上泄皆爲乳汁消渴疾者下泄爲小便皆精氣不實於內則便羸瘦也又肺爲五藏之華蓋若

下有暖氣蒸即肺潤若下冷極即陽氣不能昇故肺乾則熱故周易有否卦乾上坤下陽阻陰而不降陰無陽而不昇上下不交故成否也譬如釜中有水以火煖之其釜若以板蓋之則煖氣上騰故板能潤也若無火力水氣則不上此板終不可得潤也火力者則為腰腎強盛也常須煖將息其水氣即為食氣食氣若得煖氣即潤上而易消下亦免乾渴也是故張仲景云宜服此八味腎氣丸並不食冷物及飲冷水今亦不復發此頗得効故錄正方於後耳凡此疾與脚氣雖同為腎虛所致其脚氣始發於二三月盛於五六月衰於七八月凡消渴始發於七八月盛於十

一月十二月衰於二月三月其故何也夫脚氣者壅疾也消渴者宣疾也春夏陽氣上故壅疾發即宣疾愈也秋冬陽氣下故宣疾發即壅疾愈也審此二者疾可理也又宜食者每間五六日空腹一食餅以精羊肉及黃雌雞為臛此可溫也若取下氣不食肉菜食者宜煮牛膝韭蔓菁又宜食雞子馬肉此物微壅亦可療宣疾也壅之過度便發脚氣猶如善為政者寬以濟猛猛以濟寬隨事制度使寬猛得所定之於心口不能言也又庸醫或令喫栝樓粉往往經服之都無一効又每至椹熟之時取爛美者水淘去浮者餐之下候心胸間氣為度此亦甚佳生牛乳煖如人

[illegible]白細細呷之亦佳張仲景云足太陽者是膀胱之經也膀胱者是腎之腑也而小便數此為氣盛氣盛則消穀大便硬衰則為消渴也男子消渴飲一斗水小便亦得一斗宜八味腎氣丸主之

[illegible]方消渴人宜常服之

乾地黃八兩　署預四兩　茯苓三兩　山茱萸五兩

澤瀉四兩　牡丹皮三兩　附子三兩炮　桂心三兩

右藥搗篩蜜和丸如梧子大酒下十丸少少加以知為度忌豬肉冷水蕪荑胡荽酢物生葱范汪小品深師古今錄驗必効文仲方等並同

先服八味腎氣丸訖後服此藥壓之方

黃連二十分　苦參粉十分　乾地黃十分　知母七分

牡蠣八分　麥門冬十二分去心　栝樓七分一方無餘並同

右七味搗篩牛乳和為丸如梧子大併手作丸暴乾油袋盛用漿水或牛乳下日再服二十丸一方服十五丸患者消渴差後更服一年以來此病特慎麞鹿肉須慎酒炙肉鹹物吳宗餅五口　頓細切精羊肉勿著脂飽食㗖羊肉須著桑根白皮食一方云差後須服此丸一載以上即永絕根源此病特忌房室熱麪并乾脯一切熱肉粳米飯李子等若覺熱渴加至二十五丸亦得定

後還依前減其方神効無比餘並準前方忌猪肉魚炙

將息禁忌論一首

夫人雖常服餌而不知養性之術亦難以長生養性之道不欲飽食便卧亦不宜終日久坐皆損壽也人欲小勞但莫久勞疲極也亦不可強所不能堪耳人不得夜食食畢即須行步令稍暢而坐卧若食氣未消而傷風或醉卧當成積聚百疾或多霍亂令人暴吐又食欲得少而數不欲頓而多多即難消也能善養性者皆先候腹空積饑乃食先渴後飲不欲觸熱而飲飲酒傷多即速吐之爲佳亦不可當風卧及得扇之皆令人病也才不逮而思之傷也

悲哀憔悴傷也力所不勝而舉之傷也凡人冬不欲極溫夏不欲窮凉亦不欲露星月下卧大寒大熱大風皆不用觸冒之五味入口不欲偏多偏多則損人臟藏故曰酸多即傷脾苦多即傷肺辛多即傷肝鹹多即傷心甘多即傷腎此是五行自然之理又傷初即不覺久乃損壽耳夫喫生肉餘必須日午前即食二味之中其餘尤腥而冷也午後陰陽交錯人腹中亦頓夭時不成藏積亦能霍亂矣大人至丙戌時後不要喫飯若冬月夜長性熱者須少食仍須溫軟喫訖須搖動令食消散即不能成脚氣凡觸熱有汗不用洗手面及漱口令人五藏乾枯少津液又冬夏月不用枕冷物石鐵尤損人木枕亦損人縱不損人及少年之輩即眼暗也通按元係[illegible]後不羅[illegible]日尚是也[illegible]不來人[illegible]避之後魚肉菜木[illegible]

禽魚肉等一十五件

羊肉甚補虛患風及脚氣不用喫偶食即生癰即煮久熟肉兎肉鴨肉牛肉驢馬肉大鯉鮎魚鮒肥等並禁不可食之鹿肉微冷少喫麞肉溫不可多喫令人消渴久喫多肉令人血不行野雞春月以後不堪喫鯽魚長六七寸以上益人俗不要生喫生乾脯不可喫不消化爲癥

叙菜等二十二件

[illegible]冬瓜食之下氣唯脚氣相宜令人寒中不可多喫能下

積年菜力甘損人久服令人虛壞筋骨尚宜令人寒中久食即骨頭生冷水令人髮鬢白蘭香胡荽芸薹二物不益人也甘菊枸杞菜發丹石少喫即溫多即冷紫蘇薄荷蒔蘿小茴香溫中益人首蓿白蒿甘勞地黄苗甚益人長喫首蓿雞微冷益人堪久服凡菜皆取熟喫不可生喫損人蔬菜雖葷不同五辛溫中補筋骨可食慈蔥韭諸菜但少喫無妨多食令人虛冷韭從二月以後青稍長煮喫甚補至四月上旬止不可食從七月二十日後即漸堪喫至九月後冷兼有土氣蔬菜消食下痰痹甚宜人生熟喫俱善竹筍不其益人亦無損蔓菁作齏亦黄堪喫芥發熱動風傷筋骨

蒜傷血損孫不可食葵性滑夏不堪食冬暴乾熟擣煮用蘿蔔作虀下之利大小腸醋鹹並傷筋骨尤須節之不可縱性

粱米豆等尤佳之 太原附 通按少喫亦無云小任意喫也

白米甚益人小豆綠豆白豆並動氣仍下津液少喫任意大豆甚下氣昌人久服令人身重蕎麥不可食小麥麪喫之令人動熱不可頻喫之大麥麪甚益人性小冷發癖氣粱米性寒而中温 崔茶不可多喫熱渴者桑代之酒有熱毒漬豉可用參大豆即得飲之 以上並是劉禹錫方法亦一家縱實也

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十二卷目錄 [illegible]

癥癖方五首
癖結方三首
寒癖方五首
久癖方二首
痃癖方二首
痃病方四首
痃氣方二首
癖及痃癖不能食方一十四首
癥癖等一切病方四首
癖硬如石腹滿方二首
食不消成癥積方四首
心下如杯結癥方二首
癥癖痃氣灸法四首
積聚方五首
積聚心腹痛方三首
積聚心腹脹滿方一首
積聚宿食寒熱方四首
癥瘕方三首
暴癥方六首

鼈瘕方四首
米瘕方三首
食癥及魚肉成癥方二首
髮癥方一首
蝨瘕方一首
鼈瘕方一首
虵瘕方一首
蛟蘢病方一首
胷痺方二首
胷痺短氣方三首

胷痺心下堅痞緩急方四首
胷痺噎塞方二首
胷痺欬唾短氣方四首
胷痺心痛方四首
胷痛方二首
奔豚氣方三首
奔豚氣衝心胷方四首
雜療奔豚及結氣方六首
灸奔豚法六首

唐王燾先生外臺秘要方第十二卷

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

痃癖方五首

病源夫五藏調和則榮衛氣理榮衛氣理則津液通流雖復多飲水漿亦不能為病若攝養乖方則三焦痞隔三焦痞隔則腸胃不能宣行因飲水漿便令停滯不散更遇寒氣積聚而成癖癖者謂僻側在於兩脅之間有時而痛是也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生云卧覺勿飲水更眠令人作水癖又云飲水勿急咽久成水癖又云舉兩膝夾兩頰邊兩手據地蹲坐故久行之愈伏梁伏梁者宿食不消成癖腹中如杯如盤宿癖者宿水宿氣癖數生癖久則腸化為筋骨變為實 出第二十卷中

廣濟療腹中癖氣方

牛膝八分 桔梗六分 芍藥六分 枳實八分炙

白朮六分 鼈甲八分炙 茯苓八分 人參六分

厚朴六分炙 大黃六分 桂心六分 檳榔六分

右十二味擣篩蜜和丸空肚溫酒服如梧子二十丸日二服漸加至三十丸老小微利忌生冷油膩小豆粘食

莨菪隨生葱猪肉出第二卷中

千金與江寧衍法師破澼方

白术三兩　枳實二兩炙　柴胡三兩

右三味切以水五升煮取二升分温三服日三十劑永差忌桃李雀肉出第十九卷中

必效療澼方

取車下李人微湯退去皮及並人與乾麪相半擣之爲餅如猶乾和淡水如常溲麪大小一如病人手掌爲二餅微炙使黃勿令至熟空肚食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁即利以快利爲度至午

後利不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡爲限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉無不効但病重者李人與麪相半輕者以意減病減之後服者亦任量力頻試差神効

又方

大黃十兩

右一味擣篩醋三升和煎調內白蜜兩匙煎堪丸如梧子一服三十丸以利爲度小者減之

又方

牛黃三大豆許　麝香一當門子大　朱砂一大豆許研　生犀角小棗許別研末

以上四味並研令極細湯成後內之

大黃一兩　防葵一兩　升麻一兩　甘草半兩炙

鼈甲半兩炙　丁香五枚

右十味切以水三升先煮大黃等六味取強半升絞去滓內牛黃等四味和絞分爲三服每服如人行十里久忌如藥法若利出如桃膠肉醬等物是病出之候特忌牛馬肉其藥及水並是大兩大升此藥分兩是十五以上人服若十歲以下斟量病減之忌莧菜海藻菘菜生血物等並出第三卷中

癖結方三首

病源此由飲水聚停不散復因飲食相搏致使結積在於脅下有時弦亙起或脹痛或喘息短氣故云癖結脈緊實者癖結也出第二十卷中

廣濟療癖結心下硬痛巴豆丸方

巴豆三枚去心皮熬　杏人七枚去尖　大黃如雞子大

右三味擣篩大黃取巴豆杏人別擣如膏和大黃入蜜和丸空肚以飲服如梧子七丸日一服漸加以微利下爲度忌生冷油膩出第二卷中

千金狼毒丸主堅癖方

狼毒五兩醋汁炙　半夏三兩洗　杏人三兩　桂心四兩

附子二兩炮　細辛二兩　椒二兩汗

右七味擣篩別擣杏人蜜和飲服如大豆二丸出第十卷中

救急中候黑丸療諸癖結痰飲等大良方

桔梗四分　桂心四分　巴豆八分　芫花十二分熬

杏人五分

右五味先擣三藥成末別擣巴豆杏人如膏合和又擣一千杵下蜜又擣二千杵丸如胡豆服一丸取利可至二三丸兒生十日欲痢發可與一二丸如黍米許若不快熱中覺患便服之得一兩行利即好刖後千金同服四鎰丸下之亦得出第三卷中

寒癖方五首

病源寒癖之為病是飲水停積脅下弦強是也因遇寒即痛所以謂之寒癖脉弦而大者寒癖也出第二十卷中

別後寒癖腹中冷癖不散癥結心下停痰兩脅痞滿按之鳴轉逆害飲食方

大蟾蜍一頭去皮及腹中物支解之　芒消大人用一升中人七合瘦小五合

右二味以水七升煮取四升溫服一升一時頃服一升若未下更服一升中人七合瘦小五合得下者止後九日十日一遍作之

又方

大黃三兩　甘草二兩炙　蜜一升二合　棗七十枚

右四味切以水四升先煮三物取二升一合去滓內蜜再上火煎令烊分再服忌海藻菘菜

又方

巴豆三十枚熬　杏人二十枚　桔梗六分　藜蘆四分炙

皂莢三分去皮

右五味擣蜜和丸如胡豆未食服一丸日三欲下病者服二丸長將服百日都好差忌豬肉蘆笋狸肉古今錄驗同並出第三卷中

深師主久寒癖胸滿短氣心腹堅嘔吐手足逆冷時來時去痛不欲食食即為患心冷引腰背強急吳茱萸丸方

吳茱萸八分　附子三分炮　厚朴五分炙　半夏五分洗

桂心五分　人參五分　礬石五分熬　枳實五分炙

乾薑五分

右九味下篩蜜和酒服如梧子二十丸日三不知增之出第十六卷中

延年白术丸主宿冷癖氣因服熱藥發熱心驚虛悸下冷上熱不能食飲頻頭風旋喜嘔吐方

白术六分　厚朴兩分炙　人參五分　白芷二分

橘皮四分　防風五分　吳茱萸四分　芎藭四分

薯蕷四分 茯神五分 桂心四分 大麥蘖熬四分
乾薑四分 防葵炙四分 甘草炙五分
右十五味擣篩蜜和丸如梧桐子酒服十五丸日再加
至二十丸 出第十六卷中

久癖方二首

病源久癖謂因飲水過多水氣壅滯遇寒熱氣相搏便成
癖在於兩脅下經久不差乃結聚成形段而起摸之乃水
[illegible]積有方今以六久癖 出第二十卷中

集驗療冷熱久癖實不能下虛滿如水狀方
前胡四兩 生薑四兩 枳實炙三兩 半夏洗四兩

白朮三兩 茯苓四兩 甘草炙二兩 桂心二兩
右八味切以水八升煮取三升分三服 千金同出第六卷中

古今錄驗曾青丸療久寒積聚留飲宿食天行傷寒結胸
之二十日愈久服令人延年益壽及仲景云[illegible]
療久癖[illegible]留飲宿食天行傷寒[illegible]
[illegible]小兒服藥或吐或下或汗出方
曾青二分 寒水石三分 朴硝二分 茯苓一分
大黃三分 附子炮三分 巴豆二分
右七味各異擣下篩巴豆消相合擣六千杵次以[illegible]
擣相得次內茯苓擣相得次內大黃擣相得次內曾[illegible]

擣相得次內寒水石擣相得次內蜜和擣千杵大人服
大豆二丸小兒五歲以下如麻子一丸二三歲兒如黍
米一丸如服藥以蒸粉粥清下當覆取令汗出吐下氣
發作服二丸霍亂服三丸泄痢不止服一丸可至二丸
一方用曾青三分忌豬肉冷水蘆笋大酢 崔氏同出第十卷中

癖羸瘠方二首

刪繁療癖痃羸瘠骨髓酒方
豬脂二升 牛髓二升 油五升 薑汁三升
生地黃汁三升 當歸四分 蜀椒汗四分 吳茱萸五合
桂心五分 人參五分 五味子七分 芎藭五分

乾地黃七分 遠志皮五分
右十四味切擣九味下篩為散取骨髓等五種汁加水
一斗同汁煎取水并藥汁俱盡但餘膏在停小冷下散
攪令調火上煎三上三下煉器貯凝冷為餅方寸以清
酒一升煖下膏取服之盡兩服夜一服非但療癖亦主
百病忌生葱蕪荑

又枸杞子散方
枸杞子五升 乾薑五兩 白朮五兩 吳茱萸一升
蜀椒汗三合 橘皮五兩
右六味切擣五味三篩下為散取枸杞子煤瓷器貯稍

鼠卻作米粉法七日鼠之一鼠一研取前藥散和之又研隨飲酒食等即便服一方寸匕和酒食進之如此作三年服非但療百病亦長陽氣 並出第五卷中

痃癖方四首

廣濟療痃癖氣兩脅妨滿方

牛膝十分 桔梗八分 芍藥八分 枳實八分

人參六分 白朮八分 鱉甲八分 茯苓八分

訶梨勒皮八分 柴胡六分 大黃十分 桂心六分

右十二味擣篩蜜和丸如梧子空肚酒飲及薑湯任服二十丸日二服漸加至三十丸利多即以意減之常取微通洩爲度忌生硬難消油膩等物及莧菜 一方用五加皮無人參 出第二卷中

千金翼療十年痃癖方

桃人六升 豉六升 蜀椒三兩 乾薑三兩

右四味先擣桃人如脂令擣千杵如乾可下少許蜜和擣令可丸空肚酒服三丸如酸棗大日三 本方下有注此不載出第十九卷中

崔氏療痃癖結令發如錐刀所刺鬼疰往來者方

烏頭八分炮 人參八分 桂心八分 附子八分炮

乾薑八分 赤石脂八分 朱砂三分研

右七味擣篩蜜和爲丸如梧子以暖酒服七丸漸稍加之至十九

又療痃癖方

鼠屎一合炒令黃

右一味以水二升煮五六沸及熱濾取汁置椀中急內硇砂一小兩乃並頭經宿明日平旦溫暖頓服稍晚食細隨忌 一方硇砂作朱砂 並出第七卷中

痃氣方三首

廣濟療痃氣方

牛膝六分 芍藥六分 桔梗八分 枳實三分炙

厚朴八分炙 橘皮四分 茯苓六分 人參五分

葶藶子五分熬 訶梨勒六分熬 柴胡八分 檳榔四分

大黃六分

右十三味擣篩蜜和丸空肚煮大棗飲服如梧子二十丸日再漸漸加至三十丸如利多以意減之忌生硬難消物及油膩豬肉醋物 出第二卷中

處年澼兩肋脹急痃滿不能食兼頭痛壯熱身體痛方

枳實三兩炙 桔梗二兩 鱉甲二兩炙 人參二兩

前胡二兩 生薑四兩 檳榔七枚 桂心二兩

右八味切以水九升煮取二升五合去滓分溫三服如

人行七八里久禁生葱莧菜 出第十六卷中

又療急癖腹中痃氣連心以來相引痛緊急方

白朮三兩 枳實炙一兩 柴胡四兩 鼈甲炙二兩

右四味切以水七升煮取二升五合去滓空肚分三服相去七八里人能頓服三四劑始知驗禁生冷猪肉并毒魚大須慎之類服宜加忌莧菜生葱 出第七卷中

癖及痃癖不能食方一十四首

廣濟療癥癖痃氣不能食兼療羸瘦四肢常痛方

牛膝六兩 生地黃九兩 當歸三兩 桂心四兩

肉蓯蓉六兩 遠志去心二兩 五味子五兩 麴末五合熬令黃

白朮三兩 人參一兩 茯苓六兩 芍二兩

大麥蘗末一升五合熬黃

右十二味搗篩爲散空腹温酒服方寸匕日二服漸加至一匕半夏中煮生薑及檳榔飲下加麥門冬六兩此方甚宜久服令人輕健忌牛肉生葱蕪荑等 出第二卷中

崔氏療宿癖時腹微滿不能食調中五參丸方

人參三兩 沙參 玄參 丹參

苦參各一兩 大黃四兩 附子一兩 巴豆四十枚

蜀椒一合汗 芫花半兩 防風一兩 䗪蟲十枚熬

葶藶一合熬

右十三味搗下篩蜜和爲丸如梧子先食服一丸日三忌猪肉蘆筍生血等物

又療癖飲并醋咽吐水及沫食飲不消氣逆脹滿方

檳榔十兩 高良薑三兩 桃人一升

右三味和搗細篩以白蜜和丸酒服如彈丸一枚日再服漸加至四五丸加減任意自量 並出第七卷中

延年人參丸主痃癖氣不能食方

人參八分 白朮六分 枳實炙六分 橘皮四分

桂心七分 甘草炙五分 桔梗五分

右七味搗篩蜜和爲丸如梧子大一服十五丸酒下日二服加至二三十丸

又療冷氣兩肋脹滿痃氣不能食方

白朮二兩 人參二兩 茯苓三兩 枳實炙三兩

生薑三兩 桔梗二兩 桂心一兩半

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分温三服如人行七八里久

又桃人丸主痃癖氣漫心脹滿不下食發即更服連乳滿頭面腫悶欬逆急者方

桃人八分 鼈甲炙六分 枳實炙六分 白朮六分

桔梗五分 吳茱萸五分 烏頭炮七分 檳榔五分

防葵五分 芍藥四分 乾薑五分 紫菀四分
細辛四分 皂莢皮子二分去 人參四分 橘皮四分
甘草炙二分
右十七味搗篩蜜和丸如梧子服十丸日再服加至二十丸忌熱麪猪肉莧菜等
又浸藥酒用下前藥方
紫蘇三兩 牛膝三兩 丹參二兩 生薑六兩
生地黃汁三升 香豉三升 紫菀三兩 防風四兩
橘皮二兩 大麻人一升五合
右十味細切絹袋盛以清酒二斗五升浸三宿後温一盞用下桃人丸酒盡更添忌蕪荑

又療檳榔子丸主腹內痃癖氣滿胷背痛不能食日漸羸瘦四肢無力欬嗽心驚方
檳榔子四分 桔梗四分 當歸四分 人參五分
桂心四分 前胡四分 橘皮三分 厚朴炙三分
白朮四分 甘草炙五分 烏頭炮四分 乾薑四分
茯神四分 鼈甲炙五分 大黃四分 龍齒炙六分
右十六味搗篩蜜和為丸如梧子大服十丸飲汁下日二服加至二十丸酒下亦得忌醋莧菜生葱等
又療痃癖胷背痛時時欬嗽不能食方
桂心四分 細辛四分 白朮六分 厚朴炙三分
檳榔子五分 乾薑五分 橘皮三分 鼈甲炙四分
芍藥炙二分 吳茱萸三分
右十味搗篩蜜和為丸如梧子大服十五丸酒下日二服加至二三十丸忌莧菜醋物生葱等
又療痃癖發即兩肋弦急滿不能食方
檳榔子六分 枳實炙六分 桔梗四分 鼈甲炙四分
人參六分 白朮六分 桂心三分 芍藥五分
前胡四分 萎蕤五分 大黃五分 甘草炙六分
右十二味搗篩蜜和為丸如梧子大服十丸酒下日一服加至二十丸忌莧菜生葱猪肉等

又半夏湯主腹內左肋痃癖硬急氣滿不能食胷背痛者方
半夏洗三兩 生薑四兩 桔梗二兩 吳茱萸二兩
前胡三兩 鼈甲炙三兩 枳實炙二兩 人參一兩
檳榔子十四枚
右九味切以水九升煮取二升七合去滓分温三服如人行八九里久忌猪羊肉餳莧菜等
又療冷痃癖氣發即痃氣急引膀胱痛氣滿不消食桔梗丸方

桔梗四分 枳實炙四分 鼈甲炙四分 人參四分
當歸四分 桂心三分 白朮四分 吳茱萸三分
大麥糵六分 乾薑四分 甘草炙五分
右十一味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服十丸酒下日再服稍加至二十丸禁生葱猪肉莧菜等
又黃耆丸療風虛盜汗不能食腹內有痃癖氣滿者方
黃耆五分 白朮六分 鼈甲炙五分 白芍三分
牛膝熬四分 茯苓六分 桂心三分 乾薑四分
枳實炙四分 橘皮三分 當歸四分 檳榔子六分
人參六分 前胡四分 附子炮四分

右十五味擣篩蜜和爲丸如梧子大一服十五丸酒下日再服加至二十丸忌醋物猪肉冷水莧菜生葱並出第十六卷中
必効練中丸主癖虛熱兩脅下癖痛惡不能食四肢酸弱口乾唇燥掬粘眼澀頭時時痛并氣衝背膊虛腫大小便澀小腹痛熱衝頭髮落耳鳴彌至健忘服十日許記事如故時無禁忌方
大黃一斤 朴消練十兩 芍藥八兩 桂心四兩
右四味擣篩蜜和爲丸如梧子平旦酒服二十丸日再稍加至三十丸以利爲度能積服彌佳縱利不虛人神良忌生葱
又鼈甲丸主癖氣發動不能食心腹脹滿或時發熱方
鼈甲炙八分 白朮十分 枳實炙八分 芍藥六分
麥門冬去心八分 人參八分 前胡六分 厚朴六分
右八味擣篩蜜和爲丸如梧子飲服二十丸漸漸加至二十丸食前酒服極効禁莧菜並出第二卷中
療癖等一切病方四首
千金療癖氣乃至數服瘥方
烏牛尿一升
右一味微火煎如稠糖空肚服大棗許一枚當鳴轉病

出隔日更服慎口味等
三稜草煎主痃癖方
三稜草取一大束
右一味水五石煮取一石去滓更煎取三斗汁銅器中重釜煎如稠糖出內密器中旦以酒一盞服一匕日二服每服常令酒氣相續並出第十九卷中
崔氏療腹中痃癖飲虛熱者不可用轉冷藥瀉藥宜壽庶攻之方
鼈甲炙八分 龜甲炙八分 桑耳金色者炙八分 大黃八分
吳茱萸八分 防葵八分 附子炮四分

右七味下篩蜜和爲丸如梧子飲若酒服十丸日再服漸漸加之以微溏爲度其所忌日晚服馬齒莧汁三四合以差爲度亦足單煮此汁服前藥更佳凡諸疾即馬莧也忌豬肉冷水（今詳前方用鼈甲不宜服莧恭云目前服馬莧汁并服藥必佳也）出第七卷中

又崔白丸療痃癖癥等一切病方

紫菀三分　吳茱萸二分　菖蒲二分　柴胡二分
厚朴一分炙　桔梗二分　皂莢三分去皮子炙　烏頭十分炮
茯苓二分　桂心二分　乾薑二分　黃連二分
蜀椒二分汗　巴豆一分熬　人參二分

右十五味合擣下篩和以白蜜更擣二千杵丸如梧子一服二丸不知稍增至五丸以知爲度心腹積聚久癥癖塊大如杯碗黃疸宿食朝起嘔變支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脅徹背連胸痛無常處繞臍絞痛狀如蟲咬又療十種水病八種痞塞反胃吐逆飯食噎塞或五淋五痔或九種心痛積年食不消化或婦人不產或斷緒多年帶下淋瀝或痎瘧連年不差又療一切諸風身體頑痺不知痛癢或半身不遂或眉髮墮落又療七十二種風亦療三十六種遁注或顛或癇或婦人五邪夢與鬼交通四肢沉重不能飲食昏昏默默只欲取死終日憂愁情中不樂或恐或懼或悲或啼飲食無味月水不調真似懷孕連年累月羸瘦困弊遂至於死或歌或哭爲鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈臣知方驗便合藥與婦人服之十日下出癥癖蟲長二尺五寸三十餘枚下膿三升黑血一斗青黃汁五升所苦悉除當月有子臣兄墮馬被損腹中有積血天陰即發羸瘦異常久著在床命在旦夕臣與藥服之下如雞肝黑血手大一百片白膿二升赤黃水一升許其病即差臣知方驗謹上禁生冷鹽醋豬羊魚雞犬牛馬驢肉五辛蔥麪油膩豆及糯米粘滑藝與之屬（出第十二卷中）

癖硬如石腹滿方二首

廣濟療腹中痃氣癖硬兩脅臍下硬如石按之痛腹滿不下食心悶欬逆積年不差鼈甲丸方

鼈甲八分炙　牛膝五分　芎藭四分　防葵四分
大黃六分　當歸四分　乾薑四分　桂心四分
細辛四分　附子四分炮　甘草四分炙　巴豆二七枚

右十二味擣篩蜜和丸平旦空腹溫酒下如梧子四丸日二服漸加以微利一兩行爲度忌生蔥莧菜（出第二卷中）

必效療痃癖堅如石積年不損方

取白朴木東南枝去蒼皮細剉五升熬令黄酒五升淋訖即以絹袋盛滓還内酒中密封再宿每服一合日二出第三卷中

食不消成癥積方四首

集驗療凡所食不消方

取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐去宿食即差張文仲備急同崔氏說有人食鱠不消化作癥瘕本此方療子燒服之發時日病即差千金同出第十二卷中

備急食魚鱠及生肉住胸膈中不消化吐之不出多成癥病方

朴消如半雞子一枚 大黄一兩

右二味以酒二升煮取一升去滓盡服之立消無朴消用芒消消石亦佳 肘後同

又宿食不消大便難練中丸方

大黄八兩 葶藶 杏人去皮尖 芒消各四兩

右四味擣篩蜜和丸如梧子服七丸日三不知稍加至十丸 此方並出第三卷中

古今錄驗療宿食不消欲成癥積艾煎丸方

白艾一束 薏苡根一把

右二味合煮汁成如飴取半升一服之使利吐去宿食

神驗出第十卷中

心下大如杯結癥方二首

病源積聚痼結者是五藏六腑之氣已積聚於内重因飲食不節寒溫不調邪氣重沓牢痼盤結者也久即成癥 出第十九卷中

肘後療心下有物大如杯不得食者方

葶藶二兩熬 大黄二兩 澤漆四兩

右三味擣篩蜜和擣千杵服如梧子二丸日三不知稍加 千金文仲集驗古今錄驗同云療癥堅心下大如杯食則腹滿心腹絞痛

又熨癥方

竈中黄土一升 生葫一升

右二味先擣葫熟内土復擣以好苦酒澆令浥浥先以塗布一面仍搶病上又塗布上乾復易之取令消止 並出第一卷中

癥癖痃氣灸法四首

崔氏療癥癖閃癖方

令患人平坐取麻線一條繞項向前垂線頭至鳩尾横截斷即迴線向後當脊取線窮頭伺點記乃別横度口吻吻外截却即取度吻線中摺於脊骨點處中心上下分之各點小兩頭通前合灸三處其所灸處

日別灸七壯以上十壯以下滿十日即停看患人食稍得味即取線還度口吻於脊中點處橫分灸之其數一準前法仍看脊節穴去線一二分亦可就節穴下火如相去遠者不須就節穴若患人未損可停二十日外還依前灸之仍灸季肋頭二百壯其灸季肋早晚與灸脊上同時下火也

又灸悶癖法

其癖有根其根有著脊者有著脅上者適所患人平坐熟看癖頭仍將手從癖頭向上尋之當有脈築築然向上細細尋至脅上至築築頭當脅即下火還與前壯數無別王丞不背上恐不得過多下火只可細細日別七炷以來

又療癖左右相隨病灸法

第一屈肋頭近第二肋下即是灸處第二肋頭近第三肋下亦是灸處左右各灸五十壯一時使了千金云灸療癖方患左灸左患右灸右脊屈肋數第二肋上第三肋下向內趣前初日灸三次日五周而復始至五十止忌大前條不忌

又灸痃氣法

從乳下即數至第三肋下共乳上下相當稍似近內接肉外取穴孔即是灸處兩相俱灸初下火各灸三壯明日四壯每日加一壯至七壯還從三壯起至三十日即罷

右前兩療灸法若點時拳脚點即拳脚灸若舒脚點時還舒脚灸並出第七卷中

積聚方五首

病源積聚者由陰陽不和腑臟虛弱受於風邪搏於腑臟之氣所為也腑者陽也臟者陰也陽浮而動陰沉而伏積者陰氣五臟所生始發不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無有常處諸臟受邪初未能為積聚留滯不去乃成積聚

肝之積名曰肥氣在左脅下如覆杯有頭足久不愈令人發咳逆痎瘧連歲月不已以季夏戊己日得之何以言之肺病當傳肝肝當傳脾脾季夏適王王者不受邪肝欲復還肺肺不肯受故留結為積故知肝之積以季夏戊己日得之也

心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下以秋庚辛日得之何以言之腎病當傳心心當傳肺肺以秋適王王者不受邪心欲復還腎腎不肯受故留結為積故知伏梁以秋庚辛日得之也

脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不愈令人四肢不

攻發黃疸飲食不爲肌膚以冬壬癸日得之何以言之肝病當傳脾脾當傳腎腎以冬適王王者不受邪脾欲復還肝肝不肯受故留結爲積故知痞氣以冬壬癸日得之也

肺之積名曰息賁在右脅下覆大如杯久不愈令人洒淅寒熱喘欬發肺壅以春甲乙日得之何以言之心病當傳肺肺當傳肝肝以春適王王者不受邪肺欲復還心心不肯受故留結爲積故知息賁以春甲乙日得之也

腎之積名曰賁豚發於少腹上至心下若豚賁走之狀上下無時久不愈令人喘逆骨痿少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病當傳腎腎當傳心心以夏適王王者不受邪

腎欲復還脾脾不肯受故留結爲積故知賁豚以夏丙丁日得之也此爲五積診其脈駃而緊積聚脈浮而牢積聚脈横者脅下有積聚脈來小沉實者胃中有積聚不下故食即吐出脈來細耎附骨者積也脈出在左積在左脈出在右積在右脈兩出積在中央以部處之診得肺積脈浮而毛按之辟易脅下氣逆背相引痛少氣善忘目瞑皮膚寒秋愈夏劇主皮中時痛如蝨緣狀其甚如鍼刺之狀時痒白色也診得心積脈沉而芤時上下無常處病悸腹中熱面赤咽乾煩掌中熱甚即唾血主身瘛瘲主血厥夏差冬劇色赤也診得脾積脈浮大而長饑則減飽則見膜起與穀爭累累如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重足脛腫厥不能卧是主肌肉損色黃也診得肝積脈弦而細兩脅下痛邪走心下足腫寒脅痛引少腹男子積疝也女子病淋也身無膏澤喜轉筋爪甲枯黑春差秋劇色青也診得腎積脈沉而急苦脊與腰相引饑則見飽則減病腰痛少腹裏急口乾咽腫傷爛目䀮䀮骨中寒主髓厥喜忘色黑也診得心腹積聚其脈牢強急者生虛弱急者死又積聚之脈實強者生沉者死其異狀鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以左足踐右足上除心下積又云病心下積聚端坐柱腰向日仰頭徐以口

內氣因而咽之三十過而止開目又云左脅側卧伸臂直腳以口內氣鼻吐之周而復始除積聚心下不便又云以左手按右脅舉右手極形除積及老血又云閉口微息正坐向王氣張鼻取氣逼置臍下小口微出十二通氣以除結聚低頭不息十二通以消飲食令人輕強行之冬月令人不寒又云端坐伸腰直上展兩臂仰兩手掌以鼻內氣閉之自極七息名曰蜀王喬除脅下積聚又云向晨去枕正偃卧伸臂脛瞑目閉口不息極張腹兩足再息頃間吸腹仰兩足倍拳欲息微定復爲春三夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六腑所病皆愈腹有病積聚者張吸其腹熱乃

止癥瘕散後即愈 並出第十九卷中

范汪破積丸療積聚堅癥方

大黃一斤 牡蠣三兩 寒水石一兩 石膏一兩

石鍾乳一兩 理石一兩

右六味擣合下篩和以蜜丸如梧子先食服以飲任下二丸日三不知稍增以知爲度

又[illegible]丸主久寒積聚氣逆不能食方

大黃一分 黃芩四分 厚朴四分炙 乾地黃四分

桂心四分 滑石四分 杏子二分 黃連四分

麥門冬四分去心

右九味擣合下篩和以蜜丸如梧子服十丸日再服後食不知稍增以知爲度忌蕪荑生葱猪肉

又播鼈丸療腹中積聚邪氣寒熱消穀方

甘遂一分 蕘花一分 芫花一分 桂心一分

巴豆一分 杏人一分 桔梗一分

右七味蕘花芫花熬令香巴豆杏人去皮熬令變色巴豆別作擣合丸以白蜜擣萬杵服如小豆一丸日三行長將服之傷飽增服膈上吐膈下利小兒亦服婦人懷身亦服名曰種鼈以消息之忌猪肉蘆笋生葱 並出第十二卷中

延年療腹內積聚癖氣衝心肋急滿時吐水不能食兼惡寒方

鼈甲六分炙 防葵四分 人參四分 前胡四分

桔梗四分 檳榔八分 白朮八分 大黃八分

枳實四分炙 厚朴二分炙 當歸四分 附子四分炮

乾薑四分 甘草五分炙 吳茱萸二分

右十五味擣篩蜜和爲丸梧子大一服十五丸酒下日再服加至三十丸忌莧菜猪肉生冷魚蒜

又白朮丸主積聚癖氣不能食心肋下滿四肢骨節酸疼盜汗不絕方

白朮六分 黃耆六分 牡蠣四分熬 人參六分

茯苓六分 烏頭六分炮 乾薑六分 芍藥四分

當歸六分 細辛四分 麥門冬四分去心 桂心五分

前胡四分 甘草六分炙 防葵三分 鼈甲四分炙

紫菀三分炙 檳榔六分 桔梗三分

右十九味擣篩蜜和爲丸空肚酒下二十丸日再加至三十丸忌莧菜桃李大酢猪肉生葱 並出第十六卷中

積聚心腹痛方三首

病源積者陰氣五藏所生其痛不離其部故上下有所窮已聚者陽氣六腑所成故無根本上下無所留止其痛無

有常處此皆由寒氣搏於藏府與陰陽氣相擊下上故心腹痛也診其寸口之脉沉而横脅下有積腹中有横積聚痛又寸口脉細沉滑者有積聚在脅下左右皆滿與背相引痛又云寸口脉緊而牢者脅下腹中有横積結痛而泄痢脉微細者生浮者死 出第十九卷中

范汪通命丸療心腹積聚寒中疞痛又心胸滿脅下急繞臍痛方

大黃十分 遠志四分去心 黃芩四分 麻黃四分去節
甘遂四分 鹿茸四分炙 杏人六十枚 豉一合
巴豆五十枚 芒消一分

右十味擣合下篩和以蜜丸如小豆先食服三丸日再忌蘆笋野猪肉 一方無鹿茸黃耆用黃芩出第十四卷中

又療心腹積聚食苦不消胷脅滿除去五藏邪氣四物丸方

大戟五分炙令色變 芫花四分熬 杏人一分 巴豆一百枚去皮心熬

右藥擣合下細篩以雞子中黃亦可以蜜和丸如小豆日三日再一丸覺勿復益欲下頓服七丸下如清漆陳宿水婦人乳有餘疾留飲者下水之後養之勿飲冷水長服者服五丸先食忌野猪肉蘆笋 出第十三卷中

古今錄驗何奴露宿丸療心腹積聚膈上下有宿食留飲神方 出僧深

甘草三分炙 大黃二分 甘遂二分 芫花二分熬
大戟二分炙 葶藶子二分熬 苦參一分 消石一分
巴豆半分去心皮熬

右九味細擣合蜜和丸如小豆服三丸當吐下不吐下稍益至五六丸以知爲度先少起忌海藻菘菜野猪肉蘆笋 出第十卷中

積聚心腹脹滿方一首

病源積聚成病蘊結在内則氣行不宣通是搏於府藏故心腹脹滿煩悶而短氣也 出第十九卷中

深師烏頭丸療心腹積聚脹滿少食多厭嘔噎痛按之排手寒中有水上氣女人産後餘疾大人風癲少小風驚癇百病者元嘉中用療數人皆良有一人服五服藥即出蟲長一尺餘三枚復出如牛膽黑堅四枚中皆有飯食病即愈方

烏頭七枚炮 乾薑五分 皂莢五分炙去皮子 菖蒲三分
桂心四分 柴胡三分 附子三分炮 人參二分
厚朴三分炙 黃連三分 茯苓三分 蜀椒五分汗
吳茱萸四分 桔梗三分

右十四味擣篩蜜和爲丸服如梧子二丸日三稍加至

十五丸忌豬肉冷水酢物生葱羊肉餳出第二十三卷中

積聚宿食寒熱方四首

病源積聚而宿食不消者由府藏為寒氣所乘脾胃虛冷故不能消化留為宿食也診其脉來實心腹積聚飲食不消胃中冷故也出第十九卷中

千金翼三台丸療五藏寒熱積聚臚脹腸鳴而噫食不作肌膚甚者嘔逆若傷寒寒瘧已愈令不復發食後服五丸飲多者吞十丸長服令人大小便調和長肌肉方

大黃二兩熬 硝石一升熬 葶藶一升熬 前胡二兩
厚朴一兩炙 附子一兩炮 茯苓半兩 半夏一兩洗

杏人一升去尖皮熬 細辛一兩

右十味擣篩蜜和擣五千杵酒服如梧子五丸稍加以知為度忌豬羊肉餳生菜酢物深師同出第二十卷中

古今錄驗氣痞丸療寒氣痞積聚結不通繞臍切痛腹中脹滿留逼澼風入藏憂恚所積用力不節筋脉傷羸瘦不能食飲且紫令人疏瘠食益氣力方

烏頭二分炮 甘草二分炙 葶藶子二分熬 大黃二分
芎藭二分 芍藥二分 甘皮二分炙

右七味下篩蜜和丸如梧子一服三丸日再不知稍加至五丸七丸一方桂心二分去甘皮忌海藻菘菜豬肉冷

水等一方有通草無甘皮

又小烏頭丸療久寒積聚心腹繞臍切痛食飲不下方

烏頭三兩炮 甘草三兩炙 茱萸半兩 細辛二兩
半夏二兩 附子二兩炮 藁本二兩

右七味下篩蜜和丸如梧子大先食服五丸日再不知稍增之忌羊豬肉冷水

又五通丸主積聚留飲宿食寒熱煩結長肌膚補不足方

椒目一兩 附子一兩炮 厚朴一兩炙 杏人三兩
半夏一兩 葶藶三兩熬 芒硝五兩 大黃九兩

右八味擣葶藶子杏人使熟和諸藥末和以蜜擣五千杵

丸如梧子二丸忌豬羊肉餳冷水出第十二卷中

療癥方三首

病源癥者由寒溫失節致腑藏之氣虛弱而食飲不消聚結在內漸染生長塊段盤牢不移動者是癥也言其形狀可徵驗也若積引歲月人則柴瘦腹轉大遂至於死診其脉弦而伏其癥不轉動者必死出第十九卷中

范汪療癥病丸方

射罔二兩熬 蜀椒三百粒汗

右二味擣末下細篩以雞子白和丸半如麻子半如赤小豆先服如麻子漸服如赤小豆二丸不知稍增之以

知爲度出第十三卷中

集驗療心腹宿癥及卒得癥方

取雄雞一頭飼之令肥肥後餓二日以好赤朱攪飯極令朱多以飼雞安雞著板上取糞曝燥末温清酒服五分匕可至方寸匕日三若病困急者晝夜可五六服一雞少更飼餘雞取足出第六卷中

備急療癥方

吴茱萸三升

右一味以酒和煮熟布裹以熨癥上冷更炒更番用之癥移走逐熨都消乃止也肘後方云亦可用射罔五兩

茱萸末以雞子白和塗癥上出第三卷中

暴癥方六首

病源暴癥者由臟氣虛弱食生冷之物臟既本弱不能消之結聚成塊卒然而起其生無漸名之暴癥也本由臟弱其癥暴生至於成病斃人則速出第十九卷中

肘後療卒暴癥腹中有物堅如石痛如刺晝夜啼呼不療之百日死方

取牛膝根二斤㕮咀曝令乾

右一味酒一斗漬之密封器中封口舉著熱灰中温之令味出先食服五六合至一升以意量多少又用蒴藋根亦準此大良千金集驗經心錄張文仲同

又凡癥堅之起多以漸生而有覺便牢大者自難療也腹中微有結積便害飲食轉羸瘦療多用陷冰玉壺八毒諸大藥今上取小小易得者方

取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘淨洗乾之搗作末以秫米五斗炊飯內攪之好酒五斗漬封藥消飯浮可飲一升半勿食鮭鹺鹽當出亦可但取其根一升乾搗千杵酒漬飲之從少起日三亦佳此酒療癥乃勝諸大藥張文仲同

又方

大黃半斤　朴消三兩　蜜一斤

右三味合於湯上煎可丸如梧子服十丸日二張文仲崔氏同姚崔氏用朴消半斤蜜一升半服二十丸日再服餘依肘後並出第一卷中

千金與療卒暴癥方

蒜十片去皮五月五日戶上者良　伏龍肝鷄子大　桂心一尺二寸

右三味合搗以淳苦酒和之如泥塗著布上掩病處三日消肘後千金同凡蒜或無桂心亦得用也

又方

蒴藋根搗蒸之以新布籍腹上以藥鋪布上以衣覆冷即易取差止數日之中旦夕勿忘千金同肘後並出第十九卷中

古今錄驗療猝得瘕方

取新雚根一小束淨洗瀝去水細切以醇酒漬之取淹根三宿服五合至一升日三若欲速用可於熱灰中溫令藥味出服之此方無毒已愈十六人神驗藥盡復作將服之 出第十卷中

鼈瘕方四首

病源鼈瘕者謂腹內瘕結如鼈之形狀也有食鼈觸冷不消而生瘕者有食雜冷物不消變化而作者此皆脾胃氣弱而遇冷不能剋消故也瘕者其病結成推之不動移是也 出第十九卷中

廣濟療鼈瘕服白馬尿方

白馬尿一升五合溫服之令盡差

又方

白馬尿一升 雞子三枚破取白

右二味於鐺中煎取三合空腹服之不移時當吐出病無所忌 千金同

又療鼈瘕蟹爪丸方

蟹爪三分 附子六分炮 麝香三分研 半夏六分 生薑四分屑 鼈甲六分炙 防葵六分 郁李人八合

右八味擣篩蜜和爲丸如梧子空肚以酒下二十丸日再服以知爲度忌生冷猪肉莧菜 並出第二卷中

集驗療鼈瘕伏在心下手揣見頭足時時轉者并心腹宿瘕及卒得瘕方

白雌雞一隻絕食一宿明旦以膏熬飯飼之取其屎無問多少以小便和之於銅器中火上熬令燥擣篩服方寸匕日四五服消盡乃止常飼雞取屎盡畢殺雞單食之 肘後同 出第六卷中

米瘕方二首

病源人有好啞米 啞謹按說文烏革切笑也集韻無此字但有欸乙革切欸也今詳啞者飲嗣書 食之業轉久彌嗜啞之若不得米則胸中清水出得米便也下闕止米不消化遂生瘕結其人常思米而不能飲食久則斃人 出第十九卷中

廣濟療米瘕其疾常欲食米若不得米則胸中清水出方

雞屎一升 白米五合

右二味合炒取米焦擣篩爲散用水一升頓服取盡少時即吐出瘕如研米汁碎若無瘕即吐白沫痰水乃憎米不復食之無所忌 千金同

又療米瘕久不瘥羸瘦以至死方

葱白兩虎口切 烏梅三十枚碎

右二味以水三升宿漬烏梅使得極濃滿服啖葱白隨飲烏梅汁令盡頃之心腹煩欲吐即令出之三晨服之當吐去米瘕差無所忌 並出第二卷中

食瘕及食魚肉成瘕方二首

病源有人卒大能食乖其常分因饑值生葱便大食之乃吐一肉塊繞畔有口其病則愈故謂食瘕特由不幸致此妖異成瘕其人食生冷過度之病也 出第十九卷中

廣濟療食瘕病食葱差方

有一人食飯七升并羊脂餅醬不論數因於道中遇饑急食生葱須臾吐出一寶薄而圓繞畔有口無數

即以食投之立消盡飯七升乃止吐此物後其人食病便愈此名食瘕無忌 出第二卷中

千金療食魚肉等成癥結在腹內并諸毒氣方

狗糞五升

右一味燒灰末之綿裹以酒一斗浸再宿濾取清分十服日三服三日令盡隨所食癥結即便出矣 出第十一卷中

髮瘕方二首

病源有人因食飲內誤有頭髮隨食而入胃成瘕因喉間如有蟲下上來去者是也 出第十九卷中

廣濟療髮瘕乃由人因食而入久即胷間如有蟲上下去來唯欲得飲油方

油一升

右一味以香澤煎之大鑪鋣貯之安病人頭邊以口鼻臨油上勿令得飲及傅之鼻面並令有香氣當叫喚取飲不得與之必疲極眠睡其髮瘕當從口出飲油人專守視之并石灰一裹見瘕出以灰粉手捉之抽出須臾抽盡即是髮也初從腹中出形如不流水中濃菜隨髮長短形亦如之無忌 千金同

又療胷喉間覺有瘕蟲上下偏聞葱豉食香此是髮蟲故油方

油煎葱豉令香二日不食張口而卧將油葱豉置口邊蟲當漸出徐徐以物引去之無所忌 出第二卷中

蝨瘕方一首

病源人有多蝨性好齧之所齧既多而脾胃虛弱不能消之不幸變化生瘕而患之者亦少俗云思蝨瘕人見蝨必齧之不能禁止蝨生長在腹內時有從下部出亦能斃人 出第十九卷中

千金療蝨瘕由噉蝨在腹生長為蝨瘕方

故篦子一枚 故梳子一枚

右二味各破為兩分各取一分燒作灰末之又取一分

以水五升煮取一升用頓服前末並少時當病出無所
忌廣濟同出第二卷中

鼈瘕方一首

病源鼈瘕者謂腹內瘕結如鼈狀是也有食鼈觸冷不消
而生者亦有食諸雜冷物變化而作者皆由脾胃氣弱而
遇冷即不能剋消所致瘕言假也謂其形假而推移也昔
曾有人共奴俱患鼈瘕奴在前死遂破其腹得一白鼈仍
故活有人乘白馬來看此鼈白馬忽尿墮落鼈上即縮頭
及腳尋以馬尿灌之即化為水其主曰吾將愈矣即服之
果如其言得差故養生云六月勿食澤中水令人成鼈瘕

出第十九卷中

崔氏療鼈瘕方

大黃六銖　乾薑半兩　附子九銖炮　人參九銖
側子半兩炮　桂心六銖　貝母半兩　白朮一兩
細辛十八銖　䗪蟲大一寸者七枚熬

右十味擣下篩以酒服半方寸匕日三忌豬肉冷水生菜出九卷中

蛇瘕方二首

病源人有食蛇不消因腹內生蛇瘕也亦有蛇之精液誤
入飲食內亦令人病瘕其狀常苦饑而食則不下喉噎塞
食至胷內即吐出其病在腹摸揣亦有蛇狀謂蛇瘕也出第
十九卷中

崔氏療蛇瘕大黃湯方

大黃半兩　芒消如雞子一枚　烏鰂魚骨二枚　黃芩半兩
甘草如人指一尺炙　皂莢六枚如豬牙者炙去皮子

右六味㕮咀以水六升煮之三沸下彼去滓內芒消適
寒溫盡服之十日一劑煮作如上法欲服之宿無食平
旦服當下病也千金同出第九卷中

蛟龍病方一首

病源蛟龍病者云三月八月蛟龍子生芹菜內人食芹菜

不幸遇入人腹變成蛟龍其病之狀發則如癲出第十九卷中

魚芹菜蛟龍病三月八月近海及水邊因食生芹菜為蛟
龍子生在芹菜上食入人腹變成龍子須慎之其病發似
癇面色青黃少腹脹狀如懷妊宜食寒食餳方

寒食粥餳三升日三服之吐出蛟龍有兩頭及尾開
皇六年又賈橋有人吸餳吐出蛟龍大驗無所忌千金
同出第一卷中

胷痺方二首

病源寒氣客於五藏六腑因虛而發上衝胷間則胷痺胷
痺之候胷中愊愊如滿噎塞不利習習如癢喉裏澀唾燥

甚者心裏強痞急痛肌肉苦痺絞急如刺不得俛仰胸前皮皆痛手不能犯胸滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或徹背膂其脉浮而微者是也不治數日殺人其藥與鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方云以右足踐左足上除胸痺食熱嘔出第三十卷中

仲景傷寒論療胸痺理中湯方

人參三兩 甘草二兩炙 白朮三兩 乾薑二兩

右四味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三夜一頻服三劑愈張仲景云胸痺心中痞堅留氣結於胸胸滿脅下逆氣搶心理中湯亦主之千金同出第十六卷中

深師療胸痺麝香散方

麝香四分 牛黃二分 生犀角一分屑末

右三味研服五分匕日三忌生冷物葱蒜出第十六卷中

胸痺短氣方三首

千金論曰夫脉當取太過與不及陽微陰弦即胸痺而痛所以然者責其極虛故也今陽虛知在上焦所以胸痺心痛者以其脉陰弦故也平人無寒熱短氣不足以息者實也仲景傷寒論同胸痺之病喘息欬唾胸背痛短氣其脉沉而遲關上小緊數者栝樓湯主之方

栝樓一枚 薤白一斤 半夏半升洗 生薑四兩

枳實二兩炙

右五味切以白截漿一斗煮取四升服一升日三服後仲景傷寒論無生薑枳實半夏等三味同小品云用水一斗忌羊肉餳

又胸中氣塞短氣茯苓湯主之方

茯苓三兩 甘草一兩炙 杏人五十枚

右三味㕮咀以水一斗煮取五升温服一升日三服不差更合仲景傷寒論同並出第十二卷中

深師療胸痺達背痛短氣細辛散方

細辛 乾地黃 甘草各二兩炙 桂心

茯苓各五兩 枳實炙 白朮 生薑

栝樓實各三兩

右九味擣篩酒服方寸匕日三古今錄驗千金同出第十三卷中

胸痺心下堅痞緩急方四首

千金論胸痺之病令人心中堅痞急痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其胸前皮皆痛手不得犯胸中愊愊如滿噎塞習習如癢喉中乾燥時欲嘔吐胸滿短氣欬唾引痛煩悶白汗出或徹引背膂痛不即療之數日殺人出第十三卷

范汪療胸痺心中痞堅留氣結於胸中胸滿脅下逆氣搶心枳實湯方

陳枳實四枚炙 厚朴四兩炙 薤白八兩 桂心一兩

栝樓實一枚

右五味先以水五升煮枳實厚朴取二升半去滓內餘藥又煎三兩沸去滓分溫三服除心氣良古今錄驗千金同出本仲景傷寒論方

古今錄驗療胸中隱然而痛吞咽有痛方

桂心一分 乾薑一分 人參三分 細辛三分

烏頭一分炮 山茱萸二分 貝母三分

右七味擣下篩和以蜜丸如小豆大酒若粥汁吞二丸稍稍益以胸中痛止溫溫為度忌生葱生菜豬肉冷水

又療胸痺偏緩急薏苡人散方

薏苡人五百枚 附子十枚大者炮 甘草三兩炙

右三味擣下篩服方寸匕日三忌海藻菘菜豬肉冷水

又療胸痺偏緩急薏苡人散方

薏苡人一千五百枚 附子十枚大者炮

右二味擣下篩服方寸匕日三不知稍增之忌豬肉冷水古今錄驗范汪同仲景方用薏苡人十五兩並出第十二卷中

胸痺噎塞方二首

仲景傷寒論胸痺之病胸中愊愊如滿噎塞習習如癢喉中澀唾燥沫是也橘皮枳實湯主之方

橘皮半斤 枳實四枚炙 生薑半斤

右三味切以水五升煮取二升分再服肘後小品文仲深師范汪古今錄驗經心錄千金同出第十五卷中

千金通氣湯療胸滿短氣噎塞方

半夏八兩洗 生薑六兩 桂心三兩 吳茱萸四十枚

右四味切以水八升煮取三升去滓分溫三服忌羊肉餳生葱一方無桂心用橘皮出第十三卷中

胸痺咳唾短氣方四首

仲景傷寒論胸痺之病喘息咳唾胸背痛短氣寸脈沉而遲關脈小緊數者栝樓薤白白酒湯主之方

栝樓實一枚 薤白半升切

右二味以白截酒七升煮取二升去滓溫分再服深師范汪同出第十五卷中

肘後論胸痺之病令人心中堅痞急痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其胸前及背皆痛手不得犯胸滿短氣咳唾引痛煩悶白汗出或徹引背脊不即療數日殺人療卒患胸痺方

雄黃 巴豆去皮心熬

右二味先擣雄黃細篩內巴豆務熟擣之相和丸如小豆服一丸不覺稍益忌野豬肉蘆笋

又方

枳實炙

右一味擣篩以米汁先食服方寸匕日三夜一

又豉已差復更發方

取薤根五斤

右一味搗絞取汁飲之立愈 並出第一卷中

胷痺心痛方四首

仲景傷寒論胷痺不得卧心痛徹背者栝樓薤白半夏白截漿湯主之方

大栝樓一枚 薤白切三兩 半夏洗半升

右三味以白截漿一斗煮取四升去滓溫服一升日三忌羊肉餳 古今錄驗同范汪同出第十五卷中

千金療胷痺心痛方

灸膻中百壯穴在鳩尾上一寸 一云胷前中行直兩乳內間是忌鍼

又療胷脅滿心痛方

灸期門隨年壯穴在第二肋端乳直下不容旁一寸半是 並出第十三卷中

古今錄驗小草丸療胷痺心痛逆氣膈中飲不下方

小草二分 桂心三分 蜀椒三分汗 乾薑二分 細辛三分 附子二分炮

右六味擣合下篩和以蜜丸如梧子大先食米汁服三丸日三不知稍增以知爲度忌猪肉冷水生葱生菜范汪同出第六卷中

胷痛方二首

范汪療胷痛枳實散方

枳實八分炙 桂心五分

右二味擣下篩酒服方寸匕日三忌生葱 深師同

深師療胷痛枳實散方

枳實四枚炙 神麴一兩熬 白朮一兩

右三味擣篩酒服方寸匕日三忌桃李雀肉等 出第十六卷中

賁豚氣方四首

病源夫賁豚者腎之積氣也起於驚恐憂思所生也若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志傷動氣積於腎而氣下上遊走如豚之奔故曰賁豚其氣乘心若心中踊踊如車所驚如人所恐五藏不定食飲輙嘔氣滿胷中狂癡不定妄言妄見此驚恐奔豚之狀也若氣滿支心心下悶亂不欲聞人聲休作有時乍差乍劇吸吸短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔此憂思賁豚之狀也診其脉來視視一云厭厭者病賁豚也腎脉微急沉厥賁豚也其足不收不得前後 出第十三卷中

小品黃帝問金治子曰驚爲病如奔豚其狀奈何金治子
對曰驚爲奔豚心中踊躍如車所驚如人所恐五藏不定
食飲輒嘔氣滿胸中狂癡欲走閉眼譫言開眼妄語或張
兩目不相取與衆師不知呼有所負賁豚湯主之黃帝曰
善黃帝問金治子曰憂思賁豚何以別之金治子對曰憂
思賁豚者氣滿支心心下煩亂不欲聞人聲休作有時
乍差乍劇吸吸短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔衆師
不知呼有所負賁豚湯主之黃帝曰善
師曰病如奔豚者氣從少腹起上衝咽喉發作欲死復還
者皆從驚恐得之腎間有膿故也 范汪同

師曰病有奔豚有吐膿有驚怖有火邪此四部病者皆從
驚發得之火邪者桂枝加龍骨牡蠣湯主之若新亡財爲
縣官所捕迫從驚恐者療用鴟頭鈴鐵 千金翼有飛鴟鉛丹主之

一三角復餘物未定 未定者上所言奔豚
者此人氣息逆喘迫上如豚奔走之狀奔豚湯主之
又療卒傷損食下則覺胸中偏痛悽悽然水漿下亦隔悶
者桂打膺急作此方
生李根一斤細切之　麥門冬一升去心　人參二兩
桂心二兩　甘草一兩炙
右五味㕮咀以水一斗煮取二升分三服 范汪同

又奔豚湯療虛勞五藏氣乏損遊氣歸上上走時若羣豚
相逐憧憧時氣來便自如坐驚夢精光竭不澤陰痿上引
少腹急痛面作熱赤色喜怒無常耳聾目視無精光方
葛根八兩乾者　生李根切一升　人參二兩　半夏一升洗
芍藥二兩　當歸二兩　桂心五兩　生薑一斤
甘草二兩炙
右九味切以水二斗煮得五升溫服八合日三不知稍
增至一升日三忌羊肉餳生葱海藻菘菜等 出第十一卷中
肘後療卒厥逆上氣氣支兩脅心下痛滿淹淹欲絕此謂
奔豚病從卒驚怖憂迫得之氣從下上上衝心胸臍間築

築發動有時不療殺人方
甘草二兩炙　人參二兩　吳茱萸一升　生薑一斤
半夏一升　桂心三兩
右六味切以水一斗煮取三升分三服此藥須預蓄得
病便急合服之 千金方桂五兩甘草三兩張文仲同

賁豚氣衝心胸方四首

廣濟療豚氣在心吸吸短氣不欲聞人語聲心下煩亂不
安發作有時四肢煩疼手足逆冷方
李根白皮八兩　半夏七兩洗　乾薑四兩　茯苓三兩
人參二兩　甘草二兩炙　附子一兩炮　桂心四兩

右八味切以水一斗煮取三升絞去滓分三服別相去如人行六七里忌生冷羊肉餳海藻菘菜油膩酢物生葱粘食 范汪同

又療賁豚氣在胷心迫滿支脇方

生薑一斤 半夏四兩湯 桂心三兩 人參二兩

甘草二兩炙 吳茱萸一兩

右六味切以水一斗煮取三升絞去滓分温三服服別相去如人行六七里忌生葱熱麪羊肉餳粘食海藻菘菜 范汪同並出第四卷中

集驗賁豘茯苓湯療短氣五藏不足寒氣厥逆腹脹滿氣賁走衝胷膈發作氣欲絕不識人氣力羸瘦少腹起騰蹹如豘子走上走下馳往馳來寒熱拘引陰器手足逆冷或煩熱者方

茯苓四兩 生葛八兩 甘草三兩炙 生薑五兩

半夏一升湯洗 人參三兩 當歸二兩 芎藭二兩

李根白皮一升切

右九味切以水一斗二升煮取五升服一升日三夜二服忌羊肉餳海藻菘菜酢物等

又療賁豘氣上衝胷腹痛往來寒熱賁豘湯方

甘草二兩炙 芎藭二兩 當歸二兩 半夏四兩湯洗

黃芩三兩 生葛五兩 芍藥三兩 生薑四兩

甘李根白皮一升切

右九味切以水二斗煮取五升去滓温服一升日三夜二服忌海藻菘菜羊肉餳等 並出第四卷中

雜療奔豘氣及諸氣方六首

深師療憂勞寒熱愁思及飲食隔塞虛勞內傷五藏絕傷奔氣不能還下心中悸動不安七氣湯方

桔梗二兩 人參三兩一方二兩 芍藥三兩 茱萸七合

黃芩二兩一方三兩 乾地黃三兩一方二兩 枳實五枚炙 桂心二兩一方三兩

乾薑三兩一方一兩 甘草二兩炙一方三兩 橘皮二兩 半夏三兩一方一升

右十二味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜羊肉餳生葱豬肉蕪荑等 千金無桂心橘皮桔梗有厚朴栝蔞蜀椒

集驗療賁豘氣從下上者湯方

生葛五兩 半夏五兩洗 黃芩二兩 桂心二兩

芍藥三兩 人參二兩 生薑五兩

甘李根白皮五兩切

右八味切以水一斗五升煮取五升去滓温分為五服日三夜二服忌羊肉餳生葱 出第四卷中

小品牡蠣賁豘湯療賁豚氣從少腹起憧胷手足逆冷方

牡蠣三兩熬 桂心八兩 李根白皮一斤切 甘草三兩炙

右四味切以水一斗七升煮取李根皮得七升去滓内
餘藥再煮取三升分服五合日三夜再忌生葱海藻菘
菜（范汪同）
又療手足逆冷胷滿氣促從臍左右起欝冒者奔㹠湯方
甘草（炙，二兩） 李根白皮（切，一斤） 葛根（一斤） 黃芩（三兩）
桂心（二兩） 栝樓（二兩） 人參（二兩） 芎藭（一兩）
右八味切以水一斗五升煮取五升去滓温服一升日
三夜再忌海藻菘菜生葱（范汪同）
又方桐君說
伏出雞卵殼中白皮 紫木灰 麻黃（去節）

紫菀（各等分）
右四味擣下篩作丸散隨宜酒服十丸如梧子散者方
寸匕療三十年喉中結氣欬逆立差也亦可水煮爲湯
以意分之（經心錄同並出第一卷中）
千金奔氣湯主火氣上奔胷膈中諸病每發時迫滿短氣
不得臥劇者便悁欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣方
桂心（五兩） 生薑（一斤） 人參（三兩） 半夏（一升，洗）
吳茱萸（一升） 甘草（三兩，炙）
右六味切以水一斗煮取三升去滓分爲四服忌羊肉
餳生葱海藻菘菜（出第十七卷中）

灸奔㹠法
千金療奔㹠腹脹法
灸章門一名長平二穴在大橫外直臍季肋端百壯
又主奔㹠衝心不得息
灸中極一名玉泉在臍下四寸五十壯
又主奔㹠上下腹中與腰相引痛者法
灸中府二穴在雲門下一寸乳上三肋間氣脉是百
壯一云百五十壯
又主奔㹠上下者法
灸四滿夾丹田旁相去三寸七壯

又主奔㹠法
灸氣海在臍下一寸半百壯
又法
灸關元在臍下三寸五十壯亦可百壯（並出第十七卷中）

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校
勘

重訂唐王壽先生外臺秘要方第十二卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十三卷目錄 骨蒸傳屍鬼疰鬼魅二十六門

虛勞骨蒸方七首
骨蒸方一十七首
灸骨蒸法圖四首
痃氣骨蒸方三首
虛損慘瘁作骨蒸方四首
瘦病方五首
傳屍方四首
伏連方五首
飛尸方三首
遁尸方三首
五尸方一十一首
尸疰方四首
五疰方四首
江南九十九疰方二首
江南三十六疰方三首
疰病相染易方三首
鬼疰方二首
鬼疰心腹痛方一首
鬼疰羸瘦方二首

鬼氣方三首
鬼魅精魅方八首
鬼神交通方四首
白虎方五首
無辜方二首
除骨熱方四首
盜汗方七首

唐王燾先生外臺秘要方卷十三

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

虛勞骨蒸方七首

病源夫蒸病有五一曰骨蒸其根在腎旦起體凉日晚即熱煩躁寢不能安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力腰疼兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內即變爲疳食人五藏二曰脉蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫臥即浪言或驚恐不定脉數蒸盛之時或變爲疳

臍下悶或暴痢不止三曰皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胸滿或自稱得疰熱兩脅下脹大欬徹背連胛疼眠寐不安或蒸毒傷藏口內唾血四曰肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食即欲嘔小便如血大便秘澁蒸盛之時或體腫目赤寢臥不安五曰內蒸亦名血蒸所以名內蒸者必外寒而內熱把手附骨而熱是其根在五藏六腑其人必因患後得之骨肉自消飲食無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起又有二十三蒸一胞蒸小便黃赤二玉房蒸男子則遺瀝漏精女則月候不調三腦蒸頭眩悶熱四髓蒸髓沸熱五骨蒸齒黑六筋蒸甲焦七血蒸髮焦八脉蒸脉不調或急或緩九肝蒸眼黑十心蒸舌乾十一脾蒸脣焦十二肺蒸鼻乾十三腎蒸兩耳焦十四膀胱蒸右耳偏焦十五膽蒸眼白失色十六胃蒸舌下痛十七小腸蒸下脣焦十八大腸蒸鼻右孔乾痛十九三焦蒸亦雜病乍熱乍寒二十肉蒸二十一膚蒸二十二皮蒸二十三氣蒸遍身氣熱凡諸蒸患多因熱病患愈後食牛羊肉及肥膩或酒或房觸犯而成此疾久蒸不除多變成疳必須先防下部不得輕妄療之 出第四卷中

崔氏療五蒸夫蒸者是附骨熱毒之氣皆是死之端漸庸

醫及田野之夫不識熱蒸體形狀妄注神祟以相疑惑蒸盛總變爲疳而致死者不可勝記其蒸有五皆略陳之一曰骨蒸旦起體凉日晚便熱煩躁不安食都無味小便赤黃忽忽煩亂細喘無力或時腰疼兩足逆冷手心常熱蒸盛傷內乃變成疳食人五藏若大便澁方

可服芒消一服一方寸匕日再服亦可擣苦參蜜和爲丸如梧子大一服七丸日再以飲送之無忌以體輕凉爲度

二曰脉蒸其根在心日增煩悶擲手出足翕翕思水口唾白沫臥使浪語或驚恐不安其脉又數此蒸若盛亦變爲

瘧傍膀時悶或痢不止方

苦參　青葙各二兩　艾葉　甘草炙各一兩

右四味切以水四升煑取一升半分爲三分用羊胞盛之以葦灌下部中若不利取芒消一方寸匕和冷水合和服之日再服忌海藻菘菜

三日皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中無水舌上白小便赤如血蒸盛之時胷中煩悶或自稱得疰手足兩脅不得大欬微背連胛疼眠寐不安此蒸毒傷五藏口便唾血方

急與芒消一兩以水一升半和分爲三服三日服止訖以冷水浸手以熨脅間及腹下并胷上及痛處亦

可岸脅指灸側腋下第三肋間腋下空中七壯立止

四日肉蒸其根在脾體熱如火煩躁無汗心腹鼓脹食飲無味食訖便嘔小便如血大便秘澀蒸盛之時皮體臃腫亦不得安寐方

大黃一兩半切如小豆大以水一升浸一宿明旦絞取汁一服五合訖微利即止若熱不定亦可服芒消一方寸匕日三以體涼爲度

五日內蒸所以言內蒸者必外寒內熱把手附骨而熱也其根在五藏六腑之中其人必因患後得之骨肉自消食飲無味或皮燥而無光蒸盛之時四肢漸細足趺腫起方

石膏十兩研如乳粉法水和服方寸匕日再以體涼爲度出第七卷中

古今錄驗解五蒸湯方

甘草一兩炙　茯苓三兩　人參二兩　竹葉一把

葛根　乾地黃各三兩　知母　黃芩各二兩

石膏五兩碎　粳米一合

右十味切以水九升煑取二升半分爲三服亦可以水三升煑小麥一升乃煑藥忌海藻菘菜蕪荑火醋范汪同一方無甘草茯苓人參竹葉止六味

又五蒸丸方

烏梅　鷄骨一本是鼈骨　紫菀　芍藥

大黃　黃芩　細辛各五分　知母四分

礬石鍊　栝樓各一分　桂心二分

右十一味末之蜜和丸如梧子飲服十丸日二忌生葱生菜並出第五卷中一方無桂心

骨蒸方一十七首

廣濟療骨蒸肺氣每至日晚即惡寒壯熱顏色微赤不能下食日漸羸瘦方

生地黃三兩細切　葱白細切　香豉　甘草炙各三兩

童子小便二升

右五味切以地黃等於小便中漬一宿平旦煎兩沸絞去滓澄取一升二合分溫二服服別相去如人行七八里服一劑差止不服忌海藻菘菜蕪荑熱麪豬肉油膩黏食等 出第四卷中

崔氏療骨蒸以骨汁淋方

取枯朽骨碎五大升一切骨皆堪用唯虎骨剔不得選微有土氣但似有土氣即不堪病

柳枝剉三大斗　棘針三大斗　桃枝剉三大斗

右四味以清水五大石煮之減半乃濾出汁別取清漿兩大石投釜中和骨重煮三兩沸然後總濾出淨拭釜取此前後湯相和更報煖隨次取用使患者解髮令散

以此湯淋頂淋之其湯令熱但不破肉為準一斛淋湯遣盡若覺心悶即喫三兩口冷飯如不能坐即臥淋淋湯之時自當大汗汗出少處仍偏淋之務取汗勻以袪惡氣淋訖可食一大椀熱葱豉粥仍暖覆取汗汗解以粉摩身遍手足使周遍患重者不過再淋欲重淋時量氣力淋此湯若飲之尤佳 出第七卷中文仲療骨蒸方

生地黃一大升擣絞取汁三度擣絞始汁盡分再服

若利即減之以身輕涼為度忌蕪荑

又療骨蒸苦熱瘦羸面目痿黃嘔逆上氣煩悶短氣喘急日晚便劇不能飲食若服生地黃汁即便服此方

龍膽　黃連　栝樓　苦參

青葙　芍藥各一兩　梔子人十枚　芒消

大黃各二分　黃芩三分

右十味擣篩為散飲服一錢匕加至方寸匕日再大須慎生食若不禁生食不須服之忌豬肉冷水 千金經心錄並作丸服之藥味同

又療骨蒸唇乾口燥欲得飲水止渴竹葉飲方

竹葉一握　麥門冬一升去心　大棗二十顆擘　甘草三兩炙

半夏一升湯洗令滑盡　粳米五合　生薑三兩

右七味切以水五升煮取二升半分溫三服忌羊肉餳

海藻菘菜

又方

麥門冬一升去心　小麥二升　枸杞根切三升

右三味以水一斗煮取三升煮小麥熟去滓分溫日三服

又方

大烏梅二十枚　石膏六兩碎綿裹

右二味以水七升煮取四升去滓以蜜三合稍稍飲之佳

又方

患殗殜上於劫切下余攝切下同等病必瘦脊骨自出以壯丈夫
屈手頭指及中指夾患人脊骨從大椎向下盡骨極
指復向上來去十二三廻然以中指於兩畔處極彈
之若是此病應彈處起作頭多百三十餘頭即以墨
點上記之取三指大青竹筒長寸半一頭留節無節
頭削令薄似鑿煮此筒子數沸及熱出筒籠墨點處
按之良久以刀彈破所角處又煮筒子重角之當出
黃白赤水次有膿出亦有蟲出者數數如此角之令
惡物出盡乃即除當目明身輕也
又療骨蒸消渴消中熱中渴痢心熱虛極風虛熱傳屍等

方
苦參一大斤 黃連去毛 知母 栝樓
麥門冬去心 牡蠣各五大兩熬
右六味搗篩以生牛乳和併手捻為丸如梧子大暴乾
一服二十丸稍稍加至三十丸日再服飽食訖以漿水
下如食熱麪酒加至五十丸忌豬肉冷水救急同
又療骨蒸蒼梧道士方
紫菀 桔梗 續斷 青竹茹
五味子各三兩碎 桑根白皮五兩 甘草二兩炙 乾地黃五兩熬多
者用 赤小豆一升

右九味切以水九升煮取三升五合分溫三服服五六
劑十年者亦差每隔五日一劑初發即服大驗勿輕之
可頻服立驗蘇遊玄感論云主肺氣欬者相當餘同忌
海藻菘菜豬肉蕪荑
又療骨蒸欬出膿病垂者方
皂莢一兩炙去皮絲子 白餳一兩 乾棗七枚擘 生薑二分切
右四味以酒一大升煮取半升去滓先食飯然後服二
合如人行二四里不吐更服二合又如人行二三里不
吐惡服盡方便令吐即膿出並出第一卷中
救急骨蒸之候男子因五勞七傷或因肺壅之後或為瘧

疾之後宿患痃癖婦人因產後虛勞漏汗寒熱或為月閉
不通無問男子婦人因天行已後餘熱不除或為頻頻勞
復小兒閃癖其病並緣此十候所致因茲漸漸瘦損初著
盜汗盜汗以後即寒熱往來寒熱往來以後即漸加欬欬
後面色白兩頰見赤如臙脂色團團如錢許大左臥即右
出唇口非常鮮赤若至欬亦即極重十則七死三活若此
以後加吐吐後痢百無一生不過一月死服此丸仍得不
著後人此病人急多是冤鬼病治之方
青葙苗六月六日採 知母 葶藶去毛
大黃 梔子人 栝樓 常山

菱甤各八分　苦參皮十二分　甘草炙　蜀漆　朮各五分

右十一味擣篩蜜和爲丸如梧子大飲服五丸稍加至十五丸日再以知爲度因至利忌豬肉熱麪葱蒜生菜海藻菘菜

又療骨蒸方

毛桃人一百二十枚去皮及雙人留尖

右一味擣令可丸平旦以井華水頓服使盡服訖量性飲酒使醉仍須喫水能多最精隔日又服一劑百日不得食肉

又療骨蒸極熱方幷其人莫滅傳

取乾人糞燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄晚後服小便一小升以差爲限既常服不可朝朝取作大坑燒二升夜以水三升漬之稍稍減服小便勿用自身者小兒者佳

又方

用解英一大兩和小便一大升研令爲粉乃取黃塼石一枚方圓可一尺左側以炭火燒之三食頃極熱量准黃汁於石上恐太熱不可近宜著一片氈經熱石上令患人脫衣坐上石令停以衣被圍遶身勿令藥氣洩出莫辭衣物臭也凡經三五度如此必差

又療骨蒸傳屍方

皂莢長一尺者無損者取炙令微焦去黑皮碎之綿裹　黑錫大如雞子　斧肉大如掌炙如常法

右三味取一升無灰清酒貯銅鐺內即著綿裹煎三五沸即漉去綿裹即內黑錫使消液盡煎取三合令病者先喫肉汁即服一合如覺吐困不須起欠以銅盆貯水令病人吐上有蟲癃如馬尾赤色頭黑即效如無蟲服三合盡爲度一服相去如人行十里必是得念其禁食一如藥法並出第二卷中

必效骨蒸病小便方

取二歲童子小便五升煎取一大升以三匙蜜和爲兩服中間如人行二十里服此以後每自小便即取服之仍去前後取中央者病輕者二十日病重者五十日二十日以後當有蟲蛐蟆兒其蟲在身當處出俱令去人五步十步閑病人小便臭者無不差台州丹仙觀張道士自服非常神驗出第二卷中

灸骨蒸法圖四首崔氏別錄灸骨蒸方圖幷序中書侍郎崔知悌撰

夫含靈受氣稟之於五常攝生乖理降之以六疾至若岐黃興記綿有舊經攻灸單行罕取令術骨蒸病者亦名傳屍亦謂殗殜亦稱伏連亦曰無辜丈夫以䏶氣爲根婦人

以血氣爲本無問少長多染此疾嬰孺之流傳注更苦其
爲狀也髮乾而聳或聚或分或腹中有塊或脇後近下兩
邊有小結多者乃至五六或夜卧盜汗夢與鬼交通雖目
覶分明而四肢無力或上氣食少漸就沈羸縱延時日終
於沽盡余昔忝洛州司馬常三十日灸活一十三人前後
差者數過二百至如狸頭獺肝徒聞發說金牙銅鼻罕見
其餘亦若此方扶危拯急非止單攻骨蒸又別療氣療風
或瘵或勞或邪或癖患狀既廣救愈亦多不可具錄略陳
梗槩又恐傳授謬訛以誤將來今故具圖形狀庶令覽者
易悉使所在流布頒用家藏未暇外請名賢傍求上藥還

瑰反經何難之有遇斯疾者可不務乎
灸骨蒸及邪但夢與鬼神交通無不差之法
使患人平身正立取一細繩令於脚下緊踏男左女右其繩前
頭使與大拇指端齊後頭令當脚根後卽引向上至曲䐐
中大橫文便截繩使斷又使患人解髮分兩邊使見分頭
路仍平身正坐乃取向所截繩一頭與鼻端齊引向上路
頭通過逐脊骨引繩向下盡繩頭卽點著又別取小繩一
頭與唇端齊合口處一頭向上至鼻底便截斷將此小
繩於前所點處中摺橫分兩邊兩頭各點記使與中央初
點處正橫相當此小繩兩頭是灸處當脊初點者非灸處

只借爲度其點拭却
又法
使患人平身正坐稍縮髆取一繩繞其項向前雙垂共鳩
尾齊卽截斷鳩尾是心歧骨人有無心歧骨者可從胷前
兩歧骨下量取一寸卽當鳩尾仍一倍翻繩向後取中屈
處恰當喉骨其繩兩頭還雙垂當脊骨向下盡繩頭點著
又別取一小繩令患人合口橫度兩吻便割斷還於脊上
所點處橫分點如前其小繩兩頭是灸處長繩頭非灸處
拭却以前總通灸四處日別各灸七壯以上二七以下其
四處並須滿二十壯未覺効可至百壯乃停候瘡欲差又

取度兩吻小繩子當前雙垂繩頭所點處逐脊骨上下中
分點兩頭如橫點法謂之四花此後點兩頭亦各灸百壯
此灸法欲得取離日量度度訖卽下火唯須三月三日艾
爲佳療差百日以來不用雜食灸後一月許日患者若未
好差便須報灸一如前法當卽永差 出第七卷中
張文仲說荆州人王元禮嘗家患骨蒸傳尸死盡有一道
士教灸卽除差更教人無有不差者欲識此病其病先
作寒熱有時唇赤或頰赤并有時痢血多唾有時欲得
食有時不欲食兩脊脈常急患兒多欬盜汗以指按捻脊
骨四邊肉有時心胷氣滿急黃瘦脊中肉盡遂卽着床如

者床脊前自動脊脊兩邊肉盡灸療即難如灸候脊前肉
動非本灸法如看病兒是病更不須避忌日即須將艾去
即於邪兒於王道頭日午時灸灸七壯若先知其病又纔
即取离日午時大指多少彈繩兒面向下著患及繩物頭
以病兒大拇指自捻著床中指直向脊骨折頭以脊中肉
少肋上點記從點記處向上至耳下尖頭門中央屈繩從
初點處向上還當脊骨點繩所到記之又更以屈繩從元
點記處向上還進前點記又以杖量取患兒中指頭兩節
折斷還從元點記向下當脊骨點記一邊點四處兩邊俱
點總八處各須去脊骨遠近一種並須上下相當下從擬

肋上至耳根取直其八處一時下火艾炷如棗核堅實作
之灸了即以灰三兩圍坐處便歸家不須避頭禁肉麵生
冷特忌色及雜食十復後任依常未平復有犯重發即不
可復療

神素師灸骨蒸欬法

當頭耳孔橫量相離三寸皆相當灸有穴日灸三壯至第
八日灸二七了第三椎上第二椎下男取左手女取右手
頭指依兩指頭東西灸日上七壯至第八日各灸五十壯
復五日日灸各十五壯脛取繫鞋橫大文量至膝觸加五
下中分當脛骨外日灸一七壯滿第八日日灸滿三十五

日了當臂上皆男左女右取頭指從腕文當指當頭灸日
七壯至第八日滿百壯婦人肚脹月節不通取右手頭指
當臍量至下腹當指頭灸日七滿三百壯為上午後灸爲
下午前灸　出第一卷中

痃氣骨蒸三方

廣濟療痃氣心忪骨蒸熱關風鼈甲丸方

鼈甲炙　芍藥　蝮蛇脯炙　大黃各八分
人參　訶梨勒皮熬　枳實炙　防風各六分

右八味擣篩為末蜜和丸如梧子以酒飲下二十丸漸
漸加至三十丸日再服不利忌莧菜生菜熱麵蕎麥蒜

粘食出第二卷中

備急療痃癖鬼氣疰忤骨蒸欲驗方

大黃別浸湯欲成下一方四兩　鼈甲炙　鈎藤
升麻　甘草炙各二兩　丁香二七枚湯欲成下

右六味切以水七升煮取二升八合去滓分作三服又
用牛黃犀角屑朱砂麝香各一分細研分為三分每服以
一分內湯中服經用多効特忌豬肉粘食生冷莧菜海
藻菘菜蒜　並同出第三卷中（一方有黃芩二兩）

必効療痃癖氣壯熱兼欬久為骨蒸驗方

柴胡四兩　茯苓　白朮　枳實炙各二兩

右四味切以水七升煮取二升半分為三服稍熱不歇
即加芒消六分取利熱除之後每三日服一劑差後每
月一劑肥白終身永除忌桃李雀肉大醋 出第二卷中

虛損慘顇作骨蒸方四首

張文仲療虛損慘顇不食四體勞強時翕翕熱無氣力作
骨蒸候方

童子小便一大升澄去前後 豉一合 葱白一合切 杏人四十枚去皮尖

右四味合煎取二分中分之二服使盡日別一劑服之
至十劑愈若服經三四劑覺四體益熱即服後方

又方

小便一大升澄去前後 葱白一合切 豉一合 生薑一六兩切
生地黃汁一握

右五味合煎六七沸絞取汁半升許分為兩服或三服
每服空腹服至二七日必差差後停三四日將息更服
二七日神驗每服五六劑覺有以令即服前方二方以
意斟酌間服常夜合澄須久便即煎服至五更半令服
了至欲明更眠後是服訖至日出時不妨食至晨間未
食更一服忌蕪荑

又方

人頭骨三大兩炙 麝香一十兩

右二味擣篩蜜和丸如梧子一服七丸日再
服以粥飲送藥去貯前有青脉出者以針刺看血色未
變黑者服藥七日必差每日午時能更服後丸一服亦
好藥既無毒於事不妨

療遊疰骨蒸肺痿煩躁不能食蘆根飲子方

蘆根切一升 麥門冬去心 地骨白皮各十兩 生薑十兩合皮切
橘皮 茯苓各五兩

右六味切以水二斗煮取八升絞去滓分溫五服服別
相去八九里晝三服夜二服覆取汗忌酢物未好差更
作若無服其人或胸中寒或直惡寒及虛脹并痛者加
吳茱萸八兩

瘦病方五首

病源夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精髓萎竭血
氣虛弱不能充盛肌膚故羸瘦也其湯熨針石別有正方
補養宣導今附於後養生方云朝朝服玉泉使人丁壯有
顏色去蟲而牢齒也玉泉口中唾也朝未起早漱口祝之
輒琢齒二七過如此者三乃止名曰練精又云咽之三過
乃止補益虛勞令人強壯 出第三卷中

廣濟療瘦疾每日西即赤色脚手酸疼口乾壯熱衄所丸
方

鱉甲炙六分 天靈蓋燒四分 生犀角屑四分 前胡四分
升麻四分 松脂五分 枳實炙四分 甘草炙五分
右八味擣篩蜜和丸如梧子空腹以小便浸豉汁下二十丸日再不利忌海藻菘菜生葱熱麪炙肉魚蒜粘食陳臭等物

又療瘦病方

天靈蓋一兩炙 大麝香半臍 桃人一大抄去皮 朱砂一兩半光明者
好豉一大升熬之
右五味各別擣篩訖然後總和令調每晨空腹以小便半升和散方寸匕服若止不利忌生血物

又療腹脹瘦病不下食方

柴胡 茯苓各十二分 枳實炙 白朮
人參 麥門冬去心 生薑各六分合皮切
右七味切以水六升煮取一升八合絞去滓分溫三服服別相去七八里喫一服不利忌生冷油膩小豆粘食桃李雀肉等

又知母丸主瘦病及久瘧黃等方

知母 常山各三兩 甘草炙 大黃
麻黃去節 黃芩 杏人各二兩去皮尖熬 蜀漆洗
牡蠣各一兩熬
右九味擣篩蜜和丸如梧子空心服飲下七丸忌豬肉及葱酒麪服後心悶即吐是此病出候不吐更漸加兩丸日與諸人服神驗非一忌海藻菘菜生葱生菜等
此方云是張文仲去與公處傳

救急療瘦疾方

甘草一兩炙
右每旦以小便煮甘草三數沸頓服甚良忌海藻菘菜
前第三卷中

傳尸方四首

蘇遊論曰大都男女傳尸之候心胷滿悶背髆煩疼兩目

精明四肢無力雖知欲臥睡常不著脊膂急痛膝脛酸疼多臥少起狀如佯病每至旦起即精神尚好欲似無病從日午以後即四體微熱面好顏色喜見人過常懷忿怒纔不稱意即欲嗔恚行立腳弱夜臥盜汗夢與鬼交通或見先亡或多驚悸有時氣急有時欬嗽雖思想飲食而不能多食死在須臾而精神尚好或兩脇虛脹或時微利鼻乾口燥常多粘唾有時脣赤有時欲睡漸就沈羸猶如水涸不覺其死矣

又論曰傳尸之疾本起於無端莫問老少男女皆有斯疾大都此病相剋而生先內傳毒氣周遍五藏漸就羸瘦以

至於死死訖復易家親一人故曰傳屍亦名轉注以其初
得半卧半起號爲殗殜氣急欬者名曰肺痿骨髓中熱稱
爲骨蒸內傳五藏名之伏連不解瘵者乃至滅門假如男
子因虛損得之名爲勞極吳楚云淋瀝巴蜀云極勞其源
先從腎起初受之氣兩脛酸疼腰脊拘急行立腳弱食飲
減少兩耳颼颼欲似風聲夜卧夢泄陰汗痿弱腎既受已
次傳於心心初受氣夜卧心驚或多忪悸心懸乏氣吸吸
欲盡夢見先亡有時盜汗食無滋味口內生瘡心常煩熱
唯欲眠卧朝輕夕重兩頰口唇悉紅赤如傅臙脂又時手
足五心皆熱心既受已次傳於肺肺初受氣時時欬嗽氣

力欲弱有時喘氣卧即更甚鼻口乾燥不聞香臭假令得
聞唯覺朽腐物氣有時惡心憒憒欲吐肌膚枯燥或時刺
痛或似蟲行乾皮細起狀若麩片肺既受已次傳於肝肝
初受氣兩目䀮䀮面無血色常欲顰眉視不及遠目常乾
澀又時赤痛或復睛黃朝暮瞢莫紅切音蒙瞪音登常欲合眼及
至於卧睡還不著肝既受已次傳於脾脾初受氣兩脇虛
脹食不消化又時瀉利熟食生出有時肚痛腹脹雷鳴脣
口焦乾或生瘡癰毛髮乾聳無有光潤或復上氣擡肩喘
息利赤黑汁至此候者將死之證也
又論曰毒氣傳五藏候終不越此例但好候之百不失一

又論曰凡患殗殜之人多成骨蒸不者即作水病仍須依
殗法灸之兼服下水藥差
又論曰此病若脊膂肉消及兩臂飽肉消盡胸前骨出入
即難療也若痢赤黑汁兼上氣擡肩喘息皆爲欲死之證
也此是藏壞故爾
又論曰童女年未至十三以上月經未通與之交接其女
日就消瘦面色痿黃不悟少者將爲骨蒸因循療之屢有
死者有此疾者慎勿療之待月事通自當差矣
又論曰或有人偶得一方云療骨蒸不解尋究根本遂即
輕用之未療既不相當病愈未知何日了不求諸醫者唯

知獨任己功若此之人爲自皆是至如以主肺痿骨蒸方
將療痃癖傳屍者斯乃更增其病豈有得痊之理仍者主
療痃方中多是冷藥冷藥非痃癖之所宜若用以療痃癖
此乃欲益反損非直病仍未差兼復更損其脾脾唯宜溫
不合取冷如其傷冷脾氣即衰脾衰之證兩脇虛滿食飲
不消兼之下利如斯穿鑿欲益反損終莫能悟良可悲哉
夫略舉一隅他皆倣此
又論曰凡患骨蒸之人坐卧居處不宜傷冷亦不得過熱
冷甚則藥氣難通兼之脹滿食不消化或復氣上熱甚則
血脈擁塞頭眩目疼唇乾口燥心胸煩悶渴欲飲水此等

並是將息過度之狀深可誡也將養之法須寒溫得所先熱而脫先寒而著若背傷冷即令欬嗽若手足傷熱即令心煩若覆衣傷厚即眠臥盜汗若覆衣過薄即心腹脹滿所是食飲不限時節寧可少食保無宿疰數數進之勿頓勞也必須傷飲易消故也不宜傷硬恐損胃氣致不消也既皆以意消息之為佳
又論曰主療之法先須究其根本考其患狀診其三部次其輕重量其可不與其湯藥指期取差若能如此方可措手先療其根次其末針灸湯散必須相應無容病根深遠少服即望痊除未及得瘳便復罷藥乃言藥病乖越似不相當如此懷疑余所不取亦有因痊後作亦有因劇後為

此病根其源非一略舉綱紀先須而取療之方法如後所言
又論曰骨蒸之病無問男女特忌房室舉動勞作尤所不宜陳臭酸鹹粘食不消牛馬驢羊大小二豆豬魚油膩酒麪瓜果野豬之屬葵笋蒜蕨及生冷等並不得喫自非平復一月以後乃漸開也大略如此觸類而長之此病宜食煮飯鹽豉豆醬燒薑葱韭枸杞苜蓿苦菜地黃牛膝葉並須煮爛食之候病稍退恐肌膚虛弱者可時食乾鹿脯為味中間所有得食之者按其條下具言之
廣濟療婦人腹內冷癖血塊虛脹月經不調瘦弱不能食無顏色狀如傳尸病方 張文仲方

麴末二升 大麥糵末二升 生地黃肥大者切三升 白朮八兩
牛膝切三升 桑耳金色者剉三升 薑黃八兩 當歸十四分
生薑二升合皮切 桃人 杏人去皮尖及雙人者熬各二升
近用加橘皮八兩

右十二味並細切於臼中以木杵擣之如泥內瓶中以物蓋口封之勿令洩氣安於一大石米中飯熟出之停屋下三日開出暴乾搗為散酒飲服方寸匕日二服漸加至一匕半不利初服十日內忌生冷難消之物以助藥勢過十日外即百無所忌任意恣口食之唯忌桃李

若須桃李宜去朮若不能散蜜丸服之亦得一服三十丸日二服去病令人能食肥健好顏色忌桃李雀肉蕪荑 出第四卷中
文仲論傳屍病亦名痎瘧遁疰骨蒸伏連殗殜此病多因臨死哭泣屍氣入腹連綿或五年三年有能食不作肌膚或二日五日若微勞即發大都頭額頸骨間尋常微熱翕翕然死復家中更染一人如此乃至滅門療之方

獺肝一具炙 破鼈甲一枚炙 野狸頭一枚炙 紫菀四分
漢防己一兩半 蜀漆洗 麥門冬去心 甘草炙各一兩

右八味擣篩以成鍊烊羊腎脂二分合蜜一分烊令和

丸蜜如梧子大服十丸加至十五丸日再以飲下之忌生
蔡今和訖分一分頭邊著一分懸門額上一分繫臂上
先服頭邊次服臂上次服門上者大驗忌海藻菘菜莧
菜

又灸法

立脚於緊鞋處横文以手四指於文上量脛骨外邊
脛當四指中節按之有小穴取一彼處刺令薄以此
麻鞋繫上灸令麻鞋斷男左女右患多灸

又方

青羚羊角一具燒作灰上乾之 莨菪子一升莨菪醋一升同漬經三
日出各於布上暴之令毛乾微火熬莨菪子各搗篩
和以蜜丸如梧子服三丸加至四丸

地骨皮	白薇	芍藥	甘草
犀角	升麻	茯神	麥門冬
黃芩	桔梗	枳實	大黃
前胡	茯苓	天門冬	生薑
桑根白皮	羚羊角	當歸	柴胡
朱砂	芎藭	鼈甲	蜀漆
知母	石膏	常山	烏梅
香豉	黃耆	地黃	梔支

以上並可計度病狀用之並出第一卷中

伏連方五首

廣濟療瘦病伏連傳屍鬼氣疰忤惡氣方

斑猫去頭足熬　射干根各四分　石膽七分研　桂心
牛黃各二分研　犀角屑三分　生人參二分　石蜥蜴炙一枚
紫石七分研　蜈蚣炙四寸　麝香少許別研

右十一味擣篩為散研相和每日空腹服一方寸匕日三
服用井華水二合溫和頓服勿臨喪與白米粥與好覺
小便黃如合藥勿使婦人小兒雞狗見忌熱麵果子
五辛豬肉生血生菜

又療瘦病伏連疰諸鬼氣惡疰朱砂丸方

光明朱砂一兩研　大桃人十枚去皮尖雙人者熬　麝香三分研

右三味研朱砂麝香令細末別搗桃人如脂合和為丸
如梧子其和不合以蜜少許合成訖清飲服一七丸日
二服不利忌生血物並出第十四卷中

崔氏斷伏連解法

先覓一不開口葫蘆埋入地取上齊日開之煮取三匙
粥飲內其中又剪紙錢財將向新塚上使病兒面向還
道背塚坐以紙錢及新衣向塚及病人使亞別將少許
紙錢同飲與五道將軍使人一手捉葫蘆一手於坐傍

以一刀穿地印以药盧坐所穿地及坐新苫子使一不
亦人捉兩筒鏁掐病人背呪曰伏連伏連解伏連伏連
不解刀鏁解又呪曰生人持地上死鬼持地下生人死
鬼即各異路呪訖令不病人即擲兩鏁於病人後必取
二鏁相背不背更取擲取相背止乃並還勿反顧又取
病日令病人騎城外車轍面向城門以水三升灰三重
圍病人又作七箇不翻餅與五道將軍呪曰天門開地
戶閉生人死鬼各異路今五病之日放捨即歸呪訖乃
還莫廻頭此法大良　出第七卷中

文仲療伏連病本緣極熱氣相易相連不斷遂名伏連亦
名骨蒸傳屍比用此方甚驗

人尿五大升溫者　人小便一升　折飲粟飲五升入
六月六日麴半斤熬碎

右四味取一瓷瓶盛密封置一室中二七日並消一無
惡氣每旦服一大合盡二服無不差者合藥將常淨處
香勿令婦人小兒女子雞犬孝子見之　出第一卷中

延年桃奴湯主伏連鬼氣發即四肢無力日漸黃瘦作好
作惡不能方

桃奴　茯苓各三兩　鬼箭羽　芍藥
人參　橘皮各二兩　生薑四兩　檳榔七枚

麝香一分別研

右九味切以水九升煮取二升七合去滓內麝香一分
分二服如行八九里久忌大酢生冷五辛　出第十二卷中

飛尸方三首

病源飛尸者發無由漸忽然而至若飛走之急疾故謂之
飛尸其狀心腹刺痛氣息喘急脹滿上衝心胸　出第二十三卷中

集驗療飛尸瓜蒂散方

瓜蒂　赤小豆各一分　雄黃二分研

右三味擣下細篩一服五分匕漸增至半錢匕以酢服
集葛氏療卒中惡心腹絞刺氣急脹奄奄欲絕　○備急同　出第七卷中

備急張仲景療飛尸走馬湯方

巴豆二枚去心皮　杏人二枚去尖皮

右二味綿纏搥令極碎投熱湯二合指捻取白汁便飲
之食頃當下老小量服之通療鬼擊病忌野豬肉蘆筍
此出見卒中惡療飛尸蠱不可也　○文仲同　出第一卷中

古今錄驗附著散療飛尸在人皮中又名惡脈又名賊風
發時急頭痛不在一處鍼灸則移發時一日半日乃微差
須臾復發皆療之方

細辛　天雄炮　莽草各一分　桂心三分
附子炮四分　雄黃二分研　烏頭炮四分　乾薑四分

眞珠二分（研）

右九味擣下篩服五分匕不知稍增當以好酒服之忌豬肉冷水生葱生菜（出第六卷中）

遁尸方三首

病源遁尸者言其停遁在人肌肉血脈之間若卒有犯觸則發動亦令人心腹脹滿刺痛氣息喘急傍攻兩脅上衝心胸差後復發停遁不消故謂之遁尸也（出第二十三卷中）

廣濟療初得遁尸及五尸經年不差心腹刺氣方

龍骨（二分）　羚羊角（二枚炙）　乾薑（一兩）　麝香（二分研）

蜥蜴（炙一枚）　斑猫（十四枚去翅足熬）　雞屎白（三合）

巴豆（五枚去心皮熬令黑）　芫青（二十枚去翅足熬）　藜蘆（一兩炙）

右十味擣篩蜜和丸空腹以飲服如小豆三丸日二服稍加至六七丸以知爲度至吐利忌生冷油膩豬肉蒜粘食陳臭蘆笋（一方無斑猫雞屎白巴豆芫青藜蘆）

又初得遁尸鬼疰心腹中刺痛不可忍方

青木香（六分）　丁香（六分）　鬼箭羽　桔梗

紫蘇　橘皮　當歸（各八分）　生薑（十二分）

檳榔（十四分合子碎）　桃梟（十四枚去核）

右十味切以水九升煮取三升絞去滓分爲三服日晚再以快利爲度忌如藥法（一方無橘皮）（並出第四卷中）

集驗療遁尸心腹刺痛不可忍方

桂心（一兩）　乾薑（三分）　巴豆（二枚去皮心熬）

右三味合擣下篩以好苦酒和之如泥以塗痛處燥即易之忌野豬肉蘆笋（千金同用乾薑一兩出第一卷中）

五尸方一十一首

肘後療卒中五尸五尸者飛尸遁尸風尸沈尸尸疰也其狀皆腹痛脹急不得氣息上衝心胸傍攻兩脅或磥塊踊起或攣引腰脊今取一方而兼療之

擣蒺藜子蜜丸如胡豆服二丸日三

又方

擣商陸根熬以囊盛之更番熨之冷復易

又方

粳米二升水六升煮二沸服之

又方

掘土作小坎以水滿坎中熟攪取汁飲之（並出第一卷中）

刪繁療五尸蠱疰中惡客忤心腹刺痛丹砂丸方

丹砂（研）　乾薑　芎藭　芫花（熬）

烏頭（炮各四分）　芍藥　桂心（各八分）　野葛皮（炙三分）

吳茱萸（一合）

右九味擣篩蜜和爲丸如大豆服三丸日三清飲進之

忌生血物猪肉生葱（一方無巴豆備急出第十卷中）

備急療卒中五尸遁尸風尸飛尸尸疰沉尸其狀皆腹痛脹急衝心攻脅或磈塊踊起或牽腰脊方

破雞子一枚取白生吞之困者摇頭令下（文仲肘後同）

又方（葛氏法）

雄黃　大蒜各一兩

右二味擣和取如彈丸內二合熱酒中服之須臾未差更服有尸疹者常畜此藥用之驗（文仲肘後同）

又方

乾薑　附子各一兩　桂心二分　巴豆二十枚去皮心熬

右四味擣篩蜜和又內臼中擣萬杵服如小豆二丸此藥無所不療忌野猪肉蘆笋生葱（肘後同並出第一卷中）

文仲療卒中五尸方

取屋四角茅內銅器中以三尺布覆腹著器布上燒茅令熱隨痛追逐蹠下痒便差若瓦屋削四角柱燒用之神驗（肘後同出第一卷中）

古今錄驗八毒赤丸療五尸癥積及惡心痛蠱疰鬼氣無所不療即是李子豫赤丸方（出胡錄）

雄黃研　真珠研　礜石泥裹燒半日　牡丹皮

巴豆去皮心熬　附子炮　藜蘆炙各一兩　蜈蚣一枚炙去足

右八味擣篩蜜和丸服如小豆二丸日一極得吐下欲長將服者可減一丸忌猪肉狸肉蘆笋生血等物

又五尸丸療諸尸疰方

芍藥　桂心各八分　吳茱萸一合　丹砂

芎藭　烏頭炮　乾薑各四分　蜀椒一兩去目汗

梔子人五分　巴豆四十枚去皮心熬

右十味擣下篩蜜和丸如大豆每服三丸日三忌猪肉生葱蘆笋生血等物（並出第七卷中胡洽方有芍藥四分野葛皮二分梔子十二枚）

尸疰方四首

病源尸疰者即是五尸內之尸疰而挾外鬼邪之氣流注身體令人寒熱淋瀝沉沉默默不的知所苦而無處不惡或腹痛脹滿喘急不得氣息上衝心胸旁攻兩脅或磈塊踊起或攣引腰脊或舉身沉重精神雜錯常覺昏謬每節氣改變輒致大患積月累年漸就頓滯以至於死死後復易傍人乃至滅門以其尸病注易傍人故曰尸疰（出第二十三卷中）

刪繁療尸疰損鼻或聞哭聲或見尸常發死人席湯方

取死人眠席斬棺內餘棄路者一虎口長三寸止一物以水三升煑取一升為一服立效（出第十卷中）

文仲療尸疰方

取新布裹椒薄疰上以熨斗火熨椒令汗出立驗

又姚氏方

燒髮灰　杏人熬令紫色等分

右二味擣如脂以猪膏和酒服如梧子三丸日三神良　千金同

又鸛骨丸療尸疰惡氣兼療百病方

鸛骨三寸炙　桂心三寸　𧏾𧓍十四枚去翅足熬

巴豆二十枚去心皮熬　斑猫十四枚去翅足熬

右五味擣篩蜜和爲丸如小豆一服二丸日三服清飲進之忌野猪肉蘆笋生葱　並出第一卷中

五疰方四首

病源注者住也言其連滯停住死又注易傍人也注病之狀或乍寒乍熱或皮膚淫躍或心腹脹刺痛或支節沉重變狀多端而方云三十六種九十九種及此等五注病皆不顯出其名大體與諸注皆同　出第二十四卷中

删繁華佗録帙五疰丸療中惡五疰五尸入腹胷脅急痛鬼擊客忤停尸垂死者入喉即愈若已噤將物強發開若不可發扣齒折以灌下藥湯酒隨進之即効方

丹砂研　雄黄研　附子一兩炮　甘遂半兩熬

豉六十粒熬　巴豆六十枚去心皮熬令變色

右六味擣下篩巴豆別研令如脂乃更合擣取調白蜜和之藏以密器若有急疾服胡豆二丸不覺更益以飲投之此藥多有所療殺鬼解毒破積去水良驗忌生血物猪肉蘆笋　古今録驗同出第九卷中

小品五疰湯主卒中賊風遁尸鬼邪心腹刺痛大脹急方

大黄三兩別漬　甘草二兩炙　烏頭十枚炮去皮　生薑半斤

桂心四兩　芍藥　當歸各二兩　蜜一斤

右八味切以水九升煑取三升烏頭別内蜜中煎令得一升投著湯中去滓分服三合如人行三十里又一服日三不知可至四合王尹威數用之忌海藻菘菜猪肉生葱　千金同出第五卷中

古今録驗五疰丸一名神仙丸一名千金丸一名勢疰屯一名司命丸一名殺鬼丸療萬病邪鬼疰忤心痛上氣厥勞蠱毒傷寒時疾瘦癘方

丹砂研　礜石十日泥裹燒　雄黄研

藜蘆熬　附子二分炮各　蜈蚣一枚炙去足　巴豆去心皮熬

右七味擣篩蜜和丸如小豆服一丸日一郎差不解夜半更服一丸定止帶一丸辟惡忌猪肉冷水生血物狸肉　出第七卷中

又五野丸療五疰尸疰哭疰冷疰寒疰熱疰在身體寒熱短氣胸脅下痛引背腋脅吸吸少氣不能行飲食少面目

乃黃小便難項強不得俛仰腹堅癖臍左右下雷鳴遊手
足煩疼目不明喜忘久風濕痺腰脊不隨喜夢寤百病皆
療之方

牛黃研　麝香研　蜀椒汗去目　雄黃研

大黃　當歸　蜀烏頭炮　蜀天雄炮

消石熬一方用芒硝各一分　人參　桂心

朱砂　細辛　乾薑各　石斛　蜥蜴炙一枚

巴豆五十枚去心皮熬　皂角一分

右十七味擣篩蜜和丸如梧子服三丸日再不知稍增
以知為度忌豬肉蘆筍生蔥生菜生血物出第六卷中

江南九十九疰方二首

集驗療江南疰病凡有九十九種寒熱尸疰此為過月盛
衰人有三百六十脈走入皮中或左或右或裏或表如刀
錐所刺乍寒乍熱喉咽如鯁食如噎胸中痛繞臍苦痛食
不知味腰中難以俛仰兩膝屈伸面或黃或青或白或黑
至死更相注易方

取桑根白皮切三升暴燥作湯淋取汁浸小豆二升
如此取汁盡蒸豆熟作羊鹿肉羹噉此豆出第一卷中

崔氏金牙散主邪魅心腹刺痛病狀與前方同

金牙別研　雄黃研　丹砂研　礜石泥裹燒半日

寒水石　芫青熬　巴豆去心皮熬　朴消

桔梗　茯苓　人參　貫衆

附子炮　蜀椒去汗目　露蜂房炙　龍骨

乾薑　牡桂　烏頭炮　石膏研

甘草炙　蓯蓉　大戟　芫花熬

防風　狼骨炙　商陸根　大黃

細辛　蛇蛻炙　玉支一作玉泉　貝母一作牙子即狼牙也

右三十二味等分下篩酒服五分匕日二忌豬肉冷水
生菜生血肉大酢蘆筍集驗同出第七卷中

江南三十六疰方三首

崔氏金牙散療江南三十六疰人病經年羸瘦垂死服之
皆差并帶之能殺鬼氣逐尸疰諸惡癘不祥悉主之方
出第八卷中

金牙研　曾青研　消石研　礜石泥裹燒半日

石膏研　甘草　玉支一作玉泉　雄黃研

朱砂研　寒水石　龍骨　蛇蛻皮炙

芫青熬　當歸　龍膽　大黃

細辛　防風　大戟　芫花熬

野葛炙　蓯蓉　天雄炮　茯苓

附子炮　烏喙炮　乾薑　人參

桔梗　桂心　椒汗去　貫衆
巴豆去心皮熬　狸骨炙　蜂房炙　鸛骨炙各一兩
右三十六味擣篩爲散以酒服一錢匕漸增五分匕日三幷以三角絳囊貯散方寸匕以繫頭及心上大良一方加蜈蚣蜥蜴雄黃礬石麝香毒公合四十二味忌豬肉生血物生菜冷水大酢蘆笋出第七卷中

備急療尸疰鬼疰者葛氏云即是五尸之中尸疰又挾諸鬼邪爲害也其病變動乃有三十六種至九十九種大略令人寒熱沉沉嘿嘿不的知其所苦而無處不惡累年積月漸沉頓滯以至於死後復注易傍人乃至滅門覺知此

候者宜急療之方
獺肝一具
右一味陰乾擣末水服一方寸匕日三如一具不差更作姚氏云神良肘後崔氏千金同

又方
桑根白皮灰二升蒸令氣出下以釜湯三四升三遍重淋取二升漬赤小豆二升一宿出風乾復漬汁盡止乃濕蒸令熟以羊肉或鹿肉作羹進此豆飯食一升漸至二三升重者七八升乃愈病去時體中覺疼痒淫淫或若根本不除重爲之肘後同並出第一卷中

疰病相染易方三首

深師療鬼物前亡轉相染著殗殜往來寒熱嘿嘿煩悶欲寐復不能手足熱不能食或欲向壁悲涕或喜笑無常牛黃散方
牛黃研　鬼箭羽　王不留行　徐長卿一名鬼督郵
遠志去心　乾薑　附子炮　五味子
石韋刮去黃皮　黃芩　茯苓各二分　桂心一分
代赭三分　菖蒲四分　麥門冬去心六分
右十五味擣下篩以蜜生地黃汁相拌合復令相得以酒服方寸匕日三忌豬肉冷水生葱羊肉餳酢物出第

九卷中

崔氏療江南三十六疰丸療轉疰滅門絕族族盡轉逐中外滅盡復易親友方
雄黃研二分　麥門冬去心三分一方用天門冬　皂莢去皮子炙
莽草炙各二分　鬼臼三分　巴豆去心皮熬二分
右六味擣篩蜜和爲丸如小豆服二丸日一服忌鯉魚野豬肉蘆笋

又赤丸療人久疰室家相傳乃至滅族方
雄黃研二兩　馬目毒公鬼臼也　丹砂研
莽草炙　藜蘆炙各二兩　巴豆六十枚去心皮熬　皂莢一兩去皮子炙

真珠研一兩

右八味擣篩蜜和丸如小豆一服二丸吐下惡蟲數十枚忌野猪肉蘆笋生血物並出第七卷中

鬼疰方二首

病源注之言住也言其連滯停住也人有先無他病忽被鬼排擊時或心腹刺痛或悶絕倒地如中惡之類其得差之後餘氣不歇停住積久有時發動連滯停住乃至於死死後注易傍人故謂之鬼疰也出第二十四卷中

古今錄驗神秘丸療鬼疰邪忤飛尸疰擊犬馬齧蜂蛇毒螫晝皆消除方

大黄四兩　硝石三兩熬　巴豆去心皮熬　雄黄研各二兩

右四味擣篩蜜和丸如小豆先食服二丸日一服忌野猪肉蘆笋出第七卷中

崔氏蜀金牙散療鬼疰風邪鬼語尸疰或在脊脅流無常處不喜見人意志不定面目脫色目赤鼻張脣焦爪甲黄方

金牙研一分　蜈蚣炙　蜥蜴石上者炙　附子炮各一枚

人參四分　蜣蜋炙七枚　徐長卿　芫青炙

斑猫去翅足熬各十四枚　雄黄研一分　桂心四分

鬼臼二分　野葛炙一分　毒公三分　芎藭二分

石長生　椒目去汗　大黄　甘草炙

蛇蛻皮炙　露蜂房炙　曾青無曾青代別研　真珠別研

丹砂各二分　鬼督郵　烏頭炮　狼毒各二分

石膏研五分　䕡茹一分　蕪荑　鬼箭

藜蘆炙　鸛骨炙　雷丸　乾漆熬

鱉甲炙各二分　狼牙四分　亭長炙七枚　貝母二枚

凝水石五分　牛黄別研　胡燕屎各四分　桔梗三分

鐵精研一分　滑石研二分

右四十五味擣篩為散先食酒服一刀圭日再不知稍增之有蟲隨大小便出也忌猪肉冷水生葱海藻菘菜生血物狸肉深師千金同出第七卷中

鬼疰心腹痛方一首

古今錄驗還命千金丸療萬病心腹積聚堅結胷脅逆滿欬吐宿食不消中風鬼疰入腹面目青黑不知人方

雄黄研　鬼臼　徐長卿　礜石泥裹燒半日

瓜丁　雌黄研　乾薑各四分　野葛炙七分

斑猫去足翅熬二十枚　蜀椒去目汗四分　地膽去翅足熬十五枚

麝香二分　丹參四分

右十三味擣篩蜜和擣三千杵丸如小豆先食服一丸日三不知漸增以知為度若百毒所齧牛觸馬所蹹

噏癰瘻療癒以一丸於掌中唾和塗瘡上立愈正月旦
以椒酒卒家中大小各服一丸終歲無病神良有驗秘
不傳出第大卷中

鬼疰羸瘦方二首

古今錄驗黃帝護命千金丸療羸瘦歷年胷滿結痃飲食
變吐宿食不下中風鬼疰疾瘦方

野葛七寸炙　斑猫二十枚去足翅熬　礜黃研
雄黃　鬼臼　瓜丁　丹砂研
礜石泥裹燒半日　沙參　莽草炙　椒各一兩去目汗
地膽十五枚去足翅熬

右十二味擣下篩蜜和擣三千杵丸如梧子服二丸日
二卒中惡氣絕不知人服如小豆二丸老小半之牛馬
所觸殘癰腫若蟲毒所嚙服一丸著掌中唾和塗瘡中
毒上立愈正月旦以酒卒家中大小各一丸　歲不病
若傷寒身熱服一丸若欲視病服一丸病者共卧不恐
忌生血物

又犀角丸療百病鬼疰惡風入人皮膚淫淫液液流無常
處四肢不仁牽引腰背腹脹滿心痛逆氣填胷不得飲食
翕翕短氣寒熱羸瘦喜悲夢與鬼神交通熱欬唾膿血皆
療之方

犀角屑　桂心各三分　羚羊角屑　牛黃
鬼臼　附子炮　狸肝各二分炙　巴豆二十枚去心皮熬
蜈蚣四枚去足炙　麝香研　真珠　雄黃研
丹砂各四分研　射肉一分　貝齒十枚燒

右十五味擣篩蜜和擣五千杵平旦服如小豆二丸日
三慎生葱豬肉冷水蘆笋生血等物出第六卷中

鬼氣方三首

崔氏療鬼氣辟邪惡阿魏藥安息香方
阿魏藥即是墊經云央匱是也服法旦取棗許大研
之為末以取牛乳一大升煎之五六沸停令熱定取

鴨子許大和攪服之更以餘乳盪盞飲之取一上暮
又取安息香亦如棗許大分如梧子還以熱牛乳服
之令盡每日旦暮常然若無乳者即以煮肉汁服之
患久者不過十日近者不過五日如過三十日不愈
便停只得食脯肉之屬但是一切菜不得近口特忌
特忌禮部孫侍郎家中有此病所在訪問有人從梁
漢來云官人百姓服此得効者十餘家孫侍郎即令
依方進服七八日即効便以此法傳授親知得驗者
非一余時任度支郎中欲廣其効故錄之出第七卷中

延年療鬼氣骨蒸氣日漸羸方

獺肝十六分炙 人參 沙參 丹參各三分
鬼臼 苦參各二分
右六味擣篩蜜和丸如梧子大一服十丸飲汁下日三服加至十丸禁生冷豬魚肉生血等物
又五香丸主天行瘟疫惡氣熱毒心肋氣滿脹急及疰鬼氣等方
青木香 犀角屑 升麻 羚羊角屑
黃芩 梔子人各六分 沉香 丁香
薰陸香各四分 麝香 鬼臼各二分 大黃
芒消各八分

右十三味擣篩蜜和丸如梧子一服三丸飲下日三服加至七丸以差止禁蒜麪豬魚並出第十一卷中

鬼魅精魅方八首

病源凡人有為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寐喜魘或與鬼神交通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能食此魅之所持也出第二卷中

崔氏療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴癘赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人吐乳狐魅吃力迦丸方
吃力迦即白朮 光明砂研 麝香當門子

訶黎勒皮 香附子中白 沉香重者 青木香
丁子香 安悉香 白檀香 畢撥最上者
犀角各一兩 薰陸香 蘇合香 龍腦香各半兩
右十五味擣篩極細白蜜煎去沫和為丸每朝取井華水服如梧子四丸於淨器中研破服老小每碎一丸服之仍取一丸如彈丸蠟紙裹緋袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳令水蛭水臨時斟量忌生血肉臘月合之有御藏於密器中勿令洩氣出秘之忌生血物桃李雀肉青魚酢等

又療精魅病方

水銀一兩
右取水銀內漿水一升炭火上煎三分減二即去火取水銀如熟豆大取當日神符裹水銀空腹吞之晚又吞一服三日止無所忌並出第四卷中

肘後療卒中邪魅恍惚振噤之方
灸鼻下人中及兩手足大指爪甲本令艾丸半在爪上半在肉上各七壯不止至十四壯便愈集驗同出第三卷中

深師五邪丸療邪狂鬼魅妄言狂走恍惚不識人此為鬼魅當得殺鬼丸方
丹砂研 雄黃研 龍骨 馬目毒公

鬼箭兩各五　鬼臼二兩　赤小豆三兩　芫青　枚
桃人百枚去皮尖熬別研
右九味擣下篩別研雄黃丹砂細絹篩合諸藥拌令和
稍後內蠟和之大如彈丸絳囊盛之繫臂男左女右小
兒繫頭合藥勿令婦人雞犬見之所服蜜和丸如梧子
一服三丸日三忌五辛生血物出第九卷中

小品療鬼魅四物鳶頭散方
東海鳶頭是由䟦根　黃牙石又名金牙　莨菪
防葵各一分
右藥擣下篩以酒服方寸匕欲令病人見鬼增防葵一

分欲令知鬼主者復增一分立有驗防葵莨菪並令人
迷惑恍惚如狂不可多服備急千金同出第五卷中

崔氏療男子得鬼魅欲死所見驚怖欲走時有休止皆邪
氣所爲不能自絕九物牛黃丸方
荊實人精也　曾青蒼龍精也研　玉屑白虎精也研　牛黃土精也研
雄黃地精也研　空青天精也研　赤石脂朱雀精也　玄參真武精也
龍骨水精也各一兩
凡九物名曰九精上通九天下通九地
右擣下篩蜜和丸如小豆先食吞一丸日三稍加以知
爲度忌羊血文仲千金并翼同出第三卷中

必效辟鬼魅方
虎爪　赤朱　雄黃　蟹爪
右四味擣令碎以松脂融及煖和爲丸不然硬正朝旦
及有狐鬼處焚之甚效以熏巫人即神去王三師云奇
效忌生血物出第四卷中

近效大麝香丸療積年心痛尸疰蠱毒癥癖氣乘心兩肋
下有塊溫瘴精魅邪氣或悲或哭蛇蠍蜂等所螫並療之
方
麝香　牛黃　藜蘆炙　朱砂
蘭茹　茯苓　桔梗　鬼箭羽

金牙　烏頭炮　桂心　吳茱萸
貫衆　丹參各一分　蜈蚣去足炙　乾薑
人參　虎骨各二分　鬼臼半分　芍藥
雄黃各一分半　巴豆二十枚去心皮熬　蜥蜴一枚炙
右二十三味擣篩蜜和丸如梧子以飲下三丸至辰時
下利若不利熱飲投之即利三兩行後冷醋飲止之即
定然後煮葱食之勿食冷水明日依前服之亦差忌熱
麪生菜柿子梨等蛇蝎蜂螫取一丸研破和醋塗之便
差精鬼狐狸之屬拋塼瓦或如兵馬行夜㖆者是鬼魅
無早晚每日服前藥兩丸只一二日服即差仍每日燒

一丸熏身體及衣裳宅中燒之亦好無患人以三五丸
絳縫袋盛繫左臂上辟虎毒蛇諸精鬼魅等忌狸肉生
血物猪肉生葱蘆笋

鬼神交通方四首

崔氏療夢與鬼神交通及狐狸精魅等方
野狐鼻炙　豹鼻七枚炙各　狐頭骨一具炙　雄黃
腽肭臍　鬼箭羽　露蜂房炙　白朮
虎頭骨一兩炙各　阿魏藥二兩炙　驢馬狗駝牛等毛各四分燒作灰
若骨蒸加死人腦骨一兩炙
右十五味並大秤兩擣篩為散攪使調勻又先以水煮

松脂候烊投取以和散和散之時勿以手攪將虎爪攪
和為丸如彈丸以熏患者欲熏之時蓋覆衣被勿令藥
煙洩外別擣雄黃為末以藉藥燒藥節度一如熏香法
其藥欲分於牀下燒熏彌善忌桃李雀肉等出第七卷中

備急陶氏療女人與鬼物交通獨言笑或悲思恍惚方
松脂二兩烊　內雄黃末一兩
右二味用虎爪攪令調丸如彈丸夜內籠中燒之令女
裸坐籠上被急自蒙唯出頭耳過三熏即斷深師同

又方
雄黃　人參　防風各二兩　五味子一升

右四味為散早以井華水服方寸匕日三服

又若男女喜夢與鬼通致恍惚者方
鹿角屑酒服三撮日三並出第二卷中

白虎方五首

近效論白虎病者大都是風寒暑濕之毒因虛所致將攝
失理受此風邪經脈結滯血氣不行畜於骨節之間或在
四肢肉色不變其疾晝靜而夜發發即徹髓酸疼作縈其
病如虎之嚙故名曰白虎之病也廣濟療白虎方
犀角屑　當歸　芍藥各六分　牛膝
沉香　青木香　虎頭骨炙各八分

麝香一分研　柳葉脉炙一握
右九味切以水六升煮取二升六合去滓分溫三服如
人行四五里進一服別加麝香末服之不利忌生菜熱
麵蕎麥蒜出第四卷中

蘇孝澄療白虎病云婦人丈夫皆有此病婦人因產犯之
丈夫眠臥犯之為犯白虎爾其病口噤手拳氣不出方
炙臍中七壯　一云炙膻中七壯

近效療白虎方
炭灰五升無炭灰桑灰亦得以紗羅羅之　蚯蚓糞一升擣之
紅藍花十捻

右三味一處搗和熬令熱取好釅醋緩之拌令浥浥以故布三四重裹分作四分更番當所患痛處熨之數數轉勿住手按之冷熱得所暫令小熱不得作冷冷即復熬令熱又熨之並用後呪法曰青健皮青毛出黄健皮黄毛出赤健皮赤毛出白健皮白毛出黑健皮黑毛出急出吾口唾吾口聖唾山山崩唾石石裂得汝字汝不去所頭所頭急急如律令其呪法先令人唾痛處以手按之不住手便即誦此呪不限遍數以差即休當誦呪不得令病人及傍人聞呪須先淨漱口潔淨良效無比千金勿傳

又療風毒腫一切惡腫白虎病並差方

取三年釅醋五升熱煎三五沸切葱白三二升煮一沸許即爪籬漉出布帛熱裹當病上熨之以差為度

又療白虎方

猪肉三串　大麻子一合　酒半盞

右三味和麻子口含噀上將猪肉三串手擘向痛處來去呪曰相州張如意張得興是汝白虎本師急出呪訖將肉安牀下差送路頭神驗

無辜方二首

崔氏無辜悶癖或頭乾瘰癧頭髮黄聳分去或乍痢乍差諸狀既多不可備說大黄煎丸方

大黄九兩錦文新實者若微朽即不中用削去蒼皮乃秤

右一味擣篩為散以上好米醋三升和之置銅碗內於大鐺中浮湯上炭火煑之火不用猛又以竹木篦攪藥候堪丸乃停於小瓷器中密貯兒年三歲一服七丸如梧子日再服常以下青赤膿為度若不下膿或下膿少者稍稍加丸下膿若多丸又須減病重者或至七八劑方盡根本大人小兒不等以意量之此藥雖下膿及宿結不令兒痢禁牛馬驢雞猪魚兔肉生冷粘滑油膩小豆蕎麥乳母亦同此忌

又療無辜腦後兩畔有小結者方

凡無辜之病此結為根欲療者先看結之大小然後取細竹斷酌籠得此結便截竹使斷狀如指環形仍將此竹籠結自然不得轉動以火針針結子中央作兩下去針訖乃塗少許膏藥無者豬油亦得須待三兩日又如前報針更經一兩日當膿水自出若不出復如前針俟膿潰盡結便自散俗法多用刀子頭割者謂之割無辜比來參詳殊不如針之以絕根本恐患者不悉故復重說之　並出第七卷中

除骨熱方四首

范汪療骨蒸狸骨丸方

狸骨　連翹各五分　土瓜　山茱萸
玄參　胡鷰屎　黃芩　丹砂
馬目毒公　鳶尾各二分　黃連　芍藥
雄黃　青葙子　龍膽　栝樓各三

右十六味擣篩蜜和丸如梧子先食服三丸日三不知稍稍增之以知為度禁食生魚菜豬肉黃黍米生血物　古今錄驗同

古今錄驗除熱三黃丸療骨熱身多瘡瘃瘰熱癰疽諸方

大黃　黃芩　黃連　當歸
茯苓　桂心　乾薑　芍藥各二分
梔子一十四枚擘　柴胡三分

右十味擣篩蜜和丸先食服如小豆三丸不知增至十丸欲取微利以意增之久服益良忌生葱醋物豬肉冷水

又方

大黃　黃連　黃芩各一兩　芒消二兩

右四味擣篩蜜和為丸一服五丸漸加以知為度忌豬肉冷水　並出第四卷中

盜汗方七首

病源盜汗者因眠睡而身體流汗也此由陽虛所致久不已令人羸瘠枯瘦心氣不足亡津液故也診其脉男子平人脉虛弱細微皆為盜汗脉也　出第三卷中

崔氏療盜汗夜睡中即汗汗不休必得風方

麻黃根細切　小麥各二升

右二味以水一斗二升煮小麥得九升內麻黃根煮之得三升去滓分為三服常夜服之不過兩劑即止

又方

甘皮　薑各一兩　杏人三兩去皮尖熬　當歸四兩

右四味擣合蜜和丸服如梧子五丸漸漸增之

又方

取死人席緣燒作灰煮汁熱洗從頭至足愈

又止汗粉方　求規送

麻黃根　牡蠣粉　敗扇灰　栝樓各三兩
白朮二兩　米粉三升

右六味擣諸藥下篩為散和粉攪令調以生絹袋盛用粉身體日三兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷日灸二七五七任意不能日別灸亦得汗即漸止　並出第三卷中

延年主盜汗夜臥床席衣被並濕方

麻黃根　牡蠣熬之碎裹各三兩　黃耆　人參各二兩

枸杞根白皮　龍骨打碎各四兩　大棗擘七枚

右七味切以水六升煑取二升五合去滓分温六服如人行八九里久中間任食一日令盡禁蒜熱麪等物

又療夜卧盜汗方

左顧牡蠣　黄耆各三兩　麻黄根五兩　杜仲二兩

右四味擣篩爲散一服方寸匕日三夜一服用敗蒲扇煑取汁下藥禁蒜麪 並出第八卷中

古今錄驗療盜汗麻黄散方

麻黄根三分　故扇燒屑一分

右二味擣下篩以乳服三分仍日三大人方寸匕日三

不知益之又以乾薑三分粉三分擣合以粉粉之大善 出第十卷中

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔　較勘

重訂王燾先生外臺秘要方第十三卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十四卷目錄 中風上二十一門

中風及諸風方一十四首
卒中風方七首
四肢中風方四首
中風發熱方三首
賊風方一十二首
歷節風方一十首
中風角弓反張方七首
風口噤方一十首
風口喎方九首

風失音不語方八首
風不得語方二首
風身體手足不隨方二首
風半身不隨方八首
癱瘓風方四首
風痹方二首
偏風方九首
風猥退方三首
風嚲曳及攣躄方二首
柔風方二首

許仁則療諸風方七首
張文仲療諸風方九首

唐王燾先生外臺秘要方第十四卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

中風及諸風方一十四首 附灸法

病源中風者風氣中於人也風是四時之氣分布八方主長養萬物從其鄉來者而人中少死病不從鄉來者人中多死病其為病也藏於皮膚之間內不得通外不得泄其入經脉行於五藏者各隨藏腑而生病焉心中風但得偃臥不得傾側若脣赤流汗者可療急灸心俞百壯若脣或青或黑或白或黃此是心壞為水面目亭亭時悚動者不可復療五六日而死肝中風但踞坐不得低頭若遶兩目連額色微有青脣青面黃者可療急灸肝俞百壯若大青黑面一黃一白是肝已傷不可復療數日而死脾中風踞而腹滿身通黃吐鹹汁出者可療急灸脾俞百壯若手足青者不可復療腎中風踞而腰痛視脅左右未有黃色如餅粢大者可療急灸腎俞百壯若齒黃赤鬢髮直面土色者不可復療肺中風偃臥而胸滿短氣冒悶汗出視目下鼻上下兩邊下行至口色白者可療急灸肺俞百壯若色黃為肺已傷化為血不可復療其人當妄掇空指地或自

若衰尋衰絡如此數日而死診其脈虛弱者亦風也緩大者亦風也浮虛者亦風也滑散者亦風也出第一卷中

深師療中風汗出乾嘔桂枝湯方

桂心　甘草炙各三兩　大棗十二枚擘

右三味切以水五升煮取二升半分三服一方用生薑五兩忌生葱海藻菘菜

又桂枝湯療中風身體煩疼惡寒而自汗出頭強痛急方

桂心五兩　生薑八兩　甘草二兩炙　葛根八兩

芍藥三兩　大棗十二枚擘

右六味切以水七升煮取二升半服八合日三溫覆取

汗陸伯庸用良忌生葱海藻菘菜人王曰此仲景桂枝加葛根湯方也今云頭強痛急當作項強痛急幾幾是

又麻黃湯療中風氣逆滿悶短氣方

麻黃三兩去節　甘草二兩炙　石膏四兩碎綿裹　杏人五十枚去兩人及尖皮碎

人參三兩　乾薑五兩　茯苓

防風各二兩　桂心三兩　半夏一升洗

右十味以水九升煮取三升先食服一升日三服甚良忌海藻生葱羊肉餳菘菜

又茯苓湯療中風入腹心下如刺不得臥或在脅下轉動無常腹滿短氣慢慢欲死此病或中虛冷或素有宿食食飲不消或素風氣在內令得他邪發于五藏故成此病方

茯苓二兩　芎藭　乾薑　芍藥

白朮　當歸　人參各一兩　枳實三分炙

甘草一兩炙

右九味細切以水九升煮取三升日三若病劇者可相去如人行五里頃一服胸中有氣可加人參二兩服一劑不瘥不過兩劑神良忌海藻菘菜桃李雀肉大酢出第九卷中

千金翼中風論聖人以爲風是百病之長深爲可憂故避風如避矢是以御風邪以湯藥鍼灸蒸熨隨用一法皆能

愈疾至於火艾特有奇能雖口鍼湯散皆所不及灸爲其最要昔者華佗爲魏武帝鍼頭風但鍼即差華佗死後數年魏武帝頭風再發佗當時鍼訖即灸頭風豈可再發只由不灸其本不除所以學者不得專恃於鍼及湯藥等望病畢差既不若灸安能拔本塞源是以雖豐藥餌諸療之要在火艾爲良初得風之時當急下火火下即定比煮湯熟已覺眼明豈非大要其灸法先灸百會次灸風池次灸大椎次灸肩井次灸曲池次灸間使各三壯次灸三里五壯其炷如蒼耳子大必須大實作之其艾又須大熟從此以後日別灸之至隨年壯止凡人稍覺心神不快即須灸

此諸穴各三壯不得輕之苟度朝夕以致殞斃誠之哉誠
之哉
又論曰學者凡將欲療病先須灸前諸穴莫問風與不風
皆先灸之此之一法醫之大術宜深體之要中之要無過
此術是以常預收三月三日艾擬救急危其五月五日亦
好仍不及三月三日者又有卒死之人及中風不得語者
皆急灸之夫卒死者氣入五臟傷生平風發□恐怕痛不
灸忽然卒死謂是何病所以皆必灸之是大要也
又論曰夫得風之時則依此次第療之不可違越若不依
此當失機要性命必危

又凡初得風四肢不收心神惛憒眼不識人言不出口凡
中風多由熱起服藥當須慎酒麵羊肉生菜冷食豬魚雞
牛馬蒜乃可差得患即服此竹瀝湯方
竹瀝二升　生葛汁一升　生薑汁三合
右三味相和溫煖分三服平旦日晡夜各一服訖覺四
體有異似好以進後方 土鷄曰一云有荆瀝一升
又方
麻黃去節　防風各一兩半　芎藭　防己
附子炮　人參　芍藥　黃芩
桂心　甘草炙各一兩　生薑四兩
杏人四十枚去皮尖兩人者　羚羊角二兩屑　竹瀝一升
生葛汁五合一云地黃汁　石膏六兩碎綿裹
右十六味切以水七升煮取一半乃下瀝汁煮取二升
七合分溫三服五日更服一劑頻與三劑慎如上法漸
覺稍損次進後方忌豬肉冷水海藻菘菜生葱
又方
竹瀝二升　防己一兩　麻黃三兩去節　防風
升麻　桂心　芎藭　獨活
羚羊角屑各二兩
右九味切以水四升并瀝煮取三升分為三服兩日進

一劑進三劑若手足冷加生薑五兩白朮一兩若未除
次進後方忌生葱等如前
又方
防風　麻黃去節　芍藥各一兩半　防己
桂心　黃芩各一兩　附子炮二分　甘草炙
白朮　人參　芎藭　獨活各一兩
竹瀝一升　羚羊角屑二兩　升麻一兩　石膏二兩碎綿裹
生薑二兩
右十七味以水八升煮減半下瀝煮取二升半分三服
相去如人行十里再服有氣加橘皮牛膝五加皮各一

肉若除退訖可常將服後煮散忌豬肉冷水海藻菘菜桃李生葱雀肉等

又煮散方

防風 獨活 芍藥 黃耆
人參 芎藭 白朮 丹參
薯蕷 茯神 桂心 麥門冬去心
山茱萸 厚朴 牛膝 五加皮
天門冬去心 升麻 羚羊角屑 地骨皮
秦艽 石斛 防己 甘草炙各四
麻黃去節二兩 甘菊花 薏苡人一升 石膏六兩
橘皮三兩 生薑切二兩 乾地黃六兩 附子兩
遠志去心二兩

右三十三味擣篩爲散每煮以水三升內藥三兩煮取一升綿濾去滓頓服之日別一服覺心中煩熱以竹瀝代水煮之千金有黃芩檳榔藁本杜仲犀角無山茱萸薯蕷甘草麥門冬附子

又凡患風人多熱宜服荆瀝方

荆瀝 竹瀝 生薑汁各五合

右三味相和溫爲一服每日旦服煮散午後當服此荆瀝常作此將息

防風湯主偏風甄權處治安平公方

防風 白朮 芎藭 白芷
牛膝 狗脊 萆薢各一兩 薏苡人
杏人去尖皮兩人者 人參 葛根 羌活各二
麻黃去節四兩 石膏綿裹碎 桂心各二兩 生薑五兩切

右十六味切以水一斗二升煮取三升分爲三服服一劑覺好更服一劑一劑一度灸之服九劑九度灸之灸風池一穴肩髃一穴曲池一穴支溝一穴五樞一穴陽陵泉一穴巨虛下廉一穴合七穴即差仁壽宮備身患腳不劫灸環跳陽陵泉巨虛下廉陽輔即起行大理趙卿患風腰腳不隨不得跪起灸上窌二穴環跳二穴陽陵泉二穴巨虛下廉二穴即得跪起庫狄欽患偏風不得挽弓灸肩髃一穴即差前方忌桃李生葱方千金翼本並云鍼此云灸者蓋王遺不取鍼也

又一切風虛方常患頭痛欲破者

杏人九升去尖皮兩人者暴乾

右一味擣作末以水九升研濾如作粥法緩火煎令如麻浮上匙取和羹粥酒內一匙服之每食即服不限多少服十日後大汗出二十日後汗止慎風冷豬魚雞蒜大酢一劑後諸風減差春夏恐酢少作服之秋九月宜煎之此法神妙可深秘之並出第十六卷中千金同

備急療若卒覺體中恍恍皮肉習習此即欲中風方
急取獨活桂心各五兩二味切以酒三升漬於火邊
炙之使煖一服五合日三加至一升良忌生葱千金
同出第一卷中

近效薏苡人湯療諸風方
薏苡人五合　萎蕤　生薑　茯神各二兩
生犀角末二兩　烏梅七枚　麥門冬去心　竹瀝各三合
白蜜一合
右九味切以水八升緩煮取二升七合汁絞去滓內竹
瀝白蜜攪調細細飲之不須限以遲數多少亦不限食

前食後亦不限晝夜令暖出又合服亦不限劑數多少
此飲但合服勿輕尤佳以防風候忌食米醋油脂陳敗
臭膩等物以前方療暴風手足癱瘓言語蹇澀神情恍
惚遊風散走或出諸四肢瘰痺有所不穩似緣風候皆
合服之十日服一劑甚佳吳升處

卒中風方七首

千金芎藭湯主卒中風四肢不仁善笑不息方
芎藭六分　杏人二十枚去兩人尖皮碎　黃芩
當歸炙　石膏碎綿裹　麻黃去節　桂心
秦艽炙　甘草炙　乾薑各四分
右十味切以水九升煮取三升分爲三服忌海藻菘菜
生葱
又主卒中風四肢不仁善笑不息方
芎藭六分　黃芩　當歸　桂心
秦艽　乾薑　甘草炙　麻黃去節
黃連各四分　杏人二十枚去皮尖兩人碎
右十味切以水九升煮取三升溫服一升日三大汗忌
生葱海藻菘菜豬肉並出第八卷中
崔氏小續命湯療卒中風欲死身體緩急口目不正舌強
不能語奄奄惚惚神情悶亂諸風服之皆驗不令人虛方

出小品余昔任戶部員外忽嬰風疹便服此湯一劑之中
凡得四十六劑風疾迄今不發余曾任殿中少監以此狀
說向名醫咸云此方爲諸湯之最要
麻黃去節　人參　黃芩　芍藥
芎藭　甘草炙　杏人去兩人尖皮碎　桂心各一兩
防風一兩半　附子一枚大者炮　生薑五兩
右十一味切以水九升煮取三升分爲三服甚良不差
合三四劑必佳取汗隨人風輕重虛實也有人腳弱服
此方至六七劑得差有風疹家天陰節變輒合之可以
防瘖也忌豬肉冷水海藻菘菜生葱千金有防己一兩如恍惚者加茯神

逆志者皆節頗爽本有執者去附子倍芍藥服之

又續命湯方太府絮卿得効、

麻黃去節　茯神　生薑各三兩　附子炮

防巳　甘草炙各一兩半　芎藭　細辛

白鮮皮　杏人去皮尖兩人碎　人參　羌活

桂心各三兩

右十三味切以水八升煮取二升八合去滓分三服服別相去八九里許覆取汗可服三劑間五日一進須如藥法本方云間五日一進若老弱虛羸者間十日以上不可頻服忌豬肉冷水海藻菘菜生葱生菜大酢並出

第六卷中

備急療卒得中風急悶亂欲死方

灸足大指下横文隨年壯

又不能語者方

灸第三或第五椎上百五十壯並出第六卷中

古今錄驗小續命湯療卒中風欲死身體緩急目不停舌強不能語諸中風服之皆驗不令人虛方

大附子一枚炮　芍藥一兩　生薑五兩　芎藭一兩

甘草一兩炙　麻黃三兩去節　白朮一兩　木防巳一兩

防風六分　黃芩一兩　桂心一兩　人參一兩

右十二味㕮咀以水一斗三升煮取三升分三服甚良不瘥可作三四劑必佳忌豬肉海藻桃李生葱菘菜出第十四卷中

四時中風方四首

古今錄驗療中風發三春脉浮短者多內大而長可療青龍湯方

甘草一兩炙　麻黃二兩去節　桂心七寸　大棗二十枚擘

生薑　芍藥各二兩

右六味切以水六升煮取二升半分為再服初服稍取汗後即止忌海藻菘菜生葱等物

又療中風發三夏脉沈緊惡寒不汗煩三陽湯方

當歸一兩　生薑二兩　甘草五分炙　麻黃五兩去節

杏人四十枚去尖皮兩人碎　石膏二兩碎綿裹

右六味切以水六升煮取半分再服忌海藻菘菜等物

又療中風發三秋脉浮大而洪長扶金湯方

葛根三兩　獨活二兩　附子一兩炮四破

石膏二兩碎綿裹

右四味切以水八升煮取三升服九合晝二夜一忌豬肉冷水等物

又療中風發二冬脉浮大者溫脾湯方

芎藭一兩 石膏四分碎綿裹 甘草六分炙 黃芩三兩
杏人十四枚去尖皮兩人碎 麻黃六分去節 蜀椒二分去目閉口汗
防風四分 桂心五分
右九味切以水八升煮取三升分三服忌海藻菘菜生
葱等物

中風發熱方三首

深師十一味防風湯療中風發熱無汗肢節煩腹急痛大
小便不利方
防風 當歸 麻黃去節 甘草炙各二分
茯苓 天門冬去心 附子炮 乾地黃

白朮 山茱萸二兩 黃芩五分
右十一味㕮咀以水九升煮取二升半去滓分六七合
日三大小便不利內大黃人參各二分大棗三十枚擘
生薑三兩忌海藻菘菜豬肉蕪荑大酢桃李雀肉等物
又防風湯療中風發熱頭痛面赤吸吸苦熱惡風煩悶身
中悁悁而疼其脈浮而數者方
防風 白朮 桂心 蜀椒汗
黃芩 細辛 芍藥 人參
甘草炙各一兩 麻黃三兩去節 石膏二兩碎綿裹 大棗三十枚擘
右十二味切以水九升煮取三升分三服忌海藻菘菜
桃李生葱生菜 出第一卷中
范汪療中風發熱大戟洗湯方
大戟 苦參
右二味等分擣篩藥半升用酢漿一斗煮之三沸適寒
溫洗之從上下寒乃止小兒三指撮之酢漿四升煮如
上法 肘後同出第一卷中

賊風方十二首

病源賊風者謂冬至之日有疾風從南方來名曰虛風此
風至能傷害於人故言賊風也其傷人也但痛不可抑按
不得動轉痛處體卒無熱傷風冷則骨解深痛按之乃應

骨痛但覺身體內索索冷欲得熱物熨痛處即小寬時有
汗久而不去重遇冷風相搏乃結成瘰癧及偏枯遇風熱
氣相搏乃變作附骨疽也 出第一卷中
深師療賊風入腹五藏四肢心胸急痛背反寒咽乾口噤
戴眼方 此是人參湯藥分兩不同
麻黃三兩去節 石膏碎綿裹 當歸 芎藭
甘草炙 乾薑 桂心各二兩 黃芩一兩
杏人二十枚去尖皮兩人
右九味㕮咀以水酒各五升合煮取四升分為四服忌
海藻菘菜生葱

又秦艽湯療賊風入腹搶心拘急四肢不隨腹滿欲死者方

桂心　防風　黃芩　乾薑

茱萸　秦艽　甘草各二兩炙

右七味切以水五升煮取一升半分再服湯令熱不差更作忌海藻菘菜生葱

又竹瀝湯療大虛挾風及賊風入腹腹中拘痛煩亂恍惚妄語迷惑不知人口噤不開手足緩縱欠含不自由以攣見彦中冷口乾惡風時時失精夢寤沉重及婦人產後餘疾并受風躁憒欲死方

秦艽　甘草炙　防風　當歸各二兩

茵芋　烏頭炮　乾薑　細辛

人參　黃芩　桂心　天雄炮

木防己　茯苓　白朮各一兩

右十五味切以竹瀝一斗半煮取五升隨病加後藥胸逆滿加前胡二兩半半夏二兩洗朮附子炮各一兩腹中痛加芍藥二兩椒一兩汗煩加知母一兩口乾加麥門冬一兩去心體痹加麻黃二兩去節有方不用朮附子用半夏二兩忌海藻菘菜豬肉冷水生葱生菜桃李雀肉酢物等

又大續命湯療毒風賊風身體不能自收不知痛處咽中拳不得語若拘急腰痛引頭目眩不得見風坐欲却倒覺仰反張脊不著席脈動不安恍惚恐懼欲啼上氣嘔逆面腫方

杏人三十枚去皮尖雙仁碎　芎藭　石膏碎綿裹

甘草炙　桂心　當歸　麻黃去節

黃芩各一兩　乾薑一兩

右九味切以水六升酒三升合煮取三升分為四服取微汗汗出粉之勿見風忌海藻菘菜生葱

又茵芋酒療賊風濕痹身體不能自動四肢偏枯火灸不熱骨節皆疼手足不仁皮中淫淫如有蟲行搔之生瘡癢隱疹起手不得上頭頭眩顛甚者狂走歷節腫及諸惡風悉主之方

茵芋　烏頭炮　天雄炮　石南

女萎　附子炮　躑躅花炙　秦艽

木防己　防風各一兩

右十味㕮咀以絹囊盛之清酒三斗漬之夏三日春秋五日冬七日平旦服一合不知稍增之可至二合以意消息忌如常法

又甘草湯療心腹絞痛賊風入腹脹滿拘急不得氣息若

轉筋寒中下重溫中止痛利大小便方

甘草炙　防風各一兩半　吳茱萸　乾地黃

芍藥　當歸　細辛　乾薑各一兩

右八味㕮咀以水五升煮取三升分再服忌海藻菘菜生葱茱蕪荑

又烏頭膏療賊風身體不隨偏枯口喎僻及傷寒[illegible]強直方

烏頭炮　野葛去心各五兩　莽草一斤

右三味㕮咀以好酒漬令淹漸再宿三日漬之以不中水豬肪五斤煎成膏合藥作東向露竈以桑薪煎之三

上三下藥成去滓有病者向火摩三千過汗出即愈若觸寒鼻中塞對火摩頂鼻中即通藥不可令入口眼也范汪第九卷中

千金療賊風所中腹內攣急方

麻黃四兩去節　甘草一兩炙切　石膏如雞子大碎之綿裹

鬼箭羽如雞子大削

右四味以東流水二杯煮取一杯頓服之忌海藻菘菜

又大嚴蜜湯主賊風腹中絞痛并飛尸遁注發作無時發則搶心脹滿脅下如刀錐刺并主少陰傷寒方

甘草　乾地黃　細辛　乾薑

當歸　羊脂青羊脂更勝　桂心　茯苓

吳茱萸　芍藥各一兩　梔子十五枚擘

右十一味切以水八升煮取三升去滓內脂烊分三服忌海藻菘菜生葱生菜蕪荑酢物深師同小品治中惡一方無桂心有防風

又烏頭湯主寒疝腹中絞痛賊風入腹攻五藏拘急不得轉側叫呼發作有時使人陰縮手足厥逆方

烏頭十五枚炮　芍藥四兩　甘草二兩炙　大棗十枚擘

生薑一斤　桂心六兩

右六味切以水七升煮五味取三升去滓別取烏頭去皮四破蜜二升微火煎令減五六合內湯中兩三沸去

滓服一合日三間食強人三合以如醉狀為知不知漸增忌海藻菘菜豬肉冷水生葱深師同

又倉公當歸湯主賊風口噤角弓反張身體強直方

當歸　細辛　防風各六分　獨活二分

麻黃十分去節　附子四分炮去皮

右六味切以清酒八升水四升合煮取四升分為四服口不開者挍口下湯一服當蘇再服小汗三服大汗忌豬肉生葱廣濟同范汪出第八卷中

古今錄驗續命湯療中風賊風入腹角弓反張口噤舌不停目視不見不能語舉身不仁或心腹絞痛方

甘草炙 黃芩各二兩 防風一兩半 生薑五兩
人參 芎藭 芍藥 麻黃去節
木防已各一兩 大附子一枚炮
右十味切以水一斗二升煮取三升分為三服一日令汗可服三劑不令人虛本方有十三味見藥止有十味忌海藻豬肉菘菜冷水魚等物出第十卷中

歷節風方一十首

病源歷節風之狀短氣自汗出歷節疼痛不可忍屈伸不得是也由飲酒腠理開汗出當風所致亦有血氣虛受風邪而得之者風歷關節與血氣相搏交擊故疼痛血氣虛

則汗出風冷搏於筋則不可屈伸為歷節風也出第二卷中
深師大風引湯療男女歷節風大虛手腳曲戾或變狂走或悲笑言語錯亂無所不療方
茯苓 防風 當歸 白前
乾薑 甘草炙各二兩 大豆一升 生薑
獨活各三兩 遠志去心 附子炮 人參各一兩
大棗三十枚
右十三味切先以水一斗五升煮豆棗取一斗去滓內諸藥煮取三升分為五服忌海藻菘菜豬肉醋物蒜麪生菜等物出第九卷中

千金論曰夫歷節風著人久不療者令人骨節蹉跌變成癈病不可不知古今以來無問貴賤往往苦之此是風之毒害者也療之雖有湯藥而並不及松膏松節酒若羇旅家貧不可急辦者宜服諸湯猶勝不療但於痛處灸三七壯佳又防已湯療風發歷節四肢疼痛如搥鍛不可忍者方
防已 茯苓 白朮 桂心
生薑各四分 人參二兩 烏頭七枚炮 甘草二兩炙
右八味切以苦酒一升水一斗煮取三升半一服八合日三夜一當覺熱痺忽忽然慎勿怪也若不覺復合

服以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人宜慎之忌酢物桃李雀肉生蔥豬肉冷水海藻菘菜古今錄驗同
又大棗湯療歷節疼痛方
大棗十五枚擘 黃耆四兩 附子一枚炮 生薑一兩
麻黃五兩去節 甘草一尺炙
右六味切以水七升煮取三升服一升日三忌豬肉冷水海藻菘菜古今錄驗同
又療歷節諸風百節酸疼不可忍方
松脂三十斤鍊五十遍不能五十遍二十遍亦可用

右一味以鍊至三升温和松脂三升熬攪令極調旦空腹以酒服方寸匕日三數數食㹠粥爲佳愼血腥生冷酢物果子百日差

又松節酒主歷節風四肢疼痛猶如解落方 通按醱音撥再醸也

松節四十斤細剉以水四石煮取一石　猪椒葉四十斤細剉以水四石煮取一石

右二味澄清合漬乾麴五斤候發以糯水四石五斗釀之依家醞法四酘勿令寒令熱第一酘時下後諸藥

栢子人五兩　磁石十二兩末　獨活十五兩　天雄五兩炮
茵芋四兩炙　防風十兩　秦艽六兩　芎藭五兩
人參四兩　萆薢五兩

右十味細切内飯中炊之下酘爲抱酘足訖封頭四七日押取清適性服之勿令至醉吐忌猪肉冷水

又方

松膏一升擣酒三升漬七日服一合日再數劑即全

又方

松葉三十斤酒二石五斗漬三七日服一合日五六 並出第八卷中

延年療歷節風四肢頭面腫方

黄耆十二分　獨活八分　生地黄切三升暴乾
豆豉一升熬　鼠粘子三升暴乾

右五味擣篩爲散一服方寸匕飲汁下日二服加至二三匕忌蕪荑蒜麪猪肉 一方無鼠粘子

又療歷節風流入腰腳方

獨活六兩　玄參四兩　犀角屑　升麻各三兩
生地黄切三升暴乾　豉三合　鼠粘根切三升暴乾

右七味擣篩爲散服方寸匕飲汁下日二服加至二三匕忌蕪荑蒜麪 並出第十卷中

古今錄驗防風湯主身體四肢節解疼痛如墮脫腫按之皮急一作頭眩短氣温温悶亂如欲吐方

防風　桂心　知母各四兩　白朮

生薑各五兩　芍藥　甘草各三兩炙　附子二枚炮

右八味切以水一斗煮取三升分爲三服忌生葱猪肉海藻菘菜桃李雀肉等 出第四卷中千金有半夏杏人芍藥爲十味無附子

中風角弓反張方七首

病源風邪傷人令腰背反折不能俛仰似角弓者由邪入諸陽經故也 出第一卷中

肘後療中風無問男子婦人中風脊急身痓如弓紫湯方

雞屎二升　大豆一升　防風三兩切

右三味以水三升先煮防風取三合汁豆雞屎二味鎗中熬之令黄赤色用酒二升淋之去滓然後用防風汁

稈分爲再服相去如人行六七里衣覆取汗忌風出第一卷中

小品大續命湯療中風身如角弓反張并主卒心腹絞痛方

茯苓　芎藭　當歸　甘草炙各一兩

桂心三兩　梔子十四枚擘　吳茱萸三兩　細辛

乾薑　乾地黃各二兩

右十味切以水八升煮取三升分爲三服相去如行十里頃若痛甚者加羊脂三兩當歸芍藥人參各一兩心腹脹滿堅急者加大黃三兩忌豬肉生葱生菜海藻菘菜

蘇恭等出第四卷中

千金小續命湯主惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶絶往來有時筋急少陰傷寒口噤不利方

大黃二兩　雄黃一兩　青羊脂　乾薑

桂心　芍藥　甘草炙　細辛

乾地黃各四分　吳茱萸三兩　當歸四兩

右十一味切以水二斗煮取六升分六服重者加藥用水三斗煮取九升分十服忌海藻菘菜生葱生菜深師同

又療半身不隨手足拘急不得屈伸體冷或智或癡身彊直不語或生或死狂言不可名狀角弓反張或欲得食或不用食大小便不利方

人參　桂心　當歸　獨活

黃芩　乾薑各三分　甘草炙二分　石膏六分碎綿裹

杏人四十枚去皮尖兩人者

右九味切以井華水九升煮取三升分二服日二覆取汗不汗更合服之忌海藻菘菜生葱等物

又療賊風口噤角弓反張痓者方

當歸　防風各三分　獨活六分　麻黃五分去節

附子一枚炮　細辛二分

右六味切以酒五升水三升煮取三升服一升口不開

者挍口下湯一服當開二服小汗三服大汗又單服荊瀝忌豬肉冷水生菜並出第八卷中

備急療若身體角弓反張四肢不隨煩亂欲死者方

清酒五升　雞屎白一升熬

右二味擣篩合和揚之千遍乃飲之大人服一升小兒服五合更小者服三合良肘後同出第二卷中

必効療風入耳角弓反張及婦人風方

烏豆二升熬令聲絶沿三升內鐺中急攪以絹濾頓服取汗不過三劑極重者和雞糞合熬若口不開者灌之良備急文仲同出第三卷中

古今錄驗療卒中風身體直角弓反張口噤西州續命湯
方
麻黃去節 乾薑各三兩 附子一兩炮 防風
桂心 白朮 人參 芎藭
當歸 甘草炙各一兩 杏人四十枚去皮尖兩人者
右十一味切以水九升煮取三升未食分再服覆令汗
出文仲同出第一卷中

風口噤方一十首

病源諸陽經筋皆在於頭三陽之筋並絡入於頷頰夾於
口諸陽爲風寒所客則筋急故口噤不開診其脈遲者生

出第一卷中
深師竹瀝湯療卒中惡風噎倒悶口噤不能語肝厥方
淡竹瀝一升 防風 葛根各一兩 菊花
細辛 芍藥 白朮 當歸
桂心 通草 防己 人參各一兩
甘草炙 附子炮 茯苓 玄參各一兩
秦艽 生薑各二兩 楓寄生三兩
右十九味切以淡竹瀝一斗煮藥取四升分爲四服忌
海藻菘菜豬肉生菜生葱酢桃李雀肉等物
又斗竹瀝湯療卒中惡風噎倒悶口噤不能語肝厥尸蹷
九不識人閉目灸鍼不知痛風狂亦服此湯方
斗竹瀝一斗 生薑三兩 防風 甘草炙各二兩
防己 麻黃去節 人參 黃芩
白朮 細辛 芎藭 秦艽
桂心各一兩 附子一枚炮
右十四味㕮咀以湯煮藥令少水合竹瀝煮取四升分爲
四服忌海藻菘菜豬肉生葱生菜桃李雀肉冷水並出
第十九卷中
千金排風湯主諸毒風氣邪風所中口噤悶絕不識人身
體疼煩面目暴腫手足腫方

犀角末 羚羊角 貝齒末 升麻末
右四味各一兩和勻以方寸匕爲一分水二升半內四
匕煮取一升去滓服五合發藥者以意增之若腫和雞
子傅上日三老小以意亦可多合用之深師同
又療中風口噤不能言者方
防己二兩 葛根三兩 桂心 麻黃去節各二兩
甘草炙 防風 芍藥各一兩 生薑四兩
右八味切以水六升煮取二升分爲三服瘖不能言皆
療忌海藻菘菜生葱
又方

服淡竹瀝一升

又方

白术四兩切 酒三升

右二味合煮取一升頓服之忌桃李雀肉

又方

服荊瀝一升

又方

豉五升熬 吳茱萸一升

右二味以水七升煮取三升漸漸飲之 並出第八卷中

備急陶隱居効驗方療人卒中風口不開身不著牀人豆

散方

大豆二升熬令焦 乾薑 蜀椒汗各三兩

右三味為散酒服一錢匕日一汗出即差大良 又依前

又方

若口噤不開大豆五升熬令黃黑以五升酒漬取汁

灌之取汗肘後同 並出第一卷中

風口喎方九首

病源風邪入於足陽明手太陽之經遇寒則筋急引頰故使口喎僻言語不正而目不能平視診其脈浮而遲者可療

深師方云夜臥當耳勿得有孔風入耳中喜口喎 出第二卷中

廣濟療風著口面喎語不多轉方

生地黃汁一升 竹瀝一升 獨活三兩切

右三味相和煎取一升頓服之未正更三劑無所忌 出第一卷中

深師續命湯療中風口僻噤諸疾卒死不知人補虛起死神方

人參 木防己 麻黃去節 芍藥

芎藭 甘草炙 黃芩 白术各一兩

桂心 防風各二兩 大附子一枚炮 生薑五兩

右十二味切以水一斗二升煮取三升分為三 小差復作忌海藻菘菜豬肉生蔥桃李雀肉

又療中風面目相引偏僻牙車疼急舌不得轉方

牡蠣熬 礬石燒令汁盡 附子炮 竈中黃土

右四味分等搗篩以三歲雄雞冠血和藥傅其急上預持鏡及水著邊照候欲復故便洗去血不速去便過不復還也 肘後范汪同出第九卷中

千金附子散主中風手臂不仁口面僻方

附子炮 桂心各五兩 細辛 防風

人參 乾薑各六兩

右六味擣下篩酒服方寸匕日三稍稍増之忌猪肉冷
水生葱生菜
又口喎不正方
取空青如豆一枚含之即愈（范汪同）
又療卒中風口喎方
以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麪密塞之勿令泄氣一頭內大豆一顆并艾燒之令然灸七壯即差患右灸左患左灸右（千金不傳）
又方
灸手交脉三壯左灸右右灸左其炷如鼠矢形横安之

兩頭放火也
又方
豉大豆三升令焦以酒三升淋取汁頓服之
又方
大皂莢五兩去皮子下篩以三年大酢和右喎塗左左喎塗右乾更塗（並出第八卷中）
風失音不語方八首
病源喉嚨者氣之所以上下也會厭者聲之戶舌者聲之機脣者聲之扇也風寒客於會厭之間故卒然無音皆由風邪所傷故謂風失音不語養生方云醉卧當風使人發
瘖（出第一卷中）
廣濟療風失音不得語方
羗活十分　甘草炙　人參二分　荆瀝
竹瀝　生地黃汁（各二升）　大附子（一枚炮）八分
右七味切諸藥內三汁中煎取一升六合去滓分溫二服未差四五日更進一劑取微利忌熱麪海藻菘菜猪肉冷水蕪荑魚蒜粘食（出第一卷中）
深師防風湯療中風兩目不開不能言短氣欲死方
防風　甘草炙　黃芩　茯苓
當歸（各一兩）　杏人（五十枚去兩人尖皮）　秦艽（半兩）

生薑（五兩）　乾棗（三十枚擘）　麻黃（二兩去節）
右十味㕮咀以清酒水共四升煮取三升分三服發汗
忌海藻菘菜大酢
又四逆湯療卒中風不能言厥逆無脉手足拘急者方
山茱萸　細辛　乾薑（各一兩）　甘草（三兩炙）
麥門冬（一升去心）
右五味切以水七升煑取二升分爲四服忌海藻菘菜
生葱菜（出第九卷中）
肘後療卒不得語方
以苦酒煑芥子薄頸一周以衣包之一日一夕乃解

即差　范汪千金同

又方

煮大豆煎其汁令如飴含之亦但濃煮飲之　並出第一卷中

范汪同

千金廢失音論曰風寒之氣客於中滯不能發故瘖不言及喉痺失聲皆風邪所爲也入藏皆能殺人凡尸忌卯死脉動如故陽脉下墜陰脉上爭氣閉故也療之方

取竈突墨彈丸大漿和飲之

又方

濃煮桂汁服之一升覆取汗亦可末桂著舌下漸漸嚥

汁忌生葱　范汪同

又方

濃煮豉汁含之亦佳　並出第八卷中

風不得語方二首

病源脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉係舌本今心脾二藏受風邪故舌強不得語也　出第一卷中

救急療中風身體緩急口目不正舌強不能語奄奄忽忽神情悶亂諸風服之皆驗不令人虛湯方

麻黃去節　防己　黃芩　桂心

芍藥　甘草一兩炙　防風　人參各六分

附子一枚炮　生薑二兩

右十味切以水九升先煮麻黃三沸去沫內諸藥煮取二升五合去滓空腹分爲三服服別相去十里能言則服十劑諸風悉愈禁生冷及風勞酒　出第六卷中　千金有芎藭杏人爲十二味

古今錄驗療卒不得語方

取人乳汁半合以著美酒半升中合攪分爲再服　肘後范汪同出第十卷中

風身體手足不隨方二首

病源風身體手足不隨者由體虛腠理開風氣傷於脾胃

之經絡也足太陰爲脾之經脾與胃合足陽明爲胃之經胃爲水穀之海也脾候身之肌肉主爲胃消行水穀之氣以養身體四肢脾氣弱則肌肉虛受風邪所侵故不能爲胃通行水穀之氣致四肢肌肉無所稟受而風邪在經絡搏於陽經氣行則遲關機緩縱故令身體手足不隨也診其脉脾脉緩者爲風痿四肢不用又心脉腎脉俱至則難以言九竅不通四肢不舉腎脉來多即死也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云極力左右振兩臂不息九通愈臂痛勞倦風氣不隨振兩臂者更互踶蹹猶言蹶九通中間偃伏皆爲之名蝦蟇行氣不已愈

背痛勞倦風氣不隨患久行不覺痹便作幾種形狀又云偃臥合兩膝布兩足生腰口內氣振腹七息除壯熱疼痛兩脛不隨又云療四肢疼悶及四肢不隨腹內積氣牀席必須平而且穩正身仰臥緩解衣帶枕高三寸握固握固者必兩手各自以四指把手拇指舒臂令去身各五寸兩脚豎指相去五寸安心定意調和氣息莫思餘事專意念氣徐徐漱醴泉漱醴泉者以舌舐略脣口牙齒然後嚥唾徐徐以口吐氣鼻引氣入喉須微微緩作不可卒急強作待好調和引氣吐氣勿令自聞出入之聲每引氣心心念送之從脚指頭使氣出引氣五息六息一出之爲一息數至

十息漸漸增益能至百息二百息病即除愈不用食生菜及魚肥肉大飽食後喜怒憂恚不得輒行氣唯須向曉清靜時行氣佳能愈萬病 出第一卷中

千金療心虛寒性氣反常心手不隨語聲冒昧其所疾源厲風損心白术釀酒補心志定氣方

白术切 地骨根皮 荊實各三升 菊花

右四味切以水三石煮取一石五斗去滓澄清取汁釀米兩石用麴如常法以酒熟隨多少能飲常取小小半醉忌桃李 出第八卷中

古今錄驗小續命湯療中風入藏身緩急不隨不能語方

麻黃去節 桂心各二兩 甘草炙 人參

芍藥 芎藭 黃芩 防風

當歸 石膏各二兩碎綿裹 白术一兩 生薑五兩

附子二枚炮 杏人三十枚去皮尖兩人

右十四味切以水一斗煮取三升分三服若不差可服三四劑一方石膏三兩忌海藻菘菜生葱猪肉 出第十四卷中

風半身不隨方八首

病源風半身不隨者脾胃氣弱血氣偏虛爲風邪所乘故也脾胃爲水穀之海水穀之精化爲血氣潤養身體脾既

弱水穀之精潤養不周致血氣偏虛而爲風邪所侵故半身不隨也診其脉寸口沈細名陽中之陰苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出臂偏不舉又寸口偏絕者則不隨其兩手盡絕者不可療 出第一卷中

深師療風半身不隨口不能言十物獨活湯方

獨活四兩 桂心五兩 生葛根八兩 甘草炙

防風 當歸各二兩 生薑十兩 芍藥

附子一枚炮 半夏一升洗

右藥切以水一斗煮取三升分爲三服日三大驗忌海藻菘菜生葱猪肉羊肉餳 出第九卷中

千金療卒暴風口面僻半身不隨不轉竹瀝湯方

竹瀝二升　防風　防已　升麻

桂心　芎藭　羚羊角屑各一兩　麻黄四兩去節

右八味切以水四升合竹瀝煮取二升半分爲三服三日服一劑常用忌生葱　廣濟同集驗無羚羊角餘同

又療心虛寒風半身不隨骨節離解緩弱不用便利無度口面喎斜薑附湯方

乾薑　附子炮各八兩　麻黄去節　芎藭

桂心各四兩

右五味切以水九升煮取三升分三服三日一劑忌猪肉生葱冷水　崔氏同

又療大風半身不隨方

蠶沙兩石

右一味熟蒸作直袋三枚各受七斗即熱盛一袋著患處如冷即取餘袋一依前法數數換百不禁差止須羊肚釀粳米葱白薑豉椒等爛煮熟喫日食一枚十日止

千金不傳　並出第八卷中

古今錄驗療大痱一身不隨或半身一手一臂口不能言習習不知人不覺痛癢續命湯方

麻黄三兩去節　防風二兩　石膏碎綿裹　黄芩

乾地黄　芎藭　當歸　甘草炙各一兩

杏人四十枚去皮尖熬　桂心二兩

右十味㕮咀以水一斗煮取四升服一升日再服之當汗出氣下自覆當慎護風寒不可見風并療上氣欬逆面目大腫但得伏不得臥更善忌海藻菘菜生葱蕪荑

又獨活湯療風半身不隨口不能語方

獨活四兩　生葛根半斤　芍藥二兩　防風二兩

半夏一斤洗　桂心五兩　當歸　附子炮

甘草炙各二兩　生薑十兩

右十味切以水一斗五升煮取三升服一升日三一方去半夏用麻黄二兩去節忌羊肉餳生葱海藻菘菜豬肉冷水等

又八風續命湯療半身不隨手脚拘急不得屈伸體冷或癡或智身强直不語或生或死狂言不可名狀或角弓反張或欲得食或不用食或大小便不利皆療之方

麻黄八分去節　人參　桂心　當歸

獨活　甘草炙各三兩　石膏六分碎綿裹　黄芩

乾薑各三　杏人四十枚去皮尖兩人

右十味切以井花水九升煮取三升分爲二服日二服覆令汗汗解食白粥慎風無汗復更服唯汗得差忌生葱

崔氏卷末

又八風九州湯療男子婦人寒冷不自愛護當風解衣汗出卧冷濕地半身不遂手足苦冷或不隨或俛仰屈伸難周身淫痺四肢不收狀如風狂飲食損少方

麻黃四兩去節　甘草炙　乾薑　附子炮

防風　獨活各二兩　石膏碎綿裹　茯苓

白朮　芎藭　柴胡　當歸

人參各二兩　杏人四十枚去皮尖兩人　細辛一兩

右十五味切以水一斗清酒五升漬三夜煮取四升分為三服一日令盡若病人羸瘦者用水煎服藥訖厚覆當汗出微微去上衣汗解以粉粉之忌生菜海藻菘菜酢桃李豬肉雀肉　並出第四卷中

廣濟療癱瘓風方四首

廣濟療癱瘓風及諸風手足不隨腰脚無力方

驢皮膠五兩炙令微起

右一味先煑葱豉粥一升別貯又香淡豉二合以水一升煑豉去滓內膠更煑六七沸膠烊如餳頓服之及煖喫前葱豉粥任意多少如喫令人嘔逆頓服三四劑即止風並差忌熱麪炙豬肉魚蒜

又療熱風癱瘓常發者方

羌活二斤　穀子一升五合水中取沉者

右二味擣篩為散酒服方寸匕日三服稍加之無忌　出第一卷中

又療癱瘓風方

生地黃汁　淡竹瀝　荊瀝各一升　防風四分

獨活八分　附子一枚中形者炮

右六味切三味以和地黃等汁煑取半升去滓空腹分再服取瘥隔日一劑若虛三日一劑服可絕根大神驗忌豬肉蕪荑　備急同出第八卷中

元侍郎希聲集療癱瘓風神驗方

側子一兩炮去皮　五加皮四兩　磁石一斤碎綿裹　甘菊花一斤　漢防己

羚羊角屑　杏人去皮尖各一兩　乳遠志一方作　芍藥　麻黃去節各二兩

薏苡人一升　防風　芎藭　秦艽　甘草炙各一兩

右十五味切以水一斗二升煮麻黃去上沫內諸藥煎取三升分溫三服相去十里久將息取汗訖傳粉勿當風慎熱麪及豬魚蒜酒　出第一卷中

風痱方三首

病源風痱之狀身體無痛四肢不收神智不亂一臂不隨者風痱也時能言者可治不能言者不可治也　出第一卷中

千金療風痱方風痱者卒不能語口噤手足不隨而不彊

直是也方
伏龍肝末五升　冷水八升和攪取其汁飲之能盡佳[illegible]
同兼主中惡出第八卷中
古今錄驗西州續命湯療中風痱身體不自收口不能語冒昧不識人不知痛處但拘急中外皆痛不得轉側悉主之方
麻黃六兩去節　石膏四兩碎綿裹　桂心　當歸
甘草炙各一兩　芎藭　乾薑　黃芩各一兩
杏人四十枚去皮尖兩人
右九味切以水一斗九升先煮麻黃再沸去沫後下

諸藥煮取四升初服一升猶能自覺者勿熟眠也可卧厚覆小小汗出已漸漸減衣勿復大覆不可復服矣前服不汗者更服一升汗出即愈汗後稍稍五合一服飲食如常唯忌生葱海藻菘菜深師胡洽集驗文仲肘後千金同
又續命湯治中風痱身體不能自收口不能言冒昧不知人不知痛處或拘急不得轉側姚云與大續命同兼療產婦大去血者及老人小兒方
甘草炙　桂心　當歸　人參
石膏碎綿裹　乾薑各二兩　麻黃三兩去節　芎藭一兩
杏人四十枚去皮尖兩人

右九味㕮咀以水一斗煮取四升服一升當小汗薄覆脊憑几坐汗出則愈不更服無所禁勿當風并療但伏不得卧欬逆上氣面目洪腫忌海藻菘菜生葱范汪方主病及用水升數煑取多少並同汪云是仲景方本欠兩味出第八卷中
偏風方九首
病源偏風者風邪偏客於身一邊也人體有偏虛者風邪乘虛而傷之故為偏風也其狀或不知痛癢或緩縱或痺痛是也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云一手長舒合掌一手捉顙挽之向外一時極

勢二七左右亦然手不動兩向側勢急挽之二七去頭骨急強頭風腦旋喉痺膊內冷注偏風又云一足蹹地一手向後長舒努之一手捉湧泉急挽足努手挽一時極勢左右換易二七去上下偏風陰氣不和出第一卷中
廣濟療偏風麻子湯方
大麻子一升淨擇水漬一宿　麻黃去節　防風
生薑　橘皮　荊芥　芎藭各三兩
桂心二兩　石膏五兩碎綿裹　竹葉洗　葱白切各一升
豉心一合　蜀椒三十枚汗去目　杜仲五兩　獨活四兩
右十五味切以水二斗煮麻子令牙出去滓取一斗先

煑麻黄三沸去沫內諸藥煎取三升去滓空腹頓服之
令盡覆取汗以粉粉身勿衝風此藥補必不虛人亦不
利有患風痹及大風者不過三四劑忌生葱生菜熱麪
蕎麥猪魚笋一切陳臭物

又療偏風不隨服補麻子湯後次服枳實丸方

枳實炙　防風　羌活　人參
羚羊角屑各六分　甘菊花　乾薑　薏苡人
桂心各四分　茯苓　升麻　黄連
乾地黄八分

右十三味擣下篩蜜和爲丸以酒空腹服如梧子二十
丸加至三十丸日再忌生葱酢物猪肉冷水蕪荑生菜
熱麪蕎麥雞魚蒜笋陳臭物並出第一卷中

千金甘草湯療偏風積年不差手脚枯細口面喎僻精神
不足言語倒錯方

甘草炙　桂心　芎藭　麻黄去節
人參　當歸　芍藥各一兩　獨活三兩
秦艽半兩　茯神　生薑各四兩　防風一兩半
附子炮　側子各二枚炮　白术　黄芩
細辛各一兩　甘菊花一升　淡竹瀝四升

右十九味切以水一斗煮麻黄去沫取汁七升內諸藥
并瀝和煮取三升分爲四服前三服訖間一盃粥更後
服待藥勢自汗忌海藻菘菜桃李雀肉猪肉冷水生葱
大酢物等

又方

青松葉一斤擣令汁出淸酒一斗漬二宿近火一宿
初服半升漸至一升頭面汗即止並出第八卷中

備急徐王療偏風半身不遂兼失音不語方

取杏人生吞不去皮尖日別從一七漸加至七七周
而復始食後即以竹瀝下之任意多少日料一升取
盡文仲同出第二卷中

延年療偏風半身不遂冷痺疰等方

桃人一千七百枚去兩人尖皮以好酒一斗三升並
大升斗浸經二十一日出桃人暴乾擣令極細堪作
丸即止日別再服服別三十丸還將浸桃人酒服之
禁食猪肉蒜耳餘並不禁

又小續命湯主偏風半身不遂口眼喎不能言語拘急不
得轉側方

麻黄去節　防己　附子炮去皮　芎藭
桂心　黄芩　芍藥　人參
甘草炙各一兩　杏人四十枚去皮尖兩人　生薑切四兩

防風一兩

右十二味切以水八升煮取二升六合分為三服服五日更服頻進十劑病不食乃至二十劑忌海藻菘菜生葱豬肉冷水 並出第十二卷中

又急療偏風膈上風熱經心藏恍惚神情天陰心中惛憒如醉不醉方

淡竹瀝三升若熱多用竹瀝冷多用荊瀝　羚羊角二分屑

石膏十分碎綿裹　茯神六分切

右四味以水一斗合竹瀝煮取一升五合去滓食後欲消分為二服常能服之永不畏風發忌酢物 經心錄文仲同

又方

生附子一兩　無灰酒一升

右二味㕮咀附子內酒中經一七日隔日飲之一小合有病出無所往特忌豬肉生冷醋滑 並出第一卷中

風猥退方三首

病源風猥退者四肢不收身體疼痛肌肉虛滿骨節懈怠腰脚緩弱不自覺知是也皮肉薄弱不勝四時之虛風故令風邪侵於分肉之間流於血脈之內使之然也經久不差則變成風水之病 出第一卷中

千金療猥退半身不隨失音不語方

杏人三升去兩人者及尖皮洗入臼擣二升令碎研如寒食粥法取汁八升煎取四升口嘗看香滑即熟反此為不熟唯嫌為佳停極冷然後內好麴一升炊時以前所留一升杏人肉取四升擣下水一斗六升煎取八升第一遍酘也次一然復取杏人三升研取一斗二升汁煎取六升第二酘也次一 六斗第二酘 取杏人汁多少為第三酘也疑米不足別更取二升杏人研取八升煎取四升重掛酘米若猶不足研杏人二升取八升汁煎取四升更酘之以熟為限一石米杏人三斗所以節次研杏人者恐併煎汁酢

故也若冬月任意併煎準計三斗杏人取一石六斗煎取八斗四升漬麴以外分之酘饋酒熟封四七日開澄取清然後押糟糟可乾末和酒服之大驗 士弱氏曰 酘音豆酘酒也饋音分一蒸飯也

又方

蓖麻子脂一升　酒一升

右二味銅鉢盛著酒中一日煮之令熟服之 並出第八卷中

千金翼療猥退風方

蒼耳子五升苗亦得　羊桃二升切　蒴藋切

赤小豆二升　鹽二升

右五味以水兩石五斗煮取五斗適寒溫內所患之腳漬搽至趺骨勿過之一度餘二斗米項出之慎風冷汗從頭出　出第八卷中

風痺曳及攣躄方二首

病源風痺曳者肢體弛緩不收攝也人以胃氣養於肌肉經脈也胃若衰損其氣不實氣不實則經脈虛經脈虛則筋肉懈惰故風邪搏於筋而使痺曳也　出第一卷中

范汪療中風躄不能起迷水消食平胃下氣方

百部四分　烏頭炮　牛膝　白朮各一分

右四味搗下篩以酒服方寸匕日三稍增可至三匕良

忌豬肉冷水桃李　出第二十卷中

古今錄驗療風懿不能言四肢不收手足嚲攣獨活湯方

獨活四兩　生薑六兩　甘草炙　桂心

生葛根　芍藥　栝樓各二兩

右七味㕮咀以水五升煮取三升服一升日三忌海藻菘菜生葱　出第四卷中

柔風方二首

病源血氣俱虛風邪並入在於陽則皮膚緩在於陰則腹裏急柔風之狀皮外緩腹裏急四肢不能自收裏急不得俛息者柔風候也　出第一卷中

又療柔風體疼自汗出石膏散方

石膏二兩研　甘草一兩炙

右二味搗篩爲散以酒服方寸匕可以七服武家黃素方　出第九卷中

古今錄驗療中柔風身體疼痛四肢緩弱欲不隨獨活葛根湯產後中柔風亦用此方

羌活　桂心　乾地黃　葛根

芍藥各三兩　生薑六兩　麻黃去節　甘草各二兩炙

右八味切以清酒三升水五升煮取三升溫服五合日三忌生葱蕪荑海藻菘菜　范汪同出第八卷中

許仁則療諸風方七首

許仁則療諸風病方此病多途有失音不得語精神如醉人手足俱不得運用者有能言語手足不廢精神恍惚不能對人者有不能言語手足廢精神昏亂者有言語手足精神俱不異平常而發作有時每發即狂言浪語高聲大叫得定之後都不自醒者有諸事不異尋常發作有時每發即狂走叫喚者有時每發即作牛羊禽獸聲醒後不自覺者有諸事不異尋常發作有時發即頭旋目眩頭痛眼花心悶輒吐經久方定者有諸事不異平常發作有時每發即熱頭痛流汗不能自勝舉若此等諸風形候雖別尋

其源也俱失於養生本氣既羸偏有所損或以男女或以
飲食或以思慮或以勞役既極於事能無敗乎當量已所
歸而撙節之靜思息事兼助以藥物亦有可復之理凡有
因飲酒過節不能言語手足不隨精神昏恍得病經一兩
日宜合生葛根等三味湯服之方

生葛根一挺長一尺徑三寸 生薑汁一合 竹瀝二大升如不可得宜以竹根一大升切以水一大斗煮取二大升以代竹瀝如根不可得以竹葉一大升以水一大斗煮取二大升以代竹瀝如無竹葉宜細切竹茹二大升以水一大斗煎取二大升代之

右藥先取生葛根淨洗刷使極碎且空搾取汁令盡
訖又擣節以竹瀝溲灑極搾取汁汁盡又擣溲灑不限

遍數以葛根汁盡爲度用生薑汁綿濾之細細緩服
之不限遍數及食前食後如覺腹內轉作聲又似痢即
以食後溫服之如此經七日與後服附子等十味湯

又附子湯方

附子二枚共重一兩半者炮 生薑 乾薑各二兩
桂心一兩 石膏六兩碎綿裹 生犀角屑 地骨白皮
白朮 獨活 芎藭各二兩

右藥切以水八升煮取二升半去滓分溫三服服相去
如人行十里久服服湯後如覺欲汗少覆之令汗出須
臾歇汗後以藥末粉身其湯須服五六劑間三四日服
一劑其方一劑後量患進退臨時加減藥物熱多加生
麥門冬一兩去心冷多加桂心一兩有痛加當歸二兩
不能食加人參二兩大便澁加檳榔七枚合皮子用之
忌豬肉生葱桃李雀肉等

又療風熱未退服湯日數未滿病後未堪服丸宜合薏苡
人等十二味飲服之方

薏苡人一升 葛根五兩 生麥門冬二兩去心
石膏八兩碎綿裹 杏人六兩去尖皮兩人者 烏梅四十枚擘
生薑八兩 生犀角屑 地骨皮各三兩 人參二兩
竹瀝一升 白蜜二合

右藥切以水一斗煮十味取三升去滓內竹瀝白蜜攪
調細細飲之不限冷煖及食前後若熱多即食前冷飲
冷多即食後煖飲如服丸藥以飲送彌佳

又療風熱未退頻服湯飲力不能攻宜合苦參十二味丸
服之方

苦參 乾薑 芎藭各六兩 玄參
丹參 人參 沙參 白朮各五兩
地骨白皮 獨活各四兩 薏苡人二升 蜀升麻二兩

右藥擣篩蜜和爲丸用薏苡人飲下之初服十五丸日
再服稍稍加至三十丸如梧子大若覺冷即去玄參沙

參加桂心四兩細辛三兩若發熱則加十兩生地黃若覺有痛處去沙參加當歸六兩若覺有氣去玄參加橘皮四兩若大便澀加大檳榔人二十枚忌桃李生葱生菜蕪荑

又至九月以後二月以前宜合五加皮等八味藥酒細細用下前丸飲之方

五加皮　薏苡人　大麻人熬各五升　丹參五兩

生薑　生地黃各四斤　桂心五兩　大豆熬一斗

右藥切以絹袋盛用無灰清酒六斗浸六七日細細服下前丸初服一二合再服稍稍加至五六合能至一升亦佳忌生葱蕪荑

又須防熱病急黃賊風乾葛散方

乾葛　乾地黃各二斤　新香豉心一升

右三味暴令乾擣篩為散每食後服一方寸匕日再以稍稍加至三匕牛乳蜜湯竹瀝粥飲梅漿任意下之

又依前乾葛等三味散服之雖覺熱氣少退熱未能頓除宜合黃連等八味散服之方

黃連　黃芩　乾薑　蜀升麻

知母　乾地黃各一斤　梔子人　大青各半斤

右藥擣篩為散每食後飲服一方寸匕日再服稍加至二七若能食飲適寒溫男女節勞逸候體氣服前方乃至終身無結病急黃暴風之慮忌豬肉冷水蕪荑出第同註

出上卷中

張文仲療諸風方九首

尤侍郎希聲集張文仲方九首奉勑語張文仲等諸患風氣醫人處方多不同可共諸名醫修一本進來仍令鳳閣監王方慶專勾當臣文仲言臣准勑與諸名醫集諸方為一卷風有一百二十種氣有八十種風則大體共同其中有人性各異或冷熱庸醫不識藥之行使或冬藥夏用或秋藥冬用多殺人唯腳氣頭風大風上氣此四色常須服藥不絕自餘諸患看發即依方案藥夫患者但春夏三四月秋八九月取利一行甚妙臣所進此方不問四時皆得服輕者服小方重者服大方藥味雖同行使殊別謹上如後

桑枝煎療偏風及一切風方

桑枝剉一大升不用全新嫩枝

右一味以水一大斗煎取二大升夏月井中沈恐酢壞每日服一盞空腹服盡又煎服若預防風能服一大升終身不患偏風無忌

又療風飲子方

羌活三兩　桂心二兩　人參一兩　蜀升麻

茯神　防風　生薑合皮切　生犀角屑各二兩
右八味切以水一大升煮取二大合分溫三服如然下
竹瀝一盞一無禁忌唯忌生葱酢
又方仲云四時俱服神方十九味丸
防風　羌活　五加皮　芍藥
人參　丹參　薏苡人　玄參
麥門冬去心　乾地黃　大黃　青木香各六分
松子人　磁石各八分研　檳榔子十二分　枳實炙八分
牛膝八分　茯神八分　桂心八分
右十九味擣篩蜜和爲丸如梧子以酒服十五丸日再

服稍稍加至三十丸爲度忌猪肉魚蒜生葱酢蕪荑
又療一切風及偏風發四肢口目喎戾言語蹇澀其患不
虛人勝於續命湯故錄傳之特宜老人用之方
生地黃汁　竹瀝　荊瀝上三味汁各取一升五合
羌活　防風各二兩　附子大者一枚生用去皮八九破重一兩
者有神
右六味切內前三瀝汁中寬火煎取一升五合去滓溫
分二服服別相去八九里風甚頻服五六劑驗不可論
特宜老小等無問冬夏並同服之無忌隔三日服一劑
並忌猪肉蕪荑

又名散方
茯神六兩　防風　牛膝　枳實炙
防己　秦艽　玄參　芍藥
黃耆　白鮮皮　澤瀉　獨活各四兩
桂心三兩　五味子一升碎　人參四兩　薏苡人一升碎
麥門冬一兩去心　羚羊角二兩屑　石膏一斤碎綿裹　甘草三兩炙
磁石二十四兩綿裹
右二十一味切如麻豆分作二十四貼每日取一貼着
杏人十四枚去尖皮兩人者碎以水三升煮取一升去
滓空腹頓服每春中夏初服禁生冷忌醋生葱海藻生

菜
又療一切風乃至十年二十年不差者方
牛蒡根細切一升　生地黃細切　牛膝細切　枸杞子微碎各三升
右四味取無灰酒三升漬藥以疎絹袋盛之春夏一七
日秋冬二七日每服皆須空腹仍須稍稍令有酒色
又寒水石煮散方
寒水石　石膏　滑石　白石脂
龍骨各八兩　桂心　甘草炙　牡蠣各三兩熬
赤石脂　乾薑　大黃各四兩　犀角一兩屑
右十二味擣以馬尾羅篩之將皮囊盛之急繫頭掛著

爲宗處欲服以水一升煮五六沸內方寸一匕麥煮五六

八沸下火澄清瀉出頓服服之得汗佳亦得汗無所忌

小兒服之即以意斟酌多少忌生熱冷臊蕪荑

又五粒松酒方冬十月以去服

五粒松葉大片七斤去　麻黃七兩去節　防風

黃耆　獨活　秦艽各二兩　牛膝四兩

生地黃二斤　芎藭二兩

右九味切以絹袋清酒四大斗漬春七日冬二十日夏

五日日別二三度服服別大合四合以來忌如藥法

又藏酒法

糯米一升　麴一升　防風半斤切　蒼耳三升

右四味以水八升煎取六升米麴一時拌於瓮中盛

還着一周時即熟若須重醞任情覺冷加五味三一升

並出上卷中

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟

校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十四卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十五卷目錄 風狂及諸風下二十四門

風狂方九首

風驚恐失志喜忘及妄言方六首

風邪方八首

五邪方五首

風驚悸方九首

風驚恐方三首

風癲方七首

五癲方二首

癇方三首

風癇及驚癇方五首

風毒方五首

風多汗及虛汗方五首

風熱方六首

頭風及頭痛方一十首

頭風眩方九首

頭風旋方七首

癮癬風疹方一十三首

風搔身體癮疹方五首

風熱頭面疹痒方四首

風搔癮瘮生瘡方六首
身體如蟲行方四首
癧瘍風方一十五首
白癜風方九首
白駮方七首

唐王燾先生外臺秘要方卷十五

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

風狂方九首

病源風狂者由風邪入并於陽所為也風邪入血使人陰陽二氣虛實不調若一實一虛則令血氣相并氣并於陽則為狂發或欲走欲自高賢稱神聖是也又肝藏魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄不精明不敢正當人而攣筋兩脇骨不舉毛瘁色夭死於秋皆由血氣虛受風邪致令陰陽氣相并所致故名風狂

千金方療狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火方

苦參為末以蜜丸如梧子大每服十丸薄荷湯下

又方療癲狂不識人

人屎燒灰酒調服之

又方療風狂百病

麻仁四升水八升猛火煮令牙生去滓煎取七升旦空心服或發或不發或多言語勿怪之但令人摩手足須定凢進三服

千金翼療癲狂不識人

伏龍肝爲末水調方寸匕日進三服

肘後方療風狂喪心

取葶藶一升擣三千杵取白犬倒懸之以杖杖血出盛取以和葶藶末丸如麻子大一丸三服取差

又方

莨菪子二升酒五升漬之出曝乾再漬盡酒止擣服一錢匕日三勿多服益狂

又方

防葵爲末酒服一刀圭至二三身潤又小不仁爲候

又方

自縊死者縄繞三指撮服之

又主狂言恍惚方

灸天樞百壯 並出第十四卷中 銅人經天樞俠臍二寸

風驚恐失志喜忘及妄言方六首

深師人參湯療忽忽善忘小便赤黃喜夢見死人或夢居水中驚恐惕惕如怖目視䀮䀮不欲聞人聲飲食不得味神情恍惚不安定志養魂方

人參 甘草炙各二兩 半夏洗一兩 龍骨六兩

遠志八兩 麥門冬去心一升 乾地黃四兩

大棗擘五十枚 小麥一升 阿膠炙三兩 膠飴八兩

石膏綿裹四兩碎

右十二味切以水三斗煮小麥令熟去麥內藥煮取七升去滓內膠飴令烊一服一升日三夜一安臥當小汗彌佳忌海藻菘菜羊肉餳

又龍骨湯療宿驚失志忽忽喜忘悲傷不樂陽氣不起方

龍骨 茯苓 桂心 遠志去心各二兩

麥門冬去心二兩 牡蠣熬 甘草炙各三兩 生薑四兩

右八味㕮咀以水七升煮取二升分爲二服忌海藻菘菜酢生葱

又鎮精散療驚恐妄言或見邪魅恍惚不自覺發作有時

或如中風方

鐵精 茯苓 芎藭 桂心

蝟皮炙各三兩

右五味擣下篩以酒服錢五匕日三不知稍增至一錢以上知之爲度忌酢物生葱等並出第九卷中

古今錄驗道士陳明進茯神丸一名定志小丸主心氣不定五藏不足甚者憂愁悲傷不樂忽忽喜忘朝差暮劇暮差朝發發則狂眩加茯神爲茯神丸不加茯神爲定志凡二分合少可兩度合方

菖蒲 遠志去心 茯苓各二分 人參三兩

右四味擣下篩服方寸匕後食日三蜜和丸如梧桐子
服六七丸日五亦得一方加茯神一兩半牛黃五銖爲
六味茯苓遠志菖蒲各一兩忌酢物羊肉餳千金同
又定志紫葳丸療五驚喜怒不安方
紫葳六分　遠志十五分去心　白龍骨七分　牛黃一兩
甘草十分炙　虎頭皮十二分炙令焦　人參八分
桂心　白朮各八分　防風七分　麥門冬去心熬
雷丸各五分　紫胡六分
右十二味各別擣下篩蜜和丸如梧桐子大先食服十
丸日二甚良忌海藻菘菜桃李生葱並出第五卷中

千金療驚勞失志方
茯神五兩　甘草炙　桂心各一兩　龍骨
麥門冬去心　防風　牡蠣熬　遠志去心各二兩
棗二十枚擘
右九味切以水八升煮取二升分爲二服日再服忌海
藻菘菜生葱酢物出第十四卷中一云主驚悸心神煩亂或是或非言語無度茯神湯

風邪方八首

病源風邪者謂風氣傷於人也人以身內血氣爲正外風
氣爲邪若其居處失宜飲食不節致府藏內損血氣外虛
則爲風邪所傷故病有五邪一日中風二日傷暑三日飲
食勞倦四日中寒五日中濕其爲病不同風邪者發則不
自覺知狂惑妄言悲喜無度是也出第二卷中
廣濟療風邪狂亂失心安神定志方
金銀薄各一百和合　石膏研　龍齒研
鐵精研　地骨白皮　茯神　黃芩
生乾地黃　升麻　茯苓　玄參
人參各八分　虎睛一具微炙　牛黃　生薑屑各四分
麥門冬十分去心　枳實炙　甘草炙　葳蕤
防葵各六分　遠志去心　栢子人　白鮮皮各五分
右二十四味擣篩以蜜和爲丸食訖少時煮生枸杞根

汁服如梧桐子二十丸日二服漸加至三十丸不利忌
熱麪海藻菘菜莧菜炙肉醋蒜粘食陳臭油膩出第一卷中
小品鎮心丸療老小心氣不足虛弱者小語勞則劇風
邪百病並主之方
銀屑一分研　牛黃九銖　丹砂研　甘草炙
麥門冬去心　遠志去心各五分　防葵　人參
防風　細辛　茯神　椒汗
附子炮　紫石英研各四分　桂心　乾薑各六分
菖蒲　紫菀各二分
右十八味擣下篩以白蜜和丸如梧子大先食服三丸

日三不知稍稍增之忌海藻菘菜生果雜肉生葱生食
酸物餳等丹砂一作丹參
又五石鎮心丸療男女風虛心氣不足風邪入藏夢寤驚
恐心悸諸病悉主之方
紫石英研　白朮各一兩　茯苓　海蛤
菖蒲　白石英　杏人去皮尖兩人熬　硫黃研
遠志去心　細辛　牛黃　鐵精研
慈石　阿膠炙各四分　麥門冬去心　蓯蓉
鍾乳研　銀屑研　大豆卷　當歸
乾薑分各　大棗五十枚　人參　防風

薯蕷　甘草炙各七分　澤瀉六分　白斂
前胡各分　石膏研　乾地黃　芍藥
桔梗　栢子人　桂心　烏頭炮各一分
秦艽六分　半夏洗八分　大黃五分三斗米下蒸
黃耆六分
右四十味擣下篩蜜和為丸如梧子大一服十丸
不知增之忌海藻菘菜豬羊肉餳生葱桃李雀肉蕪荑
醋物　深師同出第十卷中
肘後麻子湯療風邪感結衆殃恍惚不安氣欲絕水漿不
入口方

麻子熬五合　橘皮　芍藥　生薑
桂心　甘草炙各三兩　半夏洗五兩　人參一兩
當歸二兩
右九味切以水九升煮取三升分為三服忌海藻菘菜
羊肉餳生葱等物　古今錄驗同出第三卷中
千金翼續命湯療大風風邪入心心痛達背背痛達心前
後心痛去來上下或少腹脹滿微痛一寒一熱心中煩悶
進退無常面或青或黃皆是房內太過虛損勞傷交通會
後汗出汗出未除或因把扇或出當風因而成勞五藏大
傷風因外入下有水因變成邪雖病如此然於飲食無退

坐起無異至卒不知是五內受風故也名曰行尸宜服續
命方
麻黃去節六分　大棗擘十枚　桂心　防風
細辛　芎藭　甘草炙　芍藥
人參　秦艽　獨活　黃芩
防己各一兩　附子炮　白朮各三分　乾薑五分
右十六味切以水一斗三升先煮麻黃令一沸下之去
沫內諸藥煮取五升去滓內漿煎取三升分為三服老
小人度服五合強人可取微汗忌生葱海藻菘菜生菜
豬肉冷水桃李雀肉等物

又鎮心丸療胃氣厥實風邪入藏喜怒愁憂心意不定恍
惚喜忘夜不得寐諸邪氣病悉主之方
秦艽一兩　栢實　當歸　乾漆熬
白歛　杏人去皮尖熬　芎藭各三分　澤瀉一兩
乾地黄六分　防風　人參各四兩　甘草一兩
白朮　薯蕷　茯苓　乾薑各二分
麥門冬二兩去心　前胡四分
右十八味擣下篩以蜜和爲丸如梧子大先食飲服十
丸日三不知稍增之忌桃李雀肉海藻菘菜蕪荑酢物
並出第十六卷中

崔氏療風邪虛悸恍惚悲傷或夢寐不安鎮心湯方
茯神　半夏洗　生薑各四兩　羚羊角屑
當歸　人參　防風　芎藭
杏人去皮尖　桔梗各二兩　龍齒碎綿裹　石膏各三兩碎綿裹
防巳　桂心各一兩半　竹瀝一升
右十五味切以水一斗煮减半内竹瀝煎取二升八合
去滓分溫三服相去如人行十里久忌酢物羊肉豬肉
餳生葱等物
又別離散療男子女人風邪男夢見女女夢見男交歡日
久成勞愁悲憂恚怒喜無常日漸羸瘦連年歲月深久難
療或半月或數月日復發者方
楊上寄生三兩炙　菖蒲　細辛
附子炮　乾薑　薊根一斤　天雄炮
桂心各一兩　白朮一兩　茵芋二兩炙
右十味合擣下篩以酒服半方寸匕日三不飲酒用童
子小便調服合藥勿令婦人雞犬見之勿令病人見合
藥見者令邪氣不去禁之爲驗忌生葱生菜豬羊肉桃
李雀肉餳等物千金同並出第七卷中
五邪方五首
深師五邪丸療心驚恐夢寤愁憂煩躁不樂心神錯亂邪

氣經入五藏往來煩悶悲哀啼泣常如苦怖吸吸短氣當
發之時恍惚喜臥心中踊躍忽然欲怒顛倒手足冷清氣
乏鬼邪氣所中涉於藏腑食即嘔逆除氣定心神方
芎藭　龍角無角用齒　茯苓　紫石英研
防風　厚朴炙　鐵精研　甘草炙各四分
遠志六分去心　丹參　大黄　梔子人
桂心　細辛　菖蒲　椒汗去目
人參　乾薑　附子炮　吳茱萸各五分
芥子三分　禹餘粮七分研
右二十二味擣下篩和以蜜丸如梧子大未食服二十

九夜服十九裹湯下不知稍加之忌海藻菘菜生葱生菜
猪羊肉餳等物

又五邪湯療風邪恍惚悲啼泣狂走如有神之狀身體強直或疼痛口噤候痺水漿不通面目變色甚者不識人方

菖蒲　秦艽　桂心　當歸
禹餘粮　人參　附子炮　黄芩
甘草炙　遠志去心　防風各一兩　龍骨
赤石脂　茯苓　芍藥　芎藭
防己各二兩

右十七味擣下篩作麁散調和取水二升一方取東流水煮小沸內散二兩煮取一升五合未食服下令日再夜一分作十二裹通裹令容勿令泄氣忌羊肉餳海藻菘菜酢物並出第八卷中

又五邪湯療五邪氣入人體中鬼語諸妄有所語悶亂恍惚不足意志不定發作來往有時方

人參　白朮　茯苓　菖蒲
茯神各三兩

右五味切以水一斗煮取三升先食服八合日三忌桃李雀肉羊肉餳酢物並出第四十二卷中

今經驗五邪湯主邪氣啼泣或歌或哭方

禹餘粮研　防風　桂心　芍藥
遠志去心　獨活　甘草炙　人參
石膏碎綿裹　牡蠣熬　秦艽各一兩　白朮
防己　菖蒲　雄黄研　茯神
蛇蛻皮炙各一兩

右十七味擣篩以水一升半內三方寸匕煮二沸去滓頓服之日再服忌生葱生菜菘菜桃李雀肉餳酢等　深師用黄丹不用雄黄餘同

又茯神湯主五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸動搖恍惚不定方

茯神二兩　人參　茯苓各三兩　赤小豆四十枚
菖蒲三兩

右五味以水一斗煮取二升半分為三服忌酢羊肉餳　深師千金翼同並出第四卷中

風驚悸方九首

病源風驚悸者由體虛心氣不足心之經為風邪所乘也或恐懼憂迫令心氣虛亦受風邪風邪搏於心則驚不自安驚不已則悸動不定其狀目睛不轉而不能呼診其脉動而弱者驚悸也動則為驚弱則為悸出第一卷中

廣濟療熱風驚悸安心久服長年鎮心丸方

茯神　人參　龍齒研　升麻
石膏研　黄芩　茯苓　麥門冬八分去心
銀薄二百番研　虎睛一具炙　枳實炙　白斂
玄參　芍藥　葳蕤　甘草炙各六分
生薑二分
右十七味擣篩蜜和丸每食訖少時以飲服如梧子大十五丸日二服漸漸加至三十丸不利忌海藻菘菜醋蒜麪粘食陳臭等物 出第一卷中
深師大定心丸療恍惚驚悸心神不安或風邪因虛加發語言喜忘胸脅滿不得飲食方

人參　桂心各三兩　白朮　防己
茯苓　乾薑　防風　大黄
茯神　桔梗　白斂各一兩　牛膝十銖
遠志二兩去心　銀屑六銖
右十四味擣合下篩以蜜丸如梧子大先食服五丸日三不知稍稍增之一方無牛膝而有茱萸一兩銀屑十銖餘悉同忌生葱酢物豬肉桃李雀肉等
又補心湯療心氣不足其病苦滿汗出心風煩悶善恐獨苦多夢不自覺者咽喉痛時時吐血舌本強水漿不通手掌熱心驚悸吐下血方
麥門冬二兩去心　紫石英五分　紫菀二兩　桂心[illegible]
茯苓四兩　小豆二十四枚　人參一兩
大棗二十枚擘　甘草五寸炙
右九味切以水八升煮取二升四合強人分作二服羸人再服心王之時有血證可服耳一方說用茱萸數不蒜同法之在下煮取多少服亦同忌海藻菘菜生葱酢物 並出第十卷中
千金療心風寒驚心悸語聲寬急混濁口喎冒昧好自笑厲風傷心荊瀝湯方
荊瀝三升　麻黄去節　白朮　芎藭各四兩

防風　桂心　升麻　茯苓
遠志去心　人參　羌活　當歸各二兩
防己　甘草二兩炙　母薑切一升取汁
右十五味切以水一斗先煮麻黄兩沸去沫次下諸藥煮取三升絞去滓下荊瀝薑汁煎取四升分為四服日三夜一忌海藻菘菜酢生葱桃李雀肉等物
又大鎮心丸療心虛驚悸夢寤恐畏方
紫石英　茯苓　防風　人參
甘草炙　澤瀉各八分　秦艽　黄耆
白朮　薯蕷　白斂各六分　麥門冬

當歸各五分　桂心　遠志去心　柏子人
石膏　桔梗　大黃　大豆卷各四分熬
椒目汗去　芍藥　乾薑　細辛各三分
右二十四味酒服如梧子大十五丸日再一方用[illegible]
丸忌海藻菘菜生葱猪肉生菜桃李雀肉等
又小鎮心散療心氣不足虛悸恐畏悲思恍惚心神不定
愓愓驚方
人參　遠志去心　赤小豆　附子炮
桂心　細辛　乾薑　防風
龍齒炙　菖蒲　乾地黃各二　茯苓

白朮　黃耆各四兩
右十四味擣篩爲散以酒服兩方寸匕日三忌羊肉餳
桃李雀肉生葱生菜猪肉出第十四卷中
崔氏療熱風驚掣心悸恐悸風邪狂叫妄走者服此湯亦
差宋四類用之極効方
茯神三兩　杏人二兩去皮尖兩人切　升麻
白鮮皮　沙參各二兩　龍齒六兩炙　寒水石一斤碎綿裹
石膏二十兩碎綿裹　生麥門冬四兩去心
右九味切以水一斗二升煎取三升去滓分溫爲三服
相去十里若甚者減水三升內竹瀝三升先用水煮汔

沸然後內竹瀝煮取三升服如上法忌酢物出第六卷中
古今錄驗茯神湯療風經五藏虛驚悸安神定志方
龍骨二兩　乾薑一兩半　細辛一兩半　白朮一兩
茯神三兩　人參　遠志去心　甘草炙
桂心　獨活各二兩　酸棗人一兩　防風二兩
右十二味切以水九升煮取三升分爲三服忌海藻菘
菜桃李雀肉生葱生菜酢物
又大竹瀝湯療大虛風氣入腹拘急心痛煩冤恍惚迷惑
不知人或驚悸時怖吸吸口乾濇濇惡寒時失精明歷節
疼痛或緩或不攝産婦體虛受風惡寒慘慘憒憒悶心欲

絶者并療風痙口噤不開目視如故耳亦聞人語心亦解
人語但口不得開刺者脊強反折百脉掣動悉主之方
秦艽　防風　茯苓　人參各二兩
芎藭　烏頭炮　黃芩　乾薑
當歸　細辛　白朮各一兩　天雄一枚炮
甘草三兩炙　防己二兩
右十四味切以竹瀝一斗水五升煮取四升分服一升
羸人服五合佳此湯令人弱寧少服也芎藭有毒令人
悶亂目花虛人可半兩良風輕者用竹瀝三升水七升
小弱者竹瀝五升水五升風大劇停水用竹瀝一斗忌

酢生菜海藻菘菜桃李雀肉等 並出第一卷中

風驚恐方三首

病源風驚恐者由體虛受風入乘臟腑其狀如人將捕之心虛則驚肝虛則恐足厥陰爲肝之經與膽合足少陽爲膽之經主決斷衆事心肝既虛而受風邪膽氣又弱而爲風所乘故驚恐如人將捕之 出第一卷中

廣濟療心虛熱風上衝頭面心忪急悸悸驚四肢煩疼腰膝冷邪氣發動不定犀角丸方

犀角 屑　防風　人參　升麻

防葵　檳榔人 各五分　青木香　光明砂 研

牛膝 各八分　龍齒 炙　鐵精 各六兩　露蜂房 炙

銀箔 研各三分

右十三味擣篩蜜和爲丸如梧子酒下二十丸至二十五丸日再服不利忌生血物熱麪蕎麥炙肉蒜黏食等 出第一卷中

深師續命湯療大風風邪入心或心痛徹背背痛徹心去來上下驚恐小腹脹滿微痛乍寒乍熱心中悶狀如微溫進退無常面青或白或黃虛勞邪氣入百脈百病皆療之方

人參　甘草 炙　乾薑　麻黃 去節

獨活　當歸　芎藭　石膏 碎綿裹各二兩

附子 一枚炮　桂心　白朮　細辛 各二分

防風 五分　芎藭 二分　秦艽 一兩

杏人 四十枚去兩人尖皮　黃芩 一兩

右十七味以水一斗煮麻黃十餘沸內諸藥煮取四升半去滓內棗十枚煎取三升分五服老小者五合此以下以意消息調和六腑安五藏然不須除獨芎藭防已代之無獨活天雄代之無附子烏頭代之湯成之後服湯以椒十枚置湯中溫令後服之此與十二卷西州續命湯療同但療癲邪大風兩中有十二味者此有大棗

二十枚忌海藻菘菜生葱豬肉桃李生菜雀肉等

又療五藏六腑血氣少亡魂失魄五藏晝夜不安惚惚善悲心中善恐怖如有鬼物此皆發於大驚及當風從高墮落內致療之十黃散方

雄黃 五分熬　人參 五分　蜀椒 汗五分　大黃 四分

朱砂 三分研　乾薑 四分　黃蘗 二分　山茱萸 二分

細辛 二分　黃耆 三分　澤瀉 三分　黃連 一分

蒲黃 一分　桂心 三分　麻黃 一分去節

黃孫 一分壯蒙也方云黃昏　黃環 三分　黃芩 一分

右十八味擣篩爲散未食溫酒服一方寸匕日三稍增

至二七服此散體中筋力強者不須增人參氣力羸虛
可增人參五分合十分忌豬肉冷水生菜生葱生血物
等並出第八卷中崔氏同千金無椒朱砂乾薑

風癲方七首

病源風癲者由血氣虛風邪入於陰經故也人有血氣少
則心虛而精神離散魂魄妄行因為風邪所傷故邪入於
陰則為癲疾又人在胎時其母卒大驚精氣并居令子發
癲其發則仆地吐涎沫無所覺是也原其癲病皆由風邪
故也養生方云夫人見十步直牆勿順牆而臥風利吹人
必發癲癇及體重人臥春夏向東秋冬向西此是常法其

湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法
云還向反望不見七通治欬逆胸中病寒熱癲疾喉不利
咽乾咽塞又云以兩手承轆轤倒懸令腳反在其上元愈
頭眩風癲坐地舒兩腳以繩絆之以大繩絆訖拖轆轤上
來下去以兩手挽繩使腳上頭下不使離地自極十一通
愈頭眩風癲久行身臥空中而不墜落出第二卷中
集驗風癲方凡癲病發則仆地吐涎沫無知若強掠如
狂及遺糞者難療無方出第二卷中千金同

千金療風癲方

莨菪子熬研　鉛丹　栝樓　虎掌各三
烏頭三分炮　白朮二分　鴟頭一枚炙　鐵精
藺茹各一兩　椒汗　大戟炙　甘遂
天雄各二分炮
右十三味末之以蜜和如梧子大服二丸日二忌桃李
雀肉豬肉冷水經心錄同名鴟頭丸

又芎藭湯主風癲引脅牽痛發作則吐耳如蟬鳴方
芎藭　藁本　藺茹各五兩
右三味切以酒一斗煮取三升頓服羸者二服
取大汗深師同

又方

生天門冬十斤　生地黃三十斤
右二味取汁作煎服之忌鯉魚蕪荑
又天門冬酒通治五藏六腑大風洞虛五勞七傷癥結滯
氣冷熱諸風癲癇惡疾耳聾頭風四肢拘攣猥退歷節風
萬病皆主之久服延年輕身齒落更生髮白再黑方
天門冬與百部相似天門冬味甘兩頭方百部細長
而味苦令人利門冬汁一斗漬麴二升令發以米二
斗準家法醞之春夏極冷下飯秋冬溫如人肌酒熟
取清服一盞常令酒相接勿至醉吐慎生冷酢滑雞
豬魚蒜特忌鯉魚亦忌油脂此是一斗汁法餘一石

二百亦準此以為大率服藥十日覺身體大癢二十日更大癢三十日乃漸止此是風氣出去故也四十日即覺心豁然大快似有所得五十日更覺大快當風坐臥覺風不著人身中諸風悉盡用米法先淨簡米暴乾令乾臨欲用時更別取天門冬汁漬米還炊之餘汁拌飯取天門冬汁法淨洗天門冬瀝去水切之擣押取汁三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣但依式服之久停即香美餘酒不及也封四七日佳凡八月九月即少少合至十月合攏到來年五月三十日以來相續服之春三月亦得合入四月不得合服酒時若得散服更得力倍速

散方如左

天門冬去心皮暴乾擣篩以上件酒服方寸匕日三加至三匕久服長生凡酒亦得服之

又療風癲方

茯神　白龍骨研　龍齒研　龍角研

龍膽　蔓菁子　鐵精研　乾薑各十分

人參　遠志去心　黃連　大黃各八分

芎藭　白芷　黃芩　當歸各六分

桂心五分去皮

右十七味末之蜜和丸湯服十五丸如梧子大日二稍稍加之以知為度忌酢物豬肉冷水生葱（並出第十四卷中）

古今錄驗療風癲六生散方

菖蒲　藺茹（一作葶藶）　防風　茵芋

商陸根　蜀附子（炮各二兩）

右六味擣下篩酒服錢五匕日再服不知稍增以知為度忌豬肉冷水羊肉餳牛大肉蒜等

又侯氏黑散療風癲方

菊花四十分　防風　白朮各十分　茯苓

細辛　牡蠣熬　鍾乳研　礬石泥裹燒半日研

人參　乾薑　桂心　芎藭

當歸　礬石（如馬齒者泲令汁盡研各三分）　黃芩五分

右十五味擣合下篩以酒服方寸匕日三忌桃李雀肉胡荽青魚鮓酢物生葱生菜（並出第十卷中張仲景此方更有桔梗八分無鍾乳礬石以溫酒下之禁一切魚肉大蒜常宜冷食六十日止即藥積在腹中不下也熱食即下矣冷食自能助藥力）

五癲方二首

病源五癲者一曰陽癲發時如死人遺尿有頃乃解二曰陰癲坐小時臍瘡未愈數洗浴因此得之三曰風癲發則眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解由熱作汗出當風因

以房室過度醉飲飽滿行事令心意逼迫短氣脉悸得之
四曰濕癲眉頭痛身重坐熱沐頭濕結腦沸未止得之五
曰馬癲發作時反目口噤手足相引身熱坐小時膏氣腦
熱不和得之皆然診其脉心脉微濇為癲疾幷脾脉緊而
疾者癲脉也腎脉急甚為骨癲疾脉洪大而長者癲疾脉
浮大附陰者癲疾脉來牢疾者癲疾三部脉緊急者癲可
療發則仆地吐涎沫無所知若強掠起如狂及遺糞者難
療脉虛則可療實則死脉緊弦實牢者生脉沉細小者死
脉搏大滑久久自已其脉沉小急疾不可療小牢急亦不
可療 出第二卷中

古今錄驗莨菪子散療五癲反側羊鳴目翻吐沫不知痛
處方
豬卵一具陰乾百日 莨菪子三升 牛黃八分研 鯉魚膽五分
桂心十分研
右五味切以清酒一升漬莨菪子暴令乾盡酒止乃擣
合下篩酒服五分七日再當如醉不知稍增以知為度
忌生葱等
又鐵精散療五癲方
鐵精一分研 芎藭 防風各一兩 蛇牀子五合
右四味合擣篩酒服一錢七日三有効 文仲范汪同

又療五癲牛癲則牛鳴馬癲則馬鳴狗癲則狗吠羊癲則
羊鳴雞癲則雞鳴五癲病者腑藏相引盈氣起寒厥不識
人氣爭瘈瘲吐沫久而得蘇雄黃丸方
鉛丹二兩熬 真珠 雄黃研 水銀熬
雌黃各一兩一方無 丹砂半兩研
右六味擣和以蜜又擣三萬杵乃丸先食服胡豆大三
丸日再稍稍亦愈良忌生血物小兒二丸如小豆 千金范汪同云各五兩
並出第六卷中
癎方三首
廣濟療癎疾積年不差得熱即發水銀丸方

水銀熬 麥門冬去心 烏蛇脯炙 鐵精研
乾地黃各八分 龍角研 人參 防風
子芩 升麻各六分 熊膽四分研
右十一味擣篩蜜和丸如梧子食後以生驢乳汁下一
十丸漸漸加至三十丸日再不利忌蕪荑生菜熱麪蕎
麥炙肉蒜粘食 出第一卷中
千金大鎮心丸主諸癎醫所不救方
虎睛一具酒漬一宿炙 防風 秦艽
防葵 龍齒研 黃芩 雄黃
防巳 山茱萸 茯苓 鐵精研

鬼臼　人參　大黃　銀屑研
乾薑　牛黃各研四分　寒水石研六分　羌活
升麻　遠志　白鮮皮　細辛
白薇　貫衆　麝香　鬼箭各三分
茯神　石膏研　天雄各炮二分　蛇蛻皮一尺炙
蜂房二分炙
右三十二味擣篩蜜和酒服十五丸日二服加至三十
丸忌蜡物生菜豬肉冷水 出第十四卷中崔氏云療風癇及風邪有鳴邪三枚炙熟
茯苓餘分同
救急療癇少老增減之方
竹節一握　衣中白魚七頭

右二味以酒一升煎取二合頓服之 出第八卷中
風癇及驚癇方五首
廣濟療風癇卒倒嘔沫無省覺方
麻黃去節　大黃　牡蠣熬　黃芩各四兩
寒水石　白石脂　石膏研　赤石脂
紫石英　滑石各研入兩　人參　桂心各一兩
蛇蛻皮一兩炙　龍齒六兩研　甘草三兩炙
右十五味擣篩爲散八兩一薄以絹袋盛散藥用水一
升五合煮取一薄取七合絞去滓頓服之日一服一方

水二升煮散方寸匕取一升去滓服之少小百日服一
合熱多者日二服三五日一服亦得本方無麻黃龍齒
蛇蛻皮忌海藻菘菜生葱熱麪蕎麥豬肉蒜黏食
又方
吊藤皮　麻黃各二分去節　龍齒六分研　銀一斤綿裹
寒水石　梔子擘　知母　石膏碎綿裹
杏人去皮尖兩人研各十二分　升麻十分　子芩十分
蛇蛻皮七寸炙　蚱蟬去足翅炙四枚　柴胡十分　芍藥
沙參各八分　生葛汁五分　蜜七合
牡牛黃如大豆粒十枚研下之

右十九味切以水六升淡竹瀝二升合煮取二升四合
絞去滓內杏人脂葛汁蜜於微火煎攪不停手令餘二
升三合成三四歲一服二合五六歲一服二合半日再
服稍增兒若大便澁者加大黃十分忌熱麪炙肉魚蒜
粘食油膩冷水 並出第一卷中
深師療大人風及少小驚癇瘈瘲日數十發醫所不能療
除熱方
龍骨　大黃　乾薑各四兩　牡蠣三兩熬
滑石　赤石脂　白石脂　桂心
甘草各三兩炙

右九味擣下篩韋囊盛大人三指撮以甘草水二升煮三沸澄成適寒温大人服一升未滿百日服一合未能飲者綿裹筯頭內湯中著小兒口中以當乳汁熱多者日四服無苦以意消息之忌海藻菘菜生葱 一方無大黄赤石脂 桂心甘草出第九卷中

崔氏療暴得驚癇立驗方 朱因云極効

吊藤皮　茯神　黄芩　升麻

白鮮皮　沙參各二兩　龍齒三兩　石膏八兩

蚱蟬七枚去翅炙研湯成內　寒水石六兩研綿裹

甘竹瀝二升湯成內之

右十一味切以水九升煮取三升温分三服相去六七里久若小孩子患藥各減量取多少細細飲之立差忌醋物

又療大人風引少小驚癇瘈瘲日數十發醫所不能療除熱鎮心紫石湯方

紫石英　滑石　白石脂　石膏

寒水石　赤石脂各八兩　大黄　龍骨

乾薑各四兩　甘草炙　桂心　牡蠣各三兩熬

右十二味擣篩盛以韋囊置於高涼處大人欲服乃取水二升先煮兩沸便內藥方寸匕又煮取一升二合濾去滓頓服之少小未滿百日服一合熱多者日二三服每以意消息之紫石湯一本無紫石英紫石英貴者可除之永嘉二年大人小兒頻行風癇之病得發例不能言或發熱半身掣縮或五六日或七八日死張思惟合此散所療皆愈忌海藻菘菜生葱 此本仲景傷寒論方古今錄驗范汪同 並出第六卷中

風毒方五首

廣濟療風毒發即眼暗疼腳痠中指疼連肘邊牢心裏悶兩脇脹少氣力喘氣急欲絕不能食黄耆丸方

黄耆　黄連各七分　防風　甘草五分炙

五加皮　白鮮皮　枳實各六分炙　升麻

車前子　苦參炙　麥門冬去心　葶藶子熬

巨勝各六分

右十二味擣篩蜜和丸如梧子空腹以酒浸大豆下二十丸漸加至三十丸日二服不知增之忌海藻菘菜豬肉冷水熱麪炙肉蕎麥 並出第一卷中

深師爲藥湯療中毒風腫心腹痛達背迫氣前後如疰痛方

芍藥　細辛　桂心　甘草炙

當歸　吳茱萸　獨活各二兩　乾地黄二兩

生薑一兩　桃人四十枚去皮兩人尖碎

右十味㕮咀以水九升煮取三升分爲四服宜利者加大黃二兩忌海藻菘菜生葱蕪荑生菜（並出第九卷中）

備急虎骨酒療男子女人骨體疼痛風毒流灌藏腑及至骨肉方

虎骨一具炭火炙令黃色刮削去脂血搥碎取盡擣篩得數升絹袋盛清酒六升浸五宿隨多少稍稍飲之日二三盃酒盡更添（文仲同）

又續命湯療毒風其病喉咽塞氣噎或口不能言或身體緩縱不能自勝不知痛處拘急腰背強引頭恍恍惚惚不得臥轉側倶絶欲死此毒風所作方

麻黃二兩去節　石膏碎綿裹　乾薑各一兩　防風一兩

當歸　芎藭　甘草炙　黃芩

桂心各二分　杏人一十枚去兩人尖皮碎

右十味切以水九升煮取三升分服小取汗若口噤不能飲絞口與湯不過二三劑忌海藻菘菜生葱（並出第九卷中）

千金逐風毒石膏湯方

石膏如雞子大三枚碎綿裹　麻黃二兩去節　杏人三十枚去尖皮兩人碎

雞子二枚　甘草一尺許大炙擘

右五味切以水三升破雞子內水中洋令相得內藥者

取一升服之覆取汗汗不出燒石熨令汗出良忌海藻菘菜等物（並出第八卷中）

風多汗及虛汗方五首

深師療風多汗惡風四味防風散方

防風五分　澤瀉　牡蠣熬　桂心各三分

右藥擣下篩爲散先食酒服方寸匕日再忌生葱

又療風汗出少氣方（范汪同）

防風十分　白朮九分　牡蠣熬三分

右三味擣篩爲散以酒服方寸匕日三增至二三匕惡風倍防風少氣倍朮汗出面腫倍牡蠣忌桃李雀肉胡荽大蒜青魚鮓等物（並出第九卷中）

延年療風虛止汗石膏散方

石膏研　甘草炙各四分

右二味合擣下篩爲散先食以漿水服方寸匕日三夜再服忌海藻菘菜等

又療風虛汗出不止方

秦艽　附子炮　石斛　菖蒲

白朮　桂心各三分　麻黃根　防風各五分

右八味擣爲散以酒服方寸匕日三忌羊肉餳豬肉冷水桃李雀肉生葱（並出第五卷中）

劉涓子療大虛汗出欲死若白汗出不止方

麻黄（去節） 附子（炮各一兩） 牡蠣（熬二兩）

右三味擣下篩以一合藥白粉一升合和令調以粉汗上一方粉二升忌豬肉冷水（出第九卷中）

風熱方六首

病源風熱者風熱之氣先從皮毛入於肺也肺為五藏上蓋候身之皮毛若膚腠虛則風熱之氣先傷皮毛乃入肺也其狀令人惡風寒戰目欲脱涕唾出候之三日內及五日內目不精明者是也七八日微有青黄膿涕如彈丸大從口鼻內出為善也若不出則傷肺變欬唾膿血也（出第二卷中）

延年黄連丸主風熱氣發即頭面煩悶不能食兼欠呿眠臥不安方

黄連（十二分） 人參 茯神（各六分） 葳蕤（四分） 豉（一合熬） 生薑（屑三分）

右六味擣篩蜜和為丸如梧子一服十丸食上飲汁下日二服加至十五丸二十丸忌豬肉冷水酢物

又葳蕤飲主風熱項強急痛四肢骨肉煩熱方

葳蕤（三兩） 羚羊角（屑） 人參（各二兩） 葱白（切一升） 豉（一升綿裹）

右五味切以水五升煮取二升去滓內豉煎取一升五合去豉分溫三服如人行八九里取微汗即差忌蒜麪腥魚（文仲處）

又葳蕤丸主虛風熱發即頭熱悶不能食方

葳蕤（六分） 人參 白朮（各五分） 甘草（四分炙）

右四味擣篩蜜和為丸如梧子一服十丸食上飲汁下日三服加至十五二十丸忌桃李雀肉菘菜海藻等物（文仲處並出第十卷中）

千金翼防風丸主腦悶風熱目朝好嚏變方

防風 茯神（各三分） 天門冬（去心三分） 芎藭

白芷 人參（各二分）

右六味擣篩蜜和丸如梧子酒服十丸日二服加至十五丸忌鯉魚鮓物（蔣孝琬處）

又葳蕤丸主熱風衝頭面妨悶方

葳蕤 黄連（各八分） 防風 人參（各六分） 茯神（五分） 豆豉（三合熬）

右六味擣篩蜜和為丸如梧子一服十五丸飲汁下日二服加至二十丸若冷用酒下之忌豬肉冷水酢物蒜熱麪（出第十八卷中）

近効療熱風衝頂熱悶方

訶梨勒大者一枚取　芒消三合　醋一升
右三味擣訶梨勒爲細末并芒消於醋中攪令消摩塗熱處日一二度 張文仲處必効芫洹同

頭風及頭痛方一十首

病源頭面風者是體虚諸陽經脉爲風所乘也諸陽經脉上走於頭面運動勞役陽氣發泄腠理開而受風謂之首風病狀頭面多汗惡風病甚則頭痛又新沐中風則爲首風又新沐未乾不可以臥使頭重身熱反得風則煩悶診其脉寸口陰陽表裏互相乘如風在首久不差則風入腦則變爲頭眩養生云飽食仰臥久成氣病頭風又云飽食沐

髮作頭風又云夏不用露面臥露墮面上令面皮厚喜成癬一云作面風其湯熨鍼石別有正方補養宜導今附於後養生方導引法云一手拓頤向上極勢一手向後長舒急努四方顯手掌一時俱極勢四七左右換手皆然拓頤手兩向共頭欹側轉身二七去臂膊頭風眠睡又云解髮東向坐握固不息一通舉手左右導引手掩兩耳治頭風令髮不白以手復捋五通脉也又云熱食枕手臥久成頭風目澀又云端坐伸腰左右傾頭閉目以鼻內氣除頭風自極七息止又云頭痛以鼻內徐吐出氣三十過休又云欲治頭痛閉氣令鼻極偃臥乃息汗出乃止又云叉兩手頭後極勢振搖一七手掌翻覆安之二七頭欲得向後仰之一時一勢欲得欹斜四角急挽之三七去頭掖膊肘風出第二卷中

千金療頭風方
附子一枚中形 炮裂　鹽附子大
右二味作散沐頭畢以方寸匕摩頂上日三忌猪肉冷水等

又方
服荆瀝不限多少取差

又方

又擣蒴藋根二升酒二升漬服汁

又方
蔓荆子二升酒一斗絹袋盛浸七宿溫服三合日三

又方
臘月烏雞屎一升炒令黃末之絹袋盛酒三升浸溫服之多少任性常令醺酣

又方
七月七日麻勃三升麥子一碩末相和蒸之沸湯一碩五斗三遍淋之煮取一石神麴二十斤漬之令發以黍米兩石五斗釀之熟封三七日服清一升百日

中身澀皮八風五藏骨髓伏風百病悉去
又方
生油二升鹽一升末油煎一宿令消盡塗頭石鹽尤
良
又方
大豆三升炒令無聲先以一斗二升瓶盛九升清酒
乘豆熱即傾著酒中密泥頭七日温服之（並出第十三卷中）
延年療風熱頭痛掣動方
防風　黄芩　升麻　芍藥（各二兩）
龍骨　石膏（碎各四兩）　乾葛（二兩）　竹瀝（一升）

右八味切以水六升和瀝煮取二升六合去滓分温三
服日晚再忌蒜麪猪肉油膩
又療風勞氣吐逆不能食四肢骨節酸疼頭痛頂重方
茯苓（三兩）　枳實（炙）　橘皮　人參
芍藥（各二兩）　生薑（四兩）
右六味切以水五升煮取三升去滓分温三服日晚再
忌麪蒜醋物（並出第十卷中）
風頭眩方九首
病源風頭眩者由血氣虚風邪入於腦而引目系故也五
藏六腑之精氣皆上注於目血氣與脉并上爲系上屬於
腦後出於項中逢身之虚則爲風邪所傷入腦則腦轉而
目系急目系急故成眩也診其脉洪大而長者風眩又得
陽維浮者暫起目眩也風眩久不差則變爲癲其湯熨鍼
石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云以兩
手拘右膝著膺除風眩又云凡人常覺脊背倔強不問時
節縮咽髆內仰面努髆并向上頭左右兩向挼之左右三
七一住待血行氣動定然始更用初緩後急不得先急後
緩若無病人常欲得旦起午時日沒三辰別二七除寒熱
病脊腰頸項痛風痺口內生瘡牙齒風頭眩衆病盡除
又云大寒不覺煖熱久頑冷患耳聾目眩病久行即成法

法身五六不能變也又云低頭不息六通治耳聾目癲眩
咽喉不利又云大前側牢不息六通愈耳聾目眩隨左右
聾伏並兩膝耳著地牢強意多用力至大極愈耳聾目眩
病久行不已耳聞十方亦能倒頭則不眩也（出第一卷中）
千金療風頭眩口喎目痛耳聾大三五七散方
天雄　細辛（各三兩）　山茱萸　乾薑（各五兩）
薯蕷　防風（各七兩）
右六味擣篩爲散清酒服五分匕日再不知稍稍加之
忌猪肉生菜
又療頭風目眩耳聾小三五七散方

天雄炮三兩　山茱萸五兩　署預七兩

右三味擣篩為散以清酒服五分匕日再不知稍增以知為度忌豬肉冷水並出第十二卷中

崔氏療忽頭眩運經久不差四體漸羸食無味好食黃土方

白朮三斤　麴三斤

右二味擣篩酒和併手捻丸如梧子暴乾飲服二十枚日三忌桃李雀肉等

又療風眩𩬊倒無定方

獨活六兩　枳實三兩炙　石膏碎綿裹　蒴藋各四兩

右四味切清酒八升煮取四升頓服之以藥滓熨取汗覺冷又內鐺中溫令熱熱又熨之即差文仲范汪千金同

又療頭痛眼眩心悶陰雨彌甚方

當歸　山茱萸各一兩　防風　柴胡

著蕷各二兩　雞子二枚熟去皮打黃碎

右六味擣下篩用前雞黃和散令調酒服方寸匕日三並出第六卷中

延年署蕷酒主頭風眩不能食補益氣力方

署蕷　白朮　五味子碎　丹參各八兩

防風十兩　山茱萸二升碎　人參二兩　生薑六兩屑

右八味切以絹袋盛酒二斗五升浸五日溫服七合日二稍加忌桃李雀肉等出第十卷中

古今錄驗九江太守獨活散療風眩厥逆身體疼痛百節不隨目眩心亂反側若癲發作無常方

獨活四分　白朮十二分　防風八分　細辛

人參　乾薑各四分　蜀天雄炮　桂心各一分

栝樓六分

右九味擣合細篩用以清酒服半方寸匕日再忌桃李雀肉豬肉冷水生菜生蔥等物

又防風湯療風眩嘔逆水漿不下食輒嘔起即眩倒發作

有時手足厥方

防風　白朮　防己　乾薑

甘草各一兩炙　附子炮　桂心各十兩　蜀椒一百去汗

右八味切以水四升煮取一升半分為三服忌豬肉冷水生蔥海藻菘菜桃李雀肉等出第四卷中

近効白朮附子湯療風虛頭重眩苦極不知食味暖肌補中益精氣又治風濕相搏骨節疼痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣身體微腫者方

白朮三兩　附子二枚炮　甘草二兩炙　桂心四兩

右四味切以水六升煮取三升分為三服日三初服得

微汗即解能食復煩者將服五合以上愈忌海藻菘菜
猪肉生葱桃李雀肉等此本仲景傷寒論方

頭風旋方七首

廣濟療熱風頭旋心悶衝風起即欲倒方

麥門冬去心　山茱萸　茯神　苦參各八分
地骨皮　署預　人參　蔓荊子
沙參　防風　芍藥　枳實
大黃各六分　甘菊花　龍膽各四分

右十五味擣篩蜜丸每食訖少時以蜜水服如梧子大
二十丸日二漸加至三十丸不利忌酢物熱麪炙肉蒜

猪肉魚粘食

又療頭面熱風頭旋眼澀項筋急強心悶腰脚疼痛上熱
下冷健忘方

肉豆蔻十顆去皮　人參　犀角屑　枳實炙各六分
黃連　白术　大黃各八分　甘草炙
苦參　旋復花各四分　檳榔人十顆

右十味擣篩蜜和丸如梧子以酒飲服二十丸漸加至
三十丸日二服無問食前後服之不利忌生菜熱麪蒜
麥酒蒜猪肉海藻菘菜桃李雀肉等

又療心虛感風頭旋心忪痰飲築心悶惛惛惚惚不能言

治其饑吐痰此候極重恭丸飲子吐方

恭丸　常山　人參　羚羊角屑各二兩
甘草生用三兩

右五味切以水六升煮取二升絞去滓分溫二服日再
如人行四五里久進一服取快吐不利忌生菜生葱熱
麪蒜蒼猪肉魚海藻菘菜出第一卷中

療頭風旋悶亂鼻塞及頭旋眼闇皆主之方

華瓜去皮　杏人去皮尖　人石鹽　芎藭
松脂　防風

右六味等分先擣石鹽以下四種爲末別擣萆麻杏人

訓以入前絕紙裹之有病者先灸百會三壯乃剃去
其毛使淨作一餅貼子裁大於灸處全得以帛兩日
三日一易之其瘡於後即爛破膿直出及帛貼之似爛
桐蒂出者良一方用膩粉前七物相和出第三卷中

延年療頭風旋不食食即吐方

前胡三兩　白术　防風　枳實炙
茯神各三兩　生薑四兩

右六味切以水六升煮取二升去滓分溫三服忌桃李
雀肉酢

又療風邪氣未除發即心腹滿急頭旋眼運欲倒方

芎藭　獨活　防風　白朮
杏人去皮尖　枳實二兩炙各　茯神三兩　生薑四兩
羚羊角屑　黃芩各一兩
右十味切以水九升煮取三升分爲三服日三忌桃李
雀肉大酢蒜麵等
又療風痰氣發即頭旋嘔吐不食防風飲方
防風　人參　橘皮各二兩　白朮
茯神各三兩　生薑四兩
右六味切以水六升煮取二升去滓分溫四服中間任
食一日令盡忌大酢桃李雀肉蒜麵等物出第十二卷中

癮疹風疹一十三首俗呼爲風矢者是也
黃帝素問曰風邪客於肌中肌虛真氣致散又被寒搏皮
膚外發腠理淫氣行之則痒也所以癮疹瘙疾皆由於此
有赤疹忽起如蚊蚋啄煩痒重沓壟起搔之逐手起也
與脈經同
深師療十種疹散方
鬼箭　甘草炙　白斂　白朮
礬石熬各一兩　防風二兩
右六味擣篩以菜米粉五合極拭身以粉內纍中搗合
一服五分七日三中間進食不知增之忌海藻菘菜桃
李雀肉等出第十卷中
千金療疹百療不差方
景天一斤一名護火草
右一味擣絞取汁塗上熱炙摸之再三即差
又方
黃連　芒消各五兩
右二味以水六升煮取四升去滓洗之日四五度良忌
豬肉冷水范汪同
又療風癬瘙癮疹方
以酒六升煮大豆二升四五沸服一杯日三

又方
蛇牀子二升　防風三兩　生蒺藜二斤
右三味切以水一斗煮取五升漬綿拭之日四五度范汪同
又方
白朮三兩　戎鹽半兩　黃連　黃芩
芎藭　細辛　莽草　茵芋各一兩
礬石半兩
右九味切以水一斗煮取二升洗之日三
又方
馬藺子　蒴藋　茺蔚子　礬石

蒺蔾　茵芋　羊桃　蒴藋各二兩
右八味切以酢漿水二斗煮取一斗二升內礬石洗之
日三（范汪經馬藺並出第二十三卷中）
崔氏療風瘮遍身方
麻黃去節　生薑各三兩　防風二兩　芎藭
芍藥　當歸　蒺蔾子　甘草炙
獨活　烏喙　人參各一兩
右十一味切以水九升煮取二升八合絞去滓分溫三
服訖進粥食三日慎生冷酢滑豬肉冷水海藻菘菜
出第四卷中

延年塗風瘮蒴藋湯方
蒴藋根切　蒺蔾子　羊桃切　楮枝切
茺蔚子　石鹽各半升　辛夷人　礬石各二兩
右八味切以水一斗煮取三升去滓內鹽攪令消用塗
風瘮上下塗之（一方有莨菪）
又方
取枳實以醋漬令濕火炙令熱適寒溫用熨上即消
文仲處並出第十卷中
古今錄驗療三十歲癮瘮耳目皆合春秋輒發方
於南屋東頭第一梁壁外以細灰厚布地大小足容
兩腳躡灰上訖使病人走去勿反顧灸腳十指間灸
灰上隨病人年爲壯數卑援道方已試神良（范汪同出第十
卷中）
元侍郎希聲集療卒風瘮秘驗方
石灰隨多少和酢漿水塗瘮上隨手即滅（出第一卷中）
近効療風瘮方
生葱一大束洗淨以上團者并根鬚臨三大升以香
漿水三石煮取兩石並大斗於浴斛中適冷熱浸踈
積年患者不過三兩度浸必差
風搔身體癮瘮方五首

病源邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起風搔瘮瘮若赤
瘮者由涼濕搏於肌中之熱熱結成赤瘮也得天熱則劇
取冷則滅也白瘮者由風氣搏於肌中之熱熱與風相搏
爲白瘮也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則滅厚
衣身暖亦差也脉浮而大浮爲風虛大爲氣強風氣相搏
即成癮瘮身體爲痒養生方云汗出不可露臥及浴使人
身振寒熱風瘮也　出第二卷中
深師療風搔癮瘮如漆瘡連心中悶方
天雄炮　蜆母也母　牛膝各四分　防風六分
桂心　乾薑　細辛　人參各三分

栝樓五分　白术八分

右十味擣篩先食服半錢匕日再不知稍增之忌豬肉生葱生菜桃李雀肉等

又療風搔身體癮疹粉散方

烏頭炮　桔梗　細辛　白术各一兩

右四味擣篩以鉛朱爲色粉四升和令調以粉身佳范汪同出第十卷中

千金療風搔癮疹方

牛膝末酒服方寸匕日三并主骨肉疽癩病及瘖瘂出第二十三卷中

延年蒴藋膏主身痒風搔癮疹方

蒴藋根切　蒺藜子各一升　附子　獨活

犀角屑　薔薇根　白芷　防風

苦參　及巳　升麻　白斂

防巳各三兩　川椒　莽草　青木香

蛇牀子　蛇銜草各二兩　茺蔚子切一升　枳實炙五枚

茵芋二兩切

右二十一味切以苦酒漬令淹匝一宿明旦銅器中炭火上用豬膏五升煎令三上三下以候白芷色黄膏成絞去滓內不津器中用摩風疹張文仲同

又茺蔚浴湯主身痒風搔或生癮疹方

茺蔚　蒺藜　羊桃　蒴藋根亦得

漏蘆蒿各一斤　鹽三斤

右六味切以水三石煮取二石五斗去滓內鹽令消適寒温先飽食即入浴能良久浸最好每至夜即浴浴訖即卧愼風如法並出第十三卷中

風熱頭面疹痒方四首

千金療風搔腫痒在頭面大黄搨洗方

大黄　芒消各四分　莽草二分　黄連六分

黄芩八分　蒺藜五合

右六味切以水七升煮取三升半去滓內芒消訖帛搨上日一遍勿令近眼出第二十三卷中

延年牡丹膏主項強痛頭風搔疹癢風腫方

牡丹皮　當歸　芎藭　防風

升麻　防巳　芒消各六分　芍藥

細辛　乾藍　犀角屑　漏蘆

蒴藋　零陵香各四分　杏人去兩人皮尖碎　梔子人

黄芩　大黄　青木香各三分　竹瀝二升

右二十味切以竹瀝漬一宿醍醐三升半煎於火上三下三上候芍藥黄膏成絞去滓以摩病上

又犀角竹瀝膏主風熱發即頭項脉掣動急強及熱毒風疹
癢方
犀角十二分屑 升麻八分 蘄蘿根 秦艽
獨活 白芨 菊花 白朮
防巳 白芷 當歸 防風
芎藭 青木香 寒水石碎 苦參
漏蘆根各四分 蒺蔾子二合 甘草二分 枳實二枚炙破
梔子人七枚 竹瀝三升 吳鹽一兩
右二十三味切以竹瀝漬一宿明旦於炭火上和豬脂
五升煎令九上九下以候白芷色黃膏成絞去滓內於

不津器中用摩風處日三張文仲同並出第七卷中
肘後枳實丸療熱風頭面痒風疹如癩方
枳實六分炙 天門冬去心 獨活 蒺蔾人
防風 桔梗各五分 黃連 薏苡人各四分
茵桂一分半
右九味擣篩蜜和丸如梧子飲服十五丸日再如能以
酒和飲之益佳不限食之前後以意加減忌鯉魚生葱
豬肉冷水出第四卷中一方有人參五分
風搔癮疹生瘡方六首
病源人皮膚虛爲風邪所折則起癮疹寒多則色赤風多
則色白甚者癢痛搔之成瘡出第二卷中
深師療風癮疹或發瘡甚則胷急滿短氣欲吐方
茵芋七分炙 芎藭 烏頭炮 防風
白斂 乾薑各三分 桂心二分
右七味擣下篩爲散服半錢匕日再忌豬肉生葱
又療癮疹煩滿及血不止方
取新湯馬矢絞取汁服二升微者一升立愈若乾者
水漬取汁並出第十卷中
延年療風瘙癢悶搔之汁出生瘡洗湯方
苦參一小斤 漏蘆根一小斤 枳實小斤 蒺蔾一小斤

楮莖葉散者一小斤
右五味切以漿水二升煮取一大升以綿沾拭癢處
日八九度訖以粉粉拭處差
又枳實丸主風熱氣發衝頭面熱皮膚生風疹瘙痒盛生
瘡不能多食方
枳實炙 蒺蔾子 苦參各六分 人參四分
獨活 天門冬去心 茵桂各三分 白朮四分
右八味擣篩蜜和丸如梧子一服十丸用薄酒下日二
加至十五丸忌蒜熱麵鯉魚桃李雀肉生葱並出第十卷中
又小豚犀角膏療諸熱風毒氣衝出皮膚搔即癮疹赤

起兼有黃水出後結爲膿窠瘡悉主之方

升麻　犀角屑　白斂　漏蘆

枳實炙　連翹　生蛇銜草　乾藍

芒消各二兩研湯成下　黃芩三兩　梔子二十枚擘

蒴藋根四兩　玄參三兩

右十三味切以竹瀝二升貯一宿以成煉豬脂五升煎令竹瀝水氣盡絞去滓內芒消攪令凝傅成用摩患處日五六度范汪文仲同

近効療風熱結瘮搔之汁出痒不可忍方

麻黃根五兩　蛇牀子四兩　蒺藜子　礬石各二兩熬

白粉二升

右五味擣篩生絹袋盛痒即粉之此方甚良

風身體如蟲行方四首

病源夫人虛風邪中於榮衛溢於皮膚之間與虛熱并故遊奕遍體狀如蟲行出第二卷中

千金石南湯療六十四種風淫淫液液走入皮膚中如蟲行腰脊強直五緩六急手足拘攣癮瘮搔之作瘡風尸身痒卒面目腫起手不上頭口

石南炙　乾薑　黃芩　細辛

人參各一兩　桂心　麻黃去節　當歸

芎藭各六分　甘草炙八分　乾地黃二分　食茱萸五分

右十二味切以水六升酒三升煮取三升去滓分爲三服取大汗勿觸風但是癮瘮服之皆差忌蕪荑生葱生菜海藻菘菜等

又療舉體痛痒如蟲齧皮上痒搔則皮脫作瘡方

蒺藜子三升碎　蛇牀子二升　茺蔚子一升　防風五兩

大戟一斤　大黃二兩　礬石三兩熬

右七味切以酒四升水七升煮取四升去滓內礬石三上火燒用帛拭身上差止

人分

灸曲池隨年壯發即灸之神良並出第二十三卷中

延年蒺藜子丸療熱風衝頭面痒如蟲行身上時有風瘮出除風熱消瘮兼補益堅筋骨倍氣力充實方

蒺藜子六分　黃耆　獨活　白芷

防風　薯蕷各三分　枳實炙　人參

黃連各四分　葳蕤　地骨白皮各二分

桂心一分

右十二味擣篩蜜和爲丸如梧子一服十丸酒下日二服加至十五丸中間欲服朮煎及黃連丸並無妨忌豬肉生葱張文仲處出第三卷中

癧瘍風方一十五首

廣濟療癧瘍風方

石硫黃二兩研 雄黃一兩研 硇砂 附子生用各二兩

右四味擣篩為散以苦酒和如泥塗瘍處乾即更塗以差為度 出第五卷中

集驗療癧瘍方

苦酒於瓦甌底磨硫黃令如泥又取附子截一頭又磨硫黃上使熟將卧先以布拭瘍上數過乃以藥傅之即愈 深師處文仲范汪延年同

又方

硫黃研 礬石研 水銀入別研 竈墨

右四味等分擣下篩內㼜子中以葱葉中涕和研之臨卧以傅病上 肘後同並出第九卷中

删繁療癧瘍方

取五月五日車轍中水并牛蹄中水浴甚良 出第九卷中

千金療癧瘍方

取三年酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之良

又方

取塗中先死蜣蜋擣爛之當揩令熱封之一宿差止

又方

酢磨硫黃塗之最上

又方

雄黃研 蛇蛻一具燒 槲皮燒灰 硫黃研

右四味分等下篩以清漆和之塗白處欲塗時先以巴豆半截拭白處皮微破然後傅之不過兩三度即差 並出第二十四卷中

崔氏療癧瘍方

取茵蔯蒿兩握以水一斗五升煮取七升以皂莢湯先洗癧瘍令傷然後以湯洗之湯冷更溫洗可作三四度洗隔日作佳不然恐痛難忍 出第四卷中

救急療癧瘍方

取青胡桃皮擣之并少許醬清和硇砂令相入如煎餅麵先以泔清洗之然後傅藥

又方

以醬汁研石硫黃作泥以生布揩破以傅瘍上

又方

以石硫黃薰之令汗出差 並出第五卷中

古今錄驗療身體癧瘍斑駁女葳膏方

女葳一分 附子一枚 雞舌香 青木香各二分

麝香方寸匕 白芷一分

右六味㕮咀以臘月猪脂七合煎內五物微火煎令小
沸急下去滓內麝香攪調復三上三下膏成以浮石摩
令小傷以傅之

又方

三淋蒴藋淋灰取汁熏之洗癧瘍訖醋研木防已塗
之即愈神驗遠奚送

又蜀水花膏療癧瘍方

蜀水花　白附子　麝香

商陸　鷹屎白各二兩　白斂

右六味切以猪膏二升合煎之沸三上三下膏成以傅

上並出第十卷中

白癜風方九首

廣濟療白癜風方

苦參三斤　露蜂房炙　松脂　附子炮

防風各三兩　梔子人五兩　烏蛇脯六兩炙　木蘭皮

右八味擣篩爲散一服一匕以酒下宜常喫蘿蔔菜勿
食雞肉猪肉冷水熱麵生菜文仲同

又方

黑油麻一大升　生地黃五大兩　桃人去兩人皮尖三丁枚熬

右三味先退去油麻皮蒸之日暴乾又蒸之如此九度
訖又暴取乾擣令極碎然後擣地黃桃人羅之即總相
和加少蜜令相著一服一匙日再服和酒喫空喫亦得
兼食諸肺尤妙忌蕪荑熱麵猪蒜油膩等

又方

礬石研　硫黃研

右二味等分酢和傅之並出第五卷中

千金療白癜風方

酒服生胡麻油一合日三稍加至五合愼生冷猪魚
蒜百日服五升差

又方

揩上令破摘蘿摩白汁塗之日日爲之取差爲度

崔氏療白癜風神効方劉秘藏餘送

雌黃七分細研　木蘭皮　白朮各八分　苦參

芎藭　麻黃去節　山茱萸　甘草炙

狗脊　枳實炙各四分　秦艽　沙參

細辛　牛膝　白斂　人參

當歸　薺苨　白芷各五分　防風

附子炮　枲耳子各六分

右二十二味擣篩爲散酒服方寸匕日再漸漸加至三
匕忌生葱菜海藻菘菜猪肉桃李雀肉等出第四卷中

古今錄驗療面白癜風商陸散方
生商陸根切一升　白斂　天雄炮
黃芩各三兩　乾薑四兩　附子炮　躑躅花一升
右七味擣篩酒服五分匕日三忌豬肉冷水千金同本主歷瘍
又療白癜風附子膏方
附子炮　天雄炮　烏頭炮各三兩　防風二兩
右四味切以豬膏三升合煎之先服散白癜上以膏傅
之一方無防風
又方
羅摩草煮以拭之取差並出第八卷中

白癜方七首
集驗療頸項及頭面上白駁侵淫漸長有似癬但無瘡可
療之方
乾鰻鱺魚脂以塗之先洗拭駁上外把刮之使燥痛
拭燥然後以魚脂塗之一塗便愈難者不過三塗之
深師千金同
又方
取蛇蛻皮熟摩之數百過棄皮置草中深師千金同
又療身體白駁方
取木空中水洗之擣桂屑唾和傅駁上日三千金文仲同並

古今錄驗療面白駁方出翁主
鼈甲　蟬頸　箒　甑帶
膞腊　履底　蛇皮
右七味等分以月蝕之夕盛餅肟合燒之擣篩以酒服
方寸匕日二三服止以淳苦酒和塗白上一拇除之
又方
荷葉裹鮓合柴相和更裹令大臭爛先拭令熱傅之
卽差二公主方
又療舉體苦白駁經年不差此風虛生菖蒲酒方

陸地菖蒲細切一石別煮　天門冬一斤去心　天雄三兩去皮生用
麻子人一升　茵芋　乾漆　乾地黃
遠志三兩去心各　露蜂房五兩　苦參一斤　黃耆半斤
獨活　石斛各五兩　柏子人二升　蛇皮長三尺
人參子一升
右十六味㕮咀之以絹囊盛著先以水二斛五斗煮菖
蒲根取八斗以釀一斛五斗米許用七月七日造冬月
酒成漉糟停藥著器中下消減令人延年益壽耳目聰
明氣力兼倍一劑不覺更作尤妙當以差爲期更重煮
菖蒲去滓取汁以漬滓悉益佳禁食羊肉餳鯉魚豬肉

熱黄雞犬生冷十日酒定熱須去滓佳 並出第八卷中

右廸功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張 寔

校正

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十五卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十六卷目錄 虛勞上凡十九門

五藏勞論一首
肝勞論一首
肝勞實熱方二首
肝勞虛熱方四首
肝勞虛寒方五首
膽實熱方二首
髓虛實方二首
咽門論并傷破聲嘶方二首
六極論一首
筋極論一首
筋實極四首
筋虛極二首
筋虛胞轉方二首
轉筋方七首
心勞論一首
心勞實熱方五首
心實熱方三首
脉極論一首
脉熱極方三首

脉寒極方四首
脾勞論一首
脾勞實熱方四首
脾勞虛寒方三首
脾實熱方六首
瀉脾丸主脾氣不調及腹滿方三首
温脾湯主脾氣不足及不調下痢方六首
温脾丸主脾胃中冷及不足方四首
肉極論一首
肉極熱方四首

肉極寒方五首
肺勞論一首
肺勞實熱方五首
肺勞虛寒方二首
肺虛勞損方三首
氣極論一首
氣極熱方三首
氣極寒方二首
腎勞論一首
腎勞實熱方二首
腎勞虛寒方二首
腎勞熱方二首
腎熱方三首
骨極論一首
骨極實方四首
骨極虛方七首
精極論并方三首
虛勞失精方五首
虛勞尿精方八首
虛勞夢洩精方一十首

唐王燾先生外臺秘要方第十六卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

五藏勞論一首

删繁論曰夫五藏勞者其源從藏腑起也鼓生死之浮沈動百病之虛實厥陰陽逆腠理皆因勞瘠而生故曰五藏勞也出第七卷中

肝勞論一首

删繁論曰凡肝勞病者補心氣以益之心王則感於肝矣人逆春氣則足少陽不生而肝氣內變順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣所以肝恐不止則傷精精傷則面離色目青盲而無所見毛悴色夭死於秋出第七卷中

肝實熱方二首

删繁療肝勞實熱悶怒精神不守恐畏不能獨臥目視無明氣逆上不下胷中滿塞半夏下氣消悶明目吐熱湯方

半夏洗 生薑各八兩 麻黃去節 芍藥

杜蘅 枳實炙 細辛 杏人去皮尖碎

烏梅擘各三兩 松蘿二兩 淡竹葉切一升

右十一味切以水一斗先煮麻黃去沫下諸藥煮取三升分為三服忌羊肉餳生菜出第七卷中

深師療肝氣實目赤若黃脅下急小便難瀉肝湯方

人參 甘草各三兩炙 生薑五兩 黃芩二兩

半夏一升洗 大棗十四枚擘

右六味切以水五升煮半夏三四沸內藥最後內薑煎取二升去滓分為二服羸人三服忌海藻菘菜羊肉餳出第十三卷中

肝勞虛熱方四首

删繁療肝勞虛熱兩目為赤閉塞不開煩悶宛轉熱氣胷裏炎炎前胡瀉肝除熱湯方

前胡 乾薑 大青 細辛

秦皮 決明子 梔子人 子芩各一兩

淡竹葉切一升 車前子切一升 石膏八兩碎綿裹

右十一味切以水一斗煮取三升去滓平旦分為三服須利加芒消三兩忌生菜

又療肝勞熱悶關格不通精神不守氣逆上胷熱炎炎不止柴胡下熱湯方

柴胡 黃芩 澤瀉 升麻

芒消各三兩 玄參六兩 淡竹葉切 生地黃切各一升

乾薑二兩

右九味切以水九升煮取三升去滓下芒消平旦分三服忌蕪荑

又療肝勞熱恐畏不安精神不守悶怒不能獨卧感激惆悵志氣錯越不得安守茯苓安肝定精神丸方

茯苓　遠志去心　防風　人參

柏子人熬各五分　龍骨七分　牡蠣熬　大棗肉各八分

甘草炙四分

右九味擣篩白蜜和為丸如梧子初服二十丸加至三十丸為度煖清白飲進之日再服忌海藻菘菜大酢

又扁鵲療勞邪氣熱眼赤方

灸當容百壯兩邊各兩當容在眼小眥近後在耳之前客主人三陽三陰之會處以手按之有上下行脈則是與耳相對　並出第七卷中

肝勞虛寒方五首

删繁療肝勞寒眩忘欬唾憂恚內傷面離色目青盲硫黃丸方

硫黃　乾薑　吳茱萸　人參

當歸　防風各七分　礬石半兩燒　烏頭各八分炮

桂心　天雄炮　甘草炙各六分　蜀椒汗

皂莢炙去皮子　枳實炙各五分　細辛　甘菊花各四分

右十六味擣篩白蜜和為丸如梧子初服二十丸加至三十丸日再溫清酒進之忌豬肉冷水生葱生菜海藻菘菜

又肝勞虛寒關格勞澀閉塞不通毛悴色夭豬膏酒方

豬膏七升　生薑汁二升

右二味微火煎取三升下酒五升和分為三服　千金同

又療肝氣虛寒眼青盲䀮䀮不見物真珠煎方

真珠四分研　白蜜二合　鯉魚膽一枚

右三味和合微火上煎兩沸綿裹內眼中眼汁當自出

藥歇更為之　本方又有鯉魚腦一枚

又療肝虛寒勞損口苦骨節疼痛筋攣縮煩悶虎骨酒補勞損骨節疼痛方

虎骨一升炙取黃焦碎如雀頭　乾薑　芎藭

地骨皮各四兩　白朮　豬椒根　五加皮

枳實熬各五兩　丹參八兩　乾地黃七兩

右十味㕮咀以絹袋貯清酒四升漬四宿初服六七合加至一升日再服忌蕪荑桃李雀肉等　並出第七卷中

千金療肝勞虛寒脅下痛脹滿氣急眼昏濁視不明檳榔湯方

生薑 附子七兩炮各 檳榔七枚合皮碎 茯苓三兩
桔梗四兩 橘皮 桂心各三兩 白朮四兩
吳茱萸五兩
右九味切以水九升煮取三升去滓分為三服若氣喘加芎藭三兩半夏四兩洗甘草二兩炙忌豬肉冷水海藻菘菜桃李雀肉等 出第十一卷中

膽實熱方二首

删繁療膽腑實熱精神不守瀉熱梔子煎方
梔子二十一枚 甘竹茹一兩 香豉六合綿裹 大青
橘皮二兩各去脈 赤蜜三合

右六味細切以水六升煮取一升七合去滓下蜜更微火上煎兩三沸分再服 出第四卷中

千金療膽腑實熱精神不守瀉熱半夏千里水湯方
半夏洗 宿薑各二兩 酸棗五合 黃芩一兩
遠志去心 茯苓各二兩 生地黃五兩 秫米一升
右八味細切取流水五斗煮秫米令蟹目沸揚之三千下澄清取五升煮藥取二升半分為三服忌羊肉餳酢物蕪荑 出第十二卷中

髓虛實方二首

删繁論曰髓虛者腦痛不安髓實者勇悍凡髓虛實之應主於肝膽若其腑藏有病從髓生熱則應臟寒則應腑 千金同 出第三卷中

千金療髓虛腦痛不安膽腑中寒羌活補髓丸方
羌活 芎藭 當歸各三兩 桂心二兩
人參四兩 酥一升 棗肉一升研為脂 牛髓一升
羊髓一升 大麻人二升熬研為脂
右十味先擣五種乾藥為散下棗膏麻人又擣相濡為一家下二髓并酥內銅鉢中重湯煎之取好為丸如梧子酒服三十丸日再加至四十丸忌生葱

又療髓實勇悍驚熱主肝熱柴胡發泄湯方

柴胡 升麻 黃芩 細辛
枳實炙 梔子人 芒消各二兩 澤瀉四兩
淡竹葉切一升 生地黃切一升
右十味切以水九升煮取三升去滓下芒消分為三服忌生菜蕪荑 並出第十二卷中

咽門論并傷破聲嘶方二首

千金論曰夫咽門者應五臟六腑往還神氣陰陽通塞之道也喉嚨胞囊舌者並津液調五味之氣本也不可不研乎咽門若肝膽之候也其重十兩廣二寸五分至胃管長一尺六寸主通五藏六府津液神氣應十二時若藏熱咽

門則閉而氣塞若腑寒咽門則破而聲嘶母薑酒主之熱則通之寒則補之若寒熱調和病不生矣删繁同出第十二卷中

又療咽門主膽腑咽門傷破聲嘶母薑酒方

母薑汁二升　牛髓　酥　油各一升煎取一熟卯

桂心　秦椒各四分　芎藭　獨活各五分

防風六分

右九味將五物合擣下篩為散內薑汁中煎取相淹濡下髓酥油等攪令調微火上三上三下平旦溫清酒一升下二合膏細細含之日三服忌生葱删繁同此方今錄附此論後

出第六卷中

六極論一首

删繁論曰夫六極者天氣通於肺地氣通於嗌風氣應於肝雷氣動於心穀素問作谷氣感於脾雨氣潤於腎六經為川腸胃為海九竅為水注之於氣所以竅應於五藏五藏邪傷則六腑生極故曰五藏六極也出第八卷中

筋極論一首

删繁論曰凡筋極者主肝也肝應筋筋與肝合肝有病從筋生又曰以春遇病為筋痺筋痺不已復感於邪內舍於肝陽氣入於內陰氣出於外凡陰氣外出出則虛虛則筋虛筋虛則善悲色青蒼白見於眼下而傷寒則筋不能動十指爪皆痛數好轉筋其源以春甲乙日得之於傷風風在筋為肝虛風也若陽氣內發發則實實則筋實筋實則善怒嗌乾傷熱則欬欬則脅下痛不能轉側又脚下滿痛故曰肝實風也然則因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之審其陰陽以別柔剛陽病療陰陰病療陽善療病者病在皮毛肌膚筋脉而療之次療六腑若至五藏則半死半生矣扁鵲曰筋絕不治九日死何以知之手足爪甲青黑呼罵口不息筋應足厥陰足厥陰氣絕則筋縮引卵與舌足厥陰者肝脉也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脉絡於舌本故脉不營則筋急筋急則引卵與舌

故脣青舌卷卵縮則筋先死庚篤辛死金勝木醫之拱手也千金同出第八卷中

筋實極方四首

删繁療筋實極則好怒口乾燥好嗔身躁不定調筋止怒定氣黃耆湯方

黃耆　芎藭　白柘皮無刺者各二兩　白朮

通草　芍藥各四兩　甘草炙　桂心各二兩

大棗四十枚擘去核　石膏八兩碎綿裹　竹葉切一升

右十一味切以水九升煮取二升去滓分為三服忌海藻菘菜生葱桃李雀肉等

又療筋實極則欬欬則兩脅下縮痛痛甚則不可轉動橘皮通氣湯方

橘皮四兩 白朮 石膏碎綿裹各五兩 桂心

細辛 當歸 茯苓各三兩 香豉一升綿裹

右八味切以水九升煮取三升去滓分爲三服忌桃李雀肉生葱生菜酢物千金同並出第八卷中

千金療筋實極則兩腳下滿滿而痛不得遠行腳心如割筋斷折痛不可忍丹參煮散方

丹參十二分 芎藭 杜仲 續斷

地骨皮各八分 通草 當歸 乾地黃

麥門冬去心 禹餘糧 麻黃七分去節 甘草炙

桂心各五分 牛膝九分 生薑切炒取焦燥 牡蠣各十分

升麻六分

右十七味擣下篩爲散以絹袋子盛散二方寸匕以井華水二升煮數動絹袋子煮取一升爲一服日再煮忌海藻菘菜生葱蕪荑刪繁同

又療筋實極則手足爪甲或青或黃或黑烏黯四肢筋急煩滿地黃煎方

生地黃汁三升 生葛汁一升澄清 生玄參汁一升 大黃二兩

梔子人 升麻 麻黃去節 犀角各三兩?

石膏碎五兩 芎藭四兩

右一十味切以水七升煮取二升去滓下地黃汁一兩沸次下葛汁等煎取三升分爲三服日再忌蕪荑刪繁同並出第十一卷中

筋虛極方二首

刪繁療筋虛極則筋痺好悲思顏色蒼白四肢噓吸腳手拘攣伸動縮急腹中轉痛五加皮酒方

五加皮一斤 枳刺二升炙 豬椒根皮 丹參各八兩

桂心 當歸 甘草炙各三兩 天雄炮

秦椒汗 白鮮皮 通草各四兩 芎藭

乾薑各五兩 薏苡人半升 大麻人三升熬研

右十五味㕮咀以絹袋貯酒四斗漬春夏四宿秋冬六七宿初服六七合稍稍加之以知爲度忌生葱豬肉冷水海藻菘菜

又療筋虛極傷風爲風所傷入筋縮攣腰背不伸強直苦痛或爲腳氣牛膝湯方

牛膝 防風 甘李根皮 丹參

前胡各四兩 石斛五兩 杜仲 秦艽

續斷 鼈甲炙各三兩 陳橘皮二兩 大麻人二升熬研

右十二味切以水一斗四升煮取五升去滓下麻人更

煎取二升分二服忌莧菜 並出第八卷中

筋虛胞轉方二首

删繁療筋虛實暴損絕極或因霍亂轉筋腹滿痛或因服藥吐利過度脚手虛轉腸胞轉痛人參湯方

人參　厚朴炙各二兩　葱白一虎口　白术四兩

蓼一把長三升

右五味切以水五升煮取二升去滓分再服忌桃李雀肉等

又療胞轉筋急方

白术　通草各四兩　梔子人　子芩

茯苓各三兩　榆白皮三兩　香豉一升綿裹熬

右七味切以水七升煮取三升去滓分三服忌酢物桃李雀肉等 並出第八卷中一方無香豉

轉筋方七首

范汪療轉筋方

以鹽一升水一升半作湯洗漬良

又療轉筋在兩臂若胷脅者方

灸手掌白肉際七壯 並出第八卷中

删繁療轉筋十指筋攣急不得屈伸灸法

灸手踝骨上七壯良

又療轉筋脛骨痛不可忍方

灸屈膝下廉筋上三壯

又治轉筋方

灸涌泉涌泉在脚心下當大母指大筋灸七壯亦可

灸大都在足大母指本節內側白肉際灸七壯

又腹腸轉筋方

灸臍上一寸十四壯 並出第八卷中

近効療脚轉筋及渾身轉筋方

煖水稍熱於浴斛中坐浸須臾便差如湯沃雪

心勞論一首

删繁論曰凡心勞病者補脾氣以益之脾王則感於心矣人逆夏氣則手太陽不長心氣內消順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣心主竅竅主耳耳枯燥而鳴不能聽遠毛悴色夭死於冬 出第十卷中

心勞實熱方五首

删繁療心勞實熱好笑無度自喜四肢煩熱麻黃止煩下氣湯方

麻黃去節　梔子人　茯苓　子芩

白术各三兩　石膏八兩碎綿裹　桂心二兩　芒消三兩

生地黃切一升　大棗三十枚　雞子二枚　甘草一兩炙

赤小豆二合

右十三味切以水一斗煎和下錫子白攪調去沫下諸藥煮取二升五合去滓下竹瀝芒消煎一沸分為三服忌生葱酢物桃李雀肉海藻菘菜等前無竹瀝復下竹瀝恐有失

又療心勞熱口為生瘡大便難閉澀不通心滿痛小腹熱大黃泄熱湯方

大黃　澤瀉　黃芩　梔子人

芒消各二兩　桂心二兩　大棗三十枚　石膏八兩碎綿裹

甘草一兩炙

右九味切以水九升先取一升水別漬大黃一宿以餘八升煮諸藥取二升五合去滓下大黃更煮兩沸去大黃滓下芒消分為三服忌海藻生葱菘菜

又療心勞熱傷心有長蟲名蠱蟲長一尺周心為病雷丸丸方

雷丸熬　橘皮　石蠶炙　桃皮炙各五分

狼牙六分　貫衆二枚　蕪荑熬　青葙子

蜀漆各四分　殭蠶三七枚熬　茱萸根皮七分　亂髮如雞子大燒末

右十二味蒸切擣篩白蜜和為丸如梧子清白飲一服七丸不覺更加至二七丸為度日再

又療心勞熱心主竅竅主耳耳枯焦而鳴不能聽遠磁石湯方

磁石五兩碎綿裹　茯苓　大青　人參

白朮　菖蒲　芍藥各三兩　竹葉切一升

赤石脂二兩綿裹

右九味切以水九升煮取二升五合去滓分為三服忌羊肉餳酢物桃李雀肉等本方無芍藥

又療心勞熱不止肉毛焦色無潤口赤乾燥心悶麥門冬飲方

生麥門冬一升去心　陳粟米一升　雞子二七枚取白　淡竹葉切三升

右四味先以水一斗八升煮粟米竹葉取九升去滓澄清接取七升冷下雞子白攪五百轉去上白沫下麥門冬煮取三升去滓分三服並出第七卷中

心實熱方三首

千金瀉心湯療心實熱或欲吐吐而不出悶喘急頭痛方

小麥三升　香豉一升綿裹　石膏一斤碎綿裹　地骨皮五兩

梔子人二十一枚　茯苓二兩　淡竹葉切一升

右七味切以水一斗五升煮小麥竹葉取八升澄清下諸藥煮取三升去滓分溫三服忌酢物本名石膏湯

又療心實熱驚夢喜恐畏悸懼不安竹瀝湯方

淡竹瀝一升　石膏八兩碎綿裹　人參　知母去毛

赤石脂　梔子人　芍藥　白朮各三兩
茯神　紫菀各二兩　生地黄汁二升
右十一味切以水九升煮十味取二升七合去滓下竹瀝更煎取三升若須利下芒消二兩去芍藥分爲三服忌桃李雀肉酢物蕪荑

又茯神煮散主心實熱口乾煩渴眠臥不安方
茯神　麥門冬去心各六分　通草六分　升麻五分
淡竹茹一丸如雞子大熬　知母四分去毛　赤石脂七分
紫菀　桂心各三分　大棗二十枚擘
右十味擣篩爲散取方寸匕帛裹之以井華水二升半煮取九合時動裹子平旦爲一服日再服忌生葱酢物並出第十二卷中

脈極論一首

删繁論曰凡脈極者主心也心應脈脈與心合心有病從脈起又曰以夏遇病爲脈痺脈痺不已復感於邪內舍於心則食飲不爲肌膚顏脫面色白不澤其脈空虛口脣見赤色凡脈氣衰血焦髮墮以夏丙丁日得之於傷風損脈爲心風心風狀汗多若脈氣實則熱熱則傷心使人好怒口爲色赤甚則言語不快血脫色乾燥不澤食飲不爲肌膚若脈氣虛則寒寒則欬欬則心痛喉中介介如哽甚則咽腫喉痺故曰心風虛實候也若陽經脈病治陰絡陰絡脈病療陽經定其血氣各守其鄉脈實宜瀉氣虛宜補善療病者病在皮毛肌膚筋脈則全療之至六腑五藏則半死半生扁鵲曰脈絕不療三日死何以知之脈氣空虛則顏焦髮落脈應手少陰手少陰氣絕則脈不通手少陰者心脈也心者脈之合也脈不通則血不流血不流則髮色不澤故面黑如漆柴則血脈先死壬篤癸死水勝火故非治樂所効也出第八卷中千金同

脈熱極方三首

删繁療脈實熱極血氣傷心使心好生嗔怒口爲色變赤言語不快消熱止血氣調脈理中茯苓湯方
茯苓　黄芩　梔子人　芒消各五兩
赤石脂　升麻　紫菀各二兩　生麥門冬五兩去心
竹葉一升切　香豉一升熬　石膏八兩碎綿裹　生地黄一升切
右十二味切以水九升煮取二升去滓下芒消分爲三服忌酢物蕪荑

又療脈極熱傷風損脈爲心風心風狀多汗無滋潤消虛熱極止汗麻黄湯方
麻黄去節　杏人各四兩去尖皮兩人碎　梔子人
黄芩　防風　紫菀各三兩　升麻

桂心　茯神　人參各三兩　大棗二十枚擘
石膏六兩碎綿裹　桑根白皮一升
右十三味切以水一斗先煮麻黃三沸去沫下諸藥煮
取三升去滓分爲三服忌生葱酢物
又療脉熱極遇風爲痹痹感心顏脫面色白不澤脉空虛
口唇色赤乾燥升麻潤色消痹止熱極湯方
升麻　射干　芎藭　人參各三兩
赤小豆五合　生薑四合　麥門冬四兩去心　葳蕤四兩
生地黃切一升　甘草二兩炙　竹葉切一升
右十一味切以水一斗煮取二升去滓分爲三服忌海
藻菘菜蕪荑並出第八卷中

脉寒極方四首
删繁療脉極虛寒則欬欬則心痛喉中介介如哽甚則咽
腫喉痺半夏消痛止極益氣湯方
半夏一升洗四破　宿薑八兩　芎藭　細辛
附子炮　玄參　當歸各三兩　桂心
甘草炙　茯苓各二兩　杏人六十枚去尖皮碎
右十一味切以水一斗煮取三升去滓分溫三服忌羊
肉餳生葱菜猪肉冷水菘菜海藻酢物等
又療脉極虛寒鬢髮墮落安髮潤生桑白皮沐頭方

桑白皮二升細切
右一味以水淹漬煮五六沸去滓洗沐鬢髮數數爲之
自不復落
又方
麻子三升研　白桐葉切一把
右二味以泔汁二斗煮取五六沸去滓以洗沐頭
則鬢髮不落而長
又療髮墮落方
生柏葉一升　附子四枚炮　猪膏三斤
右三味末以猪膏三斤和爲三十丸用布裹一丸內煎沐
頭汁中令髮長不復落也並出第八卷中

脾勞論一首
删繁論曰凡脾勞病者補肺氣以益之肺王則感脾是以
聖人春夏養陽秋冬養陰以順其根矣肝心爲陽脾肺腎
爲陰一云太陰爲陰陽明爲陽逆其根則伐其本陰陽四時者萬物之始
終也千金同出第七卷中
脾勞實熱方四首
删繁療脾勞熱身體眼目口唇悉痿黃舌本強直不能得
咽唾生地黃煎方
生地黃汁三升　赤蜜　石膏各一升碎綿裹　升麻

射干　子芩各三兩　生玄參八兩　梔子人
葳蕤各四兩　甘草二兩炙

右十味切以水七升先煮石膏等取二升去滓下生地黃汁更煎取四升綿捩分爲四服若須利泄加芒消三兩分爲三服餘一服停下芒消留晩若熱不止更進服之得利泄止後一服也忌海藻菘菜蕪荑

又療脾勞熱有白蟲長一寸在脾爲病令人好嘔胸中寒嘔而不出前胡吐熱湯方

前胡　白朮　赤茯苓　枳實炙
細辛　旋復花　龍膽　杏人去尖皮雙人

常山　松蘿各三兩　竹葉切一升

右十一味切以水一斗煮取三升去滓分爲三服若胸中熱滿加芒消山梔子人黃芩各三兩苦參二兩加水二升忌酢物桃李雀肉生葱生菜

又療脾勞熱有白蟲在脾中爲病令人好嘔茱萸根下蟲酒方

東行茱萸根一尺大者　大麻子八升　橘皮二兩切

右三味剉茱萸根擣麻子並和以酒一斗漬一宿微火上薄煖之三上三下絞去滓平旦空腹爲一服取蟲便下出或死或半爛或下黃汁凡作藥法禁聲勿語道作藥蟲便下驗並出第七卷中

千金療脾勞實熱四肢不用五藏乖反脹滿肩息氣急不安承氣泄實熱半夏湯方

半夏洗　宿薑各八兩　橘皮　芍藥各八兩
茯苓　白朮　杏人各三兩去尖皮兩人
大棗二十枚擘　竹葉切一升

右九味切以水一斗煮取三升去滓分爲三服忌羊肉餳大酢桃李雀肉等刪繁同出第十五卷中

脾勞虛寒方三首

刪繁療脾勞虛損消瘦四肢不舉毛悴色夭牛髓補虛寒

丸方

牛髓　鹿髓　羊髓　白蜜
酥　棗肉各一升研爲脂　人參四分　生地黃十斤切酒二升漬三宿出暴還內酒中取盡暴乾
桂心　茯苓各四分
乾薑　白朮　芎藭各五分　甘草六分

右十四味擣篩內五髓中微火煎攪可爲丸如梧子初服三十丸加至四十丸爲劑日再服溫清酒進之忌海藻菘菜生葱蕪荑桃李雀肉酢等髓字恐誤作蓋爲五物耳

又療脾虛勞寒飲食不消勞倦氣脹噫滿憂恚不解人參消食八味等散方

人參 茯苓 陳麥麴熬 麥蘗熬
白术 吳茱萸 厚朴炙 檳榔人炙各八分
合子用
右藥擣篩爲散食後服方寸匕日再服清酒進之忌酢
物桃李雀肉等千金同並出第七卷中
千金療脾虛寒勞損氣脹噫滿食不下通噫消食膏酒方
猪膏二升 宿薑汁五升 吳茱萸一升 白术一斤
右四味擣篩茱萸术等二物爲細散内甾汁膏中煎取
六升溫清酒一升進方寸匕日再忌桃李雀肉等翼同出
第十五卷中

脾實熱方大首
千金療脾實熱舌本強直或夢歌樂而體重不能行瀉熱
湯方
前胡 茯苓各二兩 龍膽 細辛各三兩
芒消三兩 玄參 大青各二兩 苦竹葉切一升
杏人四兩去尖皮兩人者
右七味切以水九升煮取三升分三服忌酢物生菜
又射干湯主療與前方同
射干八兩 大青三兩 石膏十兩碎綿裹 赤蜜一升
右四味切以水五升煮取一升五合去滓下蜜煎取二
升分三服
又療脾熱脅痛熱滿不歇目赤不止口脣乾裂方
石膏一斤碎綿裹 生地黃汁一升 赤蜜一升 淡竹葉切五升
右四味以水一斗二升煮竹葉取七升去滓澄清煮石
膏取一升五合去滓下地黃汁兩沸下蜜煎取三升細
細服之忌蕪荑
又療脾熱偏一邊痛胸滿脅偏脹方
茯苓 橘皮 澤瀉各三兩 石膏八兩碎綿裹
桑白皮根一升 芍藥 白术各四兩 桂心
人參各二兩 生薑切一升 半夏六兩洗

右十一味切以水一斗二升煮取三升分爲三服若須
利加芒消二兩忌羊肉餳桃李雀肉生葱酢物並出第十五卷中
千金翼瀉脾湯主脾藏病氣實胸中滿不能食方
茯苓 厚朴四兩炙 甘草炙 人參
黃芩各二兩 桂心五兩 生薑八兩 半夏一升洗
右八味切以水七升煮取三升分爲三服此方又主冷
氣在脾藏走出四肢手足流腫亦逐水氣忌海藻菘菜
羊肉餳生葱酢等物
又主脾氣實其人口中淡甘臥憒憒痛無常處嘔吐反胃
方

大黃六兩

右一味以水六升煮取一升分再服又主食仰吐并大便不通者加甘草二兩煮取二升半分為三服忌海藻菘菜（並出第十七卷中）

瀉脾丸主脾氣不調及腹滿方三首

深師調中利飲食除胃中積聚寒熱老人將服長服令人光澤瀉脾丸方

黃芩　杏人（去尖皮兩人熬）　澤瀉　通草

芎藭　桂心　白朮　乾薑（各五分）

茯苓　黃耆　乾地黃（各六分）　附子（炮一分）

麥門冬（四分去心）

右十三味擣篩蜜和服如梧子二丸日三服忌豬肉冷水桃李雀肉生葱酢蕪荑等物（出第十三卷中）

千金翼瀉脾丸主脾氣不調有寒熱或下閉塞調五藏不利嘔逆飲食者方

大黃（六分）　杏人（去尖皮兩人熬）　附子（炮）　當歸

乾薑　桂心（各四分）　人參　細辛

芍藥　茯苓　半夏（洗）　黃芩

蜀椒（各三分汗）　玄參（三分）

右十四味擣篩蜜和丸如梧子飲服六丸日三增至十丸忌豬羊肉冷水餳生葱生菜酢等物（深師無附子）

又瀉脾丸主毒風在脾中流腫腹滿短氣食輒嚮嚮不消時時微下方

當歸（三分）　吳茱萸（二分）　乾薑（二分）　大黃（二分）

狼毒（炙一分）　桂心（三分）　芎藭（二分）　蜀椒（汗二分）

白斂（一分）　甘遂（熬分）　附子（炮二分）　葶藶（熬令紫色三分）

右十二味擣篩蜜和丸如梧子飲服三丸日三忌豬肉冷水生葱（並出第十七卷中）

溫脾湯主脾氣不足及不調下痢方六首

深師厚朴湯療冷實服溫脾湯不差乃服此湯方

厚朴（炙四兩）　桂心（二兩）　枳實（炙三兩）　生薑（五兩）

右四味切以水五升煮取二升分為三服相去五里久不過五劑忌生葱

又溫脾湯療脾胃中冷結實頭痛壯熱但苦下痢或冷滯赤白如魚腦方

人參（一兩）　乾薑　附子（炮各二兩）　大黃（三兩）

右四味切以水六升煮取一升半分為三服忌豬肉冷水

又大溫脾湯療脾胃中冷不得食又穀不消嚮嚮脹滿時苦下痢方

黃芩　人參　芍藥　附子炮各三兩
甘草炙　乾薑　大黃　厚朴炙各二兩
右八味切以水八升煮取二升八合分為三服亦可四服得下住不下須臾復服甚良忌猪肉海藻菘菜並出第十一卷中

千金翼溫脾湯主脾氣不足虛弱下痢上入下出方
乾薑　大黃各三兩　人參　附子炮
甘草炙各二兩
右五味切以水八升煮取二升半去滓分為三服忌海藻菘菜猪肉冷水深師文仲同

又溫脾湯主脾氣不足水穀下痢腹痛食不消方
半夏洗四兩　乾薑　赤石脂　白石脂
厚朴炙　桂心各二兩　當歸　芎藭
附子炮　甘草炙　人參各二兩
右十一味切以水九升煮取三升分為三服忌海藻菘菜猪肉冷水羊肉餳生葱

又建脾湯主脾氣不調使人身重如石飲食即嘔四肢酸削不收方
芍藥　甘草炙　黃耆各一兩　生薑二兩
生地黃一兩　白蜜一升

右六味切以水九升煮取三升去滓內蜜攪令調煎令微沸服八合日三夜一忌海藻菘菜蕪荑深師同出第十七卷中

溫脾丸主脾胃中冷及不足方四首

深師療宿寒脾胃中冷心腹脹滿食不消化溫脾丸方
大黃二兩　麥麴熬　乾薑各三兩　厚朴炙
附子炮　當歸　甘草炙　桂心
人參　枳實炙各二兩
右十味擣下篩蜜和服如梧子十五丸日三增至二十丸亦得食已服之無當歸者用芎藭一兩代之忌猪肉冷水海藻菘菜生葱等

又療穀氣不足溫養五藏消水穀下氣令人能食溫脾丸方
法麴熬五兩　乾薑炮　枳實炙各五兩　附子炮一兩
人參　甘草炙各一兩　蜀椒汗二兩
右七味擣篩蜜和服如梧子十五丸酒飲皆得不知增之忌猪肉冷水海藻菘菜並出第十三卷中

千金翼大溫脾丸主脾胃中冷水穀不化脹滿或時寒極方
法麴熬五合　甘草炙　桔梗　人參
乾薑各三兩　桂心五兩　附子炮　細辛各二兩

枳實三枚炙　吳茱萸　大麥蘖五兩熬炙
右十一味擣篩蜜和丸如梧子酒服七丸日三加至十
五丸忌海藻菜猪肉生菜
又溫脾丸主脾胃氣弱大腹冷則下痢少腹熱則小便難
氣鬱腹滿喘氣虛乏乾嘔不得食溫中消穀療脾益氣方
法麴熬　吳茱萸　小麥蘖各五合熬　枳實三枚炙
甘草炙　桂心　厚朴炙　當歸
茯苓各一兩　細辛　乾薑　麥門冬去心
人參　桔梗　附子各一兩炮
右十五味擣篩蜜和丸如梧子空腹飲服七丸日三亦

可加大黃二兩忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜酢物
文仲肘後同並出第十七卷中

肉極論一首

删繁論曰凡肉極者主脾也脾應肉肉與脾合若脾病則
肉變色又曰至陰遇病為肌痺肌痺不已復感於邪內舍
於脾體淫淫如鼠走其身上津液脫腠理開汗大泄鼻上
色黃是其相也凡風氣藏於皮膚肉色則敗以季夏戊己
日得之於傷風為脾風脾風之狀多汗陰動傷寒寒則虛
虛則體重怠墮四肢不欲舉不嗜飲食食則欬欬則右脅
下痛陰陰引肩背不可以動轉名曰厲風裏虛外實若陽
動傷熱熱則實實則身上如鼠走脣口壞皮膚色變身體
津液脫腠理開汗大泄名曰惡風而須決其闕紀知其終
始陰陽動靜肉之虛實實則瀉之虛則補之善療病者風
始入肉皮毛肌膚筋脉之閒即須決之若入六腑五藏則
半生半死鶣鵲曰肉絕不療五日死何以知之皮膚不通
外不得泄肉應足太陰足太陰氣絕則脉不營其口脣口
脣者肌肉之本也脉不營則肌肉濡肌肉濡則人中滿人
中滿則脣反脣反則肉先死甲篤乙死木勝土若使良醫
妙藥終不可療千金同出第八卷中

肉極熱方四首

删繁療肉極熱肌痺淫淫如鼠走身上津液脫腠理開汗
大泄為脾風風氣藏於皮膚肉色則敗鼻見黃色麻黃止
汗通肉解風痺湯方
麻黃去節　枳實炙　防風　白朮
細辛各三兩　石膏八兩碎綿裹　生薑　附子炮各四兩
甘草炙　桂心各二兩
右十味切以水九升先煮麻黃去沫下諸藥煮取三升
分三服忌猪肉海藻菘菜生葱生菜桃李雀肉等千金同
又療肉極熱則體上如鼠走或風痺脣口壞皮膚色變石
南散方

石南炙五分　署預　天雄炮　桃花
菊花　甘草炙各四分　黄耆三分　山茱萸七分
真珠二分　石膏碎八分　升麻　葳蕤各六分
右十二味擣篩為散服方寸匕食後服日再温清酒進之忌猪肉海藻菘菜千金同並出第八卷中

千金療肉極熱則身體津液脫腠理開汗大泄癘風氣下焦脚弱越婢湯方
麻黄六兩去節　石膏八兩碎綿裹　生薑一兩　甘草二兩炙
附子一枚炮去皮　大棗十五枚擘
右六味切以水七升煮取二升五合去滓分為三服一

名起脾湯忌猪肉海藻菘菜本方無附子删繁同出第七卷中

又療肉極虛熱肌痺淫淫如鼠走津液脫腠理開汗大泄成痺不仁四肢急痛西州續命湯方
麻黄去節　生薑各三兩　當歸　石膏各二兩碎綿裹
芎藭　桂心　甘草炙　黄芩
防風　芍藥各一兩　杏人四十枚去皮尖兩人
右十一味切以水九升先煮麻黄去上沫下諸藥煮至二升去滓分為四服日再忌海藻菘菜生葱删繁同出第八卷中

內極寒方五首

千金療肉極虛為脾風陰動傷寒體重怠墮四肢不欲舉關節疼痛不嗜飲食虛極所致大黄耆酒方
黄耆　巴戟天去心　桂心　石斛
蜀椒汗　澤瀉　茯苓　柏子人
乾薑各三兩　防風　人參　獨活各一兩
芍藥　山茱萸　天雄炮　附子炮
烏頭炮　茵芋　栝樓　半夏洗
細辛　白朮　黄芩各一兩
右二十三味㕮咀絹袋貯以清酒二斗漬之秋冬七日春夏三日初服三合漸漸加從痺為度日再忌猪羊肉桃李雀肉生菜生葱酢物删繁同出第十五卷中

删繁療肉極虛寒則脾欬其狀右脇下痛陰陰引肩背痛不可以動動則欬腹脹滿留飲痰癖大小便不利少腹切痛膈上寒大半夏湯方
半夏一升洗　白朮　茯苓　人參
甘草炙　附子炮　橘皮各二兩　生薑八兩
桂心三兩
右九味切以水一斗煮取三升去滓分為四服忌羊肉餳桃李雀肉生葱海藻菘菜猪肉冷水

又療肉極虛寒則皮膚不通外不得泄名曰厲風內虛外實腳疼弱大風引湯方

獨活四兩 當歸 茯苓各二兩 乾薑
甘草炙 人參 黃耆 防風各二兩
桂心 附子炮各一兩 大豆二升去皮熬
右十一味切以水一斗酒三升煮取四升去滓分爲四
服晝三夜一忌海藻菘菜豬肉生葱酢等物
又療肉極寒肌肉變舌痿名曰惡風腰脚疼弱小風引湯
方
獨活 防風 茯苓 甘草炙
人參各二兩 當歸 乾薑各二兩 附子一枚炮
大豆一升去皮熬

右九味切以水一斗酒三升煮取二升去滓分爲四服
日三夜一忌豬肉冷水海藻菘菜酢等物
又療肉極虛寒四肢怠墮或欬脅下堅滿痛飲食不嗜欲
舉不能手足厥冷憂恚思慮五膈丸方
人參十分 附子炮 乾薑各三分 遠志二分去心
桂心 椒汗 麥門冬去心 甘草炙各五分
細辛四分
右九味擣篩蜜和丸如彈子大取一丸著牙中稍稍咽
之覺胷中熱氣勢盡又服日二夜一亦可丸如梧子十
丸酒服忌豬肉冷水海藻菘菜生葱生菜並出第八卷中

肺勞論一首
刪繁論曰凡肺勞病者補腎氣以益之腎王則感於肺矣
人逆秋氣則手太陰不收肺氣焦滿順之則生逆之則死
順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣千金同出
第七卷中
肺勞實熱方五首
刪繁療肺勞實熱氣喘息鼻張面目苦腫麻黃引氣湯方
麻黃去節 杏人去皮尖兩人 生薑 半夏洗各五兩
石膏八兩碎綿裹 白前 細辛 桂心各二兩
竹葉切 橘皮一升 乾紫蘇

右十一味切以水一斗煮取三升去滓分爲三服忌羊
肉餳生葱生菜
又療肺勞熱損肺生蟲形如蠶在肺爲病令人欬逆氣喘
或爲憂膈氣膈恚膈寒膈熱膈皆從勞氣所生名曰膏肓
鍼灸不著麥門冬五膈下氣丸方
麥門冬十分去心 椒四分汗 遠志皮 附子炮
細辛各六分 甘草十分炙 乾薑 桂心
人參 百部 白朮 黃耆各五分
杏人四十枚熬去皮尖兩人者
右十三味擣篩以白蜜和爲丸如彈子大將一丸內牙

齒間含稍稍咽其汁忌豬肉海藻菘菜生葱桃李雀肉

等

又療肺勞熱生肺蟲在肺爲病桑白皮根煎方

桑根東引白皮切一升　狼牙三兩　東行茱萸根皮五兩

右三味切以酒三升煮取一升平旦服之良

又療肺熱不問冬夏老少頭生白屑搔之痒起者然肺爲五藏之蓋其勞損傷肺氣衝頭頂致使頭皮白屑搔之而起人多患此皆從肺來世呼爲頭風也沐頭湯方

大麻人三升　秦椒二兩　皂莢屑五兩

右三味熟研內米泔汁中一宿漬去滓米泔攪之三五百遍取勞乃用沐髮燥訖別用皂莢湯洗之通理然後傅膏

又療頭風頭中痒搔之白屑起五香膏方

藿香　甘松香　甲香炙　雞舌香

附子炮　續斷　烏喙炮各五分　澤蘭

防風　細辛　白朮各四分　白芷

松葉　莽草各七分　柏葉炙八分　大皂莢炙二寸

甘草炙三分　豬膏四升

右十八味㕮咀綿裹以苦酒二升漬一宿用膏煎之取附子黃爲度去滓準前沐頭了將膏傅用手揩頭皮令膏翕翕著皮非唯白屑差亦能長髮光黑滋潤並出第七卷中

肺勞虛寒方二首

刪繁療肺虛勞寒腹脹彭彭氣急小便數少厚朴湯方

厚朴四兩炙　枳實炙　桂心　橘皮

大黃各三兩　甘草二兩炙　五加皮　生薑各五兩

大棗二十枚擘

右九味切以水一斗二升煮取三升去滓分溫三服忌海藻菘菜生菜

又療肺虛勞寒損則腹背苦痛難以俛仰短氣唾如膿生薑溫中下氣湯方

生薑一斤　大棗三十枚　杜仲皮五兩　萆薢

桂心各四兩　白朮五兩　甘草炙　附子炮三兩

右八味切以水九升煮取三升去滓分溫三服忌豬肉海藻菘菜生葱桃李雀肉等並出第七卷中

肺虛勞損方三首

刪繁療肺虛勞損腹中寒鳴切痛胷脅逆滿氣喘附子湯方

附子炮　甘草炙各二兩　宿薑　半夏洗各四兩

大棗二十枚去皮核擘　白朮三兩　倉米半升

右七味切以水一斗煮取三升去滓分爲三服忌豬羊

肉餳海藻菘菜桃李雀肉等

又建中湯療肺虛損不足補氣方

黃耆　芍藥各三兩　甘草二兩炙　桂心三兩

生薑六兩　半夏五兩洗　大棗十二枚擘　飴糖十兩

右八味切以水八升煮取三升分爲三服忌羊肉餳海藻菘菜生葱

又療肺虛勞損致腸中生痔名曰腸痔肚門邊有核痛寒熱得之好挺出良久乃縮而生瘡豬懸蹄青龍五生膏方

豬後懸蹄三枚炙黃　生梧桐白皮四兩

生桑根白皮　龍膽　雄黃各五分研　蛇蛻皮五寸炙

生青竹皮六分　露蜂房炙　蜀椒各三分汗　猬皮燒

附子炮各四分　生柏皮七分炙　杏人三十枚去皮尖

右十三味細切綿裹以苦酒二升半淹漬一宿於火上炙燥擣篩以豬膏三升和微火上煎如薄糖傳瘡并酒服如棗大　並出第七卷中

氣極論一首

千金論曰凡氣極者主肺也肺應氣氣與肺合又曰以秋遇病爲皮痺皮痺不已復感於邪內舍於肺則寒濕之氣客於六腑也凡肺有病先發氣氣上衝胷常欲自恚以秋庚辛日傷風邪之氣爲肺風肺風之狀多汗若陰傷則寒寒則虛虛則氣逆欬欬則短氣暮則甚陰氣至濕氣生甚陰畏陽氣晝日則差者陽傷則熱熱則實實則氣喘息上衝胷甚則唾血也然陽病療陰陰是其裏陰病療陽陽是其表是以陰陽表裏衰王之源故知以陽調陰以陰調陽陽氣實則決陰氣虛則引善療病者病初入皮毛肌膚筋脉則治之若至六腑五藏則半死半生矣扁鵲曰氣絕不療喘而冷汗出二日死氣應手太陰手太陰氣絕則皮毛焦大陰者行氣溫皮毛者也氣不營則皮毛焦皮毛焦則津液去津液去則皮節傷皮節傷則爪枯毛折毛折則氣先死丙篤丁死火勝金非療所及也　刪繁同出第十七卷中

氣極熱方三首

刪繁療氣極傷熱氣喘息衝胷常欲自恚心腹滿痛內外有熱煩嘔不安大前胡湯方

前胡八兩　半夏洗　麻黃去節　芍藥各四兩

枳實四枚炙　生薑五兩　黃芩三兩　乾棗十二枚擘

右八味切以水九升煮取三升去滓溫分三服如人行四五里進一服忌羊肉餳

又療氣極傷熱氣喘甚則唾血氣短乏不欲食口燥咽乾竹葉湯方

竹葉一升切　麥門冬去心　小麥　生地黃各一升切

生薑六兩 乾棗十枚擘去核 麻黃三兩去節 甘草一兩炙
石膏六兩碎綿裹
右九味切以水一斗煮取三升去滓分爲三服忌海藻
菘菜蕪荑
又療氣極傷熱肺虛多汗欬唾上氣喘急麻黃湯方
麻黃四兩去節 甘草二兩炙 杏人四十枚去皮尖兩人
桂心二兩 生薑二兩 半夏五十枚洗四破 石膏六兩碎
紫菀一兩
右八味切以水九升煮麻黃兩沸去上沫下藥煮取三
升去滓分爲三服忌海藻生葱菘菜羊肉餳等出第八卷中

氣極寒方二首
刪繁療氣極寒傷風肺虛欬氣短不得息胸中迫急五味
子湯方
五味子 甘草炙 紫菀 桂心
附子炮 麻黃去節 乾薑 芎藭各二兩
細辛一兩 乾棗二十枚擘
右十味切以水九升煮取三升去滓分爲三服忌海藻
菘菜豬肉生葱生菜出第八卷中
千金療氣極虛寒皮毛焦津液不通虛勞百病氣力損乏
黃耆湯方

黃耆四兩 人參 白朮 桂心各二兩
生薑八兩 乾棗十枚擘去核 附子五分炮
右七味切以水八升煮取二升去滓分爲四服忌桃李
雀肉生葱本方無附子刪繁同出第十七卷中
腎勞論一首
刪繁論曰凡腎勞病者補肝氣以益之肝王則感於腎矣
人逆冬氣則足少陰不藏腎氣沈濁順之則生逆之則死
順之則治逆之則亂反順爲逆是謂關格病則生矣千金同出
第七卷中

腎勞實熱方二首
刪繁療腎勞實熱少腹脹滿小便黃赤末有餘瀝數而少
莖中痛陰囊生瘡梔子湯方
梔子三兩 子芩四兩 石膏五兩碎綿裹 淡竹葉切
生地黃切 榆白皮各一升 芍藥 通草
石韋去毛各三兩 滑石八兩碎綿裹
右十味切以水一斗煮取三升絞去滓分爲三服忌蕪
荑千金同出第七卷中
千金療腎實熱少腹脹滿四肢正黑耳聾夢腰脊離解及
伏水等氣急瀉腎湯方
黃芩三兩 磁石八兩碎如雀頭綿裹 大黃三兩切以水一升密器中漬一宿

甘草二兩炙　茯苓三兩　芒消三兩　生地黃汁取
菖蒲各五兩　玄參四兩　細辛二兩
右十味切以水九升煮七物取二升五合去滓內大黃更煮取二升三合去大黃滓下地黃汁微火上煎一兩沸下芒消分為三服忌海藻菘菜羊肉餳生菜酢物蕪荑出第十九卷中

腎勞虛寒方二首

删繁療腎勞虛寒關格塞腰背強直飲食減少日日氣力羸人參補腎湯

人參　甘草炙　桂心　橘皮

茯苓各三兩　杜仲　白朮各四兩　生薑五兩
羊腎一具去脂膏四破　猪腎一具去脂膏四破　薤白一升切
右十一味切以水三斗煮取六升去滓分為六服晝四夜二服覆頭眠忌海藻菘菜生葱酢物桃李雀肉等

又療腎虛寒損耳鳴好唾欠呿委頓羊腎補腎湯方

羊腎一具切　磁石碎　白朮各八兩　黃耆
茯苓　乾薑各四兩　桂心三兩
右七味切以水三斗煮取七升絞去滓分服一升日三服夜三服燥器貯之六月瀉水忌生葱桃李雀肉酢等物並出第八卷中

腎勞熱方二首

千金療腎勞熱陰囊生瘡麻黃根粉方

麻黃根三兩　石硫黃三兩研　米粉五合
右三味擣下篩合研安絮如常用粉法摶瘡上粉濕更摶之删繁肘後同出第十九卷中

删繁療勞熱四肢腫急少腹滿痛顏色黑黃關格不通鱉甲湯方

鱉甲炙　麻黃去節　升麻　前胡
羚羊角屑各二兩　桑根白皮五兩　薤白一升切　香豉一升綿裹
黃芩三兩

右九味切以水一斗煮取三升去滓分為三服忌莧菜出第八卷中

腎熱方三首

删繁療腎熱四肢腫急有蟯蟲如果中蟲生在腎為病貫衆散方

貫衆大者三枚切熬　乾漆三兩熬　吳茱萸五十枚　蕪荑熬
胡粉熬　槐皮各四分　杏人四十枚去尖皮熬研
右七味擣篩和胡粉研平旦以井花水調服方寸匕並出第八卷中

千金療腎熱好忘耳聽無聞四肢滿急腰背動轉強直方

柴胡　茯苓（本方云茯神）　澤瀉　黃芩
磁石（碎綿裹）　升麻　杏人（去尖皮兩人者）　大青
芒消（各三兩）　生地黃（切一升）　羚羊角（四兩）　淡竹葉（切一升）
右十二味切以水一斗煮取三升去滓下芒消分為三
服日再忌酢物
又療腎熱小便黃赤不出出如梔子汁或如黃蘗汁每欲
小便即莖頭痛方
榆白皮（切三升）　滑石（碎八兩）　子芩　瞿麥
通草（各三兩）　石韋（去毛四兩）　冬葵子（一升）　車前草（切二升）
右八味切以水二斗煮車前草取一斗去滓澄清取七

升下諸藥煮取三升五合去滓溫分四服（並出第十九卷中）

骨極論一首

刪繁論曰凡骨極者主腎也腎應骨骨與腎合又曰以冬
遇病為骨痺骨痺不已復感於邪內舍於腎耳鳴見黑色
是其候也凡腎病則骨極牙齒苦痛手足痛疼不能久立
屈伸不利身痺腦髓痠以冬壬癸日中邪傷風為腎風風
歷骨故曰骨極若氣陰陰則虛虛則寒寒則面腫垢黑腰
脊痛不能久立屈伸不利其氣衰則髮墮齒槁腰背相引
而痛痛甚則欬唾若氣陽陽則實實則熱熱則面色始隱
曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠痟耳鳴色黑是骨極
之至也須精別陰陽審其清濁知其分部視其喘息善療
病者病始於皮毛肌膚筋脉即須療之若入六腑五藏則
半生半死矣扁鵲曰骨絕不治痟而切痛伸縮不得十日
死骨應足少陰足少陰氣絕則骨枯足少陰者冬脉也伏
行而濡滑骨髓者也故骨不濡則肉不能著骨也骨肉不
相親則肉濡而却肉濡而却故齒長而垢髮無澤髮無澤
則骨先死戊篤己死土勝水醫所不能療（千金同並出第八卷中）

骨極實方四首

刪繁療骨極主腎實熱病則色始隱曲膀胱不通大便壅
塞四肢滿急乾棗湯方

乾棗（十枚擘去核）　大黃　大戟（切炒令黃）　甘草（炙）
甘遂　黃芩（各一兩）　芫花（半兩炒）　芒消（二兩）
蕘花（半兩炒）
右九味切以水五升煮取一升六合後下芒消分為四
服忌海藻菘菜（出第八卷中）
千金療骨極主腎熱病則膀胱不通大小便閉塞面顏枯
黑耳鳴虛熱三黃湯方
大黃（切別水一升漬）　黃芩　芒消（各三兩）　梔子（十四枚）
甘草（一兩炙）
右五味切以水四升先煮三物取一升五合去滓下大

黄更煎兩沸下芒消分為三服忌海藻菘菜刪繁同出第十九卷中

又療骨實酸疼苦煩熱煎方

葛根汁一升　生地黄汁一升　生麥門冬汁一升　赤蜜

右四味汁相攪調微火上煎之三沸分三服忌蕪荑

又療骨髓中疼方

芍藥一斤　生地黄五斤　虎骨四兩炙

右三味切以酒一斗漬三宿暴乾復入酒如此取酒盡為度擣篩酒服方寸匕日三忌蕪荑並出第十九卷中

骨極虛方七首

刪繁骨極虛寒主腎病則面腫垢黑腰脊痛不能久立屈伸不利夢寤驚悸上氣少腹裏急痛引腰暖脊四肢常苦寒冷大小便或白腎瀝湯方

羊腎一具豬腎亦得　芍藥　麥門冬去心　乾地黄

當歸各三　乾薑四兩　五味子二合　人參

茯苓　甘草炙　芎藭　遠志去心各二兩

黄芩一兩　桂心六兩　大棗二十枚擘

右十五味切以水一斗五升煮腎取一斗去腎內藥煮取四升去滓分為四服晝三夜一若遺小便加桑螵蛸二十枚炙忌海藻菘菜生葱酢物蕪荑

又灸法

靜曰第十八椎名曰小腸俞主小便[illegible]並出

淋虛乏兩邊各一寸五分隨年壯灸之主骨極[illegible]

卷中

千金療骨虛酸疼不安好倦主膀胱寒虎骨酒方

虎骨一具通炙取黄焦汁盡碎之如雀頭大釀米三石麴四斗水三石如常釀酒法所以用灸骨者其骨消麴而飲水也酒熟封頭五十日開[illegible]

又療虛勞冷骨節痛無力方

豉二斗　地黄八斤切

右二味再遍蒸暴乾擣篩食後以酒一升服二方寸匕

再服亦療虛熱等疾忌蕪荑

又虛勞髓痿方

天門冬為散酒服方寸匕日三二百日差忌鯉魚

又方

地黄一石取汁酒二斗相攪重煎溫服日三補髓忌蕪荑

又療骨髓冷疼痛灸法

灸上廉七十壯三里下三寸是並出第十九卷中

精極論并方三首

刪繁論曰凡精極者通主五藏六腑之病候也若五藏六

髓衰則形體皆極目視無明齒焦而髮落身重則腎水生耳聾行步不正邪風逆於六腑淋虛厥於五藏故曰精極也凡陽邪害五藏陰邪損六腑陽實則從陰引陽陰虛則從陽引陰若陽病者主高高則實實則熱眼視無明齒焦髮脫腹中滿滿則歷節痛痛則宜瀉於內若陰病者主下下則虛虛則寒體重則腎水生耳聾行步不正但氣入內行於五藏則欬欬則多涕唾面腫氣逆所以形不足者溫之以氣精不足者補之以味善療精者先療肌膚筋脉次療六腑五藏若邪至五藏則半死半生矣扁鵲曰五陰氣俱絶不可療絶則目系轉轉則目精奪爲志先死遠至一

日半日死非醫所及也宜須精研以表療裏以左療右以右療左以我知彼疾皆差也千金同並出第八卷中

千金療精極實熱眼視無明齒焦髮落形衰體痛通身虛熱竹葉黃芩湯方

竹葉切三升　黃芩　茯苓各三兩　生薑六兩

麥門冬去心　甘草炙　大黃各二兩　芍藥四兩

生地黃切一升

右九味切以水九升煮取三升去滓分爲三服忌酢物海藻菘菜蕪荑刪繁同

又療精極五藏六腑俱損傷虛熱遍身煩疼骨中痛煩悶方

生地黃汁二升　生麥門冬汁一升　赤蜜　竹瀝各一升

石膏八兩碎　人參三兩　芎藭三兩　甘草一兩炙

黃芩三兩　當歸四兩　桂心四兩　麻黃二兩去節

右十二味切以水七升先煮八物取二升去滓下地黃汁等煮取四升分四服日三夜一忌海藻菘菜生葱蕪荑刪繁桂二兩刪繁同並出第十九卷中

虛勞失精方五首

病源腎氣虛損不能藏精故精漏失其病少腹弦急陰頭寒目眶痛髮落診其脉數而散者失精脉也凡脉芤動微

緊男子失精出第四卷中

深師人參丸療虛勞失精方

人參二兩　桂心　牡蠣熬　署預

黃蘗　細辛　附子炮　苦參各三分

澤瀉五分　麥門冬去心　乾薑　乾地黃各四分

菟絲子二分

右十三味擣合下篩和以白蜜爲丸酒服如梧子大三丸病加附子一分婦人血弱加乾地黃好者二分一本云黃蘗四分忌猪肉冷水生葱生菜蕪荑出第三卷中

范汪療男子虛失精三物天雄散方

天雄炮二兩　白朮八分　桂心六分

右搗篩服半錢匕日三稍稍增之忌豬肉冷水桃李雀肉生葱中（張仲景方有龍骨文仲同出第六十八卷）

千金療男子虛勞失精陰縮灸法

灸中封五十壯

又男子虛勞失精陰上縮莖中痛方

灸大赫三十壯穴在夾屈骨端三寸（並出第十九卷中）

以上灸穴尺寸遠近具在第三十九卷中

古今錄驗療虛損失精黃耆湯方

黃耆　當歸　甘草炙各二兩　桂心六兩

蓯蓉　石斛各三兩　乾棗三十枚　白蜜二升

右八味切以水一斗煮取四升內蜜煎取三升分為四服日三夜一以食相間忌海藻菘菜生葱（范汪同出第三卷中）

虛勞尿精方八首

病源虛勞尿精者腎氣衰弱故也腎藏精其氣通於陰勞傷腎虛不能藏其精故因小便而精液出也（出第四卷中）

深師療男子尿精方

栝樓根　澤瀉　土瓜根各二兩

右三味搗合下篩以牛膝和為丸如梧子先食服三丸良范汪云用四分餘並同

又尿精小便白濁夢泄韭子散方

韭子　菟絲子　車前子各一兩　附子三枚炮

當歸　蓯蓉　礬石燒各三兩　桂心一兩

右八味搗合下篩溫酒服方寸匕日三亦可蜜和為丸酒服如梧子大五丸忌豬肉冷水生葱（千金同出第三卷中）

千金療虛勞尿精方

韭子二升　糯米一升

右二味以水一斗七升煮如粥取汁六升分為三服精溢同此

又方

柘白皮五合　桑白皮切五合

右二味切以酒五升煮取三升分為三服（一方柘白皮作石榴皮）

又方

乾膠炙二兩

右一味搗末酒二升和溫分三服差（一方用鹿角膠）

又方

新韭子二升十月霜後採

右一味好酒八合漬一宿明旦日色好童子向南搗一萬杵平旦溫酒五合服方寸匕日再服

又小便失精及夢泄精方

韭子一升（熬）　麥門冬一升（去心）　菟絲子二合　車前子二合

芎藭二兩　白龍骨三兩

右六味擣篩，以酒服方寸匕，日三，不知，稍稍增之，甚者夜一服。（此方後用澤瀉一兩半。並出第十九卷中）

古今錄驗棘刺丸療男子百病小便過多失精方

棘刺二兩　麥門冬（去心）　萆薢　厚朴（炙）

菟絲子　柏子人　茯苓　桂心

石斛　小草　細辛　杜仲

牛膝　防葵　乾地黃各一兩　石龍芮二兩

巴戟天二兩　烏頭半兩（炮，去皮）

右十八味擣下篩，以蜜和雞子黃各半和之，擣五六千杵，以飲服如梧子十丸，日三，稍稍增至三十丸，以知為度。忌豬肉、冷水、生葱、生菜。（千金有萎蕤，餘同。並出第十卷中）

虛勞夢泄精方一十首

病源腎虛為邪所乘，邪客於陰，則夢交接。腎藏精，今腎虛弱，不能制於精，故因夢感動而泄也。（出第四卷中）

深師韭子丸療虛勞夢泄精方

韭子五合（熬）　大棗五枚　黃耆　人參

甘草（炙）　乾薑　當歸　龍骨

半夏（洗）　芍藥各三兩

右十味擣合下篩，和以白蜜，丸如梧子，服十丸，日三四。忌海藻、菘菜、羊肉、餳。（千金同）

又棘刺丸療虛勞諸氣不足，數夢或精自泄方

棘刺　天門冬（去心）各二兩　乾薑

菟絲子　烏頭（炮）　小草　防葵

薯蕷　石龍芮　枸杞子　巴戟天

萆薢　細辛　萎蕤　石斛

厚朴（炙）　牛膝　桂心各二兩

右十八味擣合下篩，和以蜜、雞子白各半相和，丸如梧子，先食服五丸，日三。若患風痿痺，氣體不便，熱煩滿少

氣，消渴枯悴，加萎蕤、天門冬、菟絲子；身黃汗，小便赤黃不利，加石龍芮、枸杞子；關節腰背痛，加萆薢、牛膝；若中氣脹，時泄，數唾，嘔吐，加厚朴、乾薑、桂心；陰囊下濕，精少，小便餘瀝，加石斛；以意增之，菟絲子兩倍之。經宿後有一方十四物長陰，加肉蓯蓉、磁石，其說小異，故兩存焉。忌豬肉、冷水、生葱、蕪荑、鯉魚等。

又鹿角湯療虛勞夢泄精方

鹿角一具（屑）　韭白半斤　生薑一斤　芎藭

茯苓各二兩　當歸　鹿茸（炙）各二兩　白米五合

右八味切，先以水五斗煮鹿角，取一斗二升，去滓，內諸

煮取四升分服一升日三夜一鹿角脛取肥而嫩者
打令碎也忌酢物

又桂心湯療虛喜夢與女邪交接精為自出方一名喜湯

桂心　牡蠣熬　芍藥　龍骨

甘草各二兩炙　大棗三七枚一方十枚　生薑五兩

右七味㕮咀以水八升煮取三升去滓溫分三服忌海
藻菘菜生葱范汪同並出第三卷中

千金療夢泄失精尿後餘瀝尿精方

人參　麥門冬去心　赤石脂　遠志去心

續斷　鹿茸炙各六分　茯神一云茯苓　龍齒炙

磁石研　蓯蓉各八分　乾地黃十二分　丹參

韭子熬　栢子人各五分

右十四味擣篩蜜和丸如梧子以酒服二十丸日再稍
稍加至三十丸忌酢物蕪荑

又療夢失精方

韭子一升熬

右一味擣篩以酒服方寸匕日再神効並出第十九卷中

古今錄驗石斛散療男子夢泄精方

石斛七分　桑螵蛸　紫菀各二分　乾漆熬

五味子　乾地黃　鍾乳研　遠志皮

附子各三分炮

右九味擣合下篩以酒服方寸匕漸漸增至二七日三
服忌猪肉冷水蕪荑出第十卷中

小品龍骨湯療夢失精諸脈浮動心悸少急隱處寒目眶
疼頭髮脫者常七日許一劑至良方

龍骨　甘草炙各二分　牡蠣三分熬　桂心

芍藥各四分　大棗四枚擘　生薑五分

右七味切以水四升煮取一升半分再服虛羸浮熱汗
出者除桂加白薇三分附子三分炮故曰二加龍骨湯
忌海藻菘菜生葱猪肉冷水

又薰草湯療夢失精方

薰草　人參　乾地黃　白朮

芍藥各三兩　茯神　桂心　甘草炙各二兩

大棗十二枚擘

右九味切以水八升煮取三升分為二服每服如人行
四五里一方又有茯苓三兩忌桃李雀肉大酢海藻菘
菜生葱一本無薰草人參又有薰草人參龍骨別是一方范汪同並出第三卷中

集驗灸丈夫夢泄法

灸足內踝上一寸一名三陰交二七壯兩脚皆灸內
踝踝大脉並四指是范汪文仲同出第五卷中

右廸功郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事張 寔

校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十六卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十七卷目錄 虛勞下 十九門

素女經四季補益方七首
五勞六極七傷方一十首
雜療五勞七傷方三首
腰痛方六首
風濕腰痛方四首
腎著腰痛方二首
腎虛腰痛方七首
臂腰痛方三首
卒腰痛方七首

久腰痛方二首
腰胯痛方二首
腰腳疼痛方三首
腰胯疼冷方二首
腰腎膿水方二首
虛勞補益方九首
補益虛損方七首
虛勞羸瘦方五首
虛勞食不生肌膚方三首
長肌膚方三首

腎氣不足方六首
虛勞裏急方六首
虛勞心腹痛方二首
虛勞偏枯方一首
虛勞骨熱方二首
虛勞虛煩不得眠方八首
病後不得眠方三首
虛勞百病方五首
虛勞陰痿方七首
虛勞小便利方五首

按盈
防料二
字可效
道按
湯彊當
作監彌

唐王燾先生外臺秘要方第十七卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞簡院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

素女經四季補益方七首

素女經黃帝問素女曰男子受氣陰陽俱等男子行陽常先病耳目本其所好陰痿不起氣力衰弱不能彊健敢問療之道素女曰帝之所問衆人同有陰陽爲身各皆由婦人夭年損壽男性節操故不能專心貪女色犯之竭力七傷之情不可不思常能審慎長生之道也其爲疾病宜以療療之令所說犯者七第一之忌日月晦朔上下弦望六丁之日以合陰陽傷子之精令人臨敵不戰時時獨起小便赤黃精空自出夭壽喪身第二之忌雷電風雨陰陽晦暝振動天地日月無精光以合陰陽生子令狂癲或有聾盲瘖瘂失神或多忘誤心意不安忽常喜驚恐悲憂不樂第三之忌新飽食飲穀力未行太倉內實五藏防響以合陰陽六腑損傷小便當赤或白或黃腰脊疼痛頭項寄彊或身體浮腫心腹脹滿毀形夭壽天道之常第四之忌新小便精氣微弱榮氣不固衛氣未散以合陰陽令人虛之陰陽氣閉絕食無味腹脹滿結怫鬱不安忘誤或喜怒無

常狀如癲發第五之忌作事出行身體勞榮氣不定衛氣未散以合陰陽藏氣相干令人氣乏喘息爲難脣口乾燥身體流汗穀不消化心腹脹滿百處酸疼起臥不安第六之忌新息沐浴頭身髮濕舉重作事流汗如雨以合陰陽風冷必傷少腹急痛腰脊疼强四肢酸疼五藏防響上攻頭面或生漏瀝第七之忌共女語話玉莖盛强以合陰陽不將禮防氣腠理開莖中痛傷外動肌體內損[illegible]結髮塞耳目視𥊑𥊑心中怵惕恍惚喜忘如於奔脇欬逆上氣內絕傷中女絕瘀弱身可不防犯此七篇形證已彰天生神藥療之有方

黃帝問高陽負曰吾知素女明知經脉滿虛盈男子五勞七傷婦人陰陽隔閉漏下赤白或絕產無子男子受氣陰陽同等其病緣由因何而起故欲問之請爲具說對曰深哉問也男子五勞六極七傷病皆有元本由狀帝曰善哉七傷之病幸願悉說對曰一曰陰汗二曰陰衰三曰精清四曰精少五曰陰下濕痿六曰小便數少七曰陰痿行事不遂病形如是此謂七傷黃帝曰七傷如是療之奈何對曰有四時神藥名曰茯苓春秋冬夏療隨病形冷加熱藥溫以冷藥風加風藥色脉診評隨病加藥悉如本經春三月宜以更生丸(更生者茯苓也)療男子五勞七傷陰衰消小蝕

丁生瘀腎背疼痛不得俛仰兩膝臏冷時時熱癢或時浮腫難以行步目風淚出遠視𥊑𥊑欬逆上氣身體痿黃遶臍弦急痛及膀胱小便尿血莖痛損傷時有遺瀝汗衣赤黃或夢驚恐口乾舌彊渴欲飲水得食不常或氣力不足時時氣逆坐犯七忌以成勞傷此藥主之甚驗方

茯苓四分(若不消食三分加一)　菖蒲四分(若耳聾三分加一)
山茱萸四分(若身痒二分加一)　栝樓根四分(若熱渴三分加一)
菟絲子四分(若夜溲一分加一)　牛膝四分(若機關不利加一倍)
赤石脂四分(若內傷二分加一)　乾地黃七分(若煩熱三分加一)
細辛四分(若目𥊑𥊑三分加一)　防風四分(若風邪三分加一)

薯蕷四分(若陰濕癢三分加一)　續斷四分(若有瘡加一倍)
蛇牀子四分(若少氣三分加一)　柏實四分(若少力加一倍)
巴戟天四分(若痿弱三分加一)　天雄四分(炮若有風三分加一)
遠志皮四分(驚恐不安三分加一)　石斛四分(若體疼加一倍)
杜仲四分(若絕陽脊痛三分加一)　蓯蓉四分(若冷痿加一倍)

右二十味擣篩蜜和丸如梧桐子先食服三丸日三不知漸增以知爲度亦可散服以清粥飲服方寸匕七日知十日愈三十日餘氣平長服老而更少忌豬羊肉餳冷水生菜蕪荑等物

又黃帝問曰夏三月以何方藥幸得具聞對曰宜以補腎

茯苓丸療男子內虛不能食飲忽忽喜忘悲憂不樂恚怒無常或身體浮腫小便赤黃精泄淋瀝痛絞膀胱脛疼冷痹伸不得行渴欲飲水心腹脹滿皆犯七忌上已具記當療之法隨病度量方用如左

茯苓二兩食不消加一倍　附子二兩炮有風三分加一
山茱萸二兩身癢三分加一　杜仲二兩腰痛三分加一
牡丹二兩腹中逆氣三分加一　澤瀉三兩有水氣三分加一
薯蕷三兩頭風加一倍　桂心六兩顏色不足三分加一
細辛三兩目䀮䀮三分加一　石斛二兩陰濕痿三分加一
蓯蓉三兩身痿三分加一　黃耆四兩體疼三分加一

右十二味擣篩蜜和丸如梧桐子先食服七丸日二服忌生葱生菜猪肉冷水大酢胡荽等物

又黃帝問曰春夏之療已聞良驗秋三月以何方藥對曰宜以補腎茯苓丸療男子腎虛冷五藏內傷風冷所苦令人身體濕痒足行失顧不自覺省或食飲失味目視䀮䀮身偏拘急腰脊痛彊不能食飲日漸羸瘦胸心懊悶欬逆上氣轉側須人起則扶舁鍼灸服藥療之小折或乘馬觸風或因房室不自將護飲食不量用力過度或口乾舌燥或流涎出口或夢寤精便自出或尿血尿有淋瀝陰下痒濕心驚動悸少腹偏急四肢酸疼氣息噓吸身體浮腫氣逆胸脅醫不能藏安加餘療方用如左

茯苓三兩　防風二兩　桂心二兩　白朮二兩
細辛二兩　山茱萸二兩　薯蕷二兩　澤瀉二兩
附子二兩炮　乾地黃二兩　紫菀二兩　牛膝三兩
芍藥二兩　丹參二兩　黃耆二兩　沙參二兩
蓯蓉二兩　乾薑二兩　玄參二兩　人參二兩
苦參二兩　獨活二兩

右二十二味擣篩蜜和丸如梧桐子食前服五丸臨時以酒飲下之忌酢物生葱桃李雀肉生菜猪肉蕪荑等

又黃帝問曰春夏秋皆有良方冬三月復以何方治之對

曰宜以垂命茯苓丸療男子五勞七傷兩目䀮䀮得風淚出頭項强痛不得迴展心腹脹滿上支胸脅下引腰脊表裏疼痛不得喘息飲食欬逆面目痿黃小便淋瀝清精自出陰痿不起臨事不對足脛酸疼或五心煩熱身體浮腫盜汗流離四肢拘攣或緩或急夢寤驚恐呼吸短氣口乾舌燥狀如消渴忽忽喜忘或悲憂嗚咽此藥主之補諸絕令人肥壯强健氣力倍常飲食百病除愈方

茯苓二兩　白朮二兩　澤瀉二兩　牡蒙二兩
桂心二兩　牡蠣二兩熬　牡荊子二兩　薯蕷二兩
杜仲二兩　天雄二兩炮　人參二兩　石長生二兩

附子二兩　乾薑二兩　菟絲子二兩　巴戟天二兩
蓯蓉二兩　山茱萸二兩　甘草二兩炙　天門冬二兩去心
右二十味擣篩以蜜和丸如梧桐子先食服五丸酒飲皆得忌海藻菘菜鯉魚生葱豬肉酢等物
又黃帝問曰四時之藥具已聞之此藥四時通服得不對曰有四時之散名茯苓散不避寒暑但能久服長生延年老而更壯方用如左
茯苓　鍾乳研　雲母粉　石斛
菖蒲　栢子人　菟絲子　續斷
杜仲　天門冬去心　牛膝　五味子

澤瀉　遠志去心　甘菊花　蛇床子
薯蕷　山茱萸　天雄炮　石韋去毛
乾地黃　蓯蓉並等分
右二十二味擣篩為散以酒服方寸匕日再二十日知三十日病悉愈百日以上體氣康彊長服八十九十老公還如童子忌酢物羊肉餳鯉魚豬肉蕪荑等
扁鵲曰凡經方神仙所造服之療病具已論訖如是所擬說從開闢以來無病不治無生不救也並出古今錄驗二十五卷中

五勞六極七傷方一十首

病源夫虛勞者五勞六極七傷是也五勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰瘦勞又有五勞肺勞者短氣而面腫鼻不聞香臭肝勞者面目乾黑口苦精神不守恐畏不能獨臥目視不明心勞者忽忽喜忘大便苦難或時鴨溏口內生瘡脾勞者舌本苦直不得咽唾腎勞者背難以俛仰小便不利色赤黃而有餘瀝莖內痛陰濕囊生瘡小腹急滿也
六極者一曰氣極令人內虛五藏不足邪氣多正氣少不欲言二曰血極令人無顏色眉髮墮落忽忽喜忘三曰筋極令人數轉筋十指爪甲皆痛苦倦不能久立四曰骨極

令人痠削齒苦痛手足煩疼不可以立不欲行動五曰肌極令人羸瘦無潤澤飲食不生肌膚六曰精極令人少氣噏噏然內虛五藏氣不足髮毛落悲傷喜忘七傷者一曰陰寒二曰陰痿三曰裏急四曰精連連五曰精少陰下濕六曰精液清七曰小便苦數臨事不舉又一曰大飽傷脾脾傷善噫欲臥面黃二曰大怒氣逆傷肝肝傷少血目暗三曰彊力舉重久坐濕地傷腎腎傷少精腰背痛厥逆下冷四曰形寒寒飲傷肺肺傷少氣欬嗽鼻鳴五曰憂愁思慮傷心心傷苦驚喜忘善怒六曰風雨寒暑傷形形傷髮落肌膚枯夭七曰大恐懼不節傷志志傷恍惚不樂男子

平人脉大爲勞極虚亦爲勞男子勞之爲病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬差陰寒精自出痠削診寸口脉浮而遲浮即爲虚遲即爲勞遲即衛氣不足浮即榮氣竭脉直上者逆虚也脉澀無陽是腎氣少寸關澀無血氣逆冷是大虚脉浮微緩皆爲虚緩而大者勞也脉微濡相搏爲五勞微弱相搏虚損爲七傷其湯熨鍼石别有正方補養宣導今附於後養生方導引法云唯欲嘿氣養神閉氣使極吐氣使微又不得多言語大喚呼令神勞損亦云不可泣淚及多唾洟此皆爲損液漏津使喉澀大渴又云雞鳴時扣齒三十六下訖舐口脣漱舌聊上齒表咽之三過殺蟲補

虚勞令人強壯又云兩手拓兩頰手不動摟肘使急腰內亦然住定放兩肘頭向外肘髆腰氣散盡勢大悶始起來去七通去肘臂之勞又云兩足跟相對坐上兩足指相向外扒兩膝頭柱席兩向外扒使急始長舒兩手兩向取勢一一皆急三七去五勞腰脊膝疼傷冷脾痺又云跪一足坐上兩手髀內捲足努踹向下身外扒一時取勢向心來去二七左右亦然去五勞足臂疼悶膝冷陰冷又云坐抱兩膝下去三里二寸急抱向身極勢足兩向身起欲似胡床住勞還坐上下來去二七去腰足臂內虚勞膀胱冷又云外轉兩脚平蹹向陰端急蹙將兩手捧膝頭兩向極勢拔之二七畢身側兩向取勢二七前後努腰去心勞痔病膝頭冷調和未損盡時須言語不瞋喜偏跏兩手抱膝頭努膝向外身手膝各兩極勢挽之三七左右亦然頭須左右仰扒去背急臂勞又云兩足相蹹令足掌合也蹙足極勢兩手長舒掌相向腦項之後兼至髆相挽向頭髆手向席來去七仰手七合手七始兩手角上極勢腰正足不動去五勞七傷臍下冷暖不和數用之常和調適又云一足蹹地一足屈膝兩手抱犢鼻下急挽向身極勢左右換易四七去五勞三里氣不下又蛇行氣曲臥以正身復起踞閉目隨氣所在不息少食裁通腸服氣爲食以舐爲漿

春出冬藏不財不養以治五勞七傷又云蝦蟇行氣正動搖兩臂不息十二通以治五勞七傷水腫之病又云外轉兩足十徧引去心腹諸勞內轉兩足十徧引去心五息止之身一切諸勞疾疹 出第三卷中

廣濟療五勞七傷六極八風十二痺消渴心下積聚使人身體潤服之多情性補益養精方

生乾地黃十二分 天門冬十分去心 乾薑六分 菟絲十分酒漬二宿焙乾別擣

石斛八分 當歸六分 白朮六分 甘草八分炙

肉蓯蓉七分 芍藥六分 人參八分 玄參六分

麥門冬十分去心 大黃八分 牛膝六分 紫菀六分

茯苓八分　防風六分　杏人八分去皮尖熬　麻子人八分
地骨皮六分　椒三分去目汗
右二十二味擣篩蜜和丸如梧子空腹酒下二十丸日
再服漸加至三十丸忌鯉魚海藻菘菜桃李雀肉大酢
蕪荑等
崔氏腎瀝丹療五勞六極八風十二痺補諸不足方
猪腎一具去脂膜　附子四分炮　芎藭四分　牡丹四分
桂心四分　茯苓八分　乾地黄六分　人參四分
桑螵蛸八分炙　磁石八分如粉研　牡荊子八分　當歸四分
黄耆八分　菖蒲八分

右十四味切以水一斗七升煮腎取一斗一升去腎內
藥煎取四升分四服忌羊肉餳冷水酢生葱蕪荑胡荽
古今錄驗同
又治丈夫五勞七傷百病無不補之乾漆散方
乾漆八兩熬令斷煙　茯苓八兩　石斛八分　枸杞子一升
乾地黄十兩　遠志皮五兩　續斷五兩　菟絲子五兩
天雄三兩炮　桂心三兩
右十味擣篩爲散每旦服一匕暮一匕酒飲皆得忌豬肉
生葱蕪荑冷水
又七味乾漆散方韋都水服不瘉月並死說合宗崇虛森無比

乾漆三兩熬煙盡　乾地黄八兩　芍藥一兩　蓯蓉二兩
五味子二兩　食茱萸四兩　枸杞子四兩
右藥擣篩爲散酒服方寸匕漸加至二匕日二服以知
爲度忌蕪荑
又五落散主五勞六極七傷八不足囊急胸脅脹滿背痛
頭眩四肢重腰脊彊痛髀脛痛小便或難或數刺若大便
去血欬欬少氣手足煩熱臥不能舉起起行不能久立有
病若此名曰內極或生愁憂恐怖生熱或飽食飲酒房室
自極陽氣虛竭耳鳴消渴甚則手足浮腫逆害飲食名曰
內消五勞七傷視病所苦加其藥方

大黄六分　麥門冬七分去心　栝樓五分　白薇七分
甘草五分炙　當歸十分　乾地黄七分　山茱萸七分
桑螵蛸七分炙　石斛九分六安者　茯苓五分　桂心三分
鐵屑三分研　厚朴三分炙　吳茱萸二分
右十五味合擣篩以白蜜一斤棗膏一斤當蒸之以湿
湯浸之和茨刃疎有前藥令如乾飲狀藥悉成又別取牛
膝五兩肉蓯蓉六兩附子三兩炮三物合擣下篩內諸
藥和令相得以酒服之方寸匕日三不知稍增之長肌
肉補不足久服益氣力若少氣力加石斛消渴加栝樓
止痛結煩爽急加芍藥腹中痛下濃血加厚朴四兩炙

四肢酸疼加當歸欬嗽少氣加天門冬白薇一名五若
散忌海藻菘菜生葱蕪荑酢物鯉魚等 通按音傻浹也又淘米声
又落腎散一名腎著散療腰背痛少腹攣急泳難自汗出
耳聾陰痿脚冷皆其病候方
羊腎 一雙作脯炙燥 礠石 六分研 天門冬 五分去心 人參 二分
防風 三分 天雄 三分炮 龍骨 五分 茯苓 一分
續斷 七分 肉蓯蓉 五分 玄參 三分 乾地黃 四分
桑白皮 三分 白膠 五分炙 乾漆 五分熬
右十五味下篩空腹以大麥飲下二方寸匕日五六服
忌鯉魚猪肉冷水蕪荑酢等物

又枸杞酒療五內邪氣消渴風濕下胸脅間氣頭痛堅筋
骨强陰利大小腸塡骨髓長肌肉破除結氣五勞七傷去
胃中宿食利耳目鼻衄吐血內濕風疰補中逐水破積癖
膿惡血石淋長髮傷寒瘴氣煩躁滿悶虛勞喘吸逐熱破
血及脚氣腫痺方
用米 一石爲一斛黍糯並得計常釀酒米一石用麴一斗此加五斤麴作其麴唯須上好者末之
枸杞 三十斤去赤皮半寸剉之以水一石浸之三日煮取五斗汁
生地黃 二十斤洗去土細切共米同炊之
秋麻子 三斗微熬細擣熱氣出以枸杞湯淋取汁 豆豉 二斗以枸杞湯煮取汁
右四味地黃一味共米同蒸之三物藥汁總合得五斗
分半漬米饙半及麴和釀飲如人肌溫總和一酘蓋瓮
口經二七日壓取封泥後經七日初一度釀用麻子二
斗多即恐令人頭痛服酒慎蕪荑生冷陳宿猪犬雞魚
麪蒜油膩白酒房室等服經一二七日將息病退 並出
第八卷中
千金五勞六極七傷虛損何謂五勞五藏病六極六腑病
七傷表裏受病凡遠思强慮傷人憂恚悲哀傷人喜樂過
差傷人忿怒不解傷人汲汲所願傷人慼慼所患傷人寒
溫失節傷人故曰五勞六極七傷也論傷甚衆且言其七
傷主之方

蓯蓉 七分 五味子 八分 地膚子 五合 續斷 五分
蛇床子 五分 車前子 五合 菟絲子 七合 乾地黃 八分
牡蠣 六分左顧熬 天雄 七分炮 桑寄生 七分 韭子 五合
天門冬 八分去心 地骨皮 八分 白石英 八分 陽起石 七分
白龍骨 七分
右十七味合擣篩以酒服方寸匕日三忌猪肉冷水鯉
魚蕪荑等 出第十九卷中
古今錄驗淮南八公石斛萬病散療五勞七傷大風緩急
濕痺不仁甚則偏枯筋縮拘攣胷脇支滿引身强直或頸
項腰背疼痛四肢酸煩陰痿臨事不起痒濕臥便盗汗心

腹滿急小便莖中疼痛或時便血咽乾口燥飲食不消往來寒熱羸瘦短氣肌肉損減或無子若生男女纔欲及人便死此皆極勞傷血氣心神不足所致藥悉主之令人康健多子方

牛膝二分　遠志二分去心　續斷二分　蛇牀子三分

菟絲子二兩酒漬　蓯蓉二分　茯苓二分　杜仲二分

桂心二分　乾薑一分　蜀椒一分汗　細辛二分

附子二分炮　天雄二分炮　防風二分　乾地黃二分

白朮一分　萆薢二分　石斛二分　雲母粉二分

菊花二分　菖蒲二分

右二十二味隨病倍其分擣篩爲散先食以酒服方寸匕日三以知爲度神良忌猪羊肉冷水桃李雀肉生葱生菜大酢餳等千金有人參山茱萸巴戟爲二十七味

又淮南王枕中丸療五勞六極七傷胃氣不和發於五藏虛勞小便或難或數令人多思脾氣不和宿食熱所爲病入百脉食欲不進沉滯著中隔并來著一邊或食不消夜服二丸方

芎藭二兩　附子二兩炮　桂心二兩　甘草二兩炙

黃芩二兩　芍藥二兩　乾薑二兩　蜀椒二兩汗

杏人四兩去皮尖熬　白朮五兩　當歸二兩　大黃一兩

右十二味擣篩蜜和丸如梧子以酒服五丸日三忌海藻菘菜生葱猪肉冷水桃李雀肉等出第二十五卷中

雜療五勞七傷方三首

古今錄驗署預丸療丈夫五勞七傷頭痛目眩手足逆冷或煩熱有時或冷痺骨疼腰髖不隨食雖多不生肌肉或少食而脹滿體澀無光澤陽氣衰絕陰氣不行此藥能補十二經脉起發陰陽通內制外安魂定魄開三焦破積聚厚腸胃消五藏邪氣除心內伏熱強筋練骨輕身明目除風去冷無所不療補益處廣常須服餌爲佳七十老人服之尚有非常力況少者乎謹具方如左

乾署預二兩　蓯蓉四兩　牛膝二兩　菟絲子二兩酒漬

杜仲二兩　赤石脂二兩　澤瀉二兩　乾地黃二兩

山茱萸二兩　茯苓二兩　巴戟天二兩去心　五味子一兩半

石膏二兩研　遠志一兩去心　柏子人一兩　白馬莖筋乾之二兩炙

右十六味擣篩蜜和丸如梧子以酒空腹服二十九至三十九日再忌大酢蕪荑蒜陳臭物

又療五勞七傷諸虛補益及下元後用甚驗五石黃耆丸方

黃耆二兩　紫石英二兩研　赤石脂二兩　石硫黃二兩研

石斛二兩 白石脂二兩 白礬石二兩 桂心四兩
烏頭二兩炮去皮 鍊鍾乳二兩研 芎藭二兩 防風二兩
茯苓三兩 乾薑四兩 棗一百枚 當歸二兩
細辛二兩 人參二兩 肉蓯蓉二兩 附子二兩炮
乾地黃二兩 芍藥二兩 甘草三兩炙 白朮二兩
右二十四味草石各別擣篩合蜜和丸如梧子空腹酒下十丸日三漸加至三十丸忌海藻菘菜豬肉冷水桃李雀肉生葱酢物蕪荑生菜（千金有羊腎龍齒無白朮鍾乳紫石英石斛黃芪赤石脂白石脂礬石止十九味）
又大薯蕷丸療男子五勞七傷晨夜氣喘急內冷身重骨

節煩疼腰背疆痛引腹內羸瘦不得飲食婦人絕孕疝瘕諸病服此藥令人肥白補虛益氣方
著蕷五分 大黃六分 前胡三分 茯苓二分
人參二分 杏人三分去皮尖熬 當歸十分 桔梗一分
防風二分 黃芩八分 麥門冬八分 甘草五分炙加二分
五味子四分 乾地黃十分 棗一百顆 芍藥四分
石膏四分研 澤瀉八分 阿膠四分炙 白朮二分
乾薑四分 桂心四分 乾漆三分 黃耆五分
右二十四味擣篩蜜和丸如梧桐子空腹以酒下三十丸日再忌豬肉冷水桃李雀肉、海藻菘菜生葱蕪荑（千金無防風麥門冬茯苓黃耆有天門冬豆黃卷白斂附子張仲景方有大豆黃卷麴柴胡白斂芎藭無附子黃芩石膏黃耆前胡為二十一味）

腰痛方六首

病源腎主腰腳腎經虛損風冷乘之故腰痛也又邪客於足少陰之絡令人腰痛引少腹不可以仰息診其尺脈沈主腰背痛寸口脈弱腰背痛尺寸俱浮直下此為督脈腰彊痛凡腰痛有五一曰少陰少陰腎也十月萬物陽氣皆衰是以腰痛二曰風痺風寒著腰是以腰痛三曰腎虛役用傷腎是以腰痛四曰臂腰墜墮傷損腰是以腰痛五曰寢臥濕地是以腰痛其湯熨鍼石別有正方補養宣導今

附於後養生方云飲食了勿即臥久作氣病令人腰疼痛又曰大便勿彊努令人腰疼目澀又笑過多即腎轉動令人腰痛又云人汗出次勿企牀懸腳久成血痺兩足重腰痛導引法云凡學將息人先須正坐並膝頭足初坐先足指相對足跟外扒坐上少欲安穩須兩足跟向內相對坐上足指外扒覺悶痛漸漸舉身似款便坐足上待共內坐相似不痛始雙豎足跟向上坐上足指並反向外每坐常歸去膀胱內冷風膝冷足疼上氣腰疼盡自消適（出第五卷中集驗千金同）

范汪腰疼方

用鼈甲一枚炙令黄刮削令淨擣

右一味擣篩空腹以湯飲酒服方寸匕日三忌莧菜小品亦主臂腰痛

備急療腰痛方

用萌藋葉火燎厚鋪牀上及熱臥眠上令復易之冬月採取根舂碎熬及熱準上用兼療風濕冷痺及產婦人患傷冷腰痛不得動亦用彌良

又療腰膝髀連腿脚疼酸者方

杜仲八兩　獨活四兩　乾地黄四兩　當歸四兩

芎藭四兩　丹參四兩

右六味切以絹袋盛以清酒二斗漬五宿初服二合日再服以知為度忌蕪荑

古今錄驗寄生湯療腰痛方

桑寄生四兩　附子三兩炮　獨活四兩　狗脊五兩黑者

桂心四兩　杜仲五兩　芎藭一兩　甘草二兩炙

芍藥三兩　石斛三兩　牛膝三兩　白朮三兩

人參二兩

右十三味切以水一斗煮取三升分三服忌海藻菘菜生葱猪肉冷水桃李雀肉等

又玄參湯療腰痛方

玄參二兩　人參二兩　杜仲四兩　芍藥四兩

桂心一兩　生薑二兩　乾地黄五兩　白朮一兩

通草三兩　當歸三兩　寄生四兩　芎藭四兩

防風二兩　丹皮二兩　獨活二兩

右十五味㕮咀以水一斗二升煮取三升日三夜一服忌生葱桃李雀肉胡荽蕪荑等

又杜仲獨活湯療腰痛方

獨活四兩　生薑六分　麻黄二兩　桂心三兩

芍藥三兩　甘草二兩炙　葛根三兩　括樓子二兩

防風二兩　杜仲四兩　附子一兩炮　杏人二十枚去皮尖碎

乾地黄一兩

右十三味切以水八升清酒二升煮取三升分三服忌生葱菘菜海藻猪肉冷水並出第十七卷中

風濕腰痛方四首

病源勞傷腎氣經絡既虛或因卧濕當風而風濕乘虛搏於腎腎經與血氣相擊而腰痛故云風濕腰痛出第五卷中

集驗療風濕客於腰令人腰痛獨活湯方

獨活三兩　生薑六兩　乾地黄五兩　芍藥四兩

防風三兩　桂心三兩　括樓二兩　甘草二兩炙

麻黄二兩去節　乾葛三兩

右十味切以水八升酒二升煎取三升分三服不差重作忌海藻生葱菘菜蕪荑出第五卷中此方比前方但無杜仲附子杏仁耳

延年療腰痛熨法

菊花二升　芫花二升　羊躑躅二升

右三味以醋拌令濕潤分爲兩劑內二布囊中蒸之如炊一斗米許頃適寒温隔衣熨之冷即易熨痛處定即差集驗范汪同一云癢作

又療腰痛大豆熨法

大豆六升水拌令濕炒令熱以布裹隔一重衣熨痛處令暖氣徹令即易之張文仲處

又方

取黄狗皮裹腰痛處取暖徹即定並出第十五卷中

腎著腰痛方二首

病源腎主腰脚腎經虛則受風冷內有積水風水相搏浸漬於腎腎氣內著不能宣通故令腰痛其病之狀身重腰冷腹重如帶五千錢狀如坐水中形狀如水不渴小便自利飲食如故久久變爲水病腎濕故也出第五卷中

古今錄驗腎著之爲病其人身體重從腰以下冷如坐水中形狀如水不渴小便自利食飲如故是其證也從作勞汗出衣裹冷濕久之故得也腰以下冷痛腹重如帶五千錢甘草湯方

甘草二兩炙　乾薑三兩炮　白术四兩　茯苓四兩

右四味切以水五升煮取三升分服一升日三腰中即温忌海藻菘菜桃李雀肉酢物經心錄方甘草一兩乾薑二兩餘同出第二十七卷中千金名腎著湯

經心錄腎著散方

桂心三兩　白术四兩　茯苓四兩　甘草二兩炙

澤瀉二兩　牛膝二兩　乾薑二兩　杜仲二兩

右八味擣篩爲散每服三方寸匕酒一升煮五六沸去滓頓服之日三忌生葱桃李雀肉海藻菘菜酢物千金同出第四卷中

腎虛腰痛方七首

小品腎虛腰痛治之方

丹皮去心二分　萆薢三分　白术三分　桂心三分

右四味擣篩以酒服方寸匕日三亦可作湯服之忌生葱胡荽桃李雀肉等必効備急范汪同

又療腰痛少氣陰弱寒冷小便清冷瀝滴陰下濕癢少腹急無子息方

甘草十四分炙　續斷三分　麥門冬三分　署預三分

附子三分炮　乾薑二分　棘刺四分

右七味擣篩酒服方寸匕日三忌猪肉冷水海藻菘菜必効同並出第五卷中一方無乾薑

備急隨氏腎氣丸主短氣腰痛身重調中補筋脉不足方

乾地黃五分 續斷五分 人參五分 萆薢三分

阿膠二分炙

右五味擣篩蜜和丸如梧子大以酒下十丸加至二十丸日再服忌蕪荑生冷出第四卷中

必効寄生散療腎虛腰痛方

桑寄生 鹿茸炙 杜仲

右三味各一分作散酒服方寸匕日三服

又方

鹿茸炙作散酒服方寸匕一味任多少爲之並出第三卷中范汪亦主腎腰痛

古今錄驗療腰痛皆猶腎氣虛弱臥冷濕地當風所得不時差久久流入脚膝冷痺疼弱重滯或偏枯腰脚疼攣脚重急痛獨活續斷湯方

獨活二兩 續斷二兩 杜仲二兩 桂心二兩

防風二兩 芎藭三兩 牛膝二兩 細辛二兩

秦艽三兩 茯苓三兩 人參二兩 當歸二兩

芍藥二兩日者 乾地黃三兩 甘草三兩炙

右十五味切以水一斗煮取三升分三服溫將息勿取冷宜用蒴藋葉火燎厚安牀上及熱臥上冷即易之冬月取根擣用事須熬之忌蕪荑生葱生菜海藻菘菜酢物別後有附子無續斷甘草牛膝人參當歸止十二味

又療男子患腰腎疼痛髀膝有風冷耳鳴食飲無味并有冷氣方

乾地黃四兩 茯苓三兩 白朮二兩 澤瀉三兩

山茱萸三兩 蓯蓉二兩 五味子三兩 桂心二兩

石斛二兩 巴戟天二兩 防風二兩 人參二兩

磁石二兩研

右十三味擣篩蜜丸如梧子酒下二十丸至三十丸日再忌桃李雀肉生葱酢物蕪荑

腎腰痛方二首

病源腎腰者謂卒然損傷於腰而致痛也此由損血搏於背脊所爲久不已令人氣息乏少面無顏色損腎故也出第五卷中

范汪療腎腰有血痛不可忍者方

桂心

右一味擣末以苦酒和塗痛處此令人喜臥可勤用之再爲必差

又療腎腰方
生地黃
右一味擣絞取汁三升煎得二升內蜜一升和煎之云
五沸日服一升亦可一日盡三升以差止甚効
經心錄療腎腰痛方
桑寄生二兩 丹皮二兩去心 鹿茸二兩炙 桂心二兩
右四味擣散以酒服方寸七日三忌生葱酸藥范汪千
金同出第五卷中
卒腰痛方七首
病源夫勞傷之人腎氣虛損而腎主腰脚其經貫腎絡脊

風邪乘虛卒入腎經故卒然而腰痛也出第五卷中
集驗療腰卒然痛杜仲酒方
杜仲半斤 丹參半斤 芎藭五兩 桂心四兩
細辛二兩
右五味切以酒一斗浸五宿隨多少飲之延年忌生葱
生菜經心錄同無桂心出第五卷中
延年療腰卒痛拘急不得喘息若醉飽得之欲死者大豆
紫湯方
大豆一升熬令焦
右一味以好酒二升煮豆令熟隨多少飲勿至醉亦云
用酒一升出第十五卷中
文仲葛氏療卒腰痛不得俛仰方
正立以小竹柱地度至臍斷竹乃以度度後當背脊灸
竹上頭處隨年壯灸畢藏竹勿令人知之千金同
又方
鹿角長六寸燒
右一味擣篩為末以酒服方寸匕陶云鹿茸尤良小品
范汪同
又方
桂心八分 丹皮四分去心 附子二分炮

右三味擣篩為末以酒服一刀圭日再服此主脅肋氣
痛如打者忌生葱猪肉冷水千金同
又方
灸脊窮骨上一寸七壯左右各一寸灸七壯差備急同
經心錄杜仲酒療卒腰痛方
杜仲半斤 丹參半斤 芎藭五兩
右三味切以酒一斗漬五宿隨性少少飲之即差出第
四卷中
久腰痛方二首
病源夫腰痛皆由傷腎氣所為腎虛而受於風邪風邪停

滯於腎經與血氣相擊久而不散故爲久腰痛也出第五卷中

小品療腰痛及積年痛者方

乾地黄十分　白术五分　乾漆五分　桂心八分

甘草五分炙

右五味擣末以酒服方寸匕日三忌桃李雀肉生葱海藻菘菜蕪荑等范汪同

必効療積年腰痛方

取一杖令病人端腰立杖以杖頭當臍中分以墨點訖廻杖於背取墨點處當脊量兩口吻折中分灸兩頭隨年壯妙

腰胯痛方二首

廣濟療胯下冷連腰胯痛食冷物即劇方

牛膝八分　當歸八分　黄耆八分　芍藥八分

厚朴六分炙　白术八分　茯苓六分　人參六分

橘皮八分　訶梨勒皮八分熬　桂心六分

右十一味擣篩蜜和丸如梧子空腹酒服二十丸加至四十九日再忌桃李雀肉生葱酢物

又療腰中冷氣食不消腰胯冷痛者方

檳榔人八分　當歸六分　牛膝八分　芍藥六分

枳實八分炙　人參六分　白术八分　桂心六分

芎藭六分　吳茱萸六分　橘皮六分

右十一味擣篩蜜和丸如梧子酒下二十丸至三十丸若飲酒衝上頭面宜煮薑棗湯下飲服亦得忌桃李雀肉生葱等出第四卷中

腰腳疼痛方三首

病源腎氣不足受風邪之所爲也勞傷則腎虚虚則受於風冷風冷與眞氣交爭故腰腳疼痛也出第五卷中

廣濟療患腰腎虚冷腳膝疼痛胷膈中風氣重聽丸方

石斛五分　五味子六分　牡丹皮八分　桂心四分

白术六分　丹參六分　磁毛石十分研　芍藥四分

檳榔人十分　枳實六分炙　通草六分　細辛四分

右十二味擣篩蜜和丸如梧子空腹以酒服二十丸漸加至三十丸日再忌生葱雀肉桃李生菜胡荽出第四卷中

必効秦艽散療風冷虚勞腰腳疼痛諸病悉主之方

秦艽四分　白术十四分　桔梗四分　乾薑五分

附子三分炮　牡蠣熬　防風六分　人參四分

茯苓四分　椒子二分汗　黄芩三分　桂心五分

細辛二分　甘草三分炙　杜仲三分

右十五味擣篩爲散以酒服方寸匕日再服一方加鍾乳粉一兩亦好忌桃李雀肉生葱生菜豬肉冷水

又徃療腰髀連腳疼方
杜仲八兩 獨活 當歸 芎藭
乾地黃各四兩 丹參五兩
右六味切以絹袋盛上清酒二斗漬之五宿服二合日再忌蕪荑備急同
腰胯疼冷方二首
廣濟療下冷腰胯肋下結氣刺痛方
當歸六分 鱉甲炙八分 桑耳炙八分 禹餘糧研八分
白石脂八分 芍藥炙八分 厚朴炙六分 吳茱萸六分
茯苓六分 橘皮六分 檳榔人六分 人參六分
右十二味擣篩蜜和丸如梧子空腹以飲服二十丸日再加至三十丸忌莧菜酢物

延年生石斛酒主風痺腳弱腰胯疼冷利關節堅筋骨令強健悅澤方
生石斛二斤搥碎 牛膝一斤 杜仲八兩
丹參八兩 生地黃切三升暴令乾
右五味切以絹袋盛以上清酒二斗入器中漬七日每食前溫服三合日三夜一服加至六七合至一升忌蕪荑出第一卷中
腰腎膿水方二首
必效療腰腎病膿水方
牛膝六分 檳榔人七枚 防己六分 牽牛子熬八分
右四味擣篩為散空腹以酒下三錢匕以宜瀉即差如利三五行即以醋飲止之慎生冷油膩蒜等物後以補腎氣湯丸也
深師療腰疼下膿水方
石鹽 乾薑 杏人去尖 醬瓣各等分
右四味擣以綿裹導之六七遍下膿水兼下氣妙差止
虛勞補益方九首
深師黃耆湯療丈夫虛勞風冷少損或大病後未平復而早榮勞腰背強直腳中疼弱補諸不足方

黃耆二兩 遠志二兩去心 麥門冬二兩去心 茯苓二兩
生薑三兩 人參三兩 甘草三兩炙 半夏二兩洗
當歸一兩 前胡二兩 橘皮二兩 蜀椒一兩汗
芍藥二兩 烏頭二枚炮 大棗二十枚 桂心二兩
右十六味切以水一斗二升煮取三升分三服增減量性服之忌羊肉餳海藻菘菜生葱生菜豬肉冷水酢物雜出第三卷中千金無遠志橘皮蜀椒烏頭有細辛五味子止十四味
千金療虛勞補養方

豬肚一具淨洗切　白术一升切

右二味以水一斗煮取六升分服一升日三忌桃李雀肉等

又方

豉二升蒸三斗米下　薤白一斤切

右二味以水七升煮取三升分三服取汗出第十九卷中

崔氏腎瀝湯療腎藏虛勞所傷補益方李子豫增損

羊腎一具切　黃耆二兩　乾薑四分　當歸二兩

甘草二兩炙　黃芩二兩　遠志二兩去心　五味子三合

芍藥三兩　澤瀉一兩　人參一兩　茯苓二兩

大棗二十枚擘　桂心二兩　防風二兩　麥門冬四兩去心

乾地黃二兩

右十七味切以水一斗九升先煮腎減四升即去腎入諸藥煮取三升二合絞去滓空腹分服八合日三忌生葱醋物海藻菘菜蕪荑等出第八卷中

文仲益州長史蔡淳妻褚氏所上補益方

蓯蓉　桂心　菟絲子酒漬　乾漆熬

蛇牀子各三兩並擣為末　生地黃一斤切以上好酒一斗漬之晝暴夜漬酒盡則止暴乾擣篩以和前藥

右六味蜜和丸如彈丸酒飲任下二丸嚼破日三稍云

奴年七十六患腰脚服之即差顏色如三十時常服者

覩滿背中忌生葱蕪荑出第二十九卷中

延年鍾乳散主補虛勞益氣力消食强腰脚無比方

鍾乳粉二分　防風一分　人參一分　細辛半分

桂心二銖　乾薑一銖

右六味為散分作三貼每日温酒服一貼食時服進食不用過飽亦不得饑日一服常飲酒令體中醺醺若熱須以冷水洗手面即定不用熱食亦不得大冷忌生葱生菜出第一卷中

又單服鹿角膠主補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健方

鹿角膠

右一味擣末以酒服方寸匕日三增至三匕效

又枸杞根釀酒療風冷虛勞方

枸杞根切一石五斗　鹿骨一具炙碎

右二味以水四石煎取六斗去滓澄清麴一斗須乾好糯米一石炊如常法造酒酒熟密封頭然後壓取清酒服之除風補益悅澤人無比

古今錄驗調中湯療虛勞補益氣力方

麥門冬半兩　乾棗一兩　茯苓半兩　甘草半兩炙

桂心半兩　當歸半兩　芍藥半兩

七味切以水八升煮取三升去滓分服一升日三忌

生葱海藻菘菜醋物

補益虛損方七首

延年常服枸杞補益延年方

春夏採苗葉如常食法秋冬採子實以九月十月採子

冬十月採根取皮作散任服至於造酒服餌各有

常宜及美謂爲妙

又生枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人方

枸杞子二升

右一味以上清酒二升搦碎更添酒浸七日漉去滓任

情飲之

又生地黃煎主補虛損填骨髓長肌肉去客熱方

生地黃汁五升 棗膏六合 白蜜七合 酒三升

羊牛酥四合 生薑汁三合 紫蘇子一升研以酒一升絞取汁

鹿角膠四兩炙末

右八味先煎地黃等三分減一內蜜酥以蜜調入膠末

候煎成以器盛之酒和服

又方

黃耆三分 人參三分 防風二分 茯神二分

甘草八分

右五味擣篩爲散內前煎中更練爲丸服之大效忌海

藻菘菜酢物張文仲同

又生地黃煎主補虛損填骨髓長肌肉去客熱方

生地黃汁五升 棗膏六合 白蜜一升 好酒七合

羊牛酥三合

右五味先煎生地黃汁如稠糖攪不停手次內棗膏蜜

酥如糖煎成可丸如彈丸日以酒服一枚日服漸至二

枚食訖以酒送含咽並得無所忌唯禁蕪荑蔣孝璋處

又地黃煎中加補益鎮心強志力方

鹿茸八分炙 人參六分 枸杞子十二分 茯神六分

乾薑三分 桂心三分 遠志二分去心

右七味擣篩細末取前地黃煎一升內藥臼中和擣令

可丸如梧子大每食前酒下三十丸日再服忌生葱大

酢張文仲處

又枸杞子煎方是西河女子神秘有驗千金不傳又名神

丹煎服者去萬病通知神理安五藏延年長生并主婦人

久無子冷病有能常服大益人好顏色年如十五時方

枸杞子三升 杏人一升去皮尖研 生地黃三升研取汁 人參十分

茯苓十分 天門冬半斤擣汁乾者末亦得 白蜜五升

牛髓一具無亦得 酥五升

右九味各別依法料理先煎汁等如稀餳內諸藥煎候
如神膏入水不散即成一服兩匙酒和服之忌鯉魚酢
物當合之時淨潔向善即得延年彊記益心力用王塌
日合雖此日復須天晴明無風雨成滿日大良文仲云
此藥性非冷非熱除風理氣鎮心填骨髓更於方內加
白朮令人能食將節既熱又非節日且可五分中合二
分多合恐難變服藥安穩續合不避忌桃李雀肉等張文
仲處出第二卷中

虛勞羸瘦方五首

病源夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精髓萎竭血
氣虛弱不能充盛肌膚故羸瘦也其湯熨鍼石別有正方
補養宣導今附於後養生方云朝朝服玉泉使人丁壯有
顏色去蟲而牢齒也（玉泉者口中唾也）朝未起早漱令滿口乃吞
之輒琢齒二七遍如此者三乃止名曰鍊精又云咽之三
過乃止補養虛勞令人強壯出第三卷中

崔氏地黃酒療虛羸令人充悅益氣力輕身明目方（蘇州刺史得効）

生地黃（肥大者一石二斗擣以生布絞取汁四斗四升）　杏人（一斗去尖皮雙人擣末）
大麻子（一斗熬擣末）　糯米（一石暴乾）　上麴（一斗五升暴乾細剉）

右五味先以地黃汁四斗四升浸麴候發炊米二斗作

[illegible]

飯冷暖如人肌酘麴汁中和之候飯消更炊米一斗作
飯酘如前法又取杏人麻子末各一升二合半和飯攪
之酘麴汁中待飯消依前炊米飯一斗以杏人麻子末
各一升二合半一如前法酘之凡如此可八酘訖待酒
發定封泥之二七日壓取清溫飲一升漸加至二升
日再服令人能食久飲之去萬病婦人服之更佳無子
者令人有子忌蕪荑

又療虛羸無比署蕷丸方

署蕷（二兩）　蓯蓉（四兩）　牛膝（二兩）　菟絲子（二兩酒漬）
杜仲（二兩）　五味子（十分）　澤瀉（二兩）　乾地黃（三兩）
巴戟天（二兩）　茯神（三兩本方作茯苓）　山茱萸（一兩）　赤石脂（二兩）

右十二味擣篩以蜜和丸如梧子食前以酒下二十丸
至三十丸日再夜一服無所忌唯禁大醋蕪荑蒜陳臭
物服之七日令人健四體潤澤唇口赤手足暖面有光
澤消食身體安和音聲清明是其驗十日後日長肌肉
其藥通中入腦鼻必酸疼不可怪若欲求大肥加燉煌
石脂二兩若失性健忘加遠志一兩少津液加柏子人
一兩一月許即充足

古今錄驗通命丸療虛勞百病七傷六極少氣羸弱不能
飲食方

茯苓六分　甘草六分炙　杏人六分去皮尖熬　牛膝七分
黃芩五分　阿膠三分炙　防風四分　乾天門冬六分去心
芍藥六分　大黃六分　當歸六分　乾薑六分
乾地黃七分　人參六分　桂心三分　乾漆四分熬
紫菀五分　白朮四分　蓯蓉五分　吳茱萸三分
蜀椒三分汗　石斛三分

右二十二味擣篩以棗膏蜜相拌和作丸食前服七丸日三不知漸增以知爲度病劇者夜更一服忌蕪荑鯉魚生葱海藻菘菜桃李雀肉酢等　出第二十五卷中

又療體虛少氣羸瘦不堪榮衛不足善驚胷膈痰冷而客

熱飲冷水飲食則心腹弦滿脾胃氣少不能消食或時衂血方

黃耆二兩　附子一兩炮　大棗十四枚　甘草二兩炙
蜀椒一兩汗　生薑六兩　芍藥二兩　茯苓二兩
當歸二兩　人參二兩　黃芩二兩　桂心二兩

右十二味切以水一斗煮取三升半去滓分五服日三夜一適寒溫忌海藻生葱菘菜猪肉冷水大酢

又療男子虛羸七傷八公散方

麥門冬去心　石韋去毛　五味子　茯苓
菟絲子酒漬　乾地黃　桂心

右七味等分擣篩爲散以飲服方寸匕日三後食二十日知三十日自任意欲行百里並得益顏色久服令人耐老輕身七十有子忌大酢生葱蕪荑　出第二十卷中

虛勞食不生肌膚方三首

范汪療男子七傷面目黃黑飲食不生肌肉手足惰疼少腹重急小便利方

石斛六分　山茱萸六分　肉蓯蓉六分　牛膝六分
五味子六分　附子四分炮　遠志六分去心　桂心四分
人參六分　茯苓六分　菟絲子八分酒漬　秦艽四分

右十二味擣篩爲散以酒服方寸匕日三食前服之忌

猪肉冷水生葱酢物　出第七卷中（一方無牛膝用草薢）

小品黃耆湯療虛勞胷中客熱冷澼痞滿宿食不消吐噫脅間水氣或流飲腸鳴不生肌肉頭痛上重下輕目視䀮䀮惚惚志損常躁熱卧不得安少腹急小便赤餘瀝臨事不起陰下濕或小便白濁傷多方

黃耆二兩　人參一兩　芍藥二兩　生薑半斤
桂肉三兩　大棗十四枚　當歸一兩　甘草一兩炙

右八味切以水一斗煮取四升分四服有寒加厚朴二兩忌生葱海藻菘菜　經心錄同出第三卷中

集驗淮南五柔丸療虛勞不足飲食不生肌膚三焦不調

大便秘澀此藥和腸藏并療癖飲百病方

大黃一斤　前胡二兩　茯苓一兩　細辛一兩

葳蕤一兩　半夏一兩湯洗　當歸一兩　葶藶子一兩熬

芍藥一兩

右九味擣篩蜜和擣萬杵丸如梧子食前以湯飲下五丸日再服加至十丸忌生菜酢物羊肉餳等延年崔氏同出第五卷中

長肌膚方三首

范汪大行諸散主羸中益氣補力不足長養肌肉通和百脉調利機關輕身潤澤安定五藏彊識不忘方

白防巳二兩　菴蕳子五兩　豬苓七兩　六安石斛二兩

占斯四兩一名良無極　鍾乳五兩研　蓯蓉七兩　麥門冬二兩去心

茯苓五兩　牡丹皮七兩　地膚子五兩　澤瀉二兩

桂心五兩　甘草五兩炙　白朮七兩　胡麻二升熬令香

當歸五兩　覆盆子五兩　薔薇五兩　牛膝三兩

八角附子三兩炮

右二十一味擣篩蜜一升生地黃汁三斤取汁合令相和微煎以和前藥丸如桐子大暴乾以酒湯飲下三十丸又和暴乾以作散服方七方云作散即恐不得丸忌豬肉冷水海藻菘菜生葱酢物胡荽桃李雀肉等出第七卷中

〇一方無暮用鬼蓋

延年服大豆法令人長肌膚益顏色填骨髓加氣力補虛又能嗜食瘦人服兩劑即令肥充不可識肥人不得服之方

大豆五升取肥好者一依作醬法料理取黃

右一味擣末以絹篩之以豬肪脂好銷鍊如法去滓以膏和豆末作團訖以油帛裹之著於磁器中收之一服如梧子五十丸細細加至一百丸日再服以酒飲任用下之一無所禁瘦人不過兩劑即大肥服十日已去食不知飽也秘驗神方

又甘草丸主安養五藏長肌肉調經脉下氣補脾胃益精髓令人能食彊健倍力方

甘草四兩炙　人參二兩　白朮二兩　芍藥二兩

黃耆二兩　遠志二兩去心　大麥糵二兩熬令黃

右七味擣篩為散以棗膏和蜜攪調和藥令成丸食後少時以酒或飲任下五丸如梧子漸加至七丸日再服長服勿絕盡即更合并止一劑即停多分兩恐難盡又壞分兩少服盡更常得新藥服忌海藻菘菜桃李雀肉並出第一卷中

腎氣不足方六首

深師療腎氣不足心中悒悒而亂目視䀮䀮心懸少氣陽氣不足耳聾目前如星火消疸疥一身悉痒骨中痛少腹拘急乏氣咽乾唇如膠顏色黑補腎方

磁石二兩研綿裹　生薑二兩　防風二兩　桂心一兩

甘草一兩炙　五味子二兩　附子一兩炮　人參二兩

牡丹皮三兩　大豆二十四枚

右十味切以水一斗二升先於銅器中揚三百過煮取六升去滓更煎取二升八合分為三服忌海藻菘菜豬肉冷水生葱胡荽等　出第十三卷中○一方無生薑有石膏　水二　千遲

小品增損腎瀝湯療腎氣不足消渴引飲小便過多腰背疼痛方

腎一具猪羊並得　遠志二兩　麥門冬一升去心　人參二兩

五味子二合　澤瀉二兩　乾地黃二兩　茯苓一兩

桂心二兩　當歸二兩　芎藭二兩　黃芩一兩

芍藥一兩　生薑五兩　棗二十枚　螵蛸二十枚炙

雞膍胵裹黃皮一兩

右十七味以水一斗五升煮腎取一斗三升去腎煎藥取三升去滓分三服忌生葱蕪荑酢物

又加減腎瀝湯療大虛內不足小便數噓噏焦熇引水漿膀胱引急方

腎一具猪羊並可用　遠志二兩去心　麥門冬一升去心　人參一兩

大棗四十枚　芎藭二兩　五味子二兩　當歸二兩

澤瀉二兩　桂心四兩　乾薑二兩　乾地黃三兩

黃芪二兩　桑螵蛸三十枚　龍骨二兩　甘草二兩炙

右十六味切以水一斗五升如常法煎取三升去滓分三服忌海藻菘菜生葱豬肉蕪荑等物

古今錄驗消腎湯療腎氣不足方

芒消二兩　礬石二兩熬汁盡　大豆一升

右三味以水三升煮取一升二合去滓分再服當快下　出第二十七卷中

又療丈夫腰脚疼腎氣不足陽氣衰風痺虛損傴僂諸不足腰背痛耳鳴小便餘瀝風虛勞冷腎氣丸方

羊腎二具炙　細辛二兩　石斛四兩　蓯蓉四兩

乾地黃四兩　狗脊一兩黑者　桂心二兩　茯苓五兩

牡丹皮二兩　麥門冬三兩去心　黃耆四兩　人參二兩

澤瀉二兩　乾薑二兩　山茱萸二兩　附子二兩炮

薯蕷二兩　大棗一百枚取膏和丸

右十八味搗篩以棗膏少著蜜合丸如梧子大以酒服二十丸漸加至三十丸日再服忌豬肉冷水生葱生菜

胡荽蕪荑酢物出第二十五卷中

經心録羊腎湯療腎氣不足耳無所聞方

羊腎一具 芎藭一兩 茯苓一兩 人參三兩

附子一兩（炮） 桂心二兩 牡丹皮一兩 磁石二兩

當歸二兩 乾地黃三兩 大棗五枚（擘） 牡荊子一兩（碎）

右十二味切以水一斗七升煮腎取一斗去腎煮取四升分四服晝三夜一忌豬肉冷水生葱胡荽蕪荑酢物出第四卷中

虛勞裏急方六首

病源虛勞則腎氣不足傷於衝脉衝脉爲陰脉之海起於

關元（穴在臍下）隨腹直上至咽喉勞傷內損故腹裏拘急也上部之脉微細而卧引裏急心膈上有熱者口乾渴寸口脉陽弦下急陰弦裏急故爲胃氣虛食難用飽飽則急痛不得息寸微關實尺弦緊者少腹腰背下苦拘急痛外如不喜寒身憒憒也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方云正偃卧以口徐徐內氣以鼻出之除裏急飽食後小嚥氣數十令溫寒者乾嘔腹痛從口內氣七十所大振腹小嚥氣數十兩手相摩令極熱以摩腹令氣下也出第三卷中

深師黃耆湯療大虛不足少腹裏急勞寒拘引臍氣上衝胸短氣言語謬誤不能食吸吸氣乏悶亂者方

黃耆三兩 半夏一升（洗） 大棗二十枚（擘） 生薑四兩

桂心四兩 芍藥四兩 人參二兩 甘草二兩（炙）

右八味切以水一斗二升煮取四升分四服日夜再若手足冷加附子一兩忌生葱海藻菘菜羊肉餳

又大建中湯療內虛絕裏急少氣手足厥逆少腹攣急或腹滿絃急不能食起即微汗出陰縮或腹中寒痛不堪勞苦脣口舌乾精自出或手足乍寒乍熱而煩苦酸疼不能久立多夢寐補中益氣方

黃耆四兩 人參二兩 大棗二十枚（擘） 當歸二兩

桂心六兩 生薑一斤 半夏一升（洗） 芍藥四兩

附子一兩（炮） 甘草二兩（炙）

右十味切以水一斗二升煮取四升分四服先服後食忌海藻菘菜生葱豬羊肉餳冷水等

又樂令黃耆湯療虛勞少氣胸心痰冷時驚惕心中悸動手足逆冷體常自汗補諸不足五藏六腑虛損腸鳴風濕榮衛不調百病又治風裏急方

黃耆二兩 當歸三兩 烏頭三兩（炮去皮尖四片入蜜炙之令黃焦）

桂心三兩 生薑四兩 蜀椒二兩（汗） 人參二兩

芍藥二兩 大棗二十枚（擘） 茯苓二兩 遠志二兩（去心）

半夏四兩洗

右十二味切以水一斗五升煮取四升分服八合日三夜再忌生葱羊肉餳猪肉冷水大酢 千金有橘皮細辛前胡甘草麥門冬無烏頭蜀椒建志爲十四味

集驗療虛勞裏急諸不足黃耆建中湯方

黃耆三兩 桂心三兩 甘草三兩炙 芍藥二兩

生薑四兩 大棗十二枚擘 飴糖一斤

右七味切以水一斗二升煮取六升去滓內飴糖令消適寒溫服一升間日可作嘔者倍生薑腹滿者去棗加茯苓四兩忌生葱海藻菘菜 古今錄驗同○此本仲景方恐是甘草二兩芍藥六兩生薑三兩也○通按當以此爲準與金匱方同

古今錄驗黃耆湯主虛勞裏急引少腹絞痛極攣卵腫縮疼痛方

黃耆三兩 甘草三兩炙 桂心二兩 芍藥六兩

生薑一斤 大棗十二枚擘 飴糖半斤

右七味切以水一斗二升煮取三升去滓內糖令消分服一升嘔即除飴糖忌海藻菘菜生葱

又黃耆湯療虛勞裏急少腹痛氣引胷脅痛或心痛短氣方

芍藥六兩 黃耆四兩 甘草二兩炙 桂心二兩

乾薑四兩 當歸四兩 大棗十二枚 飴糖六兩

右八味切以水一斗煮取三升去滓下飴糖令消分三服忌海藻生葱菘菜 並出第二十三卷中

虛勞心腹痛方二首

病源虛勞者臟氣不足復爲風邪所乘邪正相干冷熱擊搏故令心腹俱痛 出第三卷中

古今錄驗療虛勞腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥并婦人少腹痛芍藥湯方

芍藥六兩 桂心三兩 甘草三兩炙 生薑四兩

大棗十二枚擘 飴糖一斤

右六味切以水九升煮取三升去滓下糖分服七合日三夜一忌海藻菘菜生葱 范汪同仲景小建中湯方本云甘草二兩生薑三兩

、建中黃耆湯療虛勞短氣少腹急痛五藏不足方

黃耆三兩 甘草三兩炙 桂心三兩 生薑一斤薄切

飴糖半斤 大棗十二枚擘

右六味切以水一斗煮取三升去滓下糖溫服一升日三忌海藻菘菜生葱 並出第三卷中

虛勞偏枯方一首

病源夫勞損之人體虛易傷風邪風邪乘虛客於半身留在肌膚未即發作因飲水水未消散即勞於腎風水相搏

勞虛偏發風邪留止血氣不行故半身手足枯細爲偏枯也出第四卷中

古今錄驗主新飲水未散而交接令人偏枯身偏不足乾地黃丸方

乾地黃五分 乾漆四分熬 萆薢三分 防風二分 椒一分汗 附子二分炮 烏頭一分炮

右七味擣篩以蜜和丸如梧子每服三丸漸加至五丸酒下日三以知爲度忌蕪荑豬肉冷水出第二十四卷中

虛勞骨熱方二首

集驗枸杞湯療虛勞口中苦渴骨節煩熱或寒方

枸杞根白皮五升切 麥門冬一升去心 小麥二升

右三味以水二斗煮麥熟藥成去滓分服一升差止出第五卷中

古今錄驗療虛勞少氣骨節中微熱諸疼痛枸杞湯方

枸杞葉十斤 乾薑二兩 桂心一兩 甘草五兩炙 大麻子人二升

右五味切碎以河水三斗煮取九升去滓每服一升日三忌海藻菘菜生葱出第二十三卷中

虛勞虛煩不得眠方八首

病源夫邪氣之客於人也或令人目不得眠者何也五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉榮氣者泌其津液注之於脈化而爲血以營四末內注五藏六腑以應刻數焉衛氣者其出悍氣之慓疾而先行於四末分肉皮膚之間而不休息也晝行於陽夜行於陰其入於陰也常從足少陰之分行於五藏六腑今邪氣客於五藏六腑則衛氣獨營於外行於陽不得入於陰行於陽則陽氣盛陽氣盛則陽蹻滿不得入於陰陰氣虛故目不得眠也出第三卷中

深師小酸棗湯療虛勞不得眠煩不可寧者方

酸棗人二升 知母二兩 生薑二兩 甘草一兩炙 茯苓二兩 芎藭二兩

右六味切以水一斗煮酸棗人減三升內藥煮取三升分三服一方加桂二兩忌海藻菘菜酢物出第三卷中

小品流水湯主虛煩不得眠方

半夏二兩洗十遍 粳米一升 茯苓四兩

右三味切以東流水二斗揚之三千遍令勞煮藥取五升分服一升日三夜再忌羊肉餳醋物有半夏必須著生薑四兩不爾戟人咽不審古方何以如此今改正之

集驗療虛煩悶不得眠千里流水湯方

半夏三兩洗 生薑四兩 麥門冬三兩去心 酸棗人二兩

甘草二兩炙　桂心三兩　黃芩二兩　萆薢二兩
人參二兩　茯苓四兩　秫米一升
右十一味切以千里流水一斛煮米令蟹目沸揚之萬遍澄清一斗煮諸藥取三升分三服忌海藻菘菜羊肉餳酢物生葱
又煩悶不得眠方
生地黃五兩　香豉五合綿裹　人參一兩　粟米三合
茯苓四兩　知母四兩　麥門冬三兩去心　前胡三兩
甘草一兩炙　枸杞根皮五兩
右十味切以水八升煮取二升七合去滓分四服忌海藻菘菜蕪荑酢物

延年酸棗飲主虛煩不得眠并下氣方
酸棗二升　茯苓三兩　人參三兩　生薑一兩半
麥門冬一兩去心　橘皮二兩陳者　杏人二兩去皮尖碎　紫蘇二兩
右八味切以水七升煮取一升半分再服忌大酢
又酸棗飲療虛煩不得眠肋下氣衝心方
酸棗人一升　人參二兩　白朮二兩　橘皮二兩
五味子二兩　桂心一兩　茯苓二兩　生薑四兩
右八味切以水六升煮取二升半去滓分三服忌桃子雀肉生葱酢物蔣孝璋方

又酸棗飲主虛煩不得眠方
酸棗人一升　茯神二兩　人參二兩　生薑三兩
右四味切以水五升煮取一升二合去滓分再服忌酢物蔣孝璋處
又茯神飲療心虛不得睡多不食用此方
茯神四兩　人參三兩　橘皮二兩　甘草一兩半炙
生薑二兩　酸棗人一升
右六味切以水一斗煮取二升去滓分三服忌海藻菘菜酢物蔣孝璋處並出第十一卷中
病後不得眠方二首

病源大病之後腑藏尚虛榮衛未和故生冷熱陰氣虛衛氣獨行於陽不入於陰故不得眠若心煩而不得睡者心熱也若但虛煩而不得臥者膽冷也出第三卷中
集驗溫膽湯療大病後虛煩不得眠此膽寒故也宜服此湯方
生薑四兩　半夏三兩洗　橘皮三兩　竹茹二兩
枳實二枚炙　甘草一兩炙
右六味切以水八升煮取二升去滓分三服忌羊肉海藻菘菜餳出第五卷中
古今錄驗療虛勞客熱百病之後虛勞煩擾不得眠臥骨

旁熱面目青黃口乾煩躁僵怯悸所頂也切不自安短氣乏少食不得味縱食不生肌膚胸中痰熱煩滿憒悶大竹葉湯方

甘草二兩炙　小麥五合完用　黃耆二兩　人參二兩

知母二兩　大棗二十枚擘　半夏三兩洗　栝樓一兩

粳米一升　黃芩一兩　當歸二兩　生薑四兩

前胡二兩　芍藥二兩　麥門冬六合去心　龍骨三兩

桂心三兩　竹葉切一兩

右十八味切用東流水二升煮取五升去滓分服一升日三夜二不過兩劑如湯沃雪効忌海藻菘菜羊肉餳生葱

虛勞百病方五首

廣濟療虛勞百病腎瀝湯方

羊腎一具去脂切八片　茯苓三兩　五味子二兩

肉蓯蓉三兩　牛膝二兩　防風二兩　黃耆二兩

澤瀉二兩　五加皮二兩　地骨皮二兩　磁石六兩

桂心二兩

右十二味切以水一斗五升先煮腎取一斗去腎入諸藥煎取三升去滓分溫服服別相去如七八里久不利春夏秋三時並可服之忌生葱酢物油膩陳臭出第四卷中

古今錄驗彭祖丸無所不療延年益壽通耐歲安神魂寧心意固榮衛開益智慧寒暑風濕氣不能傷又療勞虛風冷百病方

栢子人五合　石斛二兩　天雄一兩炮　巴戟天三兩去心

續斷三兩　天門冬三兩去心　澤瀉二兩　菟絲子五兩

人參二兩　乾地黃四兩　署預二兩　遠志二兩去心

蛇牀子五合取人　鍾乳三兩研鍊成粉　覆盆子五合　蓯蓉六兩

山茱萸二兩　杜仲三兩　菖蒲二兩　五味子五兩

桂心四兩　茯苓二兩

右二十二味擣篩蜜和丸如梧子服八丸日再漸加至十丸本方與天門冬散方同但以覆盆子代菊花先服藥齋五日不食脂肉菜五辛菜宜以酒服勿令醉服二十日斷白髮三十日漸脫六十日服盡子白黑分明不復淚出溺血餘瀝斷八十日白髮變黑腰背不復痛行步腳輕百五十日都差意氣如年少時諸病皆除長服如神忌鯉魚生葱猪羊肉冷水酢物蕪荑餳

經心錄鍾乳散療傷損虛乏少氣虛勞百病令人丁壯能食去風冷方

鍾乳粉五分用　附子五分炮　白朮十四分　防風十分

牡蠣十分熬　栝樓十分　乾薑五分　桔梗五分

茯苓五分 細辛五分 桂心五分 人參五分

右十二味擣篩爲散以酒服方寸匕日二漸加至二匕忌食生菜生葱猪肉冷水桃李雀肉大酢

又更生散療虛勞百病方

防風十分 栝樓十分 鍾乳十分 赤石脂十分

海蛤十分 乾薑六分 白朮六分 桔梗五分

白石脂十分 細辛六分 人參五分 附子三分炮

桂心二分

右十二味擣篩爲散以酒服方寸匕日再服忌猪肉冷水生菜生葱桃李雀肉等 出第四卷中一方以一分半爲一劑以溫酒一劑日再

又陸抗膏療百病勞損傷風濕補益神効男女通服之方

猪脂二升 羊脂二升 牛髓二升煉成 白蜜二升

生薑汁二升

右五味先煎猪脂等次下薑汁又煎次下蜜復煎候膏成收之取兩匙溫酒服又一方加生地黃三升忌蕪荑 出第六卷中

虛勞陰痿方七首

病源腎開竅於陰若勞傷於腎腎虛不能榮於陰氣故痿弱也診其脉瞥瞥如羹上肥者陽氣微連連如蜘蛛絲者陰氣衰陰陽衰微而風邪入於腎經故陰不起或引少腹痛也養生云水銀不得令近陰令消縮 出第四卷中

廣濟療陰痿不起滴瀝精清鍾乳酒方

鍾乳三兩研絹袋盛 附子二兩炮 甘草二兩炙 當歸二兩

石斛二兩 前胡二兩 薯蕷二兩 五味子三兩

人參二兩 生薑屑一兩 牡蠣一兩熬 桂心一兩

菟絲子五合 枳實一兩 乾地黃五兩

右十五味切以絹袋盛清酒二斗漬之春夏三日秋冬七日量性飲之効忌海藻菘菜猪肉冷水生葱蕪荑生冷粘食等 出第四卷中

范汪療男子虛勞陰痿不起無子方

杜仲十分 蛇牀子八分 菟絲子五分酒漬 遠志五分去心

茯苓四分 天雄五分炮 澤瀉五分 石斛五分

蓯蓉四分 五味子四分

右十味擣篩爲散酒服方寸匕日再効忌猪肉冷水酢物 出第七卷中

側蓯蓉丸療痿弱益精氣男子服之外充婦人服之內補百病差方

鍾乳粉三分 萆薢三分 蓯蓉三分 乾地黃六分

薏苡人三分 菟絲子四分

右六味擣篩以雞子黃和丸如梧子酒服十丸漸

至二十九日再服忌蕪荑

又遠志丸療男子痿弱丸

續斷二兩 署預二兩 遠志二兩去心 蛇牀子二兩

肉蓯蓉二兩

右五味擣篩以雀卵和丸如小豆以酒下七丸至十丸百日知之神良

文仲療陰下濕痒又痿弱粉散方

白粉 乾薑 牡蠣各三分熬

右三味擣篩爲散欲卧時粉陰下至起亦粉粉盛疏布袋中撲之佳此大驗又方加麻黃根三兩

又方

礬石燒令汁盡 蛇牀子 黃連各三分

右三味爲散粉之同前

經心錄雄鷄散療五勞七傷陰痿十年陽不起皆繇少小房多損陽神女養母得道方

雄鷄十分熬 石斛二分 巴戟天二分 天雄二分炮

五味子二分 蛇牀子二分 署預二分 菟絲子二分

牛膝二分 遠志二分去心 蓯蓉五分

右十一味擣篩爲散以酒服方寸匕亦可丸服日三忌猪肉冷水出第四卷中

虛勞小便利方五首

病源此繇下焦虛冷故也腎主水與膀胱爲表裏膀胱主藏津液腎氣衰弱不能制於津液胞內虛冷水下不禁故小便利也出第四卷中

深師黃耆湯療虛乏四肢沉重或口乾吸吸少氣小便利諸不足方

黃耆三兩 茯苓二兩 桂心二兩 芍藥二兩

甘草一兩 半夏三兩洗 生薑五兩 當歸一兩

大棗三十枚 人參二兩 桑螵蛸二十枚熬兩片破

右十一味切以水一斗煑取四升分服一升忌海藻菘菜羊肉餳生葱大酢出第四卷中

又療虛勞腹滿食少小便多黃耆建中湯方

黃耆三兩 甘草三兩炙 大棗三十枚 桂心二兩

芍藥四兩 生薑四兩 人參一兩 半夏一升洗

右八味切以水一斗煑取三升去滓分三服忌海藻菘菜羊肉湯生葱古今錄驗同出第十九卷中

又阿膠湯療虛勞小便利而多有人虛勞服散又虛熱盛當風取冷患腳氣喜發動兼小便利脈細弱服此方利即減

阿膠二兩 乾薑二兩 麻子一升研碎 遠志四兩去心

附子一枚炮 人參一兩 甘草一兩炙
右七味切以水七升煑六味取三升去滓內滲烊消分三服一方云小便利多日夜數十行一石五斗者良忌猪肉冷水海藻菘菜

小品黃耆湯療虚勞少氣小便過多方

黃耆二兩 麥門冬二兩去心 大棗三十枚擘 芍藥二兩
乾地黃二兩 黃芩一兩 桂心二兩 生薑二兩
當歸二兩 甘草二兩炙

右十味切以水九升煑取三升去滓分三服忌海藻菘菜生葱蕪荑猪肉冷水 出第十卷二十一方有黃連一兩

必効療虚勞下焦虚冷不甚渴小便數黃耆建中湯方

黃耆三兩 桂心二兩 人參二兩 當歸二兩
芍藥三兩 生薑八兩 膠飴八兩 大棗三枚

右八味切以水一斗煑七味取三升去滓下飴烊銷分三服若失精加龍骨一兩白歛一兩忌生葱

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元較正
右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張 寔較勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十七卷 終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十八卷目録 脚氣上

脚氣論二十三首
脚氣服湯藥色目方一十九首
脚氣不隨方五首
風毒脚弱痺方六首
大小續命湯中風方二首
不仁不能行方三首
因脚氣續生諸病方四首
大法春秋宜服散湯方六首
脚氣嘔逆不下食方二首

脚氣疼不仁方二首
脚氣衝心煩悶方二十二首
嶺南瘴氣脚氣酒湯散方一十三首

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

腳氣論二十三首

千金論曰考諸經方往往有腳弱之論而古人少有此疾自永嘉南渡衣纓士人多有遭者嶺表江東有支法存仰道人等並留意經方偏善斯術晉朝仕望多獲全濟莫不由此二公又宋齊之間有釋門深師師仰道人述支法存等諸家舊方為三十卷其腳弱一方近百餘首魏周之世

蓋無此病所以姚公集驗殊不殷勤徐王撰錄未以為意特以三方鼎峙風教未一霜露不均寒暑不等是以關西河北之人不識此疾自聖唐開闢六合無外南極之地襟帶是重爪牙之寄作鎮於彼不襲水土往者皆遭近來中國士大夫雖不涉江表亦有居然而患之者良由今代天下風氣混同物類齊等所致之耳然此病初得即先從腳起因即脛腫時人號為腳氣深師云腳弱者即其義也深師述支法存所用永平山敷施連范祖耀黃素等諸家療腳弱方凡八千餘條皆是精要學者尋覽頗覺繁重正是方集耳卒欲救急莫測指南今取其所經用灼然有効者以備倉卒餘者不復具述

論何以得之於腳

問曰風毒中人隨處皆得作病何偏著於腳也答曰夫人有五藏心肺二藏經絡所起在手十指肝腎與脾三藏經絡所起在足十指夫風毒之氣皆起於地地之寒暑風濕皆作蒸氣足當履之所以風毒之中人也必先中腳久而不差遍及四肢腹背頭項也微時不覺痼滯乃知經云次傳間傳是也

論得已便令人覺否

凡腳氣病皆由感風毒所致得此病多不令人即覺會因

他病一度乃始發動或奄然大悶經三兩日不起方乃覺之諸小庸醫皆不識此疾謾作餘病療之莫不盡斃故此病多不令人識也始起甚微食飲嬉戲氣力如故唯卒起腳屈弱不能動有此為異耳黃帝云緩風濕痺是也

論風毒相貌

夫有腳氣未覺異而頭項臂膊已有所苦有諸處皆悉未知而心腹五內已有所困又風毒之中人也或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下痢或大小便秘澀不通或胸中衝悸不欲見光明或精神惛憒或喜迷忘語言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺轉筋或腳脛腫或不腫或髀腿

頑痹或時緩縱不隨或復百節攣急或少腹不仁此皆脚氣狀貌也亦云風毒脚氣之候也其候難知當須細意察之不爾必失其機要一朝病成難可以理婦人亦有又有婦人產後春夏取涼多中此毒宜深慎之其熱悶掣疭驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也又但覺臍下冷痞愊愊然不快兼小便淋瀝不同生平即是脚氣之候頑弱名緩風疼痛爲濕痹

論得之所由

凡四時之中皆不得久立久坐濕冷之地亦不得因酒醉汗出脫衣靴襪當風取涼皆成脚氣若暑月久坐久立濕

地者則熱濕之氣蒸入經絡病發必熱四肢酸疼煩悶若寒月久坐久立濕冷地者則冷濕之氣上入經絡病發則四體酷冷轉筋若當風取涼得之者病發則皮肉頑痹諸處瞤動漸漸向頭凡常之日忽然暴熱人皆不能忍得者當於此時必不得頓取於寒以快意也卒有暴寒復不得受之皆生病也世有勤功力學之士一心注意於事久坐行立於濕地不時動轉冷風來擊入於經絡不覺成病也故風毒中人或先中手足十指因汗毛孔開腠理疏通風如擊箭或先中足心或先中足趺或先中膝以下腨脛表裏者若欲使人不成病者初覺即灸所覺處三二十壯因此即愈不復發也黃帝云當風取涼醉已入房能成此疾

論冷熱不同

問曰何故得者有冷有熱答曰足有三陰三陽寒中三陽所患必冷暑中三陰所患必熱故有表裏冷熱不同熱者療以冷藥冷者療以熱藥以意消息之脾受陽毒即熱頑腎受陰濕即寒痹

論須療緩急

凡小覺病候有異即須大怖畏決意療之傷緩氣上入腹或腫或不腫胸脅逆滿氣上肩息急者死不旋踵寬者數日必死不可不急療也但看心下急則氣喘不停或白汗

數出或乍寒乍熱其脈促短而數嘔吐不止者皆死也

論脈候法

凡脚氣雖復診候多塗而三部之脈要須不違四時者爲吉其逆四時者勿治餘如脈經所說此中不復具載其人本黑瘦者易治肥大肉厚赤白者難愈黑人耐風濕赤白不耐風瘦人肉硬肥人肉軟肉軟則受疾至深難已也

論腫不腫

凡有人久患脚氣不自知別於後因他病發動療之得差後直患嘔吐而復脚弱余爲診之乃告爲脚氣病者曰我平生不患脚腫何因名爲脚氣不肯服湯餘醫以爲石發

狐疑之間不過一旬而死故脚氣不得一向以腫爲候有腫者亦有不腫者其以小腹頑痺不仁者脚多不腫小腹頑後不過三五日即令人嘔吐者名脚氣入心如此者死在旦夕凡患脚氣到心難治以其腎水剋心火故也

論須愼不須愼

凡脚氣之病極須愼房室羊肉牛肉魚蒜蕺菜菘菜蔓菁瓠子酒麪酥油乳糜猪雞鵝鴨有方用鯉魚頭此等並切禁不得犯之并忌大怒唯得食粳米粱米粟米醬豉葱韭薤椒薑橘皮又不得食諸生果子酸酢之食犯之者皆不可差又大宜生牛乳生栗子

論善能療者幾日可差

凡脚氣病枉死者衆略而言之有三種一覺之傷晩二驕很恣傲三狐疑不決此之三種正當枉死之色世間雖有良醫而病人有性靈堪受入者更復不少故雖有驥騄而不遇伯樂雖有尼父而人莫之師其爲枉横亦猶此也今有此者有受入性依法使余療之不過十日可得永差矣若無受入性者亦不須爲療縱令療之恐無差日也非但脚氣諸病皆然良藥善言觸目可致不可使人必服法爲信者施不爲疑者說 出第七卷中

病源凡脚氣病皆由感風毒所致也得此病者多不即覺或先無他病而忽得之或因衆病後得之初甚微飲食嬉戲氣力如故當熟察之其狀自膝至脚有不仁或若痺或淫淫如蟲所緣或脚指及膝脛洒洒爾或脚屈弱不能行或微腫或酷冷或痛疼或緩縱不隨或攣急或有至困能飲食者或有不能者或見飲食而嘔吐惡聞食臭或有物如指發於腨腸逕上衝心氣上者或舉體轉筋或壯熱頭痛或胷心忪悸寢處不欲見明或腹內苦痛而兼下者或語言錯亂有善忘誤者或眼濁精神惛憒者此皆病之證也若療之緩便上入腹入腹或腫或不腫胷脇滿氣上便殺人急者不全日緩者或一二三月初得此病便宜速療

之不同常病也病既入藏其脉有三品內外證候相似但脉異耳若病人脉得浮大而緩宜服續命湯兩劑若風盛宜作越婢湯加朮四兩若脉轉駃而緊宜服竹瀝湯若脉微而弱宜服風引湯二三劑此皆多是因虛而得之若大虛乏短氣可間服補湯隨病體之冷熱而用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駃此是三品之中最惡脉也脉或沈細而駃者此脉正與浮大而緊者同是惡脉浮大者病在外沈細者病在內療亦不異當消息以意耳其形或尚可而手脚未及至弱數日之內上氣便死如此之脉急服竹瀝湯日服一劑湯勢常令相及勿令半日之內

空無湯也若服竹瀝湯得下者必佳也此湯竹瀝多服之皆須熱服之不熱輒停在胸膈更為人患若已服數劑病及脉勢未折而若脹滿者可作大鱉甲湯下之湯勢盡而不得下者可以丸藥助令得下下後更服竹瀝湯趣令脉勢折氣息料理乃佳江東嶺南土地卑下風濕之氣易傷於人初得此病多從下上所以脚先屏弱然後轉氣循經絡漸入臟藏臟藏受邪氣便喘滿以其病從脚起故名脚氣其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云坐兩足長舒自縱身內氣向下使心內氣柔一作和適散然後屈一足安膝下努長舒一足仰取指向上便急

仰眠頭不至席兩手急努向前頭向上努挽一時各各取勢來去二七遞互亦然去脚疼腰髀冷血冷風痺日日漸損又云覆卧傍視內踵生腰以鼻內氣自極七息除脚中弦痛轉筋脚酸疼脚痺弱又云舒兩足坐散氣向涌泉可三通氣徹到始收右足屈捲將兩手急捉脚涌泉挽足踏手手挽足踏一時取勢手足用力送氣向下三七不失氣數尋去腎中冷氣膝冷脚疼又云一足屈之足指仰傒急一足安膝頭散心兩足跟出氣向下一手拓膝頭向下急捺一手向後拓席一時極勢左右亦然二七去膝痺疼急又云一足踏地一足向後將足解谿安腨上急努兩手偏相向後側身如軒極勢二七左右亦然去足疼痛痺急腰痛出第十三卷中

吳氏竊尋蘇長史唐侍中徐王等脚氣方身經自患三二十年各序氣論皆有道理具述灸穴備說醫方庶言總試但有効驗凡家傳用實愈非虛今撰此三本勒為二卷色類同者編次寫之仍以朱題蘇唐徐姓號各於方論下傳之門內以救疾耳

蘇長史論曰脚氣之為病本因腎虛多中肥溢肌膚者無問男女若瘦而勞若肌膚薄實皮膚厚緊者縱患亦無死憂一差已後又不可久立蒸濕等地多飲酒食麪心情憂

悒亦使發動晉宋以前名為緩風古來無脚氣名後以病從脚起初發因脚腫故名脚氣也又有不腫而緩弱行卒屈倒漸至不仁毒氣上陰攻心便死急不旋踵寬延歲月耳然則緩風毒氣得其總稱矣近來諸醫多宗小品所說此論詳悉而因循舊貫煩為脹枉肘後單略殊有可依集驗亦遵小品胡洽陶公微在梗槩並非身以經患不能原始要終也今略述病有數種形證不同一人經病三十年中便數發每發差異為療亦殊前用經効後用便增一旬之內變候不等未能深達往往致斃固不可先方救後發近鄙年二十許時因丁憂得此病三十年中已經六七度

發再發幾死後發時大況雖同三分論之二分作以此疾漸
用差方療不復有効更張乃要異一分同者身氣冷後于
足緩弱頑痺不仁服側子金牙酒往往得差此自脚氣之
要也余製以加痰歷不能動搖服之捐擲取起二分異者
毒氣入腹冷熱不同已經投藥虛實亦異或補或瀉須臨
時變革也按小品集驗脚氣脉三種以緩脉爲輕沉緊爲
次洪數者爲下自三十年凡見得此病者皆脉沉緊者
多死洪數者並生緩者不療自差人況如此疾之進法雖
輕亦殆療之得理雖重可生也凡脚氣爲疾不同餘病風
毒不退未宜停藥比見病者皆以輕疾使棄或以病小則

言疾自愈廢棄不服或已服藥而患未退諸藥病相違乃
更爲他療皆自取危殆如之何略述所知以示同病者
若能凡脚氣病多以春末夏初發動得之皆因熱蒸情地憂
憤春發如輕夏發更重入秋少輕至冬自歇大約如此亦
時有異於此候者近入京以來見在室女及婦人或少年
學士得此病者皆以不在江嶺庸醫不識以爲他病皆錯
療之多有死者風氣遊行天下遍有非獨江嶺閩也既婦
人亦病又非由腎虛而得卑濕之土斯病尤衆不爲此療
寃死極多深用哀悼無如之何夫療脚氣者須順四時春
秋二時宜兼補瀉夏時疾盛專須汗利十月以後乃用補

藥雖小小變通終不越此法或有凡人曾以夏時見患汗
利稍差冬時遇病遂令汗利冬時見患用補藥得除夏時
遇病遂用補藥此並下愚學問可之醫者雖寒疾勿之必
搦有致死之効恨未深達以外亡療又如野獸以發入乎
今錄此方並經試驗患者披覽皆如自療少有益効殊勝
庸醫也宇當傳之以濟危殆矣
蘇凡脚氣病雖若虛羸要不可補之補藥唯冬月酒中
用之丸散亦不可補服之驗服之腫不差唯見有丸用葶
藶子大黃乃往耳庸醫多不曉此謂爲腎虛多將補藥有
不差制而斃也古方多用風引續命湯療之得十愈一二

若氣毒少而風多者若以療脚氣法用療風則十愈八九
矣如常病用藥終無不差脚氣非他病若不肯療盡自取
死非病能殺人也若在遠無藥物處病毒深其又不能差
病者不論耳中華足藥病不自衣而後死者亡可痛哉
療夫脚氣病不可常服補藥補藥多令拔脹緊實皆此也
每月之中須五六度行利爲佳縱常服藥時時取利亦宜
時取汗當候冷熱隨時消息不可專一法覺熱須日乾頭
面熱則自須取冷覺頑痺不仁身體強屈令痰者使緩將
息此並可解辛常飲酒作散酒服之大勝風濕兼利腰脚
覺日夜多則須力散遊舒暢情性以勿睡也

緣諸毒氣所攻攻內則心急悶不痛至死若攻外毒出皮
膚則不仁不仁者胥痹之等若未攻皮膚毒氣行則痛者
隨痛處急宜灸三五炷即差不必要在孔穴也其方療法
物處急宜灸之腹背下足諸腳穴皆能療此病則以空鍼
正文但隨所苦火文徹處痛便消散此不可不知也又候
灸瘡差後瘢色赤白平復如本則風毒盡矣若色青黑者
風毒未盡仍灸勿止待瘢體轉乃休矣
薛療腳氣不可合補當依前論隨四時候病虛實療之常
宜食犢肉猪蹄鯽魚鱧魚猪兔肉葱芥薤葵等菜其肝食
法先湯中浸之使絕熟作鱠切以醬汁和水并著一抄米

豉椒煮令極熟每食下飯大補益消得腳氣生薑蒜或當
食大佳不宜食麪及羊肉蘿蔔蔓菁韭酒醉房室久立冷
濕船行水氣夏月屋中眠氣熱氣勞劇哭泣憂憤如此等
類好使氣發也初以微發即服藥散以壓之取消散不必
日別二三服量病輕重日一服或二日一服以攘毒耳若
毒氣盛非煮散所能救者急服麻黃等湯也毒氣既退唯
若頑痺兩腳緩弱十月服側子酒不至三劑皆即能行
蘇凡腳氣復發或似石發惡寒壯熱頭痛手足冷或似瘧
發發作有時又似傷寒脉甚洪急七日以後壯熱便定則
腳氣狀見也冷毒盛服即服金牙酒熱盛服紫雪平

平服者單用檳榔飲子亦差患腳氣人遠行在家常有金
牙紫雪不虞病發便能起死諸大湯藥卒求難濟
蘇凡腳氣虛病猶在皮膚毒未入者可服三五劑大小竹
瀝湯唯宜多熱者大小續命湯時宜可用不宜多至十劑
也石斛酒及鍾乳酒惡於側子百倍須鍊小石斛散及鍾
乳散宜多冷者猶不如側子酒中加鍾乳一二十兩白石
英一二斤合漬服之其力數倍兩腳緩弱者服之百日皆
起行消息腳氣法依此消息必得氣愈第一忌嗔嗔即心
煩煩即腳氣發第二忌大語大語即損肺肺損亦發動
又不得露腳當風入水以冷水洗腳腳腿尤不宜冷雖暑

月常須著綿袴至冬寒倍令兩腿溫暖微有汗是大佳依
此將息氣漸薄損每至丑寅日割手足爪甲丑日指寅日
足亦宜十二日一度割少使肉去氣又數須用梳櫳頭每
梳欲得一百餘梳亦大去氣每旦長跽腳坐手攀腳七度
虛攀一度令手著腳指漸至腳心腳極踏手極攀每日如
此腳氣亦不傷人
雷若頭面及項少似熱氣上即露背膊取冷勿使腰腎冷
其有膊冷極厚著衣須如此姑息必漸差若不解將息立
見危殆困篤轉加易發致損性命洗面及腳皆須熱湯小
添冷水洗之又不得食酸飯不用乘馬若能步行勞筋力

其脚氣自然漸差
唐凡脚氣病人不能永差至春夏還復發冬夏所勝理須
不宜卧睡睡覺令人按摩勿使邪氣稽留數勞動關節常
令通暢此並養生之要拒風邪法也每食後行
五百步罷倦便止此脚中惡氣隨即下散雖浮腫氣不能
上也 出上卷中

服湯藥色目方一十九首

千金風毒之氣入人體中脉有三品內外證候相似但脉
有異耳若脉浮大而緩宜服續命湯兩劑應差若風盛宜
作越婢湯加朮四兩若脉浮大而緊轉駃者宜服竹瀝湯

若病人脉微而弱宜服風引湯兩劑應差此人脉多是因
虛而得之若大虛短氣力乏可其間作補湯隨病冷熱而
用之若未愈更服竹瀝湯若病人脉浮大而緊駃此是三
品之中最惡脉也脉或沉細而駃者此脉正與浮大而緊
者同是惡脉浮大者病在外沉細者病在內治亦不異但
當消息以意耳其形尚可而手脚未及至弱數日之中氣
上便終如此之脉往往有人得之無一存者急服竹瀝湯
日服一劑切要湯勢常令相及勿令半日之中空無湯也
此湯竹汁多服之若不極熱輒停在胸心更為人患每服
皆使極熱若服竹瀝湯得下者必佳也若已服三劑竹瀝

湯病及脉勢未折而若脹滿可以大鼈甲湯下之湯勢
盡而不得下可以丸葶藶湯令得下下後更服竹瀝湯趣
令脉勢折氣息料理便停得服三十二物八風散佳又初
得病便摩野葛膏日再頑痺脚弱都愈乃止若服竹瀝湯
脉勢折如未病時氣力轉弱脚故未能行體力充足然後
漸微行步病重者瘥後半年始能扶人行耳既覺脚弱便
內先但當急服八風散勿以脚未能行輒加餘療余療未
必得差更生諸惡失此諸家也被人道亦勿行野葛膏有
人脚竹瀝湯即云恐傷腸脚者即勿與療宜知此法人無
又八症者不可壓故也不為疑者說此之謂也竹瀝湯有

三首初得者服前方重者次第服後方此風毒乃相注易病
人宜將空缺服小金牙散以少許塗鼻孔耳門病困人及
新亡人喜易人強健人宜將服之亦以塗耳鼻乃可臨近
亡人及視疾者絳囊帶一方寸匕男左女右臂上此散毒
服宜從少始 金牙散方在第十二卷中
凡人常宜服赤小豆飲冬服側子金牙酒續命湯療風毒
病初得似天行毒病而脉浮緩終不變駃此不療或數日
而死或十日而死或得便不識人或發黃或發斑二日赤
或下部穿爛或腿膝穿潰者此最急得之即先服續命湯
一劑須服葛根湯麻黃湯下之若故不折更與續命湯兩

二劑必差此病大急令湯勢相接不可使半日闕湯即傷
殺人
又第一竹瀝湯療兩脚痺弱或轉筋皮肉不仁脹起如腫
按之不陷心中惡不欲食或患冷方
甘草三兩炙　秦艽一兩　葛根一兩　附子二枚炮
黃芩一兩　麻黃一兩去節　防已一兩　杏人五十枚
防風一兩　升麻一兩　茯苓三兩　細辛一兩
竹瀝九升　桂心一兩　乾薑一兩
右十五味切以水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗
忌海藻菘菜猪肉酢物生菜生葱 翼方無茯苓杏人有白朮

又第二大竹瀝湯療卒中風口噤不能語言四肢緩縱偏
痺攣急痛風經五藏恍惚恚怒無常手足不隨方
竹瀝一斗四升　獨活二兩　芍藥二兩　桂心二兩
防風二兩　麻黃一兩去節　白朮二兩　葛根二兩
生薑三兩　茵芋二兩　細辛二兩　茯苓三兩
防已一兩　烏頭一枚炮　人參一兩　石膏一兩
黃芩二兩　芎藭二兩　甘草二兩炙
右十九味切以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗
一狀相當即服忌同 翼方無白朮
又第三竹瀝湯療風毒入人五內短氣心下煩熱手足煩
疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方
當歸二兩　防風三兩　生薑八兩　白朮三兩
人參二兩　黃芩二兩　芎藭二兩　細辛二兩
桂心二兩　茯苓三兩　甘草二兩炙　附子二枚炮
秦艽三兩　葛根五兩　升麻二兩　麻黃二兩去節
蜀椒一兩汗
右十七味切以竹瀝一斗九升煮取四升分五服忌
同 翼方有芍藥防已黃耆無茯苓黃芩芎藭升麻蜀椒麻黃生薑當歸七物
千金翼療脚氣常作穀白皮粥防之法即不發方
穀白皮五升切勿取斑者有毒

右一味以水一斗半煮取七升去滓煮米粥常食之 出第
十六卷中
崔氏療脚氣夏月須食瓜及瓜飲子方
生瓜一枚去蒂四破以水五升煮令爛去滓　白朮二兩　生薑一兩
右三味切二物以前汁煮取二升去滓分三服空食桃
李雀肉等 生瓜恐是木瓜出第六卷中
又療脚氣毒遍內外煩熱口中生瘡者方
服紫雪強人服如兩棗大弱者減之和水服當利熱
毒若經服石發熱毒悶者服之如神 勝三黃湯十劑
備急同

又若冷服毒悶方
服金牙散以湯如桃李許和散如棗核大服不過再服
利及吐者一服四分七用之若神良備急同並出第九卷中
必効療脚氣方
蒼耳子五升　赤小豆二升　鹽一斤
右三味以水一石五斗緩火煎取五六斗去滓別貯取
受斗半鐺於前泥門面闊一尺入火處鐺內暫所煎汁
用浸脚纔令沒踝鐺下俟著火常令溫溫如汁漸盡
不沒踝續續添使沒踝仍於密房中牀前遮閉為垂
腫悉風不能久坐之仰臥亦得適夜從之隨性淺經三

日外其欲食飲常若與便食任食服一劑藥汁盡必差
不過用半汁即可覺漸可一日兩日食一頓生猪肉膾
大精此方甚効
又方
取上好椒未經研者取一大斗分為兩袋袋以布作
長八寸椒須滿實勿使虛即以醋漿水三大升鹽一
大升內在漿中即煮椒袋可經十餘沸即止其鐺釜
底仍微著火勿使冷又取冷醋漿一大升安貯盆中
即取前件袋一枚內於冷漿盆裹患人於牀上坐垂
脚牀下盆安地上將兩脚踏盆中熱袋上其椒袋冷

熱令可忍覺椒袋如冷即換取釜中熱袋還從前盆
中以脚踏之如冷還於舊釜中以火溫使熱更互用
之其牀前可垂氈席到地勿使風吹脚如雨汗至膝
以來痺風如蟲行頭項及四肢身體總於腹中如雷
鳴氣下即休踏椒袋得汗開發心氣悶可取冷飯嚼
三五口以鹿脯下勿食猪羊肉等以與錢又不得食
麪於如須和羹可以蘇和漿生薑合皮啖麵餅蒜韭
等皮脂等並得食踏袋得汗已後覺微利勿怪之此
是疏泄通瀉之候若不差隔日三日二遍取舊湯袋
依前法踏之得汗還止覺腹中緩空能食起即停如

未覺損終而復始以差為度白英葉膏服之亦可不
相妨
又方
白椹桑葉切細取大斗一石如無葉即取軟條還細
剉取一石以清水一石五斗於一釜中和上件一石
白桑椹葉即火煮使常滿其湯可有五斗許即漉却
葉更煎可有二斗以來移於鐺中又煎取三升以下
二升以上似稠餳即止每旦空腹服一匙至日晚又
服一匙如嘔不能下可和羹和粥和食能與不嘔能
服一七日以上即覺四肢通暢下泄氣泄氣以後兩

腳腫勿怪此得藥力是病差候此法已經療五六十人以上與種神効

又方

大半夏三兩淨削去皮　生薑汁三升

右二味水五升煮取二升去滓空腹一服隔日一劑三劑必好禁羊肉餳此方梁公家出方神有奇異神効並出第三卷中

蘇恭云凡患脚氣每旦早食任意飽午後少食日晚不食彌佳如饑可食豉粥若暝不消及喫難消之物致霍亂轉筋十不一活若曉食不消欲致霍亂者方

高良薑一兩打碎

右一味以水三升煮取一升頓服盡即消待極饑乃食一椀薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑取母薑一兩切之以清酒一升煮令極熟并滓飲之雖不及高良薑亦大驗

又若已覺者脚氣宜服此方

蒜三升去心切熬令黃色　桃人一升去皮尖雙人熬令紫色　豉一大升熬令香

右三味合和生絹袋盛以美酒一斗漬之夏月三日冬月七日初服半升漸加至二升量增減若盡更著五升美酒漬飲之加椒一二合尤妙

又方

香豉一升小便一升和清少時令有潤色去滓平旦空腹服三日一停三日復作服以差為度

又紫雪療脚氣毒遍內外煩熱口中生瘡狂易叫走及解諸石草熱藥毒發邪熱卒黃等瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五注心腹諸疾絞刺切痛蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病最良方

黃金百兩　寒水石三斤　石膏三斤　磁石三斤

滑石三斤　玄參一斤　羚羊角屑五兩　犀角屑五兩

升麻一升　沉香五兩　丁子香一兩　青木香五兩

甘草八兩炙

右十三味以水一斛先煮五種金石藥得四斗去滓後內八物煮取一斗五升去滓取消石四升芒消亦可用朴消精者十斤投汁中微炭上煎柳木篦攪勿住手有七升投在木盆中半日欲凝內成研朱砂三兩細研麝香當門子五分內中攪調寒之二日成霜雪紫色病人強壯者一服二分當利熱毒老弱人或熱毒微者一服一分以意節之合得一劑支十年許用大神妙不用餘論熱氣病經服石藥發熱毒悶者服之如神水和四分服勝三黃湯十劑以後依舊方用麝香丸下脚氣或熱脹留

用不如金牙散忌海藻菘菜生血物等

又金牙散方此方並要

金牙研　曾青研　礜石研尼裴燒半日　丹砂研

雄黃研　朴消研　寒水石研　代赭研

龍骨研　羊角屑　鼉甲炙　鸛骨炙

狸骨炙　巴豆去心皮熬別研　大黃　野葛皮炙各三分

牛黃別入　麝香別研　升麻　桂心

附子生去皮別　鬼臼　鬼督郵　貫衆

鳶根本草有鳶尾則云鳶根是用鳶尾之根也　青木香

蜥蜴炙　蘇合香別研入　常山　茯苓

黃耆　知母　龍膽各二分　露蜂房

玉支　茵草一本作茵芋　鬼箭羽　徐長卿

石長生　蜀漆　當歸　桔梗

白薇各一分　蜈蚣一枚炙　蜥蜴一枚炙　芫青炙

地膽炙　亭長炙各三十九枚　椒四十九枚汗

右四十九味合擣爲散以湯如桃李許和散三分匕或如棗核服之常患者日再服平患取利吐者服四分匕若以絳袋盛方寸匕三七帶之辟諸惡厲忌食生冷醋笋生葱菜猪肉冷水酢物陳臭生血等物合藥用臘月子祖日勿令穢汚風見之以臘紙裹得二年用此藥能冷熱能虛實說其功効卒不盡矣

凡服藥散酒丸等但所服者衆家効者寡或五藏證候不同七情有所乖舛分兩參差冷熱有異故陶隱居云醫者意也古之所謂良醫蓋以其意量而得其節是知療病者皆意出當時不可以舊方醫療今之人或異於此病勢少與方題似便即以和合病機未察於候宜然大同小異致令乖舛寔取危殆如之何又云代無良醫枉死者半此之一言深可悲也凡患脚氣者雖苦虛羸不得多服補藥服之臨脹非瀉不差但益虛羸也唯冬月得用補藥如冬月仍患氣不除者亦不得服可斟酌此大都患氣毒常須微

利但不得大利益虛耳凡脚須至冬則定者多所以然冬腎王王則不受邪所以腰脚得利也凡此有五種冷脚氣純脚氣平平脚氣大虛脚氣大實脚氣或患變作五者冷者專瀉疏兼療風毒者患脚氣乃似傷寒參差危殆深須隨識若不通博不宜爲金牙散功少大猛就中姑息兼治療蠱毒注忤鬼魅邪道肺痿骨蒸傳屍相易爲第一藥用物既多斟酌用悉要者乃爲施功少合之須得真好決得差不要盡劑用之並出第一卷中

近効療脚氣方

附子五兩炮　甘草五兩大炙

右二味並細剉以木五斗煎取二十斗置盆中以版子
閣三十許橫湯上共水面平脚踏版上以湯捋脚水冷
即休此湯得四五度用即氣未除此方極驗

又桑煎療水氣肺氣癖腫兼風氣方

桑條二兩炒用

右一味細剉如豆以水一大升煎取三大合如欲得多
造准此增加先熬令香然後煎每朝空腹或茶湯
或羹粥每服半大升亦無禁忌

又本方云桑枝平不冷不熱可以常服療遍體風痒乾燥
脚氣風氣四肢拘攣七氣眼暈肺氣欬嗽消食利小便久

服輕悅耳目令人光澤兼療口乾仙經云一切仙藥不得
桑枝不服出抱朴子

桑枝細剉一小升

右一味熬令香以水三大升煎取二大升一日服盡無
問食前後此服只依前方

脚氣不隨方五首

崔氏側子酒療脚氣不隨方

側子四兩炮 生石斛八兩碎 磁石八兩 獨活三兩
秦艽三兩 甘草三兩炙 紫蘇莖一握 前胡四兩
防風三兩 茯苓八兩 黃芩三兩 五味子三兩
防己三兩 桂心二兩 丹參三兩 蜀椒一兩出汗
山茱萸四兩 芍藥二兩 細辛二兩 當歸三兩
白朮四兩 乾薑三兩 薏苡人一升三合

右二十三味㕮咀切以絹袋盛以清酒四斗漬五日一服四
合日再稍稍加至八九合溫飲常令酒氣相接其中
間覺熱渴得飲豉粥仍須蒸暴之忌海藻菘菜桃李
雀肉生葱生菜及酢物等

又遺散方

地骨皮十二分 麻黃六分去節 杏人八分去皮尖兩人
防己二十分 黃芩十分 羚羊角八分屑 茯苓十二分

澤瀉六分 細辛五分 薏苡人二十分 石斛二十分
人參六分 白朮十分 大黃六分 磁石二十分
丹參十分 犀角八分屑 蒺藜子十二分 甘草十分炙
桂心六分 生薑十二分 前胡六分

右二十二味擣以釅醋篩度攪使極調三兩爲一劑以
後藥汁二升煮取一升頓服之日服一劑以小便利爲
度忌海藻菘菜生葱菜桃李雀肉醋等物

又小飲子法用煮前散

大棗五枚擘 桑根白皮五兩 白前二兩 橘皮二兩

右四味切以水五升煮取二升將煮前散頓如常法

又若脚氣上入少腹少腹不仁即服張仲景八味丸方
乾地黄八兩 澤瀉四兩 附子二兩炮 薯蕷四兩
茯苓三兩 桂心三兩 牡丹三兩去心 山茱萸五兩
右八味擣篩蜜和爲丸如梧子酒服二十丸漸加至三
十丸仍灸三里絶骨若脚數轉筋灸承山若脚脛內稍
不仁灸三陰交忌豬肉冷水生葱醋物蕪荑
又脚氣雖差至冬季間常須服側子酒方
側子二兩炮 乾薑二兩 石斛八兩 丹參三兩
牛膝二兩 甘草二兩炙 防風二兩 乾地黄四兩
芎藭二兩 當歸三兩 桂心三兩 五味子三兩

白朮二兩 秦艽三兩 防已一兩 椒二兩汗
獨活三兩 山茱萸四兩 細辛二兩 黄芩二兩
茯苓四兩 附子一兩炮
右二十二味切絹袋貯以酒三斗五升浸秋冬七日春
夏五日一服四合日二細細加之以知爲度得食[illegible]
齊肉雞亦得食忌海藻菘菜豬肉冷水桃李雀肉生葱
生菜蕪荑酢物並出第六卷中
風毒脚弱痺方六首
千金療惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不能言
毒氣衝心有人病者但一病相當即服第一服此麻黄湯
次服第二第三第四方
麻黄一兩去節 防風二兩 大棗二十枚擘 當歸二兩
茯苓三兩 升麻二兩 芎藭二兩 白朮二兩
芍藥二兩 麥門冬二兩去心 黄芩二兩 桂心二兩
杏人三十枚去皮心 甘草二兩炙
右十四味切以水九升清酒二升合煮取二升半分四
服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風忌海藻菘菜生
葱桃李雀肉酢物
第二服獨活湯方
獨活四兩 乾地黄三兩 芍藥二兩 葛根二兩

桂心二兩 生薑五兩 麻黄二兩去節 甘草二兩炙
右八味切以水八升清酒二升合煮取二升五合去滓
分四服日三夜一犯之一世不愈忌同脚弱特忌食瓠
子蕺菜
第三服兼補厚朴湯并治諸氣欬嗽逆氣嘔吐方
吳茱萸一升一方用三兩 半夏七兩洗 乾地黄一兩
生薑一斤 芎藭二兩 桂心二兩 厚朴二兩炙
芍藥二兩 當歸二兩 人參二兩 黄耆三兩
甘草三兩炙
右十二味切以水二斗煮豬蹄一具取一斗二升去上

凡內清酒三升合煮取三升分四服相去如人行二十
里久忌同

又第四服風引獨活湯兼補方

獨活四兩　人參二兩　附子一兩炮　大豆[illegible]
桂心二兩　防風二兩　芍藥二兩　當歸[illegible]兩
茯苓三兩　黃耆二兩　乾薑二兩　甘草一兩炙
升麻一兩

右十三味切以水九升清酒三升合煮取三升半去滓分四服相去二十里久忌同

又療脚弱神驗防風湯方

防風一兩　獨活二兩　黃芩二兩　茵芋一兩
葛根二兩　芎藭二兩　細辛一兩　蜀椒一兩汗
防已一兩　桂心一兩　芍藥二兩　麻黃一兩去節
石膏一兩碎　生薑三兩　烏頭二枚炮　茯苓三兩
甘草二兩

右十七味切以竹瀝一斗煮取四升去滓分六服一日一夜服盡其間可常作赤小豆飲有人脚弱先常服竹瀝湯四劑未覺增損作此方後覺得力云脉沉細駃風在內者作此湯也忌海藻菘菜猪肉冷水生葱生菜醋物

又越婢湯療風痺脚弱方

麻黃六兩去節　石膏半斤碎　白朮四兩　大附子一枚炮
生薑三兩　大棗十五枚擘　甘草二兩炙

右七味切以水七升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取二升分三服覆取汗一方用附子二枚忌海藻菘菜猪肉冷水桃李雀肉等此仲景方本云越婢加朮湯又無附子胡洽云若惡風者加附子一枚多冷痰者加白朮並出第七卷中

大小續命湯中風方二首

唐侍郎大續命湯主手足攣急及不隨此方療苦脚氣上

又中風四肢壯熱如火攣急或緩不隨氣衝胸中方

當歸二兩　芎藭一兩　桂心一兩　麻黃二兩去節
芍藥一兩　石膏一兩　生薑三兩　人參一兩
防風二兩　黃芩一兩　杏人四十枚　甘草一兩炙

右十二味切以水九升煮取三升去滓分四服忌海藻菘菜生葱等深師同

又小續命湯療中毒風口不能言咽中如塞或緩或急身體不自收冒昧不知痛處拘急不得轉側方

麻黃三兩去節　甘草一兩炙　桂心一兩　石膏一兩
芎藭二兩　乾薑二分　黃芩一兩　當歸一分
杏人二十枚

右九味切以水九升煮取二升去滓分二服薄取汗莫
見風不差復作禁加藥法并療久失聲上氣嘔逆面目
腫皆愈服湯已多覆虛宜兼補忌海藻菘菜生葱等

不仁不能行方三首

千金風引湯療兩脚疼痺腫或不仁拘急屈不得行方

麻黃二兩去節 吳茱萸一兩 獨活二兩 秦艽一兩
石膏二兩 杏人六十枚 白朮三兩 茯苓二兩
桂心一兩 人參一兩 細辛一兩 乾薑一兩碎
防風一兩 防已一兩 芎藭一兩 甘草一兩炙
附子一兩炮

右十七味切以水一斗六升煮取三升分三服取汗佳
忌海藻菘菜生葱生菜桃李雀肉酢等物

又小風引湯主中風腰脚疼痛弱者方

獨活二兩 防風二兩 當歸二兩 茯苓三兩
大豆二升 人參三兩 乾薑二兩 附子一枚炮
石斛二兩 甘草二兩炙

右十味切以水九升酒三升煮取三升去滓分四服服
別如人行十里久忌海藻菘菜豬肉冷水酢等 一方無乾薑石
斛有桂心黃耆

又金牙側子酒療風濕痺不仁足弱不能行常用古方今

新出

側子炮 牛膝 丹參 山茱萸
蒴藋根 杜仲去皮炙 石斛各四分 防風
乾薑 椒汗 細辛 獨活
秦艽 桂心 芎藭 當歸
白朮 茵芋各三分炙 五加皮五分 薏苡人一升碎

右二十味並細切絹袋盛清酒四五升漬五六宿初服
三合日再服稍加以知為度患目昏頭旋者彌精忌豬
肉冷水生葱生菜桃李雀肉等 方中無金牙未詳其名並出第七卷中

因脚氣續生諸病方四首

千金云雖患脚氣不妨乳動石發皆須服壓石藥療之夫
因脚氣續生諸病者則以餘藥對之或大小便不利則以
豬苓茯苓及諸利小便藥療之大便極堅者則用五柔麻
人等丸療之遍體腫滿成水病者則取療水方中諸療水
之藥療之餘皆倣此更無拘忌出第七卷中

又豬苓散主虎滿通身腫利三焦通水道方

茯苓 葶藶熬 人參 防風
澤瀉 甘草炙 桂心 白朮
狼毒 椒汗 乾薑各三分 赤小豆二合
大戟二分 蓯蓉二分半 豬苓二分 女萎三合熬

五味子三分
右十七味擣篩酒服方寸匕日三夜一老小一錢匕以
小便利爲度忌海藻菘菜生葱桃李雀肉醋等物
又茯苓丸主水脹 甄權爲安康公處得差方
茯苓 白朮 椒目各四分 葶藶熬六分
澤瀉 防己各五分 赤小豆 前胡
芫花熬 桂心各三分 甘遂十二分 芒消五分
右十二味擣末蜜和丸如梧子湯服五丸日一稍加以
知爲度忌桃李雀肉生葱醋物 並第二十一卷中
又淮南五柔丸療秘澀及澼飲食不生肌膚虛損不足三

焦不調和榮衛利腑藏補三焦方
葶藶熬各一兩 前胡二兩 半夏洗 蓯蓉
芍藥 茯苓 細辛 當歸
大黃一斤蒸三斗米下
右九味擣篩蜜和擣萬杵食後服十五丸如梧子日三
服忌羊肉餳生菜醋物 一方有黃芩
又麻人丸療大便堅小便利而不渴方
麻子人一升 枳實八兩炙 杏人一升 芍藥八兩
大黃一斤 厚朴一尺炙
右六味擣篩蜜和丸如梧子飲服五丸日三加至十丸

謹按首經一作草有俟未詳

一本芎藭六兩 此本仲景傷寒論脾約丸方附後無杏人並出第十五卷中
大法春秋宜服散湯方六首 千金但云宜服散此又兼湯藥
千金八風散療風虛面青黑土色不見日月光脚氣痺弱
准經面青黑主腎不見日月光主肝補腎治肝方
茯苓八分 烏頭炮二分 鍾乳研四分 蓯蓉四分
續斷四分 黃耆四分 麥門冬去心四分 五味子二分
澤瀉四分 遠志皮去心四分 菟絲子酒漬十四分
細辛四分 龍膽草四分 秦艽四分 石韋去毛四分
柏子人四分 牛膝四分 杜仲四分 菖蒲四分
蛇牀子四分 山茱萸四分 防風四分 白朮四分

乾薑四分 乾地黃四分 茯苓四分 附子炮五分
甘草炙五分 石斛六分 天雄炮六分 萆薢四分
人參五分 菊花十二分
右三十三味擣篩酒服方寸匕日三不知加至二七
又大八風散療諸緩風濕痺脚弱方
巴戟天去心二分 芎藭一分 附子炮三分 黃耆二分
白斂二分 桂心二分 細辛二分 桔梗二分
人參二分 芍藥二分 牛膝四分 蘼蕪二分
菊花二分 萎蕤二分 秦艽二分 烏喙四分
牡荊子二分 天雄炮二分 蓯蓉一分 萆薢二分

茯苓四分　遠志四分去心　山茱萸一分　黃芪二分
石斛二分　白朮二分　菖蒲四分　磁石二分研
厚朴一分炙　龍膽草一分　蜀椒二分汗　五味子一分
右三十二味擣篩溫酒服半方寸匕日三不知稍增取
令微覺爲度一本有甘草乾薑無石斛牛膝
又凡腳氣之疾皆由氣實而死終無一人以服藥致虛而
殂故腳氣之人皆不得大補亦不可大瀉終不得從虛故
預止之不服也如此者皆死不療世間大有此人屈服故
友遠來問疾其人曾不經一事未讀一方自騁了了詐作
明能談說異端或言是虛或言是實或云是風或云是蟲

或道是水或云是痰紛紛謬說種種不同破壞病人心意
莫知孰是遷延未定時不待人忽然致禍各自散走是故
旦須好人及好名醫識疾深淺探賾方書博覽古今是事
明解者看病不爾大誤人事竊悲其如此者衆故一一顯
析具述病之源狀令來世病者讀之以自防備也但有一
狀憂恚積思喜怒悲歡復隨風濕結氣咳時嘔吐食以變
大小便不利時溏利重下溺血上氣吐下乍寒乍熱臥不
安席小便赤黃時時惡夢夢與死人共食飲入冢神室魂
飛魄散筋極則傷肝傷肝則腰背相引難可俛仰氣極則
傷肺傷肺則小便有血目不明髓極則陰痿不起住而不
卒骨極則傷腎傷腎則短氣不可久立陰疼惡寒甚者卵
縮陰下生瘡濕癢搔之不欲止汁出此皆爲腎病甚者多
遇風毒四肢頑痹手足浮腫名曰腳弱一名腳氣醫所不
療此者主之方
天門冬三十斤去心擣壓取令汁盡　麋骨一具碎以水一石煮取五斗澄清
枸杞根切三斗淨洗以水二石五斗煮取一斗澄清　酥三升鍊
生地黃切二斗擣壓取汁如天門冬法　白蜜一斗鍊
右六味並大斗銅器中微火先煎門冬地黃汁減半乃
合煎取大斗二斗下後散藥煎取一斗內銅器中重釜
煎令隱掌可丸平旦空腹酒服如梧子二十丸日二稍

加至五十丸擇四時王相日合之
散藥如左
茯苓　柏子人　桂心　白朮
萎蕤　菖蒲　遠志去心　澤瀉
薯蕷　人參　石斛　牛膝
杜仲炙　細辛　蔓荊子　獨活
枳實炙　芎藭　黃耆　從蓉
續斷　狗脊去毛　萆薢　白芷
巴戟　五加皮　覆盆子　橘皮
胡麻人　大豆黃卷各二兩　甘草炙六兩

薏苡人一升 蜀椒一兩汗 阿膠一兩炙 鹿角膠炙
大棗一百枚煮作膏 石南二兩 茯神二兩
右三十八味擣篩下篩內煎中有牛髓鹿髓各加三升
大佳小便澀去栀子人加秦艽二兩乾地黃六兩陰痿
失精去萎蕤加五味子二兩頭風去栀子人加菊花二
兩防風二兩小便利陰氣弱去細辛防風加山茱萸二
兩腹中冷去防風加乾薑二兩無他疾依方合之凡此
煎至九月下旬採藥立冬日合而服之至五月上旬止
若十二月臘日合者經夏至七月下旬即服之若停經
夏不壞當於舍北陰處入地深六尺填沙置藥沙中上

加少土覆之即經夏不壞也女人先患熱者得服冷者
勿服
又大鼈甲湯療腳弱風毒攣痺氣上及傷寒惡風溫毒及
山水瘴氣熱毒四肢痺弱方
鼈甲二兩炙 防風一兩 麻黃一兩去節 白朮一兩
吳茱萸五合 知母一兩 升麻一兩 大棗二十枚擘
貝齒七枚燒 茯苓一兩 橘皮一兩 芎藭一兩
杏人一兩 犀角半兩屑 生薑三兩 人參一兩
赤小豆三合 青木香半兩 麝香三銖研 羚羊角屑一八
麥門冬一兩去心 大黃一兩半 薤白十四枚 烏頭七枚炮

石膏一兩碎 雄黃二分研 半夏一兩洗 當歸一兩
麥穀一兩 芍藥一兩 甘草一兩炙
右三十一味切以水二斗煮取四升去滓分六服相去
十里久得下止一方用大黃二分恐下可用一分也一
方用羚羊角二分毒盛可用三分也忌[illegible]
桃李雀肉醋物羊肉餳等一方有[illegible]
又小鼈甲湯療身體虛脹如微腫胸心痞滿有氣壯熱小
腹厚重兩腳弱方
鼈甲三兩炙 升麻三兩 黃芩二兩 麻黃三兩去節
羚羊角三兩屑 前胡四兩 桂心三兩 烏梅七枚擘
杏人三兩去皮尖 薤白一斤

右十味切以水一斗煮取二升七合去滓分三服此常
用若體強壯須利者加大黃二兩忌莧菜生葱
又療風虛腳弱手足拘急攣疼痺不能行腳趺腫上膝
小腹堅如繩約氣息常如憂恚不能食飲者皆由五勞七
傷腎氣不足受風濕故也宜服內補石斛秦艽散方
石斛四分 秦艽五分 山茱萸三分 蜀椒二分汗
五味子二分 麻黃三分去節 桔梗三分 前胡三分
白芷二分 白朮二分 附子炮 獨活
天門冬去心 桂心各四分 烏頭五分炮 人參五分

天雄四分炮 乾薑五分 防風五分 細辛三分
杜仲五分 萆薢三分炙 當歸五分
右二十三物擣篩為散酒服方寸匕日再服不知加至二七匕虛人三建皆炮實人亦可生用風氣者本因腎虛既得病後毒氣外滿則灸洩其氣內滿則藥馳之當其救急理必如此至於風消退四體虛弱餘毒未除不可便止宜服此散推陳致新極為良妙此既人情可解者無可疑焉忌桃李雀肉猪肉冷水生葱生菜鯉魚 出第七卷中
脚氣嘔逆不下食方二首

文仲瓜飲療脚氣嘔逆不得食方
生瓜一枚切以水九升煮取五升去滓 白朮四兩 甘草一兩炙
生薑二兩
右四味切三物內瓜汁中煮取二升去滓温分三服忌桃李雀肉海藻菘菜 生瓜恐是木瓜 出第九卷中
延年茯苓飲主脚氣腫氣急上氣心悶熱煩嘔逆不下食方
茯苓三兩 紫蘇葉三兩 杏人三兩 橘皮三兩
升麻三兩 柴胡二兩 生薑四兩 犀角二兩屑
檳榔十二枚并皮子碎
右九味切以水八升煮取二升五合去滓分温三服如人行八里久忌醋物 出第十九卷中
脚氣疼不仁方二首
病源此由風濕毒氣與血氣相搏正氣與邪氣交擊而正氣不宣散故疼痛邪在膚腠血氣則澀隔則皮膚厚搔之似隔衣物不覺知者為不仁也 出第十二卷中
蘇恭療初患脚足皮膚舒緩足上不仁臍下攻痛骨髓動兩脅下氣滿飽食即欬背上熱臍下冷心虛陰汗且疼藥服煮散方
黃耆 人參 獨活 芎藭

防風 當歸 桂心 萆薢
防己各六兩 茯苓 白朮 丹參各八兩
附子生用 甘草炙各四兩 杏人去皮尖 生地黃
生薑 磁石二十分碎如小豆
右十八味並切分之為三十服服別以生薑二兩生地黃一兩杏人十四枚碎以水二升煮取七合布絞去滓一服之常以日曉或夜中服之不妨公事如逆嘔者加半夏一兩如前加減法忌猪肉冷水海藻菘菜生葱桃李雀肉醋物蕪荑 人參三兩以後並無禁忌
又側子酒主脚氣脅疼發入秋腹消氣定但苦脚弱不能

屈伸足上不仁手指腰悶不得屈伸四肢腰頸背皆痛者
服此酒方

側子生用　乾薑各五兩生者良　丹參　牛膝各六兩
金牙研綿裹　磁石如上　生石斛各一斤乾用八兩
石南炙　獨活炙各六兩　萆薢　生茱萸
生地黃各十兩乾者用八兩　防風　茯苓各四兩
五加皮　薏苡人各一兩　甘草炙　蜀椒各三兩汗
桂心　天雄生用　人參　烏喙
當歸　白朮　細辛各二兩

右二十五味切絹袋貯清酒六七斗漬之七日成一服

一小盞日二三服量性多少稍加以瘥為度若婦人服去石南丈夫若冷著孔公孽鍾乳等多至一二斤少至七八兩服此酒時須隨病內外灸三兩處以泄氣忌豬肉冷水醋物生葱桃李雀肉生菜蕪荑等並出第一卷中

腳氣衝心煩悶方二十二首

廣濟療腳氣衝心悶洗腳漬湯方

糜穰一石內釜中

右一味多煮取濃汁去滓內椒目一斗更煎十餘沸漬腳三兩度如冷溫漬洗差止無所忌

又療腳氣急上衝心悶欲死者方

檳榔三顆細末　生薑汁三合　童子小便二升新者

右三味攪頓服須臾卻氣退若未全差更服最佳利三兩行無所忌

又療腳氣心煩悶氣急臥不安方

半夏一升洗去滑　生薑八兩　桂心三兩　檳榔一兩半末

右四味切以水八升煮取半內檳榔人末煎取一升八合絞去滓分溫三服服別相去如人行五六里進一服以利為度

又療腳氣攻心悶腹脹氣急欲死者方

吳茱萸二升　木瓜二合切　檳榔二十顆碎　竹葉二升切

右四味以水一斗煮取三升分三服得快利即差忌生菜熱麪蕎麥蒜等物

又療腎虛風腳氣衝心痛氣下墜小便數膝冷腰疼時時心悶氣急欲絕四肢無力射干丸方

射干六分　昆布洗八分　通草五分　犀角屑六分
杏人去皮尖八分　漢防己八分　茯苓六分　青木香八分
旋覆花分　白頭翁四分　獨活六分　葶藶子熬八分

右十二味擣篩蜜和丸如梧子酒下二十丸漸加至三十丸日再服不利空腹服煮檳榔桑根皮下更佳忌生菜熱麪蕎麥蒜炙肉粘膩醋物並出第一卷中

又旋復花湯療脚氣衝心欲死者服之救病[illegible]先方最先

旋復花二兩 犀角屑一兩 紫蘇莖一握 桂心一兩
赤茯苓二兩 橘皮一兩 生薑二兩 前胡四兩
乾薑[illegible] 白朮一兩 香豉七合綿裹 [illegible]

右十一味切以水八升煮取二升四合分三服相去十里久以下氣小便利為度忌生葱酢物

又治脚氣痹痺不仁兩脚緩弱脚腫無力重者少腹氣滿胷中痞塞見食即嘔或兩手大拇指不遂或兩脚大拇指不遂或小便澀第一療氣滿嘔逆不下食旋復飲子方

旋復花一兩 橘皮二兩 生薑三兩 紫蘇莖一握
茯苓三兩 香豉一升綿裹 大棗十枚擘

右七味切以水八升煮取二升四合分三服服別相去十里久日一劑凡服五劑上氣即下小便澀者加桑根白皮四兩慎生冷猪肉蒜生葱粘食如其服此飲二三劑氣下訖即須服大犀角湯第一方十四味者是也服訖當小便利為度如其胷膈中氣滿者加半夏四兩湯洗行腹內氣和脚腫欲消皮膚猶如隔帛者宜服犀角麻黃湯一二劑五日後然服之忌生葱酢物

又大犀角湯療脚氣毒衝心變成水身體遍腫悶絕死者方

犀角屑二兩 桑根白皮四兩 白朮二兩 桂心二兩
香豉一升 防己二兩 紫蘇一握 前胡四兩
橘皮三兩 黃芩三兩 茯苓一兩 大棗十枚擘
生薑一兩

右十三味切以水九升浸一宿煮取二升七合或水一斗煮取三升分為三服服相去如人行十里久以下氣利小便為度忌酢物桃李雀肉生葱等

又犀角麻黃湯方

犀角屑二兩 麻黃二兩去節 甘草一兩炙 茯苓二兩
防己二兩 黃芩一兩 石膏一兩 附子一兩炮
白朮一兩 芎藭一兩 防風一兩 當歸一兩
生薑三分 細辛一兩 桂心一兩

右十五味切以水一斗先煮麻黃去沫訖取汁入升下諸藥煎取二升七合分三服相去十里久服訖覆取汗待三四日後若其皮膚不仁差即停不差宜更服之不得過三劑即差差訖脚中無力者宜服獨活犀角湯二三劑即愈

又獨活犀角湯

獨活三兩 犀角屑二兩 石斛二兩洗蒸 丹參二兩

側子一兩炮　防風二兩　防已二兩　芎藭二兩
生薑二兩　當歸二兩　芍藥三兩　茯苓四兩
桂心一兩　甘草二兩炙
右十四味切以水一斗煮取二升七合去滓分三服相去十里久服訖任臥不須取汗凡作三二劑間五日一服初服此藥覺腹內氣散兩脚有力行動無妨或可即停又可常服香豉酒灸三里穴絕骨各三百壯
又香豉酒方
取香豉一斗以酒三斗浸三日取飲任性多少利即減之不利任性其中用橘皮生薑調適香味任意服

盡復作以差為度 並出第六卷中
又仲療脚氣心煩不下食方
牛乳一升　杏人一小升去皮　橘皮一分切　生薑一兩切
右四味合煎取八合空心頓服令盡虛人或微利亦無苦有人服驗 備急同
又脚氣攻心欲死者方與蘇徐木瓜二物相加減用
吳茱萸四升　淡竹葉一升切
右二味以水一斗煮取二升去滓分五服兼主上氣腫滿 蘇恭云大快比加檳榔人四十枚末之更快於本方 備急同徐王用尋常氣滿日服一劑檳榔七枚合橘皮一兩厚

朴炙各三兩　生薑四兩　水三升煮取一升二合分二服此湯性溫去冷服亦蘇家之法 備急同
又若毒氣攻心手足脈絕此亦難療不得已作此湯十愈七八方 千金云治脚氣入腹困悶欲死腹脹茱萸湯方
吳茱萸六升　木瓜二枚切
右二味以水一斗三升煮取三升分三服或以吐汗便活蘇恭云服得活甚易但縱擊一二年少將息則耳此方是焉起死也高麗老師方與徐王方相似應神妙備急千金蘇徐同方云與木瓜刑取吳茱萸一色煮服又方加青木香二兩犀角二兩屑 亦云此湯起死人

又脚氣冷毒悶心下堅背膊痛上氣欲死者方
吳茱萸三升　檳榔四十枚　青木香二兩　犀角三兩屑　半夏八兩湯洗　生薑六兩
右六味切以水一斗煮取三升分三服大効破毒氣尤良 備急同
又脚氣入腹心悶者方
濃煮大豆汁飲一大升不止更飲大驗 備急同
又療脚氣入心悶絕欲死者
半夏三兩洗切　生薑汁二升半
右二味內半夏煮取一升八合分四服極効忌羊肉餳

蘇恭云若風熱𤸎但毒氣入胃唯心悶煩熱水漿不下而乾
嘔好叫喚欲死於者服此犀角湯妙方
犀角屑　青木香　羚羊角屑　人參
竹茹　沉香　射干各二　麥門冬去心
茯苓各三兩　麝香　雞舌香各一　石膏八兩碎綿裹
右十二味切以水六升煮取二升二合分日服相去六
七里晚再服如覺藥明心煩者速人作二劑此湯救死
已試大驗若嘔逆不下食加木香即吐出者加半夏五兩
生薑五兩橘皮五兩加水一升半煮取二升三合忌五辛醋宅

肉錫酢物唐寺中同出第一卷中
又方救腳氣衝心悶方甚効
檳榔六顆
右一味擣篩取童子小便半升微温和末強半頓服如
一炊久不轉動更取半准前服令盡得通即好甚良
又療腳氣悶腨并腳氣衝心方
烏豆一斗
右一味以水五大斗煮取斟酌有一斗半即休分向兩故
瓮瓷中以兩腳各於一瓮中浸遣人從膝向下捋之換
百遍以來必差如無瓷瓮取故瓦瓮不滲者亦得極重

不過再浸一度必差　崔氏李用極効
又方青木香丸方
檳榔青木香各六分　大腹檳榔七分　□心四分
芍藥六分　枳實七分炙　大黃十分
右六味擣篩蜜和為丸如梧子大以酒若飲任性服十
五丸日二服稍稍加至大便微通忌生葱巳
前方療一切氣上衝悶方不得三兩日
取宜通亦療心腹脹悶水服亦得方
又療腳氣上衝心狂亂悶者方
赤茯苓十二分　漢防己八兩　芍藥十分　檳榔人十二分
甘草八分炙　郁李人十分　枳實八分炙
春若大黃十四分　冬著牛膝十分

右九味擣篩蜜和丸如梧子空腹清酒服十五丸日再
服漸加至二十丸以微通泄為度利多減丸冬則去大
黃加牛膝若體中虛弱去大黃加牛膝服亦得其法皆
須州士上好者惡藥服無益忌海藻菘菜酢物生葱油
膩粘食熱麪炙飯及陳臭難消之物一切勿食
又療腳氣衝心腳氣急及水氣卧不得立驗方
葶藶子熬令紫色四分別搗　杏人四分　甘草二分炙
海蛤四分研如粉　郁李人四分　漢防己五分

吳茱萸二分　檳榔人六分　大黃七分

右九味擣篩爲散合研令調和服茶飲中棗膏二分去皮攪和白蜜少許更於臼中杵一千二百杵方止空腹一服十五丸如梧子漸漸加至下洩爲度服良久待丸散後可食忌海藻菘菜

又催前狀常服方

白蒺藜十二分[illegible]　五味子八分　牛膝八分

杏人一升　枳實八分炙　甘草五分炙　人參八分

車前子二兩　桑根白皮一兩　通草一兩

右十味擣篩蜜和丸如梧子空腹一服十五丸漸漸加至二十五丸日再服亦得酒飲任情服良久待散可食忌海藻菘菜牛肉熱麪　蔣孝璋方[illegible]

嶺南瘴氣腳氣酒湯散方一十二首

千金夫腳氣之疾先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痺或兩脛腫滿行起眠弱或上入少腹不仁或時冷時熱小便秘澀喘息氣衝喉氣急欲死食嘔不下氣上逆者皆其候也是先覺此證先與犀角旋復花湯方

犀角屑二兩　旋復花二兩　橘皮三兩　茯苓二兩

大棗二十枚擘　香豉一升　紫蘇莖一握　生薑三兩

右八味切以水八升煮取二升七合分三服相去十里久服之以氣下小便利爲度如其不下服後大犀角湯忌酢物　崔氏名小犀角湯備急同

又大犀角湯方

犀角屑二兩　旋復花二兩　白朮二兩　桂心二兩

防己二兩　黃芩二兩　生薑一兩　香豉一升綿裹

橘皮三兩　茯苓三兩　前胡四兩　桑根白皮四兩

紫蘇莖一握　大棗十枚擘

右一十二味切以水九升煮取二升七合分三服相去十里久取下氣爲度若得氣下小便利腳腫即消能食若服湯竟不下氣急不定仍服後湯忌桃李雀肉生葱酢物以上二方出崔氏文仲同

又方

甘草二兩炙　犀角屑二兩　防風二兩　桂心三兩

杏人二兩　獨活二兩　防己二兩　石膏四兩

芎藭二兩　麻黃三兩去節　生薑三兩　白朮二兩

當歸二兩　羚羊角屑二兩　黃芩一兩

右十五味切以水二斗先煮麻黃取八升汁下藥煎取三升分三服相去十里久三服訖覆取汗五日後更服一劑取汗同前忌海藻菘菜桃李雀肉生葱

又療腳氣初發從足起至膝脛腫骨疼者方

取茆麻葉切擣蒸薄裹之日二三易即消茆麻子似牛蓽蝨故名茆麻也若冬月無茆麻取莖乾根擣碎和酒糟三分根一分合蒸熟及熱封裹腫上如前法日二即消亦治不仁頑痺

又若腫已入腹至少腹服小便澀少者方

取烏特牛尿一升一服日再服取消乃止（范汪方云疑者二分尿一分牛乳合煮消熱乃服之）

又若腫已消仍有此候者急服此湯方

麻黃二兩去節 半夏洗一兩 生薑五兩 射干二兩

獨活三兩 犀角屑一兩 羚羊角屑一兩 青木香一兩

橘皮一兩 杏人一兩 人參二兩 升麻二兩

吳茱萸一升 茯苓一兩 防巳二兩 前胡一兩

枳實二兩炙

右十七味切以水九升煮取四升分五服相去二十里久中間進少粥以助胃氣此湯兩日服一劑取病氣退乃止以之消息之若熱盛喘煩者加石膏六兩生麥門冬一升去心去吳茱萸若心下堅加鼈甲一兩炙忌羊肉酢物餳莧菜（以上一方出蘇長史並出第七卷中）

又大金牙酒療痺癘痜氣中人風冷濕痺尸疰疝瘕半身不遂手足拘攣歷節腫痛甚者少腹不仁名曰脚氣無所不療方

金牙一斤 側子炮三兩 附子炮一兩 天雄炮三兩

人參二兩 蓯蓉三兩 茯苓一兩 獨活半斤

當歸三兩 白朮三兩 防風二兩 黃耆三兩

薯蕷三兩 細辛二兩 桂心三兩 茵芋二兩

石南三兩 芎藭二兩 地骨皮一兩 五加皮三兩

磁石十兩 丹參五兩 杜仲一兩 萆薢三兩

牛膝五兩 狗脊一兩 萎蕤一兩 薏苡人一升

白芷三兩 麥門冬一升 生石斛八兩 厚朴炙三兩

枳實三兩 桔梗三兩 生地黃切一斤 蒴藋四兩

黃芩三兩 遠志去心三兩 荊子二兩

右三十九味切以酒八斗漬七日温服一合日四五服一石藥細研如粉別絹袋盛共藥同漬藥力和善主療極多凡是風虛四體小覺有風病者皆須將服之無不瘥者服者一依方合之不得輙信人大言浪有加減也忌豬肉冷水生葱生菜桃李雀肉蕪荑等（並出第七卷中）

又小金牙散療南方瘴癘疫氣脚弱風邪鬼注方

金牙五分 牛黃一分 天雄二分 萆薢二分

黃芩二分 麝香二分 蜀椒二分汗 由跋二分

雄黃二分 朱砂二分 烏頭二分 細辛二分

萎蕤三分　桂心二分　芥草二分　犀角二分

乾薑二分　黃連四分　蜈蚣一枚長六寸炙

右十九味擣篩合牛黃麝香擣三千杵溫酒服錢五七日三夜二以知為度絳囊盛帶男左女右一方寸七省病問孝不避夜行塗鼻人中晨昏霧露亦塗之忌豬肉冷水生血物生菜等出第十二卷中

延年療得嶺南瘴氣熱煩短氣心悶氣欲絕方

香豉一升　梔子十四枚擘　升麻一兩

右三味切以水四升煮取一升半分為三服即定也

又嶺南瘴氣面腳腫乍寒乍熱似瘴狀腳腫氣上心悶欬

嗽擁緩頑痺方

大麻人一兩綿裹　升麻一兩　射干一兩　菖蒲一兩

甘草一兩炙　麻黃一兩去節　大黃一兩別浸　豉三合綿裹

芒消半兩

右九味切以水六升煮取二升去滓乃內芒消分三服微利一二行解毒熱忌羊肉餳海藻菘菜並出第十九卷中

蘇唐豉酒若能常飲此酒極利腰腳嶺南常服此酒必佳及卑濕處亦准此又恐有腳氣似著即宜服之方

香豉三升　美酒香者一斗

右二味先取香豉三升三蒸三暴乾內一斗酒中漬三宿便可飲隨人多少用涉傳別良

又方

大豆新者一斗九蒸九暴

右一味以美酒三斗漬二宿便可隨性多少飲盡復作常服甚佳

又方

香豉三升　犀角八兩末之

右二味其豉如前用一生絹袋貯用好美酒九升漬之五日許其犀角末散著袋外每服常攪令犀角味入酒中服三合量性增減日三服其酒夏月勿作多恐壞可

用此方豉三合橘皮生薑蔥細切任意調和先熬油令香次下諸物熬熟以綿裹內餅中著酒任意性飲之並出上卷中

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔

校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方卷第十八終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十九卷目錄 脚氣下 十六門

脚氣腫滿方二十九首
脚氣腫滿小便澀方三首
脚氣上氣方五首
脚氣心腹脹急方四首
脚氣寒熱湯酒方一十首
脚氣痿弱方七首
脚氣痺攣方二首
風偏枯方二首 從風偏枯以下五門並兼療脚氣及風等相類
風四肢拘攣不得屈伸方五首
風不仁方三首
風濕痺方四首
風濕方九首
許仁則療脚氣方三首
論陰陽表裏灸法三十七首
灸用火善惡補寫法一首
雜療脚氣方一十五首

唐王燾先生外臺秘要方第十九卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

脚氣腫滿方二十九首

病源此由風濕毒氣搏於腎經腎主水今為邪所搏則腎氣不能宣通水液水液不傳於小腸致水氣擁溢腑藏浸漬皮膚故腫滿也 出第十二卷中

千金翼溫腎湯主腰脊膝脚浮腫不隨方

茯苓 乾薑 澤瀉各二兩 桂心三兩

右四味切以水六升煮取二升分為三服忌酢物生葱

又療脚氣初發從足起至膝脛腫骨疼者方

烏牛尿一服一升日二服腫消止羸瘦者二分尿一分牛乳合煮乳結乃服之

又方

生豬肝一具細切以淡蒜虀食之令盡若不盡者分再食之 並出第十六卷中

崔氏療脚氣遍身腫方

大豆二大升以水一斗煮取五升去豆 桑根白皮一握切 檳榔二七枚碎 茯苓二兩切

右四味搗三物以前豆汁浸經宿煑取二升殺去滓澄
酒二合內藥中隨多少服之忌酢物 救急同
又療遍身腫小便澀者用麻豆方主之療脚腫氣
烏豆 取一斗以水四斗煑取一斗去豆 桑根白皮 切一升 大麻子 二升熬研碎
右三味以豆汁內藥煎取六升一服一升日二服三日
令盡
又方
烏豆五升 桑根白皮 切四升二物以水二斗煑取一斗半去滓
大麻子人一升熬 橘皮二兩 升麻二兩
杏人二兩 猪苓二兩 丹參三兩 生薑二兩切

右九味切搗七物內前桑皮豆汁中煑取四升朝二服
相去如三食久藥消進食食消又更進二服 此二方並唐尚書逆
又療脚氣及腰腎膀胱宿水及痰飲桃花散方
收桃花陰乾量取一大升但隨虛滿不須按捺擣爲
散紗羅下之溫淸酒和一服令盡通利爲度空腹服
之須臾當轉可六七行但宿食不消化等物摠瀉盡
若中間覺儀虛進少許軟飯及糜粥極安穩不似轉
藥虛人瘦弱謂但覺腰脚輕快使人踴躍食味倍佳
脚先腫者一宿頓消如囊中貯物傾却相似又無毒
易將息唯忌胡荽猪肉三月內腹虛大都消息慎生
冷酸滑五辛酒麪及粘食肥膩四五日外諸食復常
又余見古方論云脚氣但腫不問經服利藥法令人瀉利
脈縱不服利藥亦遲人所宜利方
取大麻子熬令香和水研取一大升別以三大升水
煑一大升赤小豆取一升汁即內麻汁更煎三五沸
渴飢飲之冷熱任取安穩儀特微豆亦佳兩利小便
止消消腫大良殺藥及桑白皮熬灸爲飲飲之亦良
脈盛力弱不堪大藥者取牛乳一小升烏牛尿一小
升無烏牛尿用黃者亦得和調分二服相去十里久
小便大利脚腫即頓消若一劑不除隔一二日更服

氣力好者依前服羸弱者每日平旦唯一服六七合
以差乃止忌粘肉 並出第六卷中
又作大麻子酒方療脚氣上輕腫小腹痹
大麻子一升碎研淸酒三升漬三宿溫服隨性兼療
頭風補益此一方傳用大良 備急同
又療脚氣滿小便少者方
檳榔 四十枚切 大豆 三升 桑根白皮 切一升
右三味以水二斗煑取六升分六服間粥亦得若冷服
加吳茱萸二升生薑一兩用亦良 備急同
又療脚氣非冷非熱老人弱人服備者方

檳榔散汁中或茶飲中或汁中服檳榔人散方寸匕

利甚快極良 備急同

又脚氣滿方

大豆一升以水四升煮之令熟去滓取桑根白皮切

一大升和豆汁重煎之厚薄如酪布絞去滓空腹日

再 備急同

又徐王枳實散宜春秋服消腫利小便兼補瘀風虛冷脹

不能食方

枳實炙半斤 桂心一斤 茯苓 白朮各五兩

右四味爲散酒服方寸匕日三服加至二七忌生葱酢

物桃李雀肉等 備急同

又手脚酸痛兼微腫方

烏麻五升微熬研之

右一味以酒一升漬一宿隨多少飲之盡更作大佳 備

急同

又若身腫氣攻心者方

生猪肉去脂以漿水洗於兩板中壓去汁細切作膾

蒜薤啖之日二頓下氣除風此方外國法 備急同

又搨脚方

搗烏麻碎水煮漬搨大驗

又方

水煮杉木浸搨脚去腫滿大驗 備急同

又腫滿脹方

取小豆一升和穀樹心一握熟煮喫三二升即差如

湯沃雪良此二方特用効 備急同並出第九卷中

救急療風水毒氣遍身腫方

穀楮白皮三兩 橘皮二兩 桑根白皮切各五兩 東紫蘇

生薑各四兩 大豆二小升

右六味切以水九升煮取一大升絞去滓分爲四服其

藥並須煖不過三劑必當差百日來喉禁大酢 出第七卷中

必効療脚氣數發遍身滿妨氣急者方

取大麻子一升碎以小便二升煮取一升去滓頓服

之 蘇唐徐同出第三卷中

范汪療下焦冷腫滿胃寒吐不下食者兼去溫毒方

防己 芍藥各二兩 枳實炙 獨活

防風 桂心各三兩 生薑八兩 葛根三兩

半夏洗一升

右九味切以水九升煮取三升分作四服相去八九里

久中間食少粥一方無防己枳實加附子二兩塊餘依

本方忌羊肉餳生葱 出上卷中

崔侍中療苦脚氣攻心此方甚散腫氣極驗

大檳榔七枚合子碎　生薑各二兩　橘皮　吳茱萸

紫蘇　木瓜各一兩

右六味切以水三升煮取一升三合分再服忌如藥法

又葶藶丸療水氣及脚并虛腫方

葶藶子七分生用　牽牛子　澤漆葉　海藻洗去六炙

昆布如上炙　桑根白皮炙　甘遂熬　椒目

郁李人各三分去皮　桂心一分

右十味擣篩蜜和爲丸如梧子一服十五丸日再服加

至二十九其藥用桑白皮切五合赤小豆一合通草一

兩切水二升煮取一升下藥忌生葱出下卷中

蘇恭療脚氣腫盛因生瘡積年不差膿血長流依狀是風

毒氣爲冬間服藥酒擁滯散在膝理宜服此方療風痒及

舊癬疥百病輕腰脚兼通大腸療肺中熱毒氣方

漏蘆　萎蕤　烏蛇脯炙各二十四分

枳實十二分炙　秦艽九分　苦參一斤擣去筋脉取粉

漢防已八分　玄參二十二分　乾麥門冬十二分去心

白朮　黃耆各十分　大黃二十四分　黃芩八分

右十三味擣篩蜜和丸如梧子一服四十丸日再漸加

至五十丸無問食前食後服酒浸藥下之

又方

牛蒡根切二大升　枳實六兩炙　磁石一斤　薏苡人一升

玄參六兩　烏蛇脯六兩炙　生地黃切二大升　烏豆小粒者一大升

右八味細切絹袋盛以好無灰酒一大斗浸經三日任

性多少飲以下前藥

又洗方

漏蘆一大升　白斂五兩　甘草三兩炙　蒺藜子

槐白皮　五加根皮各一大升

右六味切以水二大斗煮取六升內芒消半大升弃即

洗其湯微溫如人體如瘡熱濕布搨上忌海藻菘菜

又解風毒入腹脚暴悶痛欲死方

生犀角屑　蜀升麻　黃芩　乾藍

漢防已　枳實炙各二兩　漏蘆三兩炙　白斂一兩

梔子人十個　甘草炙二兩

右十味切以水八升煮取二升三合絞去滓分溫三服

不問食前後忌海藻菘菜酢此方忌酢恐更有茯苓

又溻方

取前方加大黃三兩梔子四十顆取軟白布剪作三

二十箇孔內藥汁中浸溻傅瘡上乾即換

近効療脚氣兩脚腫滿暴破衝心衆醫不差方

小便三升　黍三斤

右二味相和煮三五沸將浸脚日三四度極神効其[illegible]於水盆中感下著火煖之如池瓮法周廻泥塞然後浸脚搨使汗出立効

脚氣腫滿小便澀方三首

蘇恭防已湯主通身體滿小便澀上氣土下痰水不能食食則喘者方

桑白皮五兩　大豆五升以水二十升并桑白皮煮汲一十五升去滓　防已

橘皮　赤茯苓　麻黄去節各二兩　生薑五兩

旋復花一兩　杏人八十枚　紫蘇莖葉切二兩

右十味切以前件藥汁煮取三升去滓分為三服力弱者分為五服相去六七里久微覆當大汗小便利腫氣消下冷多加茱萸四兩熱多加玄參四兩忌酢物

又腫滿小便少者湯方

檳榔二十枚合子碎　大豆一升　桑根白皮二升　生薑一斤合皮

右四味切以水二斗煮取五升半去滓分為六七服各相去十里久再服小便當利腫即消瘦弱不能怒者將復以少粥止之

又紫蘇湯方

紫蘇莖一兩　甘草炙　橘皮各一兩　生薑一兩

檳榔五枚

右五味切以水五升煮取二升分三服相去十里久若能長服之永令氣消下忌海藻菘菜　並出上卷中

脚氣上氣方五首

病源此由風濕毒氣初從脚上後轉入腹而乘於氣故上氣也　出第十三卷中

張文仲硇砂牛膝三物散療脚氣上氣方

硇砂　牛膝　細辛各三兩

右藥為散酒和服方寸匕日再經四五服即効此方効陽泉容寶飾將軍服者云神効蘇恭脚氣方云是婆羅

門法　備急必効同

又脚氣上氣入腹腫方

野椒根除上皮細剉一升

右一味以酒二升投安瓶中泥頭塘火燒得一沸然後溫服一盞甚効唯忌冷肥物其餘不禁　並出第九卷中

蘇恭脚氣散主脚弱上氣痺滿不能食常服方

牛膝　硇砂　細辛　丹參

白朮　郁李人去皮各三兩

右六味擣篩為散酒服方寸匕日二服主服腫下氣春秋冬三月時科服夏熱不可服春秋冬消腫利小便兼

積癖風虚冷脹不能食忌桃李雀肉生菜 出上卷中
療上氣檳榔湯方
檳榔皮二七 杏人四七枚去皮尖熬
右二味以小便一大升煮取半升分為二服相去五六里許此方甚下氣一日一服之作丸亦佳中欲須利檳榔子搗碎如前煮取汁服之即快利也
又風引湯療痺滿上氣遍身脹腫疼并去風濕痺方
大豆三升 附子三兩炮 枳實炙 澤瀉
橘皮各四兩 甘草炙 茯苓 防風各二兩
右八味切以水二斗酒二升煮大豆取一斗去滓內藥

煮取三升分三服三劑腫消去大豆澤瀉再服三劑甚
忌猪肉冷水海藻菘菜酢物 並出上卷中
脚氣心腹脹急方四首
病源此由風濕毒氣從脚上入於內與藏氣相搏結聚不散故心腹脹急也 出第十三卷中
深師療諸脚氣定時候間滿腹脹不能食者四時俱得服下氣消脹方
昆布八兩 射干四兩 茯苓 乾薑各一兩
羚羊角屑 橘皮各三分 杏人五分去皮尖熬
吳茱萸 大黃各六分大小便澀者大黃無不須用

右十味擣篩蜜和為丸如梧子大飲服十五丸利多服七丸以意消息不能食者加白朮六分麴末十分氣發服已前丸得定如不定作檳榔皮湯壓之忌酢物桃李雀肉等
又方
檳榔七枚碎 生薑三兩切 橘皮二兩 杏人二十枚
右四味切以水四升煮取一升五合分二服相去七八里久或作半劑一服亦得氣脹發則服之差止
又若覺冷氣攻喉方
當含吳茱萸三五粒即氣散

又脚氣夏盛秋歇毒氣既謝風緩猶在若諸病皆退但苦食腹脹不安為氣在咽喉吐不出嚥不入心悶痰滿食已吐酢水者宜此昆布丸若先服諸藥及湯酒等甚服之不相違件昆布丸方 一云吳茱萸丸
吳茱萸 蓽撥 茯苓 白朮
麴 葶藶熬 昆布各四兩洗 杏人去皮尖熬
枳實炙 大黃 乾薑各三兩 旋覆花半兩
橘皮三兩半
右十三味擣篩蜜和為丸如梧子飲服十丸一本云二十丸日二服利多減之不利加之常令微利覺病退則

止發便服之不可常服令人痰六七日半合之或三分減一分不爾敗一本有半夏六兩以湯洗滌之附子二兩又一本無旋覆花乾薑大黃杏人橘皮忌羊肉餳桃李雀肉酢物並出上卷中

脚氣寒熱湯酒方一十首

千金甘草湯療脚弱舉身洪腫胃反食穀吐逆胷中氣結不安而寒熱下痢不止小便難服此湯即益亦服女麴散利小便腫消服大散摩膏有驗方

甘草一兩炙　人參一兩　半夏一升洗　桂心三兩
小麥八合完用　大棗二十枚擘　生薑八兩　吳茱萸二升

蜀椒三兩出汗

右九味切以水一斗三升煮麥取一斗去麥內諸藥煮取四升一服六合作六服忌海藻菘菜羊肉餳生葱

又若寒熱日再三發可服此常山甘草湯方

常山三兩　甘草一兩半

右二味切以水四升煮取一升半分三服相去五里久進一服忌海藻菘菜生葱生菜

又白术膏酒療脚弱風虛五勞七傷萬病皆主之方

生白术淨洗一石五斗仍須揀擇擣取汁三斗煎取半
牡荆二十五束束別三尺圍各長二尺五寸徑頭一寸火燒取瀝三斗煎取半
青竹三十束束別三尺圍各長二尺五十徑頭一寸燒取瀝三斗煎取半
生地黃五大斤擣取汁三斗煎取半
生五加根三十斤淨洗訖剉於大釜內以水四石煎之去滓澄清取汁七斗以銅器中盛大釜內水上煎之取汁三斗五升其煎諸藥汁一準五加汁

右件白术等五種藥總計並訖得汁九斗五升上糯米一石五斗上小麥麴八斤暴乾末之以藥汁六斗漬麴五日待麴起第一淨淘米七斗令得三十遍以上下米置淨席上以生布拭之然後炊之下饋以餘藥汁澆饋調強弱更蒸之待饋上痳生然後下於席上調強弱冷熱如常醸法醖之密蓋頭三日後第二酘更淘米四升

一如前法酘之三日後即加藥如左

桂心六兩　甘草六兩炙　白芷六兩　當歸六兩
芎藭六兩　麻黄六兩去節　乾薑一斤　五加皮一斤
細辛六兩　防風六兩　附子五兩炮　牛膝九兩

右十二味㕮咀訖第三酘以米四斗淨淘如前法還以餘汁澆饋重蒸待上痳生下置席上調冷熱如常醸法和上件藥酘之三日外便嘗甘苦得中訖密封頭二七日後押取清酒一服四合日再細細加以知爲度溫酒不得過熱慎生冷酢滑猪鯉牛肉蒜麫等物

又松葉酒療脚弱十二風痺不能行服更生散數劑及眾

療不得力服此一劑便能遠行不過一兩劑方

松葉六十斤

右一味㕮咀以水四石煮取四斗九升以漬五斗米如常法別煮松葉汁以漬米并饙飯釀如封頭七日發澄飲之取醉得此酒力者甚衆神妙（並出第七卷中）

崔氏療腳弱獨活湯方

獨活三兩　生石斛三兩　白朮一兩　防風一兩半

茯苓四兩　白前一兩　羚羊角二兩屑　芍藥二兩

桑根白皮二兩　黃芩三兩　附子一兩炮　生薑二兩

桂心一兩　防己一兩

右十四味切以水九升煮取二升五合去滓分三服相去十里久服隔四日一劑宜服兩劑佳忌生冷酢滑猪肉桃李雀肉生葱（蘇恭同出第六卷中）

必效療腳氣屈弱若田舍貧家無藥者可釀菝葜及松節酒肯普方

菝葜一斛淨洗剉之以水三斛煮取九斗以漬麴又以水二斛煮滓取一斛以漬飯釀之如酒法熟即取飲隨多少若用松節及葉亦準此法其汁不厭也患腳氣屈弱積年不能行腰脊攣痹及腹內緊結者服之不過三五劑皆平復如常神驗（出後文仲同）

又金牙酒最爲療腳氣屈弱之要今載之方如左

金牙　細辛　茵芋（肘後作乾薑）

乾地黃　防風　附子（去皮）　地膚子

蒴藋　升麻（各四兩）　人參（二兩）　獨活（一斤）

牛膝（五兩）　石斛（五兩）

右十四味切之以酒四斗漬之六七日服一二合稍加之亦療口不能語腳屈至良又側子酒亦主之（肘後同無升麻人參石斛牛膝有蜀椒莽草止十味云冷加乾薑）

又陶效驗方云金牙酒療腳弱風冷痺曳又令人肥健勝舊自倍起三十年痺曳不能行口不能語者昔趙寅陽得疾二十六年內冷如鐵唯餘骨露服此三十日便起郡太守家代傳秘之云一方用茵芋四兩初服無數任性令足使有酒色便止不得食肥肉生菜其方無牛膝石斛二物餘同（文仲同並出第二卷中）

療腳獨活酒十月以後腰腳屈弱兼頭眩氣滿服此方

獨活　生薑　石斛（各六兩）　牛膝

丹參　萆薢　附子（炮）　茯苓（各四兩）

防風　薏苡人　山茱萸　桂心

白朮　天雄（炮）　芎藭　秦艽

當歸　人參（各二兩）　甘菊花（二兩）　生地黃（八兩）

右二十味切絹袋貯以酒二斗五升漬四日温服三四合日二服頭風患冷者加椒二兩汗出第一卷中

脚氣痹弱方七首

病源此由血氣虛弱受風寒濕毒氣與血并行於膚腠邪氣盛正氣少故血氣澀澀則痹虛則弱故令痹弱也出第六卷

肘後療脚氣之病先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痹或兩脛小滿或行起忽弱或少腹不仁或時冷時熱皆其候也不即療轉上入腹便發氣上則殺人療之多用湯酒摩膏藥種數既多不但五三劑今止取單行効用方

急先取好豆豉一斗三蒸三暴乾以好酒三斗漬三宿便可飲隨人多少欲盡預作若不及待漬便以酒煮豉飲之以滓薄脚其勢得小退乃更營諸酒及膏湯炙之文仲備急同

又獨活酒方

獨活五兩切 附子五兩生用去皮臍

右二味以酒一斗漬三宿服從一合始以微痹爲度忌豬肉冷水文仲備急同

又方

好硫黄三兩末之 牛乳五升

右二味以水五升先煮乳水至五升乃內硫黄煎取三升一服三合亦可直以乳煎硫黄不用水也卒無牛乳羊乳亦得千金翼云一服一合不知至三合

又方

先煎牛乳三升令減半以五合服硫黄末一兩服訖厚覆取汗勿令得風中間更一服暮又一服若已得汗不復服但好消息將護之若未差愈後數日中亦可更作若長將亦可煎爲丸北人服此療脚多效但須極好硫黄耳預備之並出第一卷中

千金松脂散主一切風及大風脚弱風痹方蔣陸法亦同

取松脂三十斤以棧皮安瓮底紫頭鐵鎗底布竹木置袋於上石押之下水於鎗中令淹者之膏浮出得置以後量更二十沸接取置於冷水中易凝流鎗凡八煮如此九過藥成搗篩爲散以粗羅下之用酒服一方寸匕日二初和藥以冷酒藥入腹後飲熱酒行藥以知爲度如覺熱即減不減令人大小便秘澀宜食葱葵仍自不通宜服生地黄汁微取泄利也除忌大麻子以外無所禁若欲斷米加茯苓與松脂等分蜜和爲丸但食淡麵餺飥日兩度一食一小椀勿多食也

作餺飥法硬和麪熟挼煮五十沸漉出冷水淘更置湯中煮十餘沸然後漉出食之服松脂三十日後自覺有驗兩脚如似水流下是効如恐秘澁和一斤松脂茯苓與棗許大礪即不澁服經一百日後脚氣當愈有經日服松脂一年增壽一年服之二年增壽二年服之乃至十年增壽十年 出第七卷中

茯苓散療脚氣經春夏及秋脚弱或腫氣時上衝心身體疼悶者方

獨活　茯苓　牛膝　漢防已

白术　黃耆　麻黃去節　柴胡各六兩

當歸　防風　橘皮　桂心

人參各四兩　附子三兩生用　磁石十六兩碎如豆　羚羊角屑三兩

生薑　杏人　半夏洗　吳茱萸

檳榔碎　丹參八兩

右二十二味不著分兩自隨時加減餘二十物切如巴分作三十貼貼著生薑一兩合皮碎切杏人十四枚去皮尖碎以水二升煮取七合去滓頓服之日一服或二日一服冷多加吳茱萸半兩熱多加麥門冬半兩大熱以竹瀝一升代水嘔逆食不下加半夏一兩毒悶加甘木香二分以意消息之患人大便難加大黃半兩服滿食不消加檳榔三二枚所加藥病差即止不當服忌猪肉冷水羊肉餳生葱蒜李雀肉酢物 出第一卷中

又療諸脚氣弱未至大然喜常煮散方

獨活　漢防已　麻黃去節　茯苓

丹參　牛膝各六兩　磁石十六兩碎　黃耆

防風　人參　羚羊角屑各六兩　升麻

青木香　桂心各四兩　石膏十兩碎　吳茱萸八兩

生薑　半夏洗　檳榔大者　杏人

大黃切

右二十一味將十八物擣切如豆分作二十分分和為

一服服以檳榔三枚生薑一兩各合皮切杏人十四枚去皮尖以水二升三合煮取七合去滓日晚或夜中服之日一服若氣虛時日二服可一服或二日一服或三日一服若心下滿嘔逆者加半夏一兩嘔定止若大便澀者可去磁石加大黃一兩大便利即停忌生葱酢物羊肉餳

脚氣痺攣方二首

病源脚氣之病有挾風毒者則風毒搏於筋筋為攣風濕乘於血則痺故令痺攣也 出第十三卷中

千金石斛酒療風虛氣滿去痰冷痺攣弱不能行方

石斛五兩　丹參五兩　防風二兩　側子四兩
桂心一兩　乾薑二兩　羌活三兩　秦艽四兩
芎藭二兩　杜仲四兩　薏苡人一升碎　五加根皮五兩
山茱萸四兩　橘皮三兩　椒三兩　黃耆三兩
白前二兩　茵芋三兩　當歸三兩　牛膝四兩
鍾乳八兩

右二十一味切將鍾乳擣碎別絹袋盛繫於大藥袋內以清酒四斗漬三日初服三合日再稍稍加之以知為度忌豬肉冷水生葱并第七卷中

千金翼防己湯主風濕四肢疼痺攣急浮腫方

木防己二兩　茯苓四兩　芎藭三兩　芍藥二兩
桂心三兩　甘草六分炙　大棗十二枚擘　麻黃二兩去節
桑根白皮切二升

右九味以水一斗二升煮麻黃減一升內藥煮取三升分三服服藥汗出令遍身以粉粉之慎風冷并出第十六卷中

風偏枯方二首此風偏枯以下五門並載脚氣風毒攣痹撮頓

病源風偏枯者由血氣偏虛則腠理開受於風濕風濕客於半身在分腠之間使血氣凝濇不能潤養久不差生氣去邪獨留則成偏枯其狀半身不隨肌肉偏枯小而痛言不變智不亂是也邪初在分腠之間宜溫卧取汗益其不足損其有餘乃可復也診其胃脉沉大心脉小牢急皆為偏枯男子則發左女子則發右若不瘖舌轉者可療三十日起其年未滿二十者三歲死又左手尺中神門以後脉足太陽經也虛者則病惡風偏枯此由愁思所致憂思所為其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云正倚壁不息行氣從頭至足止愈疽疝大風偏枯諸風痺

又云仰兩足指五息止引腰背痺偏枯令人耳聞聲常行眼耳諸根無有障礙

又云正倚壁不息行氣從口趣令氣至頭始止療疽痺大風偏枯

又云一足踏地足不動一足向側相轉身欲勢并手盡急迴左右迭二七去脊風冷偏枯不通潤并出第一卷中

深師大八風湯療毒風虛痺嚲曳或手脚不遂身體偏枯或毒弱不任或風經五藏恍恍惚惚或多語喜忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊強直不得俛仰又加腹滿食少時氣欬或始遇病時卒倒悶絕即不能語便失音半身或舉體不隨不仁沉重皆由體虛恃少不避風冷所致二十三種大八風湯方

當歸一兩半　升麻一兩半　烏頭二兩炮　黃芩二兩

芍藥二兩 遠志二兩去心 獨活二兩 五味子一兩半
防風二兩 芎藭二兩 麻黃一兩去節 乾薑一兩半
秦艽一兩 桂心二兩 大豆二升 石斛一兩
甘草二兩炙 杏人四十枚 人參二兩 茯苓二兩
黃耆一兩 紫菀二兩 石膏二兩碎
右藥㕮咀以水一斗二升酒二升合煮取四升強人分四服羸人分五六服千金翼同出第九卷中
古今錄驗療三十年風癖偏枯不能行香豉散方
生地黃二十斤 香豉三升熬
右二味洗地黃㕮咀先蒸半日暴燥更合豉蒸半日暴令燥擣下篩以酒服三方寸匕日三亦可水服益精爽氣服數月有神効出第十四卷中

風四肢拘攣不得屈伸方五首
病源此由體虛腠理開風邪在於筋故也春遇痺為筋痺則筋屈邪客關機則使筋攣邪客於足太陽之絡令人肩背拘急也足厥陰肝之經也肝通主諸筋王在春其經絡虛春遇風邪則傷於筋使四肢拘攣不得屈伸診其脉急細如弦者筋急足攣也若筋屈不已又遇於邪則移變入肝其狀夜卧則驚小便數也其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云手前後遞互交拓極勢三七手掌向下低頭面心氣向下至涌泉倉門卻努一時取勢散氣放縱身體平頭動髆前後欹側柔髆二七去髆井冷血筋急漸漸如消又云兩手抱左膝生腰鼻內氣七息展右足除難屈伸拜起脛中痛萎
又云以兩手抱左膝著膺除下重難屈伸
又云踞坐伸右腳兩手抱左膝頭生腰以鼻內氣自極七息展右足著外除難屈伸拜起脛中疼痺
又云立身上下正直一手上拓仰手如似推物勢一手向下如似捺物勢上下來去換易四七去髆內風兩肩井內冷血兩腋筋脉攣急

又云踞伸左腳兩手抱右膝生腰以鼻內氣自極七息展左足著外除難屈伸拜起脛中疼痺出第一卷中
千金療中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食張仲景三黃湯方
麻黃五分去節 獨活四分 細辛二分 黃耆二分
黃芩三分
右五味切以水五升煮取二升分二服一服小汗兩服大汗心中熱加大黃二分腹滿加枳實一分炙氣逆加人參三分悸加牡蠣三分熬渴加栝樓根三分先有寒加八角附子一枚炮此方神秘不傳張文仲備急深師及古今錄驗同

又麻子湯療大風周身四肢攣急風行在皮膚身勞強服之不虛人又主精神蒙昧方

秋麻子（三升淨擇水漬一宿） 防風（二兩） 麻黃（去節二兩）
生薑（一斤） 橘皮 桂心（二兩） 竹瀝（一握）
石膏（二兩碎） 細辛（二兩） 葱白（一握） 香豉（一合）

右十一味切先以水二斗半煮麻子令極熟漉去滓取九升別煮麻黃數沸掠去沫內諸藥汁中煮取三升去滓空腹分三服服訖當微汗汗出以粉塗身然後避風者不過二劑乃至五劑以來無不差輕者不過兩劑差有人患大風賊風刺風加獨活三兩比小續命湯準當

六七劑忌生葱生菜（一方無細辛）

又白斂薏苡湯療風拘攣不可屈伸方

白斂（一升） 薏苡人（一升） 芍藥（一升） 酸棗人（一升）
乾薑（一升） 附子（三枚炮去皮） 甘草（炙一升） 桂心（一升）
牛膝（一升）

右九味淳酒二斗漬一宿微火煎三沸服一升日三扶杖起行不耐酒服五合忌生葱豬肉海藻（古今錄驗同 異方有車前）

千金出第八卷中

崔氏療暴得風四肢攣縮枯細不能行動用大豆蒸發人不能辨藥者可依此方

取大豆三升淨揀擇淘之漉出蒸之待氣溜下甑傾二大升釅醋甑中和攪令遍於密屋內地上設鋪席一鋪帕傾豆著帕上仍以五六重綿衣覆豆令病人於豆上臥以被覆之若豆冷漸漸抽綿不令一人於被內引挽攣急處却綿衣盡豆冷收取更著甑中依前法蒸熱下甑復著升半醋和豆一準前法用鋪設每一收豆作二升荊瀝湯與病人飲徐徐任食日再度夜一度如此經三日三夜即休忌風（出第二卷中）

古今錄驗西州續命湯療中風入藏及四肢拘急不隨緩急風方

麻黃（去節三兩） 石膏（二兩） 芎藭（一兩） 生薑（三兩）
黃芩（一兩） 甘草（炙一兩） 芍藥（一兩） 桂心（一兩）
郁李人（去皮三兩） 防風（一兩） 杏人（去皮尖） 當歸（一兩）

右十二味切以水九升煮麻黃去上沫內諸藥煮取三升分四服初服取汗米粉粉於衣裹粉之忌海藻菘菜生葱（出第二卷中）

風不仁方三首

病源風不仁者由榮氣虛衛氣實風寒入於肌肉使血氣行不宣流其狀搔之皮膚如隔衣也是診其寸口脈緩則皮膚不仁不仁脈虛數者生牢急疾者死其湯熨鍼石別

有正方補養宣導今附於後養生方導引法云赤松子曰偃臥展兩脛兩手足外踵指相向以鼻內氣自極七息除死肌不仁足寒

又云展左足右足上除不仁脛寒 出第一卷中

深師茵芋酒療新久風體不仁屈曳或拘急腫或枯焦皆主之施連所增損方甚良

茵芋一兩 狗脊一兩 躑躅花二兩生用 烏頭二兩生用
附子二兩生用 天雄一兩生用

右六味切以酒一斗絹袋盛漬之冬八九日夏五六日初服半合不知增之以知爲度忌猪肉冷水 千金同

又八風湯療五緩六急不隨身體不仁下重腹中雷鳴失小便方

防風二兩 芍藥二兩 茯苓二兩 黃耆三兩
獨活四兩 當歸三兩 人參三兩 乾薑二兩
甘草一兩炙 大豆二升 附子一枚炮

右十一味切以水一斗清酒二升合煮取三升分三服忌海藻菘菜猪肉冷水酢物

又犀角丸療百病鬼注惡風入皮膚淫淫液液流移無有常處四肢不仁牽引腰背脹滿心痛逆胸滿不得飲食吸吸短氣寒熱羸瘦夜寤惡夢與鬼神交通欬嗽膿血背療之方

犀角二分屑 獺肝三分炙 雄黃四分研 桂心二分
丹砂四分研 貝齒十分炙研 巴豆十一枚去心皮 蜈蚣一枚去頭足炙
真珠四分研 射罔一分 麝香一分研 羚羊角二分屑
牛黃二分研 附子一分炮 鬼臼二分

右十五味擣下篩蜜和更擣五千杵平旦服如胡豆二丸酒飲並得日三忌猪肉冷水生葱生血物蘆笋 並出第九卷中

風濕痺方四首

病源風濕痺病之狀或皮膚頑厚或肌肉酸疼風寒濕三氣雜至合而成痺其風濕氣多而寒氣少者爲風濕痺也由血氣虛則受風濕而成此病久不差入於經絡搏於陽經亦變令身體手足不隨其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云任臂不息十二通愈足濕痺不任行腰脊痛又正臥疊兩手著背下伸兩腳不息十二通愈足濕痺不任行腰脊痛痺有偏患者患左壓右足患右壓左足久行手亦如足周行滿十方止

又云以手摩腹從足至頭正臥伸臂導引以手持引足住任臂閉氣不息十二通以療痺濕不可任腰脊痛 出第一卷中

千金諸風痺方

桂心一兩　當歸一兩　茯苓一兩　防風一兩
甘草一兩炙　黃芩一兩　生薑五兩　秦艽二分
葛根二分　乾棗二十枚擘　杏人七十枚去皮尖
右十一味切水酒各四升煮取二升分三服取汗
又療風痺遊走無定處名曰血痺大主之方
萆薢四分　薯蕷四分　牛膝四分　澤瀉四分
蠐螬二分熬　天雄三分炮　車前子三分　乾漆三分熬
白朮三分　地膚子二分　山茱萸五分　狗脊三分
茵芋一分　乾地黃十分
右十四味擣篩蜜和丸酒服如梧子十丸日三服稍稍

加之忌桃李雀肉猪肉冷水蕪荑等物
又白斂散療風痺腫筋急展轉易無常處方
白斂二分　附子一分炮
右二味擣下篩酒服半刀圭日三不知增至一刀圭身
中熱行爲候十日便覺忌猪肉冷水并出第八卷中
古今錄驗六生散療急風痺身軀拘痛方
生菖蒲一斤切　生地黃一斤　枸杞根一斤　生商陸根一斤
生烏頭半斤　生薑二斤
右六味以淳酒漬之一宿出暴乾復內酒中令酒盡暴
令燥擣下篩以清酒一升服一錢七日再服之忌猪羊
肉冷水蕪荑餳出第十四卷中

風濕方九首

病源風濕者是風氣與濕氣共傷於人也風者八方之虛
風濕者水濕之蒸氣若地下濕復少霜雪其山水氣蒸
值暖濕退人腠理開便受風濕其狀令人懈惰精神昏憒
若經久亦令四肢緩縱不隨入藏則瘖瘂口舌不收或腳
痺弱變爲腳氣其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於
後養生方導引法云撋頭却髮放行多遍通流血脈散風濕
數易更櫛當用之出第十一卷中
深師療風濕脈浮身重汗出惡風方

漢防己四兩　白朮三兩　蜀黃耆五分　甘草一兩炙
大棗十二枚擘　生薑三兩
右六味㕮咀以水六升煮取二升分爲三服服湯當坐
被中欲解汗出如蟲行皮中忌桃李雀肉海藻菘菜千
金同出本仲景傷寒論方
又四物附子湯療風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近
之則痛自汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或一身悉
腫方
附子二枚炮去皮　桂心四兩　白朮三兩　甘草二兩炙
右藥㕮咀以水六升煮取三升去滓服一升日三當微

汗若汗出竭者一服五合蔡公數用驗忌豬肉冷水生
葱餘忌同前方 此本仲景傷寒論方
又療風濕百節疼痛不可屈伸痛時汗出方
芍藥 四兩　甘草 二兩炙　芎藭 四兩　附子 三兩炮四破
右四味㕮咀以水五升煮取二升分再服相去十里頃
忌同
又療風濕身體疼痛惡風微腫湯方
桂心 四兩　麻黃 六兩去節　芍藥 三兩　天門冬 二兩去心
生薑 一兩　杏人 五十枚
右六味㕮咀以水一斗煮取三升一服一升日三忌鯉

魚忌同 並出第九卷中
古今錄驗附子湯療風濕相搏骨節煩疼不得屈伸近之
則痛白汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或一身微
腫方
桂心 三兩　白朮 三兩　附子 二枚炮八破　甘草 二兩
右四味㕮咀以水六升煮取三升分三服微汗即止若
汗出煩者稍服五合驃騎使吳諧以建元元年八月二
十六日始覺如風至七日卒起便頓倒髀及手皆不隨
通引腰背疼痛通身腫心多滿至九月四日服此湯一
劑通身流汗即從來所患悉愈本方不用生薑既有附

子今加生薑三兩忌同
又療風濕體疼惡風微腫天門冬湯方
天門冬 一兩去心　葛根 四兩　生薑 三兩　桂心 四兩
麻黃 三兩去節　芍藥 二兩　杏人 五十枚　甘草 二兩炙
右八味切以水一斗煮取三升分三服取汗忌鯉魚餘
同前 深師無芍藥名天門冬湯並出第十四卷中
又療風濕脈浮如鍼刺之狀身體有腫惡風汗出短氣不
能飲食麻黃湯方
麻黃 四兩　芎藭 一兩　莽草 一兩　當歸 一兩
杏人 二十枚

右五味切以水五升煮取二升去滓分三服日三療弱
將息佳
又論中風偏枯風痱風懿風夫偏枯者半身偏不隨肌肉
偏不用而痛言不變智不亂病在分腠之間溫臥取汗益
其不足損其有餘乃可復也風痱者身無痛四肢不收智
亂不甚言微知可療甚則不能言不可治也風懿者奄忽
不知人咽中塞窒然舌強不能言病在藏府先入陰後
入陽治之先補於陰後瀉於陽發其汗身轉軟者生汗不
出身直者七日死風痱病不可已者足如履水時如入湯
腹中股脛淖濼煩心頭痛嘔眩時時汗出目眩悲恐短氣

不樂不出三年死騎士息王恕每年五十紗扇白扇汗出
中風口不得語身緩不收積一月困篤殷荀彥作七物獨
活湯服五劑得愈又士度良母年七十餘中風困苦口不
得語積百餘日往來飲食如故荀又與合獨活湯四劑得
愈七物獨活湯療脚弱及中風濕緩縱不隨方（出翼方）
獨活（五兩） 葛根（四兩） 乾薑（二兩） 桂心（四兩）
半夏（四兩洗） 甘草（二兩炙） 防風（二兩）
右七味㕮咀以水一斗煮取三升分服一升日三得少
微汗出好忌羊肉餳海藻菘菜生葱
又療濕家始得病時可與薏苡麻黃湯方

薏苡（半升） 麻黃（四兩去節） 甘草（二兩炙） 杏人（二兩）
右四味㕮咀以水五升煮取二升分再服汗出即愈濕
家煩疼可以甘草麻黃湯發汗不差更合飲家加白朮
四兩名白朮麻黃湯忌海藻菘菜桃李雀肉等（此本仲景方分兩小異並出第十五卷中）
許仁則療脚氣方三首
許仁則曰此病有數種有飲氣下流以成脚氣飲氣即水
氣之漸亦有腎氣先虛暑月承熱以冷水洗脚濕氣不散
亦成脚氣亦有腎氣既虛諸事不節因居卑濕濕氣上衝
亦成脚氣此諸脚氣皆令人脚脛大脚趺腫重悶甚上衝

心腹滿悶短氣中間有乾濕二脚氣濕者脚腫乾者脚不
腫漸覺枯燥皮膚甲錯須細察之若先覺心腹脅肋刺痛
胷背滿悶吸食之後此狀彌加時時氣短手脚沉重骨髓
疼多嗔氣每食諸黏膩陳敗臭物即諸狀轉劇此即飲氣
下流而成脚氣有此候者自宜依前療飲氣將成水氣細
辛等八味湯葶藶子等十五味丸療之若先無前狀但覺
脚膝疼悶沉重有時緩弱乍衝心腹滿悶小腹下不仁有
時急痛宜依後吴茱萸等五味湯桑根白皮等十味丸側
子等十味酒細細服之吴茱萸湯方
吴茱萸（二兩） 生薑（五兩） 橘皮（二兩） 桂心（二兩）

大檳榔（十枚）
右藥切以水七升煮取二升半去滓分温三服服相去
如人行七八里久一服覺諸狀可欲重合服亦佳服湯
後將息經三四日即服後桑根白皮等十味丸忌生葱
又方
桑根白皮（五兩） 生薑（屑六兩） 蜀椒（汗） 桂心
升麻（四兩） 五味子（四兩）
右藥擣篩蜜和爲丸以飲下之初服十五丸日再服稍
稍加至三十丸如梧子大覺熱食前服覺冷食後服之
忌同（蜀椒桂心元未見分兩）

又主九月以後宜合側子等十味酒服之兼將下九方

側子五兩　生薑八兩　桑根白皮八兩　桂心四兩

白术八兩　五加白皮六兩　丹參六兩　續斷五兩

牛膝五兩　細辛四兩

右藥切絹袋盛用無灰酒五升浸五六日初服一雞子黃許日再服稍稍加之以知爲度必用前數方不覺可宜依前脚氣方用之忌豬肉冷水桃李雀肉生葱生菜

吳升同並出一卷中

論陰陽表裏灸法三十七首

蘇恭云凡脚氣發有陰陽表裏當隨狀療之不可灸依古方也患陰療陽病表攻裏皆爲重虛實危殆之甚也若病從陰發起兩足大指內側上循脛內及膝裏頑痺不仁或腫先發於此者皆須隨病灸復留中都陰陵泉等諸穴灸者先從上始向下引其氣使各灸二十壯向後隔七日灸七壯無在止餘穴皆依此若病從陽發起兩小指外側向上循脛外從絕骨至風市頑痺不仁或腫起於此者須灸陽輔絕骨陽陵泉風市等諸穴灸數及上向下皆依前法若氣毒兼行表裏者乃可量其輕重隨灸兼摩之若上下通發表裏各灸一二處以此通洩之其用藥內攻各從病按藥也經偏若處常使灸瘡不差爲佳風氣都除乃聽瘡

瘥差後瘢色赤者風毒盡青黑者猶有毒氣仍灸勿止猶身體輕利然後可休矣又一本云皆須灸三里絕骨乃令瘥差佳

灸脚氣穴名

陽陵泉 二穴在膝下一寸外廉陷中是也 [illegible]

絕骨 二穴在足外踝上 [illegible]

陽輔 [illegible]

上廉 下三寸 [illegible]

條口 [illegible]

下廉 二穴在 [illegible]

犢鼻 二穴在膝蓋上 [illegible]

太衝 二穴在足大指本節後二寸是 [illegible]

曲泉 [illegible]

陰陵泉 二穴在膝下內側 [illegible]

三陰交 二穴在內踝上三寸 [illegible]

太陰 [illegible]

太陰蹻 [illegible]

委中 二穴在 [illegible]

承筋 二穴在腨中央陷中是 [illegible]

承山 二穴在 [illegible]

湧泉 二穴在 [illegible]

右件穴並要不可摠能灸其穴最要者有三里絶骨承筋大衝崑崙涌泉有患者可灸又謹按明堂側當以立為正取穴必須直立脚下骨坐立便即後動不定故宜立取之其寸取病人中指上節為一寸若取尺寸有長短取穴必不著又按秦承祖華佗等取穴並云三指四指為準取三里穴四指指闊六分計六二十四只闊二寸四分取穴如何得著黃帝為本諸說並不可信 徐同

徐論患脚氣體皆春發夏甚秋輕冬歇大法春秋宜灸冬差可行夏都不可灸既瘡敗又不得觸風令四人反更增劇久時血凝又逆天理急不得已無藥物處可灸一二要

穴不可過身多灸脚氣病大論毒從下上亦有從上向下者或云灸上毒氣便上罷灸止見毒氣攻處疼痛如刺隨痛即灸火徹便瘥不拘上下凡毒氣所衝如賊欲出得穴即出豈在大門也風毒所攻亦復如是此皆經試為不失一必不為誤耳 蘇同

蘇恭云脚氣初發轉筋者灸承山承筋二穴喘逆者灸涌泉若從頭至連背痛寒熱如瘧及腰痛者灸委中頭項背痛隨所痛即灸不在正穴也

又云若脚氣並發時自腰以上並不得鍼灸當引風氣上則殺人氣歇以後有餘病者灸無妨唯冬月得灸春夏不可灸自風市以下固宜佳耳

又云若氣上撃心不退急灸手心三七炷氣即便退若未退即悶急煮豉酒熱飲逐之即差不去即取烏特牛尿一大升煖服以利為止從至三服五服彌佳

又若已灸脚而胷中氣猶不下煩悶者宜灸間使五十炷兩手掌横文後一云三寸兩筋間是也

又若胷中氣散而心下有脉洪大跳其數向下分入兩髀股內令人心急忪悸者宜以手按捻少腹下兩傍接髀大斜文中有脉跳動便當文上灸跳三七炷即定灸畢皆須灸三里二十炷以引其氣下也

又若心腹氣定而兩髀外連膝悶者宜灸膝眼七炷在膝頭骨下相接處在筋之外陷中是若後更發復灸一炷

又凡人雖不患脚氣但苦髀膝疼悶灸此無不應手即愈極為要穴然不可鍼亦不可多灸唯只灸七炷以下

又若脚十指酸疼悶漸入趺上者宜灸指頭正中甲肉際三炷即愈

又若大指或小指傍側疼悶覺內有脉如流水上入髀腹者宜隨指傍處灸三炷即愈 並出上卷中

唐論若手指本節間疼稍入臂者宜灸指間疼處七炷即定

又若心胷氣滿已灸身脛諸穴及服湯藥而氣猶不下煩急欲死者宜灸兩足心下當中陷處各七壯氣即下此穴尤爲極要而不可數灸但極急乃灸七壯耳以前諸灸法並經用所試皆驗灸畢應時即愈故具録記之凡灸不廢湯藥藥攻其內灸瀉其外譬如開門驅賊賊則易出若閉戸逐之賊無出路當反害人耳

灸用火善惡補寫法一首

張仲景云四肢者身之支幹也其氣係於五藏六府其分度淺故灸之不欲過多須依經數也過謂餘病則宜依之若脚氣不得拘此例風毒灸之務欲多也依此經數則在

難愈疾小品論灸有八木火明堂論灸有補寫之法若能依之應有道理八木之火凡灸用松木火則難愈柏木火則瘡多汁橘木火則傷皮桑木火則肉枯棗木火則髓消竹木火則傷筋多壯則筋縱枳木火則陷脉潰榆木火則傷骨多壯則骨枯凡八木之火皆不可用也火用陽燧之火其次用碏石之火天陰則用槐木之火陽燧是以火珠向日下以艾於下承之便得火也碏石似玉堅以此石擊實鐵即火出仍以極燥榆木承之即得亦用艾取之此是胡奴取火法今胡人猶脩灸有補寫者甲乙經云用灸補者無吹其火須自滅也以灸寫者疾吹其火拊其艾須其

道按經一本作灶

火滅也此言以口吹艾炷令疾滅即是寫也不吹聽自滅者即補也小品又云黃帝曰灸不過三分是謂從穴此言作艾炷欲令根下闊三分也若減此則不覆孔穴不中經脉火氣不行不能除病也若江南嶺南寒氣既少當二分爲準炷小不得減一分半也嬰兒以意減之凡灸瘡得膿增壞其病乃出瘡不壞則病不除矣甲乙經云灸不發者灸故履底炙之三日即發也甚宜解此又近有蘇恭善醫此疾遂名於上京顯要於下且撰脚氣方卷論方則信爲指南敍灸亦未成膠柱乃云毒氣如賊出何必要在大門腹背手足皆須灸也愚謂灸療風毒所攻腹則引賊入室

如何令賊出門特宜知之不可輕脱若手指疾間灸無妨也 出第一卷中

雜療脚氣方一十五首

千金防風湯療肢體虛風微經內發熱肢節不隨恍惚狂言來去無時不自覺曾南方支法存所用多得力溫和不損人爲勝於續命越婢風引等湯羅廣州一門南州人士常用亦治脚弱甚良方

防風三兩 麻黃三兩去節 秦艽三兩 獨活三兩

當歸三兩 遠志二兩去心 木防己二兩 甘草二兩炙

人參二兩 黃芩二兩 升麻二兩 芍藥二兩

石膏碎一兩　麝香二分　生薑一兩　半夏洗二兩

右十六味切以水一斗三升煮取四升一服一升初服厚覆取微汗亦當三兩行下其間相去如人行十里久更服有熱加大黃二兩先有冷心痛疾者倍當歸加桂心三兩去大黃忌海藻菘菜羊肉餳一方有白朮出第七卷中

千金翼膏丸主腳氣皮肉身體諸風方

烏頭一兩　附子三兩炮　麻黃四兩去節　枳實四兩炙

右四味擣篩蜜和丸梧子酒服五丸日三忌豬肉冷水如生用烏頭附子服如麻子五丸出第十八卷中

必効白楊皮酒主腳氣偏廢及主一切風緩風手足拘攣

並効方

取白楊東南面皮去地三尺以上去蒼皮勿令見風細切熬令黃赤色即止內不津器中以酒浸皮多少每令酒浸皮二三寸乃以泥封冬月二七日春夏一七日開飲晝二夜一隨性多少有酒氣爲度得本口爲佳病可者飲至一石若重者乃至兩石以差爲度酒唯須不飯其白楊不得取丘塚者服每日一兩行鴨溏利蘇恭文仲備急同出第三卷中

蘇恭療諸氣方

杏人一百二十枚　大棗六十枚去皮核　香豉三百粒熬令乾

右三味先擣豉次擣杏人次擣棗令相得以如彈丸大含之細細嚥之忌如藥法此方唯少深有効驗

又凡腳氣內須服藥攻擊外須膏摩火灸發洩膏並是腳氣之要若有攣急及有不仁之處不問冬夏常用膏摩之

又有膏摩法由風毒先從手腳上腨及上氣衝及面如入腹即殺人宜用此膏摩之方

冶葛二兩　蛇銜二兩　犀角二兩屑　烏頭二兩

桔梗二兩　茵芋二兩　防風二兩　蜀椒二兩

乾薑一兩　巴豆三十枚又方云一兩去心皮　升麻二兩

細辛一兩　雄黃半兩　鼈甲一兩炙

右十四味細切以酒四升漬藥一宿以不中水豬膏五斤以煎藥於微火上三上三下令藥色變黃勿令焦黑膏成絞去滓乃下之攪令調和以摩病上忌豬肉冷水生菜莧菜蘆筍等一方有下兩白芷爲十六味千金無茵芋細辛有莽草丹參蜀漆花

又療風痺手足疼弱風濕惡毒疼痛有瘀肉攣痛百病摩之皆愈方

莽草三分　牡丹皮二兩　蜀椒四分　藜蘆三分

芫花二兩　大黃四分　皂莢二分　附子一兩

右八味擣篩以苦酒三升漬一宿以不中水豬脂三斤微火上煎之三上三下令藥色黃膏成去滓以摩腫痛

瘡有毒不可服及近孔要處合藥勿令婦人孝子雞犬見之其二膏療風毒最善然治葛膏救急勝於前魚膏久用不已令人肉漸枯細由魚膏雖稍緩常用為佳當以臘月合一劑用之極効忌豬肉冷水胡荽

又令莽膏有巴豆摩多損皮肉用莽草膏方

莽草五兩　附子八兩生用去皮　丹參四兩　漢防己三兩

芎藭四兩　椒三兩　吳茱萸四兩　白芷三兩

沉香半兩　零陵香半兩　雞舌香半兩　犀角二兩屑

當歸三兩　商陸根四兩　青木香半兩

右十五味切以酢漬一宿以好酥三大斤煎九上九下

布絞去滓用摩頑痺并腫處好膏入肉亦無損傷服諸藥不相妨神効忌豬肉冷水

又治葛膏方

冶葛二兩　犀角二兩屑　漢防己二兩　莽草二兩

烏頭五兩生用　吳茱萸五兩　椒三兩生用　丹參三兩

躑躅花一升　升麻二兩　乾薑二兩　附子五兩

白芷一升　當歸三兩　桔梗三兩

右十五味切酢漬以成煎豬肪七升煎五上五下去滓用之以豚代肪諸忌豬肉冷水舊方無白芷防己茱萸附子當歸有巴豆雄黃蛇銜防風鼈甲

又神明膏方

附子十四枚小者二十枚　吳茱萸一升生用　蜀椒一升半

白芷一升　前胡切一升　芎藭切一升　白朮切一升

桂心三兩　當歸二兩　漢防己切一升風多去之風者加細辛

細辛二兩

右十一味切酢淹漬一宿以成煎豬肪三升煎五上五下去滓摩病及不仁大試有驗有半豚代豬脂尤佳忌豬肉冷水生葱生菜桃李等

又卿氣風毒發不與人期攻心即死若居僻遠無藥物處致斃為横死其要藥常宜備隨身

半夏洗　青木香　吳茱萸　木瓜

犀角屑　大黃　生薑　橘皮宿者縣之

檳榔　茯苓　昆布　草撥

紫蘇　杏人　前胡　細辛

桂心　旋復花其大也

並須備急救命若卒患無藥處隨病所在三五味濃煮服之後依方合藥服之

又凡人入八月氣自漸定非意氣大發者作半夏獨活湯多在或睡覺心悸心悶風熱故也竹葉湯食後服之為佳如不已作後湯服

麥門冬三兩去心 茯苓二兩 石膏四兩碎 小麥五合
竹葉切一升 生薑二兩

右六味切以水五升煮取一升二合食後分再服相去七八里久忌酢物

又尋常氣滿二日兩日服一劑湯方

檳榔七枚碎 橘皮一兩 厚朴二兩炙 生薑四兩
吳茱萸二兩

右五味切以水二升煮取一升二合分三服相去五六里久復服之此藥性溫去冷氣

又蒼耳酒去安節頭足諸熱風藥性冷不便熱方

六月以後收取日乾至九月刈一大斛水三斛煮取四斗漬二大斗麴三夜想以米一大斛漬三日如凡醸法將息醸之酒熟日二三服五合得諸風骨節中風若差或發癢疼差後皮痛膚堅實光悅腰腳甚便若虛熱羸瘦弱人無問男女加生地黃五升牛膝根剉二升丹參二升天門冬二升松葉五升枸杞根五升杏人一升去皮尖剃根若子二升水三石別煮牛膝丹參松葉等取六斗并蒼耳汁總一石漬五斗麴用米二石五斗分四度醸杏人末著第一醸飯中下天門冬去心蒸熟剃去皮擣如泥著第三醸飯中下又大麻子一大斗擣碎著第四醸中下大去皮膚風痹虛大良劾多頭風者得甘菊花一升漬第五醸糯中下攪之調訶熬大小同服並得餘無禁忌蕪食肉並勿食有藥處可辨無藥處可以蒼耳為本如或少三兩物亦得不必俱備年常醸至三月服極撥衆疾復延齡輕身將漬石斛等藥酒彌佳忌鯉魚熱麪

又單醸鼠黏根酒和蒼耳單酒法大去風疼癢止欬嗽消痰癖差疽瘻亦是良藥腳氣人作廣側子等酒彌佳一名牛蒡根草名惡實根又患昏昏頭旋瘻甚氣滿背痛取前蒼耳酒漬此後藥方

獨活 山茱萸 天門冬去心 黃耆
甘菊花 防風 天雄炮 側子炮
防己 白朮 茯苓 牛膝各四兩
枸杞五兩 丹參四兩 生薑六兩 磁石十兩
貫衆二兩 生地黃八兩切

右十八味切以絹袋盛酒二大斗漬七日溫服一盞日二三服忌豬魚陳臭物餘無禁主腰腳兼去酒風忌豬肉冷水桃李雀肉鯉魚蕪荑酢物並出第一卷中

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張　寔

校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第十九卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十卷目録水病二十六門

水腫方一十三首
水病方七首
十水方三首
大腹水腫方五首
風水方八首
水蠱方四首
卒腫滿方六首
腫入腹苦滿方三首
水通身腫方一十一首
水氣腫鼓脹方四首
水腫欬逆上氣方三首
氣兼水身面腫方四首
水氣方六首
皮水方三首
水腫從脚起方四首
水癥方二首
水瘕方一首
石水方四首
暴腫滿方四首

氣滿胷急方八首
虛熱及先服石風水腫方三首
三焦決漏水病方二首
男女新久腫方二首
水腫小便澀方三首
上氣大便澀方二首
水病雜療方一十一首

唐王燾先生外臺秘要方第二十卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進
新安後學程衍道敬通父訂梓

水腫方一十三首

病源腎者主水脾胃俱主土土性剋水脾與胃合相為表裏胃為水穀之海今胃虛不能傳化水氣使水氣滲溢經絡浸漬府藏脾得水濕之氣加之則病脾病則不能制水故水氣獨歸於腎三焦不寫經脉閉塞故水氣溢於皮膚而令腫也其狀目裹上微腫如臥起之狀頸脉動時欬股間冷以手按腫處隨手而起如物裹水之狀口苦舌乾不得正偃偃則欬清水不得臥臥則驚驚則欬甚小便黃澀是也水病有五不可療第一脣黑傷肝第二缺盆平傷心第三臍出傷脾第四足下平滿傷腎第五背平傷肺凡此五傷必不可療脉沉者水也脉洪大者可療微細者不療養生方云十一月勿食經夏自死肉脯內動於腎喜成水病其湯熨鍼石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云蝦蟇行氣正坐動搖兩臂不息十二通以治五勞水腫之病也又云人臥勿以腳懸蹋高處不久必成腎水出第二十一卷中

黃帝問曰水與膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之岐伯對曰水始起也目裹上微腫如新臥起之狀頸脉動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹者寒氣客於皮膚之間殼殼然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹陷而不起腹色不變此其候也鼓脹者腹脹身腫大與膚脹等色蒼黃腹脉起此其候也腸覃者寒氣客於腸外與衛氣相薄正氣不得營因有所繫癖而內著惡氣乃起瘜肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成也若懷子之狀久者離歲月按之則堅推之則移月事不以時下此其候也石瘕者生於胞

中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當寫不寫衃以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下曰膚脹鼓脹可刺耶對曰先寫其脹之血絡後調其經亦刺去其血脉師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脉亦浮外證胕腫按之沒指不惡風其腹如鼓不滿不渴當發其汗正水其脉沉遲外證自喘石水其脉自沉外證腹滿不喘黃汗其脉沉遲身體發熱胷滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿 千金范汪同並出甲乙經第八卷

范汪療水腫方

葶藶子一兩熬 甘遂一兩熬 吳茱萸四兩

右三味別擣異下篩和以蜜丸如梧子服可至五丸經心錄云服三丸日三服餘同

又葶藶丸療水腫方

葶藶熬一升 吳茱萸一升

右二味合別擣篩合以蜜和更擣二萬杵藥成飲服二丸如梧實不知增之當以小便利及下為候若下者但可病日一服若不下但小便利者日可再三服常將服腫消耳一名二利丸

又利小便消水腫郁李核丸方

郁李核人一分 松蘿三分 海藻二分 桂心二分
大黃五分 葶藶熬五分 黃連一分 通草一分
石韋去毛一分

右九味擣合下篩和以蜜丸如梧子先食飲服七丸日二稍增以知為度 並出第二十八卷中

又療水腫大檳榔丸方

檳榔三兩 桂心二兩 附子一兩炮 桔梗三兩
杏人二兩熬一方無 乾薑二兩 甘草二兩炙 麻黃三兩去節
黃耆二兩 茯苓三兩 厚朴二兩炙 葶藶二兩熬
椒目三兩 吳茱萸五合 白朮三兩 防己二兩

右十六味下篩蜜和服如梧子大二丸日三不知稍增至四丸不知又加二丸不下還服四丸得小下爲驗此療老小水腫虚腫大病後客腫作喘欬療之佳忌海藻菘菜猪肉冷水生葱桃李雀肉大酢 千金翼有海藻二味出第四十五卷中

小品療水腫方

大豆三升

右一味以水六升煮令熟出豆澄汁更内美酒五升微火煎如餳服一升漸增之令小下

又桃皮酒療水腫方

桃皮三斤削去上黑以黄皮 女麴一升 秫米一升

右二味以水三斗煮桃皮令得一斗以五升汁漬女麴五升汁饙飯釀如酒法熟漉去滓可服一合日三耐酒者增之以體中有熱爲候小便多者即是病去便愈忌生冷酒麪一切毒物

又麝香散療水腫方 千金云治婦人短氣虚羸遍身浮腫皮膚急

麝香三銖 芫花二分熬 甘遂三分

右三味合下篩酒服錢半邊七老小錢邊三分七亦可丸服之強人如小豆十丸老人五丸 千金有葶藶一兩并麝香各用六銖

肘後又有人參二分

又療水腫商陸膏方

商陸根一斤生者 猪膏一斤先煎可有二升

右二味合煎令黄去滓以摩腫亦可服少許忌犬肉經心錄同 千金云塗以紙覆之燥即塗不過三日愈並出第一卷中

集驗療水腫方

黄牸牛尿一飲三升若不覺更加服之以得下爲度病者小者寧從少起飲半亦可用後方

又療水腫方

猪腎一枚分爲七臠甘遂一分末篩爲散以粉腎微火炙令熟食之至三四臠乃可止當覺腹中鳴轉攻兩脅下小便利去水即愈若三四臠不覺可食七臠令盡 肘後深師文仲同並第六卷中

千金翼療水腫方

葶藶子六兩生用 桂心二兩

右二味擣蜜和丸飲服十丸如梧子日二慎蒜麪猪雞油膩 出第二十卷中

必効療水腫方

皂莢一挺去皮子炙 烏餳五兩

右二味以酒二升煮取六沸絞去滓頓服之須臾即小便二三升腫消忌一切肉及麪生冷醎酢食一周

又方

取苦瓠一枚

右一味以水一石煮一炊久去滓煎汁令堪丸如胡豆一服二丸當小便下後作小豆羹飯慎勿飲水𠄘並出第二卷中

水病方七首

千金論曰大凡水病難療差後特須慎於口味又病水人多嗜食不廉所以此病難愈世有醫者隨逐時情意在財物不本性命病人欲食肉於貴勝之處劫令食羊頭蹄肉如此者未見一愈者耳又此病百脉之中氣水俱實療之皆令瀉之使虛羊頭蹄極補那得瘥愈所以治水藥多用

葶藶等諸藥本草云葶藶久服令人虛故水病非久虛不得絕其根本又有蠱脹但腹滿不腫水脹脹而四肢面目俱腫醫者不善診候療蠱以水藥療水以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者仲景所云醫殺之今錄慎忌如左其療蠱方具在備急中

喪孝產乳音樂房室諠戲一切魚一切肉生冷醋滑

蒜粘米豆油膩並不得食之亦不得用心

右以前禁者並具本方之下其房室等猶三年慎之不復重發不爾差而更發重發不可更療古方有十水丸歷驗多利大便不利小便所以不能述錄也

洪從腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗即愈並出第二十一卷中

范汪療水病方

黃連末

右一味以蜜和擣萬杵丸如梧子飲服二丸可至三四丸禁飲水并冷物

又方

以苦酒一升飲之一方取豎豉名一撮以飲飲之一方取角木柴滿虎口擣取汁飲之並出第二十八卷中

徐氏療水病方

赤小豆一大升　桑根白皮五大斤細切

右二味以水五斗和煮可一斗汁濾去滓於銅器中重湯煎如餳可作丸即成所患人每服取利小便為度其小便復舊色身上腫除候體中熱煩即服之禁房及死牛馬肉麵膩麵酒等經數日得食羊頭肉兔肉水病忌食羊頭蹄此云得食恐誤也

又療水病洪腫氣脹不消食方

乾香薷五十斤

右一味細剉內釜中以水淹之出香薷上數寸煮使氣兩盡去滓清澄之漸火煎令可丸服五丸如梧子日三稍加之以小便利為度也無所忌經心錄同

又療水病身腫方

鯉魚一頭極大者去頭尾及骨唯取肉

右一味以水二斗赤小豆一升和魚肉煮可取二升以上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分為二服後服溫令煖服訖下利利盡即差慎牛肉白酒生冷麵猪魚油酪藥滓埋之勿令人食 並出第六卷中

古今錄驗療水病方

木防已八分　蜀大黃八分錦文者炙　人參八分

杏人八分去皮尖熬　葶藶子十分熬紫

右五味擣和擣篩蜜和為丸先食飲服七丸如梧子

日再日加一丸至十二丸是日歲一丸至七丸復漸加至十二丸循環服之以白飲服若病人熱多加黃芩茯苓各八分如病人冷多加厚朴八分如病久心鬱加葶藶八分忌酒麪羊肉其牛肉一色永斷不得食外禁酢物剌食鵝鴨麞兔鯉魚鱔魚等肉

又療水病牛黃桂枝丸方

牛黃六銖研　桂枝十二銖又一方云桂六銖　牡蠣十二銖熬研

椒目二十四銖一方云不須椒目　葶藶子半升熬一方云用二十銖

右五味擣篩蜜和丸如梧子飲服七丸日再小便利為度忌生葱 並出第十一卷中

十水方三首

病源十水者青水赤水黃水白水黑水懸水風水石水裏水氣水也青水者先從面目腫遍一身其根在肝赤水者先從心腫其根在心黃水者先從腹腫其根在脾白水者先從脚腫上氣而欬其根在肺黑水者先從脚趺腫其根在腎懸水者先從面腫至足其根在膽風水者先從四肢起腹滿大目盡腫其根在胃石水者先從四肢小腹腫獨大其根在膀胱裏水者先從腹滿其根在小腸氣水者乍盛乍虛乍來乍去其根在大腸皆由榮衛痞澀三焦不調腑藏虛弱所生雖名證不同並令身體虛腫喘息上氣

小便黃澀也 出第二十一卷中

古今錄驗十水丸療十種水腫方

腫從頭葶藶主之起名為白水其根在肺椒目主之腫從面起名為青水其根在肝大戟主之腫從胸起名為黃水其根在脾甘遂主之腫從腹起名為氣水乍實乍虛其根在大腸芫花主之腫從股起名為黑水其根在腎玄參主之腫從頭面起至足名為懸水其根在膽赤小豆主之腫從內起堅塊四肢腫名為石水其根在膀胱桑根白皮主之腫從四肢起腹大名為風水其根在胃葶藶主之腫從腹起名為裏水其根在小腸巴豆主之腫從胸中氣起名為赤水其根

在心葶藶子主之
右十味分等隨其病始所在增其所主藥皆一分巴豆四分去心皮擣末合下篩蜜和丸服如梧子三丸得下爲度不下日三亦可散食服半錢匕便利即止後服如法再服病愈禁飲但得食乾物耳

又方

第一之水先從面目腫遍一身名曰青水其根在肝大戟主之

第二之水先從心腫名曰赤水其根在心葶藶主之

第三之水先從腹腫名曰黄水其根在脾甘遂主之

第四之水先從脚腫上氣而欬名曰白水其根在肺

藁本主之

第五之水先從足趺腫名曰黒水其根在腎連翹主之

第六之水先從面腫至足名曰玄水其根在膽芫花主之

第七之水先從四肢起腹滿大身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之

第八之水四肢小其腹腫獨大名曰石水其根在膀胱桑根白皮主之

第九之水先從小腹滿名曰裏水其根在小腸巴豆主之

第十之水乍盛乍虚乍來乍去名曰氣水其根在大腸赤小豆主之

右十病藥皆分等所病形同則倍之擣合白蜜丸如小豆先食飲服一丸日三欲下病服三丸人弱者以意節之療得食飲寒熱溫病禁辛菜猪肉生魚不禁熱也范汪千金翼同

又療十水大黄丸方

大黄一分　消石一分　大戟熬一分　甘遂熬一分
芫花熬一分　椒目一分　葶藶一分

右七味擣合下篩以蜜和丸如小豆先食飲服一丸日再漸增以知爲度范汪同並出第十一卷中

大腹水腫方五首

病源夫水病皆由榮衛痞澀腎脾虚弱所爲而大腹水腫者或因大病之後或積虚勞損或新熱食訖入水自漬及浴令水氣不散流溢腸外三焦閉塞小便不通水氣結聚於内乃腹大而腫故四肢小陰下濕手足逆冷腰痛上氣欬嗽煩疼故云大腹水腫也出第二十一卷中

肘後療卒大腹水病諸方此病本繇水來寫水字而經方作水爲病故施疾淋水病之初先兩目上腫起如老蠶色俠頸脉動股裏冷脛中滿按之沒指腹内轉側有聲此其候也不即療須臾身體稍腫腹盡脹按之隨手起則病已

成瘥可療此皆從虛損大病或下痢後婦人產後飲水不即消三焦決漏小便不利乃相結漸漸生聚遂流諸經絡故也療之方

防巳　甘草炙　葶藶子熬各二兩

右三味擣篩苦酒和丸飲服如梧子三丸日三常將之取消平乃止忌海藻菘菜

又方

將服牛溺商陸羊肉臛及香葇煎等在腫滿條中其十水丸諸大方在別卷若止皮膚水腹內未有者服諸發汗藥得汗藥得汗便差然慎護風寒為急

又方

牽牛子三分熬　厚朴一分炙

右二味擣篩為散強人服三錢匕弱人二錢酒飲隨意稍稍有水氣病水腫諸藥不能瘳者此方効驗出第一卷中

千金療大腹水腫氣息不通命在旦夕者方

牛黃二分研　昆布十分洗　海藻十分洗　牽牛子八分熬

桂心八分　椒目三分　葶藶六分熬

右七味別擣葶藶如膏合丸如梧子飲服十丸日再稍加小便利為度正觀九年汾陽王患水醫所不療余處此古方日夜服一二斗五六日差差後有他犯因爾殂矣詳此即是神方忌生葱出第二十一卷中

崔氏療大腹水病身體腫上氣小便澀赤臍深頭上有兩大脈動喘稍不得眠睡每腫先從脚腫亦有在前頭面腫或大便澀者服此藥大佳若先患大便利臍凸腹大脹手掌平滿即不可服此藥方

大棗四十枚飯蒸剝去皮核　葶藶子五兩取苦者熬令紫色　杏人三兩熬令黃色

右三味先擣葶藶子一萬杵寫出之乃擣杏人三百杵訖總和合棗膏擣一萬杵藥成平旦空腹服八丸日晚食消更服五丸以飯汁下之三日後每旦服五丸日晚服三丸丸如棗核加大便利未得服此藥若正服藥次

忽患痢即先食二三口飯然後喫藥若利過多停藥即可爛煮小豆勿以鹽食之忌鹹粘脂膩及大冷熱物等唯得食秔粟米飯及淡醋不得喫稀粥唯只得喫飯佳如欲食粥即稠煮不得遺大便利一方加薏人桑葺出第六卷中

風水方八首

病源風水者由腎脾氣虛弱所為也腎勞則虛虛則汗出汗出逢風風氣內入還客於腎脾虛又不能制於水故水散溢皮膚又與風濕相搏故云風水也令人身浮腫如裹水之狀頸脈動時欬按腫上凹而不起也骨節疼痛而惡風是也脉浮大者名風水也出第二十一卷中

謹按仲景傷寒論無木防己湯今金匱要畧療風水有木防己湯

深師療大風水脉浮浮爲在表其人或頭汗出表無他病但下重故知從腰以上爲和腰以下當腫及陰難以屈伸木防己湯方

生薑三兩　大棗十二枚擘　白术四兩　木防己四兩

甘草二兩炙　黃耆五兩

右六味切以水六升煮取二升分三服喘者加麻黃身重胃中不和者加芍藥氣上衝者加桂心下久寒者加細辛防己黃耆爲本服藥欲解當如蟲行皮中狀從腰以下冷如冰服湯後坐被上又以一被繞腰溫下令得汗汗出則愈也忌海藻菘菜桃李雀肉等此本仲景傷寒論方

又療風水氣舉身腫滿短氣欲絶大豆湯方

大豆一升　杏人一升去尖皮熬　黃耆二兩　防風三兩

白术五兩　木防己四兩　茯苓四兩　麻黃四兩去節

甘草四兩炙　生薑六兩　清酒一升

右十一味切以水三斗先煮豆取一斗去滓內酒及藥煮取七升分七服一日一夜令盡當下小便極利神驗忌大醋餘忌同前

又療暴水風水氣水腫或瘡中水通身皆腫香薷术丸方

乾香薷一斤　白术七兩

右二味擣术下篩濃煮香薷取汁和术爲丸飲服如梧子十丸日夜四五服利小便極良夏取花葉合用亦佳忌青魚鮓忌同前

崔氏療風水腫黃氣遍身方

楮白皮三兩　桑根白皮五兩　橘皮一兩　紫蘇四兩

生薑四兩　大豆三升

右六味切以水九升煮取四升絞去滓分溫爲四服與三劑佳百日內忌鹹酢出第六卷中

古今錄驗療風水惡風舉身悉腫脉浮不渴欲自有汗而無大熱越婢湯方

麻黃六兩去節　生薑三兩　甘草二兩炙　石膏半斤碎

大棗十五枚擘

右五味切以水六升先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取三升分三服惡風加附子一枚炮風水加术四兩服如上法欬肺脹加半夏五合洗一服五合稍稍增之忌豬羊肉餘忌同前此本仲景傷寒論方云裹水越婢加术湯主之

又療風水腫商陸酒療方

商陸根一斤薄切

右一味以淳酒二斗漬三宿服一升當下下者減從半升起日三服盡更合不堪酒者以意減之忌犬肉

又甘遂丸療人風水黃疸體大如囊而目皆合陰腫如斗

正如霜瓜方

甘遂一兩熬 葶藶子二兩熬 杏人五十枚熬 巴豆四十枚去心皮熬

右四味下篩蜜和丸如大豆一服三丸飲下當吐不知可至五丸禁野猪肉蘆笋

又麻黃湯療風水身體面目盡浮腰背牽引髀股不能食方

麻黃五兩去節 桂心四兩 生薑二兩 甘草二兩炙 附子一枚炮

右五味切以水一斗先煮麻黃減一升內藥煎取三升一服一升日三忌同前

水蠱方四首

病源此由水毒氣結聚於內令腹漸大動搖有聲常欲飲水皮膚黧黑如似腫狀名為水蠱也出第二十一卷中

肘後療唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱方

白茅根一大把切 小豆三升

右二味以水二升煮取乾去茅根食豆水隨小便下

又方

鼠尾草 馬鞭草各十斤

右二味切以水一石煮取五斗去滓更煎餘五升以粉和丸飲服如大豆二丸至四五丸禁肥肉生冷勿食之

李根白皮五分 橘皮二分 五味子六分 大麻人五分熬

茯苓八分 生薑八分切暴燥

右十味擣篩蜜和丸飲清服二十丸如梧子日再稍加至三十丸忌酢物出第十一卷中

水氣方六首

范汪療風虛水氣腫豆酒方

大豆一升

右一味以水四升煮取二升汁去豆內美酒一升合煎取一升能隨意飲之日三常令有酒氣當清酒作之

又療通身腫皆是風虛水氣亦療暴腫蒲黃酒方

蒲黃一升 小豆一升 大豆一升

右三味以清酒一斗煮取三升去豆分三服

又療腫患下水氣四肢腫聶聶動木防已湯方

木防已三兩 甘草二兩炙 桂心一兩 茯苓六兩

黃耆三兩 生薑二兩 白朮三兩 芍藥二兩

右八味切以水八升煮取三升二合分為四服有人患下是胃寒加當歸三兩人參二兩半龍骨二兩水一斗煮取三升二合分四服相去二十里頃服不下即不須內此三物也忌海藻菘菜桃李雀肉生葱大酢並出第四十五卷中

食魚勿用酢及鹽豉他物雜也不過再作愈備急同肘後用醇酒

又方

車下李核中人十枚研令熟搗米三合研令合又以四升水中煮作粥令得一二升服之日三作末亦更增核肘後古今錄驗同並出第二十八卷中

備急療卒患腫滿身方曾有人忽脚趺腫漸上至膝足不得踐地諸療不差方

以蒴藋莖葉埋熱灰中令極熱以薄腫上冷又易一日夜消盡出第三卷中

腫入腹苦滿方三首

肘後論凡此滿或是虛氣或是風冷氣或是飲氣此方皆療之腫入腹苦滿急害飲食方

大戟 烏翅 白朮各二兩

右三味擣篩蜜和丸如梧子旦服二丸當下漸退更服取令消乃止

又方

葶藶七兩 椒目三兩 茯苓三兩 吳茱萸二兩

右四味擣篩蜜和丸如梧子飲服十丸日三忌酢物

又方

鯉魚一頭重五斤者以水二斗煮取汁去魚 澤漆五兩 茯苓二兩

桑白皮切三升 澤瀉五兩

右五味取四物內魚汁中煮取四升去滓分四服小便當利漸消也忌酢物並出第一卷中

水通身腫方一十一首

病源水病者由腎脾俱虛故也腎虛不能宣通水氣脾虛又不能制水故水氣盈溢滲入皮膚流遍四肢所以通身腫也令人上氣體重小便黃澀腫處按之隨手而起是也出第二十一卷中

千金療[illegible]遍身流腫方

麻子五升 商陸一斤切 防風三兩切 附子一兩炮去皮

赤小豆三升

右五味先搗麻子令熟以水三斗煮麻子取一斗三升去滓內藥及豆合煮取四升去滓食豆飲汁日再忌猪肉及冷水犬肉

又療水氣通身洪腫百藥不愈待死者方

大麻子一石末入窨不擇新者為佳 赤小豆一石不得雜

右二味取新精者以淨擇以水淘洗暴令乾蒸麻子使熟更暴令乾貯於淨器中欲服取五升麻子熬令黃香唯須緩火勿令焦擣極細作末以水五升搦取汁令

盡淨器密貯之明旦欲服今夜以小豆一升淨淘漉之至旦乾漉去水以新水煮未及好熟即漉出令乾內麻子汁中煮令爛熟為佳空腹恣意飽食日三服常小心悶少時止五日後小便數或赤濁口乾不足怪之服訖常須微行不得即臥十日後灸三里絕骨下氣不爾灸不復盡服藥後五日逆不可下者取大鯉魚一頭先死者去鱗尾翅以湯脫去將淨洗開肚去腸以上作麻汁中和小豆煮令極熟作羹下葱豉橘皮生薑紫蘇調和下藥食之始終一切斷鹽渴飲麻汁秋冬暖飲春夏冷飲常食不得至飽止得免饑而已慎房室瞋恚大語

高聲酒麵油酢生冷菜茹一切魚肉鹽醬五辛療十十差神驗并療一切氣病服者皆差凡作一月日服之大是麻子熟時多收新瓮貯之施人也

又方

吳茱萸 草撥 昆布 杏人去尖皮兩人熬

葶藶子熬

右五味等分擣丸如梧子氣急飲服五丸勿令至利食訖飽悶氣急服之即散

又苦瓠丸主大水頭面遍身大腫脹滿方

苦瓠白穰實捻如大豆粒

右一味以麪裹煮一沸空腹吞七枚至午當出水一升三四日水自出不止大瘦乃差三年內慎口味也苦瓠須好無黶翳細理妍淨者不爾有毒不堪用

又方

苦瓠膜二分 葶藶子五分熬

右二味擣丸服之日五丸如梧子

又方

葶藶子熬 桃人去皮尖熬

右二味等分擣丸服之利小便一方用杏人

又方

大棗七枚去皮核 苦瓠膜如棗核大

右二味擣丸一服三丸日三

又方

燒薑石令赤內黑牛尿中令熱服一升日一並出第二十一卷中

千金翼澤漆根湯主水通身洪腫四肢無堪或從消渴或從黃疸支飲內虛不足榮衛不通血氣不化氣實皮膚中喘息不安腹中響響脹滿眼不得視方

澤漆根十兩 赤小豆二升 甘草二兩炙 鯉魚一枚重五斤淨去腸

麥門冬一兩去心 茯苓三兩 人參二兩 生薑八兩

右八味切以水一斗七升先煮鯉魚豆減七升去之內
藥煮取四升半去滓一服三合日三弱人二合日再服
氣下喘止可至四合晬時小便利腫氣減或小溏下若
小便大利還從一合始大利止若無鯉魚鯛音魚亦可
用者水甚不得臥臥不得轉側加澤漆一片渴加栝樓
二兩欬加紫菀二兩細辛一兩款冬花一兩桂心三兩
背魚汁三升忌海藻菘菜酢物深師同出第二十卷中
古今錄驗療胡承郎水腫通身衆醫不能療得此湯一劑
一夜小便五六升即差療水欬逆氣通身流腫短氣腹滿
晝夜倚壁不得臥喉中水雞鳴白前湯方

白前六分 紫菀二兩 半夏五合又方四兩洗之三十遍
生澤漆根一七合切量一方三兩
右四味切以水一斗內藥刻誌水處復加水七升微火
煎令至刻去滓次內藥七種白朮二兩吳茱萸五合桂
心三兩人參一兩乾薑一兩或生薑五兩栝樓五合或
六合六物微火煮取三升半分三服小便當利或當溏
下勿怪氣即低腫減唱計方經傳楊氏有驗忌羊肉餳
桃李雀肉生葱范汪同一方有棗二十枚擘
又小消化水丸療水病令通身微腫腹大食飲不消方
芫花熬一兩 甘遂熬一兩 大黃一兩 葶藶熬一兩

巴豆四十枚去心皮熬研
右五味合擣下篩蜜和為丸如梧子一服一丸不知稍增
以知為度忌蘆筍野豬肉並出第十一卷中
水氣腫鼓脹方四首數是四首
千金翼療水氣腹鼓脹小便不利山連治韋司業得差司
業姪雲表所送云數用神驗莨菪丸方
莨菪子一升 羖羊肺一具青羊亦佳湯微煠即薄切之曝乾作末
右二味以三年大酢漬莨菪一伏時出之熬令變色熟
擣如泥和肺末蜜和擣作丸食後一食久服如梧子大
四丸麥門冬飲服之喉中乾口粘妄語為候數日小便

大利即差
麥門冬飲法
麥門冬二十五枚去心 米二十五粒
右二味以三合半水煮之米大熟去滓以下丸每服常
作千金同出第二十卷中
救急療水氣腹鼓脹硬頻試要效方
葶藶子七兩熬 茯苓三兩 吳茱萸二兩 椒目三兩沉水者
甘遂五兩
右五味擣篩蜜和為丸如梧子大以飲服五丸日三服
不知稍加丸以利為度禁食如藥法并酢物出第九卷中

古今錄驗療大水腫腹如鼓堅如石方（出胡洽）

葶藶（熬）一升　椒目一升　芒消六兩　水銀十二兩

右四味以水煮鍊水銀三日三夜數益水要當令黃白以合擣藥六萬杵自令相和如梧子先食服一丸日三日增一丸至十丸不知更從一丸始病當從小便利當飲好羊肉羹晝夜五飲當令補養禁辛物生魚菜勿忘飲漿水渴飲羹汁（深師同深師所撥方云療水腫一日一夜亦是也不銀用十二兩芒消用七兩小豆先食服二丸文仲陶氏集驗范汪同出第十一卷中）

小腫欬逆上氣方三首

病源腎主水肺主氣腎虛不能制水故水妄行浸溢皮膚而身體腫滿流散不已上乘於肺肺得水而浮浮則上氣而欬嗽也（出第二十一卷中）

深師療水欬逆上氣通身洪腫短氣脹滿晝夜倚壁不得臥喉中水雞鳴大小便不通不下食而不甚渴白前湯方

白前三兩　紫菀四兩　半夏一升洗　生澤漆根一升切

右四味水一斗七升煮取一斗汁又內後藥

桂心二兩　人參六分　大棗二十枚擘　白朮五兩

生薑八兩一方乾者二兩　茯苓四兩　吳茱萸五兩

杏人三十枚去皮尖碎　葶藶二兩　栝樓五合一方十合

右十味內煎汁中煮取三升分四服當得微下利小便

氣即下腫減深師云增損用之若神忌羊肉餳生葱桃李雀肉酢物（出第十九卷中）

古今錄驗夫水在五藏令人欬逆喘上氣腹大響響兩脚腫目下有臥蠶微渴不得安臥氣奔短氣有頃乃復小便難少而數肺病胸滿隱痛宜利小便水氣迫肺吸吸寒熱澤漆根湯方

生鯉魚一頭重五斤　麥門冬二兩去心　甘草二兩炙

人參二兩　茯苓二兩　澤漆根八兩生者

右六味切以水一斗七升煮魚取一斗去魚以煮藥取四升分服日三小便利為度不利增服之大便如利而

小便未利者增至四合服一日氣即下得安臥有寒可內生薑八兩（深師同）

又防己煮散療水腫上氣方（出許澄療）

漢防己三兩　澤漆葉三兩　石韋三兩去毛　澤瀉三兩

郁李人五兩　白朮三兩　丹參三兩　赤茯苓三兩

桑白皮三兩　橘皮二兩　生薑十兩　通草二兩

右十二味擣篩為散以水一斗七合內四方寸匕散煮取八合去滓一服令盡日三大便利者一服取小便利為度許澄秘方忌同前（千金同出第十一卷中）

[illegible]療水身面腫方四首

張文仲用大候王大將軍平公于禮患氣發水身面腫垂
死長壽公姚僧垣處二方應手即差先服此方
桑根白皮四兩 橘皮二兩 海藻三兩洗去鹹 茯苓
郁李人八兩各 赤小豆一升
右六味切以水八升煮取二升半分三服甚効古今錄
驗療氣水身腫腹滿姚大夫治燕公薛州録事于志光
遂云從來知不能服湯事較急勿不努力服之服此湯
若微覺爲益頻服三兩劑勿不服此藥甚易必無逆忤
如不能服可服後丸丸遲不應急耳
又方

橘皮五分 郁李人十分 茯苓八分 葶藶六分熬
防己 桑根白皮各五分 甘遂四分熬 蘇子四合
右八味擣下篩蜜和丸取穀白皮火炙焦黃煮飲服十
丸如梧子日再服若不得宣通稍稍加常以宣爲度渴
者飲此方老蔣公處與張大夫家勿忌醉物
又方
灸丹田穴在臍下二寸灸三壯療水腫女子禁灸 出并第五卷中
古今錄驗療氣水身腫腹滿方
杏人十分去皮尖熬 蘇子五分 白前六分 昆布八分洗去鹹

出第一卷中
文仲療若唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱方
鬼扇擣絞取汁服如雞子即下水更服取水盡若渴
研麻子汁飲之良 肘後同
又方
巴豆九十枚去心皮熬令黃 杏人六十枚去皮尖熬令黃
右二味擣和服如小豆一枚以水下爲度勿飲酒佳
忌猪肉蘆笋 肘後同並出第五卷中
卒腫滿方六首
肘後療卒腫滿身面皆洪大方

灸足內踝下白肉際三壯差 備急同
又方
香薷剉煮令濃及熱以漬亦可服之
又方
商陸根一斤刮去皮薄切之煮令爛去滓內羊肉一
斤下葱豉亦如常作臛法隨意食之腫差後亦可
宜作此可常擣商陸與米中拌蒸作餅子食之忌犬
肉 范汪方云商陸同備急經心錄千金同並出第一卷中
范汪療卒腫滿身面皆洪大方
用大鯉魚一頭以淳苦酒三升煮之令苦酒盡訖乃

崔氏療水氣方

葶藶子 三兩

右一味以物盛於飯上蒸令濕微上即擣萬杵自堪爲丸不須蜜和如不得以少蜜和之一服五丸稍加至七丸以微利爲度得利即停不可多服令人不甚能食若氣發又服之得利氣下定即停此方療水氣無以加蕭駙馬時任太常卿患水腫見在名醫悉療不差唯服此丸得平復故記

又葶藶子療水氣極効方

取葶藶子一合熬令色黃擣碎別研如麪取大棗二十顆去核以水一大升煮棗取半升汁去棗滓內前汁葶藶子并棗汁於銅器中緩火煎令堪成丸平旦空腹頓服盡必不能頓者分爲兩服得利兩行差至日午宜食乾飯慎如藥法並出第六卷中

近効療水氣方

商陸根去皮取白者不用赤色切如小豆一大盞

右一味以水三升煮取一升以上爛即取粟米一大盞煮成粥仍空腹服若一日兩度服即恐利多每日服一頓即微利不得喫生冷等

皮水方三首

病源肺主於皮毛腎主於水腎虛則水妄行流溢於皮膚故令身體面目悉腫按之沒指而無汗也腹如故不滿亦不渴四肢重而不惡風是也脈浮者名皮水也出第二十一卷中

深師療皮水如腫水氣在皮膚中四肢集集動木防己湯方

木防己三兩　黃耆三兩　桂心三兩　茯苓六兩

甘草二兩炙

右五味切以水六升煮取二升分再服忌海藻菘菜生葱酢物出第十九卷中

范汪皮水一身面目悉腫甘草麻黃湯主之方

甘草二兩炙　麻黃四兩去節

右二味以水五升先煮麻黃再沸去上沫乃內甘草煮得一升絞去滓適寒溫先服一升重覆之日移二丈所當汗出汗出勿復服不汗乃復服當慎護風寒數日乃出入忌海藻菘菜出第二十八卷中

古今錄驗皮水越婢湯加朮主之方

麻黃六兩去節　大棗十二枚擘　白朮四兩　生薑三兩切

甘草二兩炙　石膏半斤

右六味㕮咀以水七升煮麻黃一二沸去上沫乃內餘藥煮取二升絞去滓適寒溫服七合日三忌同前

上二方並本出仲景傷寒論

水腫從脚起方四首

病源腎者陰氣也主於水而又主腰脚腎虛則腰脚血氣不足水之流溢先從虛而入故脚先腫也（出第二十一卷中）

肘後若腫從脚起稍上進者入腹則殺人療之方

小豆一斛煮令極爛得四五斗汁溫以漬膝以下日日為之數日消盡若已入腹者不復漬但煮小豆食之莫雜喫飯及鮭（音圭）魚鹽又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用如此之病十死一生急救之

又方

削楠及桐木煮取汁以漬之并飲少許如小豆法（並出第一卷中）

范汪療水腫從足始轉上入腹則殺人豚肝方

生豬肝一具煮如食法細切頓食令盡不得用鹽可用苦酒豬重五六十斤以上肝者一頓食盡百斤以上豬者分兩服（肘後同）

又若但兩足腫者方

剉葱葉煮令爛以漬之日三四度良也（集驗同並出第二十八卷中）

水癥方二首

病源水癥者由經絡否澀水氣停聚在於腹內六小腸不利所為也其病腹內有結塊堅強在兩脅間膨膨脹滿遍身腫所以謂之水癥（出第二十一卷中）

深師療水癥腹內堅脹喘逆汗出不能食海藻丸方

海藻（洗）一兩　水銀一兩　椒目一兩　芒硝一兩
葶藶（熬）一兩　大黃一兩　甘遂（熬）一兩　杏人（三十枚去尖皮熬）
桂心一兩　附子（炮）一兩　茯苓一兩　大戟一兩
松蘿一兩　乾薑一兩　巴豆（三十枚去心皮熬）

右十五味下篩蜜和服如小豆二丸日三不知稍稍加之忌豬肉大酢生葱蘆笋（范汪同出第十九卷中）

范汪療水腫大腹水癥丸方

礬石（熬）十分　躑躅花十分　細辛十分　半夏（洗）十分
蔾蘆十分　丹參十分　承露十分（是落葵承露）　大黃十分
巴豆十枚（去心皮熬）　苦參十分　雄黃十分
芒硝十分　大戟十分　烏頭二十分（炮）　狼毒十分
野葛二分

右十六味擣下篩蜜和藥成以置甖上并服如黍米二丸日三欲取下者服五丸禁食生魚生菜肥肉千金不傳用之千金丸（並出第三十五卷中）

水瘕方一首

病源水瘕者由經絡否澀水氣停聚在於心下腎經又虛

謹按

不能宣利溲便致令水氣結聚而成形癥在於心下之間抑按作水聲但欲飲而不用食遍身虛腫是也 出第二十一卷中

古今錄驗水癥病心下如數升油囊裹水作聲日飲三斗不用食但欲飲久病則爲癥堅有蝦蟆流溢之方

取草麻成熟好者二十枚去皮杯中研令熟不用擣水解得三合宿不食清旦一頓服盡日中許當吐下青黃如葵汁當囊結裹其病不盡即三日更增服三十枚草麻如上法若病如故復不盡復增十枚服如上法其以盡病根爲限藥但去病不令人悶亂下病之後愼不可飲當五日斷飲止進白糜隔商方已試神良 范汪同出第十一卷中

石水方四首

病源腎主水腎虛則水氣妄行不依經絡停聚結在臍間少腹腫大鞕如石故云石水其候引脅下脹痛而不喘是也脈沉者名曰石水脈微大亦曰石水腫起臍下至少腹垂垂然上至胃管則死不療 出第二十一卷中

深師療石水四肢瘦腹腫方

大豆五升　防已四兩　桑根白皮切三升　白朮四兩

澤漆葉切三升　射干四兩　穀白皮切三升 一云四兩

右七味切以水一斗半煮取六升去滓內好酒三升更煎取五升分五服日再夜一餘煎明日服之 千金同出第六卷中

千金療膀胱石水四肢瘦腹腫方

桑根白皮六兩　射干四兩　澤瀉五兩　澤漆切一升

茯苓四兩　防已一兩　黃芩四兩　白朮四兩

大豆三升

右九味切以水五斗煮大豆取二斗去滓澄清取汁一斗下諸藥煮取三升空腹溫分三服 出第二十一卷中

灸石水病引脅下脹頭眩痛身盡熱灸法

灸關元

又灸石水法

灸章門然谷

暴腫滿方四首

集驗療暴患遍身腫滿方

大豆

右一味擣篩爲散粥清服三方寸匕日再甚良驗

又療身體暴腫如吹方

巴豆三十枚合皮㕮咀

右一味以水五升煮取三升綿內汁中以拭腫上隨手滅矣日五六拭勿近目及陰 范汪同出第六卷中

備急療身體暴腫滿方

榆白皮擣篩隨多少雜米作粥食小便利即消陷効
方出第三卷中
古今錄驗澤漆湯療寒熱當風飲多暴腫身如吹脈浮數
者方
澤漆炙二兩 知母二兩 海藻二兩 茯苓二兩
丹參三兩 秦艽二兩 木防已二兩 豬苓去皮二兩
大黃二兩 通草二兩 青木香二兩
右十一味切以水九升煮取三升分三服忌酢物出第
十一卷中
氣滿胷急方八首

古今錄驗療氣忽發滿胷急者方
茯苓四兩 杏人四兩 橘皮二兩
右三味切以水六升煮取二升分作二服日三隨小便
下愈飲盡更作忌酢物
又茯苓杏人煎方
茯苓四兩 杏人四兩 橘皮三兩 蘇子一升碎
甘草炙三兩 芍藥四兩 白前三兩 五味子三兩
生薑汁五合 蜜六合 竹瀝二升
右十一味切以水九升先煮諸藥取三升去滓內竹瀝
生薑汁蜜等和攪微火煎取四升一服四合日再夜一

忌海藻菘菜酢物
又方
甘遂熬二兩 茯苓四兩 杏人四兩 澤漆葉炙三兩
黃芩四兩 澤瀉三兩 郁李人碎五兩 橘皮三兩
朴消四兩
右九味切以水九升煮取二升七合分三服忌酢物
又方
桑根白皮切一升 郁李人碎一升 赤小豆二升
橘皮二兩 蘇葉二兩 茅根切一升
右六味切以水一斗煮取二升適冷煖稍稍飲之

又方
桑白皮四兩 橘皮三兩 茯苓四兩 甘遂熬二兩
杏人三兩 澤瀉三兩 黃芩四兩 赤小豆一升
右八味切以水九升煮取二升半分三服忌酢物一方
甘草三兩
又方
羊腎一具去脂炙 桑根白皮四兩 茯苓四兩 橘皮三兩
李根白皮四兩 黃耆三兩 玄參三兩 生薑四兩
右八味切以水九升煮取二升七合分三服忌酢物
又方

豬腎一具去脂膜 桑根白皮五兩 茯苓四兩 澤漆葉二兩炙
防己三兩 澤瀉三兩 橘皮三兩 大豆三升
甘遂三兩熬 郁李人一升碎
右十味切以水一斗三升先煮腎桑根皮澤漆葉大豆取八升去滓內餘藥煎取一升七合分爲三服忌酢物
又方
大棗三十枚擘 烏梅三十枚打碎
右一味以水四升煮取二升內蜜和調不得過甜不得過酢稍稍含咽之並出第一卷中
虛熱及先服石風水腫方三首

集驗葱豆洗湯療虛熱及服石熱當風露卧冷濕傷肌熱阻在裏變成熱風水病心腹腫滿氣急不得下頭小便不利大便難四肢腫如皮囊盛水晃晃如老蠶色陰莖堅腫如升莖腫生瘡狀如死鼠此皆虛損腎中有熱強取風冷濕所故也內宜依方服諸利水藥外宜以此湯洗四肢訖以葱豆消腫之別以豬蹄湯洗瘡爛處及卵腫也方
赤小豆一升 葱一虎口合青切 蒺藜子一升碎 菘菜子一升碎
蒴藋五升切 巴豆一百枚合心皮打碎
右六味以水一石二斗煮取四斗以淋洗身腫處古今錄驗同

又豬蹄洗湯療丈夫服石有虛因勞損熱盛背上汗傷於風濕身體成熱風水腫病腹滿氣急四肢欲腫小便不利陰卵堅腫莖腫生瘡狀與如死鼠名水疝以此洗之方
豬蹄一雙 黃蘗五兩 蒴藋根切二升 葶藶子一合
蒺藜子一升
右五味以水三斗煮取二斗冷以洗之日三古今錄驗同並出第六卷中
古今錄驗葱白膏方療與前葱豆湯同
葱青白一升切 菘菜子一升半 葶藶子半升熬 蒴藋一升切
青木香二兩切 茅草一兩切 丹參一升切 生蛇銜一升切
蒺藜子一升碎
右九味以豬肪五升煎之三沸令水氣竭去滓傅痛處集驗同出第十一卷中

三焦決漏水病方二首
古今錄驗療三焦決漏水在膏外名曰水病腹獨腫大在腹表用大麝香丸華佗方
麝香三銖研 雄黃六銖研 甘遂十二銖熬 芫花十二銖熬
右四味搗合下篩和以白蜜丸如大豆二丸酒下日三服可至四丸節飲食禁肥肉生菜之難有效千金同
古今錄驗療通身手足面目腫食飲減少此是三焦決漏

精液不通水氣却行若鯉魚湯方
鯉魚重五斤者 茯苓六兩 澤漆五兩炙 人參二兩
杏人一兩 澤瀉五兩 甘草二兩炙
右七味切以水二斗五升煮魚汁一斗半汁內藥煮取四升去食服一升日三以小便利為度年八十病大困服此差忌海藻菘菜酢物並出第十一卷中
男女新久腫方三首
范汪療久腫新腫方
黑大豆一斗清水一斗煮之令得八升去豆以八升清酒投中更微火上煎令得八升一服之為妙不能者亦可分再三服腫當隨小便去腫除後渴難忍切不可飲慎之出第二十八卷中
千金療男女新久腫得惡暴風入腹婦女新產上圊風入臟中如馬鞭者噓吸短氣欬嗽大豆煎方
大豆一斗擇令淨以水五斗煮取一斗二升澄清內釜中以一斗半美酒內汁中更煎取九升宿勿食日服三升溫覆取汗兩食頃當下去風氣腫減慎風冷十日平復也除日合服之若急不可待逐急令服歷令六畜婦人見之腫差勿服之神驗也亦可任性飲之常使酒氣相接范汪并翼同

又方
楮枝皮一大束切煮取汁隨多少釀酒且服存為佳不過三日腫減差後可常服之並出第二十一卷中
水腫小便澀方三首
廣濟主下水氣若小便澀水腫氣妨悶不能食海蛤丸方
昆布洗 橘皮 赤茯苓 漢防已
海蛤研 郁李人 桑根白皮 澤漆炙
檳榔 杏人四分去皮尖 大黃六分 葶藶子二十分熬火煞令紫
右十二味擣篩蜜和丸飲服如梧子十五丸日二服加至二十五丸以小便利為度忌熱麪冷滑大酢出第五卷中

崔氏療水腫盛滿氣急喘欬小便澀如血者方
桑根白皮六兩 澤漆葉切一升炙 白朮二兩 生薑四兩
郁李人六兩 杏人二兩 橘皮二兩 玄參三兩
右八味切以水九升急著火煮取四升溫分四服相去六七里久或利黃水三五升及小便利為候即差者可頻服三四劑佳忌桃李雀肉青魚酢等出第六卷中
古今錄驗療男女心上脹滿胷背痛食進少面微似腫小便如澀方出吳大夫
杏人八分熬 橘皮五分 蘇子三合 防已五分
葶藶六分熬 茯苓八分

右六味擣篩蜜和為丸如小豆細切桑根白皮煮湯飲
用服此丸初服十丸日再漸加至三十丸 千金同出第十一卷中
上氣大便澀方二首
崔氏療上氣大便澀方
葶藶子四兩熬 牽牛子一兩熬 杏人二百顆 大棗四十枚去皮
芒消一兩 牛酥一合
右六味擣一萬杵更別著牛酥乃更擣一萬杵空腹服
八丸用粥飲下忌先禁鹹醬等物
又療上氣大便秘澀方
杏人五兩熬 印城鹽三兩 乾薑二兩

右三味擣篩以醬汁和之令得相著作挺可長一寸餘
如指大兩頭尖仍以薄綿裹之於風日中暴令少乾內
下部中將易之不過一兩易即有惡物下氣上行即定
亦下食內藥痛時少須忍如深內少頃亦不大痛急出
將物即出痛恐之不得後可便轉將出膿及惡物多穴
後不澀停之 並出第六卷中
水病雜療方一十二首
集驗療水腹大臍平者法
灸臍中腹無文理者不可療
又水腹脹皮腫法
灸三里風水灸解谿 並出第六卷中
千金翼鯉魚灸主腹滿方
鯉魚長一尺五寸以尿漬令沒一宿平旦以水從口
中灌至尾微火灸令微熟去皮宿勿食頓服之不
能者再服令盡神方 肘後同出第六卷中千金同
又有人虛肥積年氣上似水病眼脹飽[illegible]不渴方
榖楮葉八兩
右一味以水一斗煮取六升去滓內米煮粥亦當以水
煮及菜等皆用之狀中多夜以瓶盛冬用其水多少隨
意任人勿有此方但恭病循雞魚油膩重者三年服之

永差輕者一年 並出第二十卷中
崔氏療一切腫方
取紅藍花熟揉擣取汁服之不過再三服便愈服之
多少量腫大小而進花汁也
又療水腫已上少腹速臍併氣上悶方
苦瓠子一兩
右一味以麵如作餛飩法其麵勿著鹽作二七枚湯中
煮令熟出及煖吞之如不下以湯汁下之能禁生冷
酢滑及肉油膩佳若恐虛煮牛乳服之如此隔日作漸
加至三七枚以小便利為候小便若太多即歇一二日

以腹腫消即止

又療水病差後口中習習熱發出方

先以鐵鐺中著水一小斗煮金器不問多少煎取二小升出金取金水著瓶入口中含良久應徹下即有要事方可吐出勿嚥之殺藥氣並出第八卷中

張文仲羊胃湯久病羸瘦不生肌肉水氣在脅下不能食四肢煩熱方

羊胃一枚切　白朮一升切

右二味以水二斗煮取九升服一升日三三日盡更作兩劑乃差忌桃李雀肉等

備急小品小女麴散療利後虛腫水腫者服此藥小便利得止腫亦消方

女麴一升生用　乾薑　細辛　椒目

附子炮　桂心各一兩

右六味為散酒服方寸匕不知服二三七日三產後虛滿者大良忌豬肉生葱生菜出第三卷中

古今錄驗療水或下不下則滿溢下之則虛竭還復十無一活桑酒方

桑枝并心皮細剉以水八升煮取四升汁以四升米釀酒一服一升

又療腳胃水面目手足肘腫胃管堅大滿短氣不能動搖方

桑根白皮切三升　桂心一尺　生薑三兩　人參一兩

右四味切以水三升煮桑白皮得一升後去滓內桂心等并飴十一兩煮之竭得七合消息更服須臾當下不盡復一升忌生葱

傳効鯉魚湯療水腫腹大面目身體手足盡腫喘欬短氣又背滿不得臥方

鯉魚一頭重一斤　桂心三兩　紫菀一兩　木防己二兩

黃芩一兩　消石二兩　乾薑二兩　人參二兩

右八味切以水一斗五升煮魚如食法取汁一斗二升出魚內藥煮取三升去滓先食温服一升日三忌生葱並出第十一卷中

右從事郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事趙　孟

較勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十卷終

天竺經論眼序一首
叙眼生起一首
出眼疾候一首
眼疾品類不同候一首
眼將節謹慎法一首
眼暴腫痛方一十首
目赤痛方二十一首
胎赤久赤方七首
目暴卒赤方六首

目痒方四首
目中風腫方五首
眼熱礙痛赤腫方三首
眼闇令明方一十四首
失明方六首
青盲及盲方六首
雀目方四首
目膚翳方一十四首
暈瞖方四首
生膚息肉方八首
目風淚出方六首
眯目方八首
肝氣不足方二首
肝實目痛方二首
眼雜療方二十首

唐王燾先生外臺秘要方第二十一卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等 上進

新安後學程衍道敬通甫訂梓

天竺經論眼序一首 隴上道人撰俗姓謝住齊州於西國胡僧處授

蓋聞乾坤之道唯人爲貴在身所重唯眼爲寶以其所繫妙絕通神語其六根眼最稱上是以療眼之方無輕易爾

敘眼生起一首

謝道人曰夫眼者六神之主也身者四大所成也地水火風陰陽氣候以成人身八尺之體骨肉肌膚塊然而處是地大也血淚膏涕津潤之處是水大也生氣溫暖是火大也舉動行來屈伸俛仰喘息視瞑是風大也四種假合以成人身父母精血實斯增長而精成者也其眼根尋無他物直是水耳輕膜裹水圓滿精微皎潔明淨狀如寶珠稱曰眼珠實無別珠也黑白分明肝管無滯外託三光內因神識故有所見凡人不解謂眼有珠喻若魚之被煮此事不然夫魚畜水陸之有目者悉皆是水無有別珠直以湯火煎煮水凝結變白成珠但看生魚未被煮多豈有珠璣直道死魚木已凝厚論其活者水亦輕薄

出眼疾候一首

謝道人曰夫人眼白睛重數有三設小小犯觸無過傷損但黑睛水膜止有一重不可輕觸致敗俄頃深可慎之凡人不究謬探多重或七或五此皆是其妄說一家成言耳然眼之精微本自輕薄無所堪耐易致諸疾故學療之者事須安審不可麤疎恐致毀傷患眼之家自須謹慎諸所禁忌悉不應犯若覺有疾即宜早療當及其初根脚未立則易驅遣若其久後根盤四布既成痼疾雖復行療極難成効且身稟四大性各不同是以治者證候非一冷熱風損疾生不同傷勞虛實其方各異宜應察其元起尋究本根按法依源以行療救不得謬濫措方以乾嘗療熱毒之眼以冷木療風寒之目非直冷熱無効蓋亦致患俄頃常見愚人不識病源直尋古方輕欲立療或經有疾遇藥得愈便以此法遞相傳授都不知病有冷熱之殊虛實之異或有道姑庸嫗爲人求食輕稱有損常慮幽冥長爲病家不別真僞聞語便從遂使應愈之病增爲痼疾毀珠之痛永成盲瞽一何可哀故目有條貫以示後人皆昔眼無所因起忽然膜膜不痛不痒漸漸不明久歷年歲遂致失明今觀容狀眼形不異唯正當眼中央小珠子裏乃有其障作青白色雖不辨明猶知明暗三光知晝知夜如此之者名作腦流青盲眼未患時忽覺眼前時見飛蠅黑子逐眼

通抄一本針作決竹字欠字

上下來去此宜用金篦決一針之後豁若開雲而見白日針訖宜服大黃丸不宜大泄此疾皆由虛熱兼風所作也

眼疾品類不同候一首

謝道人曰若有人苦患眼漸膜膜狀與前青盲相似而眼中一無所有此名黑盲宜針刺服藥如瞳子大者名曰烏風如瞳子翳綠色者名爲綠翳青盲皆是虛風所作當覺急須即療湯丸散煎針灸禁慎以驅疾勢若眼自闇多時不復可療此疾之源皆從內肝管缺眼孔不通所致也亦宜須初欲覺時即須速療之若已成病更不復可療亦無勞措意也若因時病後得眼生白障者此名爲翳也爲熱

毒所作宜應速服湯丸依法鎌之傅食翳散若因病後生肉者此爲膚障也（後餘併無食翳散通後方恐食翳散間除字意）此是風熱所作宜服湯丸鉤割除之若眼赤痒淚出者爲熱虛風服散煎除之若見濕煙赤光瞳子黑大者爲勞風勞水動故宜服車前空青丸以消息之若眼忽覆赤痛者此是天行眼痛風熱所作應宜早急療之不者當生於瞖後難療若人眼痛當黑珠生白瞖并黑子等大如米如此之者名爲痛損眼此不易可療勿輕犯觸但眼因破損有物撞作瞖障瘢痕者悉不可療亦無勞措意（此按勞水勁三字疑有闕文）

眼將節謹慎法一首

悉今無事當作決當

謝道人曰五行云肝者眼家之根本此乃一家之同類而言無實五藏六腑悉皆相連故欲療眼而審其虛實察其由起既識病源宜先作內療湯丸散煎事事分明既服諸藥便須依方謹慎凡欲療眼不問輕重悉不得以風霜雨水寒熱虛損大勞并及房室飲食禁忌悉不得犯若虛勞冷者宜服補肝丸出千金翼第十卷十五味在此卷下也若人患眼不值明師過從庸醫欺許妄語云祟神鬼或以鐶鈎或復燕熨或火烙針熨此皆不識病源而逆療但增陰陽爲益實猥動致傷余見此途內懷悲愍學療之者勿習是方并直疾勢不除亦自奇成毀道（見此法中文句有舛全局季校）

眼暴腫痛方　十首

謝道人療眼暴腫毒痛不可忍欲生瞖方

決明子一升　石膏四兩，研　升麻四兩，切　梔子人一升

地膚子　茺蔚子各二分　苦竹葉二升，切　乾藍葉一升，切

芒硝二兩　車前草汁一升二合　冬瓜子一升，末

右十一味以水二斗煮竹葉取七升二合去滓內諸藥煮取四升分爲四服每服相去可兩食間再服爲度小兒減藥以意裁之

又療眼暴腫痛方

苦竹葉一升　柴胡二兩　蛇銜二兩　黃連

通按吳本一本炙甘也

白苦硝　細辛各一兩

右六味切以水三升煮取一升去滓溫服之忌豬肉

又方

秦皮　黄連各二兩　竹葉一升

右三味切以水五升煮取八合洗眼與前方相類服忽腫痛盲須煮秦皮作湯洗是其療也忌豬肉

又方

細辛　蕤核人　蘆鹽各一兩　決明子二兩

右四味切以地骨汁煮取一升半去滓更以鹽一升半合煎取一升半與前方同

又療眼天行暴腫癢痛方

地骨皮三斤切

右一味以水三斗煮取三升絞去滓更內鹽二兩煎取一升傅目或加乾薑一兩

又方

前胡三兩　芍藥　青葙子　決明子　細辛各二兩　車前子五合　梔子　淡竹葉切一升

右九味切以水九升煮取三升溫分爲三服忌生菜

又方

半夏一升洗　生薑八兩　前胡四兩　枳實二兩炙

細辛一兩　烏梅十二枚擘

右六味切以水七升煮取二升半溫分爲三服忌羊肉餳生菜

又方

甘草一兩炙　粟米二合　竹茹大如雞子　蘆根五兩

右四味切以水八升煮取二升七合分爲三服忌海藻菘菜

又療兩眼痛大黄湯方

大黄四兩　芍藥五兩　細辛　甘草炙各一兩　黄芩二兩

右五味切以水七升煮取二升半溫分爲三服甚妙

又方

大黄八兩切

右一味以水五升漬之一宿明旦絞取汁分三服之病甚多肉脾實以上忌油膩生冷房室蒜菜酒麪等物

目赤痛方二十一首

病源凡人肝氣通於目若肝氣有熱熱衝於目故令赤痛

出第二十八卷中

廣濟療目赤痛及胎赤方

以蜯蛤殼鹽蜜二分鹽綠一分夜臥火炙煖著目眥

三四日差止
又方
豬膽和鹽碌五分點眥妙
深師療眼赤痛除熱黃連煎方
黃連半兩 大棗一枚切
右二味以水五合煎取一合去滓展綿取以注目
日十夜再忌豬肉
集驗療目赤痛方
苦竹葉一七片 烏梅四兩碎 大錢三七文
右三味以水二升洗漬藥半日早向東竈煮之三沸三
上三下取二合以注目眥

又療目赤痛洗眼方
蕤核人二十枚碎 苦竹葉一把 細辛半兩
右三味以水三升煮取半升以洗眼日三五度甚妙
刪繁療眼赤洗眼竹葉湯方
淡竹葉五合 黃連四枚 青錢二十文 大棗二十枚去皮核
梔子人七枚 車前草五合
右六味以水四升煮取二升以洗眼日六七過此方孔
良忌豬肉
千金療眼赤闇方
杏求熟時杏人汁一合 鹽五兩 青錢三文
右三味合內瓷器中封頭勿令泄百日後出著目眥頭
日二三
千金翼療赤眼方
杏人四十九枚去皮尖綿袋裹飯底蒸之承熱絞取
脂以銅青胡粉各如大豆乾薑石鹽各如半大豆許
熟研之以雞毛沾取綿取中眥頭日三夜再
又方
杏人脂一合 鹽碌如杏人 印成鹽三顆
右三味取杏人脂法先擣杏人如脂布裹盛蒸絞取脂

置密器中內諸藥直坐著其中密蓋二七日夜臥注目
四眥不過七度差止
又療赤眼不問久近方
硇砂三兩以醋漿埔器中浸日中暴之三日藥著器
四畔乾者取如粟大夜著兩眥不過三兩度永差崔
石鹽石膽等分丸住 [illegible]
張文仲療兩眼熱赤方
東壁上土帛細羅內如豆大兩眥中令淚出三五度
即差常用大効 肘後同
又傳効療眼赤無新久皆差神驗方

石鹽棗核大人乳一棗許置故銅椀中以古錢十文研之使青稠著椀底取熟艾急搏一雞子許掘地作小坑子坐艾於坑中燒使煙出以銅椀覆上以土擁四邊勿令煙出量艾然盡即止刮取著椀者藥每以半豆許於蛤蜯中和棗核大人乳汁研細以綿纏杖頭注入兩眥夜即仰臥著之至五六度必差無石鹽以白鹽無古錢以青錢替之亦得 肘後同

延年療眼赤熱不能得好差此由肝中客熱不絕方

黃連三兩 秦皮二兩

右二味切以水三升煮取一升五合去滓食後溫服分

二服如人行七八里服 必効同

又療眼赤飲方

前胡 黃連 秦皮 黃芩

梔子人各三兩 決明子二兩半 蕤人一兩 竹葉一升

右八味切以水六升煮取二升五合去滓分三服食後服之忌豬肉

又療眼赤方

蕤人 黃芩 梔子人 黃連

秦皮各二兩 竹葉一升

右六味切以水五升煮取一升六合分三服

又療目赤熱方

前胡二兩 防風 決明子 黃連

蕤人各二兩 竹葉一升

右六味切以水六升煮取二升分為五服

又竹葉飲主療熱眼赤頭痛方

竹葉一握 犀角屑 升麻 乾葛各二兩

黃芩 麥門冬去心各三兩

右六味切以水六升煮取二升分為三服

又方

竹葉一握 麥一升淘 地骨白皮二分

右三味以水五升煮取二升以麥熟為度食後分二服

蔣孝璋處此方

近効療眼赤痛眼漠漠方

消石研末於眼四角各點一粟許須臾熱淚出便睡睡覺以漿水洗又明目

又療赤眼及眼睛上瘡方

秦皮一大兩以清水一大升於白瓷椀中浸春夏一食久以上看碧色出即以筯頭纏綿點下碧汁仰臥點所患眼中仍先從大眥中滿眼著微痛不畏量久三五度飯閒即側臥瀝却熱汁每日十度以上著不

過兩日差忌酢蘿蔔（李諫議近效方）

又勑賜源乾曜療赤眼方

生石蜜　朱砂（光明者）　石鹽　甘消

鹽緑　石決明（去麁皮研各六分）　蕤人（三百顆）

黃連（宣州者）　細辛（各一兩）　烏賊魚骨（去甲一寸）

右十味擣篩細研欲著時少少取白蜜和如綠豆兩大角

中如菉豆許大仍不避風日㗛咳及將除皆並差萬全

不傳忌猪肉生菜

胎赤久赤方七首

病源胎赤者是人初生洗目不淨令穢汁浸漬於眼使瞼

赤爛至大不差故云胎赤（出第二十八卷中）

千金療胎赤眼方

取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭麻油一匙置銅鉢

中旦使童子以水研之至暝止取夜臥時以塗目眥

日三度差止

崔氏療三五十年眼赤并胎赤方（西域法人常不出才過）

生烏麻油（半雞子許著銅器中以細礪石磨之使過淺不能研乃止）　熟艾（三升）

杏人（去皮尖）　黃連（一兩）　雞糞（一升）　鹽（一合）

亂頭髮（如半雞子許大圓）

右七味穿一坑其形如瓶口小裏大燒使乾別開一小

風孔以前藥并艾等一重重布著坑內狀如灸炷以火

燒之將前所磨銅器以蓋坑口煙盡收取銅器上脂煙

傅眼眥磨上欲臥時著胎赤三十五十年者不過三兩

日差忌猪肉

又方

胡粉（六分）　蕤人（四分）

右二味先研蕤人使碎內胡粉中更熟研又擣生麻子

為燭燃使著別取猪肪脂於燭焰上燒使脂流下滴入

蕤人胡粉中更研攪使均如餳以綿纏細杖子內藥內

承軟點眼兩眥莫與更令還於麻燭上燒而用之

又療積年赤眼方

取古字錢四十九文重著又取石鹽末填（心孔中令）

滿以五月五日中於石上用烈炭火燒令極赤然後

內一升醶酢中以瓷器內用四十九重紙封一日去

一重去盡後用一黍米大點眼眥中極効（並出第二十八卷中）

必効主積年久赤方

銅鉢錨一尺以下面者一枚著石鹽末如杏人許由

脂半雞子許相和合鹽取柳枝如箸一握急研一

頭用研油脂三日狀如墨取熟艾如雞卵大（碎作）

小坑置几於下炙艾著火令銅鉢錨於上其下仍令

過氣火盡即成常蓋頭欲用時以綿纏杖子頭□□
外臺兩背頭每夜著即臥待六方云頻用甚効
又療積年風赤眼方
取生油生豬脂胡粉各等分和研傅眼中一日內赤
總除
救急療久患風赤眼方
黃連一兩　大棗一兩擘去皮核細切　印成鹽二兩大許
右一味以井花水半升內前件藥緩緩少煮三分去一
以綿濾使盡其餘汁更緩火煎之候藥上有紫瘀起即
是更蒸以物盡刮取於合內貯之勿使塵污取用一度

取一大豆許以人乳和之置兩眼背頭從淚出每著並
人咽喉即停積年患赤眼者不過五度即差及風胎赤
皆差亦不勞避風每欲出時口含鹽水以洗之甚良忌
豬肉
目暴卒赤方六首
肘後葛氏療目卒赤痛方
以鹽湯洗之
又方
燒荊木出黃汁傅之
又方
竹葉　黃連各一兩　錢二七枚
右三味以水二升煎取二合綿蘸傅背目五六度忌豬
肉並出第二卷中
深師療眼忽赤痛方
鯉魚膽一枚　黃連二十一枚
右二味和漬於飯下蒸之熟去滓以綿點目中五六度瘥忌
豬肉
必效療淚赤方
雞舌香二十枚　乾棗二十枚擘　黃連二十枚碎
右三味以水半升煎五六沸澄取清點目中差多者令

人目明忌豬肉[illegible]
又目暴赤熱毒方
蕤人一分去皮　黃連一分　雞子白一枚
右三味以綿裹二味內雞子白中漬一宿塗眼四五度
厚則洗之
目痒方四首
肘後療目卒痒且痛方
削乾薑令圓滑內眥中有汁拭薑復內之未盡易之
集驗同
又風目常痒淚出方

以鹽注眥中差止

文仲療眼暗及風赤痒方

煎成白鹽三匙 烏賊魚骨四枚去甲

右二味以清酢漿水四升煎取二升澄清鈍豆及睫洗眼大去膚肉單鹽漿水煎之洗亦佳

又療風痒赤方

黃連半兩 丁香二七枚碎 蘗皮半兩 棗大一十枚 錢七文古者

右五味以水二升煎取一升去滓綿纏杖點取著眼角差止肘後同

目中風腫方五首

病源目為肝之外候肝虛不足為冷熱所干故氣上衝於目外復遇風冷所擊冷熱相搏而令瞼內結腫或如杏核大或如酸棗之狀腫而因風所發故謂之風腫出第二十八卷中

肘後療目中風腫弄眼方

礬石二錢熬末

右一味以棗膏和如彈丸以磨目上下食頃止日三度一作揉姚同

又方

取頭垢著眥中亦得

又方

枸杞根白皮 伏雞子殼

右二味等分擣為末著目上

范汪療目中風腫痛方

取薤白刀截仍以摩目上令遍痛皆差延年文仲肘後同止之

集驗療目中腫痛方

搗枸杞汁洗之日六七度深師療眼有熱生瞖肘後同

眼熱疹痛赤腫方三首

刪繁療眼熱眥赤生赤脈息肉急痛開不得開如芥在眼疹痛大棗煎方

大棗十顆去皮核 黃連二兩 淡竹葉五合

右三味以水二升煎取一升澄取八合下棗黃連煎取四合去滓綿濾細細點傅眼中忌豬肉

又車前草湯洗方

車前草切半升 乾藍五合 淡竹葉二兩

右三味切以水三升煮取二升綿濾去滓用上好鹽半刀圭內湯中攪令調取冷細細用洗眼一刀圭者準丸如兩大豆大必效同

張文仲療眼暴赤腫疹痛不得開淚出方

黃連　黃蘗　甤人　鹽豉

芒硝各等分

右五味擣篩和如黍米大內眥中忌猪肉

眼闇令明方一十四首

千金論曰凡人年四十五十以後漸覺眼闇至六十以後還漸自明療之法五十以前可服瀉肝湯五十以後不可瀉肝目中病可傅石膽散等藥無病不可輒傅散但補肝而已目病肝中有風熱令人眼闇者當灸肝俞五百壯穴在明堂部中及服除風湯丸散數十劑當愈也

凡生食五辛接熱食飲刺頭出血過多極目遠視夜讀細

書不避煙火博弈不休日沒後讀書飲酒不已熱食麪食抄寫多年雕鏤細作泣淚過度房室無節數向日月輪看夜遠視星火月中讀書雪山巨晴視日極目瞻視山川草木

右十九件並是喪明之由養性之士宜熟慎之又有馳騁田獵冒涉霜雪迎風追獸日夜不息者亦是傷目之媒也恣一時之浮意為百年之痼疾可不慎歟可不慎歟凡人從少時不自將慎年至四十卽漸漸眼闇若能依此將慎可得白首無他所以人年四十已去常須瞑目非有要事不可輒開此之一術護慎之極也其讀書博弈等過度患

近世佔當作視

目者名曰肝勞若欲療之非三年閉目不視不可得差徒自瀉肝及作諸療終是無効也人有風邪多必眼闇先攻其風而闇自差出第六卷中

廣濟主令明目方

三月中取新杏人研爛絞取汁一升石鹽兩大豆大銅器盛之取銅古錢二七文漬之二七日綿注目中夜洗眼用出第五卷中

小品療眼漠漠黃連洗湯方

黃連三兩　秦皮二兩　甤人半兩

右三味㕮咀水三升煮取一升半絞去滓適寒溫以洗

目日四五度又加升麻二兩加水煎之忌猪肉

集驗明目令髮不落方

十月上巳日取槐子內新甕中封口三十日洗去皮初服一枚再服二枚至十日服十枚滿十日卻從一起千金云從月一日服一枚二日二枚每日加一枚計十日服五十五枚一月日服一百六十五枚一年服一千九百八十枚小月減六十枚此療主明目令髮不白好顏色長生益壽病冷人勿服肘後云扁鵲方

刪繁療肝虛寒目䀮䀮視物不明稀視生花防風補煎方

防風　細辛各一兩　芎藭　白鮮皮

獨活各三兩　甘草炙　橘皮去脉各二兩　大棗二七枚去核

甘竹葉切一升　蜜五合

右十味切以水一斗二升煮取四升去滓下蜜更煎兩
沸分為四服日三發一[illegible]若是五六月熱[illegible]瓷器貯於冷水藏
之忌海藻菘菜生葱[illegible]
千金補肝散療男子五勞七傷明目方
地膚子一升陰乾　生地黃十斤取汁
右二味擣地膚末和汁暴之令乾更擣為散酒服方寸
匕日三
又方
白瓜子七升絹袋盛絞沸湯中三遍曝乾以酢五升漬
一宿暴乾擣下篩酒服方寸匕日三久服佳

又神麴丸主明目百歲可讀注書方
神麴四兩　磁石二兩燒研　光明朱砂一兩研
右三味末之蜜和丸如梧子飲服三丸日三常服益眼
力衆方不及學者須知此方神驗當實秘之忌生血物
並出第六卷中
千金瀉肝湯主藏中痰實熱衝眼漠漠闇方
苦竹根八兩　半夏四兩洗　乾薑
枳實炙　白朮各三兩　杏人二兩去　茯苓
細辛二兩　甘草二兩炙　[illegible]
右十味切以水一斗二升煮取二升七合分三服

又補肝丸主明目方
地膚子　藍子　蒺藜子　車前子
瓜子　菟絲子　茺蔚子　青葙子各二分
決明子三合　細辛　桂心　螢火蟲各二分
大黃八分　黃連六分
右十四味擣篩蜜和為丸如梧子飲服二十丸日三加
至三十丸[illegible]
又主眼闇方
蔓菁子一斗淨洗
右一味以水四升煮自旦至午去汁易水又煮至晚去
汁易水又煮至旦暴乾以布袋貯之一度擣三升以粥
飲服三方寸匕日三服後酒等任性所便並出第十一卷中

療年令目明方
燕脂香取黍米一粒內目眥中當有水出亦目中習
習然引風由狀而明之候也常以日申時傅之若似
痛以冷水洗之即定以申時傅藥者為其目至日下
便痕漠暗如有物即以藥內中淚出以熱帛拭之以
水洗訖便豁然明也此香以單主百病[illegible]一盃人勝
不乳也本云是外國用之明月甚驗大[illegible]香中出
此

必効洗眼湯去熱氣漠漠視物不見并瞖方

秦皮　黃蘗皮　蕤人各三分　細辛二分

茺蔚子三分　黃連四分　古錢七文

右七味切以水二升煮取八合平旦洗目忌生菜

又青葙子丸主眼風闇有花方

青葙子　槐子　覆盆子　地膚子

菥蓂子　車前子各五分

右六味擣篩蜜和丸如梧子日服十五丸忌五辛猪雞牛羊肉魚蒜麫酢

近効療眼中一切諸疾青盲瞖天行風冷熱胎赤淚出常漠漠不多見物唯不療睛破餘悉主之方

石膽一兩光明者　波斯鹽綠一兩色青陰兩卜是不黑者是　奠石鹽二兩研

硇砂二分以上四味各別研　秦皮二兩　蕤人三兩去皮

烏賊魚骨一兩去上甲別研　細辛一兩　防風三兩

馬蹄決明二兩七孔者仍以鹽水洗去上黑皮熬過用　鉛丹一兩

黃連三兩

右十二味草石藥合擣篩唯似粉仍以重絹羅重篩訖以白蜜於火上微煖去上沫取下清者和之作塊更擣千杵以油膩紙裹之亦取瓷瓶子盛貯勿使見風可得多年不敗每欲著以兩米許硬和少許蜜稀搗如熟麫以筯子頭分置兩眼眥至夜仰卧揩之合眼至明不歛口合清漿和一豆許鹽盥消以洗眼不避風日未差之前忌食麪羊肉醬梨子生菜薹汁育若蕎苣惟羊頭豬肝冷鹽下餘並不得食至著後後更七日愼之過此一任與食每日一度著藥甚妙

失明方六首

肘後療積年失明不識人方

七月七日取蔓菁子陰乾擣篩食後服方寸匕

深師療失明主一歲二歲三歲四歲拭目中無所見如綃中視決明散方

馬蹄決明二升

右一味擣篩以粥飲服方寸匕忌魚蒜猪肉辛菜

千金補肝散療目失明漠漠無所見方

青羊肝一具去上膜薄切之以新瓦盆子未用者淨拭之內肝於中炭火上炙令極燥脂汁盡取之別擣決明子半升蓼子一合熬令香下篩三味合和更篩以飲汁食後服方寸匕漸加至三匕不過兩劑能一歲復可夜讀書

又補肝散療三十年失明方

細辛　鍾乳研　茯苓　雲母粉

遠志去心　五味子

右六味各等分擣作散飲服五分七日三加至一錢匕

忌生菜大酢

又方

胡麻一石蒸三十遍末之日服一升良

又方

三月採蔓菁花陰乾末之空腹以井花水服方寸匕久服長生目明可夜讀細書並出第六卷中

青盲及盲方六首

病源青盲者謂眼本無異瞳子黑白分明直不見物耳但五藏六府之精氣皆上注於目若藏虛有風邪痰飲乘之有熱則赤痛無熱但內生障是府藏血氣不榮於睛故外狀不異只不見物而已是謂之青盲養生方云勿塞故井水瀆令人耳聾目盲又云正月八日沐浴除目盲出第二十八卷中

深師療青盲方

猪膽一枚一味微火煎之可丸如黍米內眼中食頃良

又黃牛肝散療青盲積年方

黃牛肝一具　土瓜根三兩　羚羊角屑三升　蕤人三兩　細辛六兩　車前子一升

外臺秘要　〈二十一卷　三　羅餘居〉

右六味蒸合肝於瓶中春夏之月封之十五日冬月封之二十日出暴乾擣下篩酒服方寸匕忌肉魚五辛生菜等

又療肝藏病眼青盲內或生障惡風赤痛補肝散方

乾藍六分　甘遂三分　桂心　茯苓　附子炮　黃連　甘草炙　當歸　乾漆熬　貝齒燒　猪苓　白朮各五分　乾地黃八分　丹參六分　防風七分　黃耆六分

右十六味爲散酒服方寸匕日三服忌海藻菘菜生菜猪肉冷水桃李雀肉等

外臺秘要　〈二十一卷　四　羅餘居〉

又療肝氣之少眼視䀮䀮面目青眼中眵淚不見光明調肝散方

細辛　柏實各二兩　蕤人　甘草炙各一兩　羊肝一具去脂薄炙乾

右五味擣篩以酒服方寸匕甚良忌同前

又療眼闇熱痛方

鯉魚膽幷腦等分調以注目眥日三良肘後療雀目

又勿逆青盲十五年有瞳子不壞者治十得九方

蔓菁子六升蒸之看氣遍合甑下以釜中熱湯淋之即暴乾如是三度訖擣篩清酒服二方寸匕日三加三

七陰雨日勿合散壞百日翹愈神効甚良
雀目方四首
病源人有晝而睛明至瞑則不見物世謂之雀目言其如
鳥雀瞑便無所見也 出第二十八卷中
廣濟療雀目地膚子丸方
地膚子五兩　決明子一升
右二味擣篩米飲和丸每食後以飲服二十丸至三十
丸
又雀目至暮無所見者栢皮散方
老栢白皮四兩　烏梅肉二兩熬　細辛　地膚子各四兩

右四味擣篩爲散每食後清酒服二方寸匕日三四服
差
崔氏療雀目方
七月七日九月九日取地衣草淨洗陰乾末之酒和
服方寸匕日三服一月即愈 出第四卷中
千金翼療眼暮無所見方
豬肝一具細切以水一斗煮熟置小口器中及熱以目
臨上大開勿閉也冷復温之取差爲度 出第十一卷中
目膚瞖方一十四首
病源陰陽之氣皆上注於目若風邪痰氣乘於腑臟腑臟
之氣虛實不調故氣衝於目久不散變生膚瞖膚瞖者明
眼睛上有物如蠅翅者即是又此言肝藏不足爲風熱之
氣干之故令目睛上生瞖瞖久不散漸漸長侵覆瞳子 出
第二十八卷中
深師療眼瞖方
胡粉注瞖上以療三年瞖
又療眼異瞖覆瞳子膚起方
貝子四枚燒　空青一兩　礬石一兩熬汁盡
右三味末取如黍米注瞖上日二
又去眼瞖方

書中白魚末注少許於瞖上
千金療目赤及瞖方
烏賊魚骨去甲　鉛丹等分合研細和白蜜如泥蒸之半
食久著少許四眥中差
又去瞖方
貝齒十枚燒　細篩末取如胡豆著瞖上日再正仰臥令人
傅之妙一石米久乃拭之息肉者加真珠如貝子分
等研如粉
又療目瞖障白膜落方
雄雀屎人乳和研以傅上當漸漸消爛良妙 肘後并眞同

熏按留中一作銅器中

謹按朱砂一作瑚碣

又洗眼湯療熱出攻眼生障瞖方

秦皮　黄蘗　決明子　黄芩

黄連各三分　蕤人五分　梔子七枚　大棗五枚

右八味切以水一升煮取六合洗目日二差忌猪肉

千金翼眞珠散主白瞖覆瞳睛不見物方

光明朱砂二分研　貝子五枚炭火燒末之　白魚七枚炙　乾薑半分

右四味擣爲末相和研之如粉以熟帛三篩之仰卧遣人以小指爪挑取少許着傳眼中亦主白膚瞖風淚忌生血物

又七寶散主目瞖經年不愈方

白眞珠一分　珊瑚一分　紫貝一分　馬牙硝一分

朱砂二分　琥珀一分　蕤人二分　決明子一分

石膽一分

右九味擣下篩極細傳目中如小豆日三大良忌生血物　並出第十一卷中

崔氏療瞖五十年不差方

貝齒一枚燒　豆豉三十枚　三年苦酒三升

右三味先漬貝齒三指消盡乃内豉微火煎如膠取三合藥置筒中夜卧時若如小麥大於眥頭引目以湯洗之十日愈

又療眼中瞖少輕者方

取枸杞及車前子葉分等手中熟挼使汁欲出又別取桑葉兩三重裹之懸於陰地經宿乃擣破桑葉取汁細細點目中不過三五度瞖自消

又瞖如重者方

取猪白皮暴乾合作小繩子如麤釵脚許火燒作灰待冷便以灰點瞖上不過三五度瞖自當爛張右司差　並出第十一卷中

延年療眼熱赤白瞖覆瞳子方

車前子九分　決明子　黄連各九分　黄芩

秦皮　玄參　沙參　苦參

地骨皮　蕤核人各六分　藍實九分

右十一味擣篩蜜和丸如梧子食後飲服二十丸漸加至三十丸差止忌猪肉

謝道人療眼瞖欲盡微微猶有者傳此散方

珊瑚　虎珀　玉屑　曾青

紫貝　朱砂　伏雞子殼去白皮

右七味各等分研重篩爲散仰卧以米許置瞖上四五度忌血物

眼瞖方四首

病源五藏六府之精華皆上注於目目為肝之外候肝藏血血氣不足則肝虛致受風邪風邪搏於精氣故精氣聚生於白睛之上繞於黑睛之際精彩昏濁黑白不明審謂之目暈

延年主眼熱暈暗覆瞳子方

柴胡三兩　茯苓　枳實炙　決明子

瞿麥各三兩　黃連別滴　甘草炙　蕤人各二兩

右八味切以水一斗煮取二升七合去滓分再服忌海藻菘菜豬肉酢物

又方

黃連　決明子　車前子各九分　黃芩

沙參　人參　地骨皮　蕤人

瞿麥　茯神各七分　秦皮　甘草

澤瀉各五分

右十三味擣篩蜜和為丸如梧子飲服二十丸日再服為度

又療眼因赤差後暈方

決明子六分　黃連　蕤人各六分　黃蘗四分

鹽碌三分

右五味擣末更研極細取少許內目中日三四度忌豬肉

又方

秦皮一兩

右一味以水一升五合煮取七合澄清決明用漬兩目中一如前法并出第四卷中

生膚息肉方八首

病源息肉淫膚此由邪熱在藏氣衝於目熱氣攻於血脈蘊積不散結而生息肉在於白睛膚瞼之間即謂之息肉淫膚也

肘後療目中生肉稍長欲滿目及生珠管方

貝齒　真珠分等

右二味並研如粉拌令和以注肉上日三四度良

小品療眼膚肉生覆瞳子者方

取針燒令赤爍著膚上不過三爍縮也有令人割之三復生不如爍之良

又療肝熱不止衝眼眼為暫赤脈息肉閉痛不開但熱勢彭彭不歇及目眥頭洗肝乾藍飲方

乾藍切　車前子　苦竹葉切各三升　秦皮三兩

細辛　決明子　蕤人　山梔子

升麻　芍藥各三兩

右十味切以水二斗煮乾藍取一斗去滓取精八升煮
藥取一升下芒硝三兩沸去滓分再服忌生菜

千金療眼中息肉方

驢脂石鹽末和以注眥即差

千金翼礬石散主目瞖及努肉方

礬石上上白者內如黍米大於瞖上及努肉上即令
淚出以綿拭之令得惡汁盡日一其疾逐惡汁盡日
日漸自薄便差好上上礬石無過絳礬色明淨者偵
如療眼常法

崔氏療人眼熱冷膚肉閤方

光明朱砂一兩研 硇砂一兩研 繁水一大升

右三味以五月五日合置銅器中日暴使乾用刀子刮
取以新帛裹之每夜眠時著一米許安眼眥各一米
並一月間內外瞖者皆愈忌生血物 出第四卷中

必効療眼熱努肉及赤癢方

黃連一兩碎 竹葉一兩切

右二味以水一升半煎取半升置銅器中湯上煎似稀
餳止卧時點眼中熱淚出即差止

謝道人療眼風熱生赤肉方

大黃二兩 黃芩一兩 甘草炙 人參

地骨白皮 決明子各二兩 防風 石膽

地膚子 黃連 兎肝各一兩 車前子一升

螢火蟲一兩枚

右十三味擣篩爲散以鯉魚膽一合和丸飲下十五至
三十丸忌猪肉海藻菘菜

目風淚出方六首

病源目爲肝之外候若被風邪傷肝肝氣不足故令目淚
出其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導
引法云以鼻內氣左手持鼻除目晴淚出又云端坐伸腰
徐以鼻內氣以手持鼻除目晴淚出又夫五藏六腑皆有

津液通於目者爲淚若藏氣不足則不能收制其液故目
常淚出亦不因風而出不止本無赤痛 並出第二十八卷中

深師療眼淚出雞舌香丸方

雞舌香二銖 黃連六銖 乾薑一銖 蕤人一百枚

礬石二銖熬

右五味擣爲末以棗膏和丸如雞距以注眼眥忌猪肉

又療眼白瞖淚出雞距丸方

乾薑三分 蕤人三十枚 雞舌香十枚 黃連二銖

胡粉四銖 礬石五銖熬

右六味擣末以棗膏丸如雞距注眼大眥日再忌猪肉

又療風淚出眼痒痛散方

貝齒十枚燒　決明子　黃連　細辛

乾薑各一分

右五味搗下篩以指爪取如麻子注眥中日三夜一忌

加乾薑一分眼痛以三指撮二合水煮三沸去滓以汁

洗之良　何漢壽用甚有効驗

集驗療目中風腫淚出眥赤痒乳汁煎方

黃連三分　蕤人二分　乾薑四分

右三味擣散以乳汁一升漬藥一宿明旦於微火上煎

得三合綿絞去滓取如米內眥中

崔氏療目淚出方

苦酒一升　古錢一百五十文

右二味以苦酒漬錢微火煎取三升去錢澁取汁更煎

取七合漸漸點著眥中甚良

又療目中痙淚出不得開即刺痛方

取石鹽如大豆許用內目中習習去鹽以冷水洗數

日差　並出第四卷中

眯目方八首

廣濟療眯目氍毹灰方

取少許氍毹燒作灰水服方寸匕立出[illegible]

又療眯目不出淫膚瞿麥散方

瞿麥　乾薑各二分

右二味為散以井花水服方寸匕日三不過三眯出

又療眯目豬膏塞鼻方

以豬膏如半雞子果鼻孔中隨眯左右著鼻中以噏

之即便仰臥須臾不知眯處

又麥芒入目不出方

煮大麥汁注眼中即出良

肘後療目眯芒草沙石輩眯不出方

磨好書墨以新筆點注目中瞳子上

又方

鹽豉各少許著水中臨目視之即出　並出第一卷中

深師療目痛及眯忽中傷因有熱瞑者方

取地膚白注目中

千金翼主眯目不明方

椎羊鹿筋擘之內口中熟嚼著瞼上以手輕挼之若

有眯者二七過挼便出之視眯當著筋出即止不出

者復為之如此法常以平旦日未出時為之以差為

度出訖以好蜜注四眥頭鯉魚膽亦佳若數數目痛

可間日挼之　出第十一卷中

肝氣不足方二首

千金翼補肝湯主肝氣不足兩脅拘急痛寒熱目不明并婦人心痛乳癰膝脛熱消渴爪甲枯口面青方

甘草炙 防風各三兩 烏頭一兩炮 大棗二十枚

細辛 柏子人 茯苓各一兩 蕤人

桂心各一兩

右九味切以水八升煮取三升分為三服忌海藻菘菜豬肉生葱菜酢物

又補肝湯主肝氣不足方

甘草炙 黃芩 人參 桂心各二兩

右四味切以水六升煮取二升分三服忌生葱餘同

肝實目痛方二首

刪繁療肝實熱目痛胸滿急塞瀉肝前胡湯丸方

前胡 秦皮 細辛 梔子人

黃芩 升麻 蕤人 決明子各三兩

芒硝三兩 苦竹葉切一升 車前草切一升

右十一味切以水九升煮取三升去滓內芒硝分為三服

千金同

又療肝實熱或眼痛熱不止生地黃煎方

生地黃汁一升 玄參汁五合 蜜五合 車前汁五合

升麻 細辛各二兩 芍藥 梔子各三兩切

右八味切以水五升煮升麻等四物取一升五合去滓下生地黃等汁蜜沸成煎分五六服

眼雜療方二十首 內缺二方

廣濟療客熱衝眼赤痛淚出決明湯方

決明子 升麻 枳實炙 柴胡

黃芩 芍藥各一兩 梔子十四枚 竹葉一升

車前草四升 甘草一兩炙

右十味切以水九升煮取二升五合去滓內芒硝溫服分為三服忌海藻菘菜

又療先服石熱衝上眼赤方

黃連 苦參 梔子各八兩 蕤人

決明子 黃芩各一分 麥門冬去心六分 黃蘗

大黃各六分

右九味搗篩蜜和丸如梧子食後以蜜水下二十至三十丸忌豬肉

肘後療目卒痛珠子脫出及有青翳方

越燕矢 真丹 乾薑各等分

右三味末如粉以少許著目中翳上良妙

小品療眼風結腫合或眼生翳人口吹之睛中牽引疼痛

上胞赤起或黑髮黃從下上覆半睛者秦皮湯方
秦皮洗 黃連各二分 黃蘗三分 大棗五枚
蕤人二分
右五味切以水二升煮取一升以洗眼忌豬肉
集驗療眼暴熱赤後失明方
以羊膽生朝膽各一枚吞之
又療風眼爛眥者方
竹葉四分 柏白皮六分 黃連四分
右三味切以水二升煎取五合稍稍瀝兩眥日三度忌
豬肝

刪繁療肝陽氣伏邪熱喘逆悶恐眼視無明狂悸非常語
言竹瀝泄熱湯方
竹瀝一升 麻黃 大青 梔子
人參 玄參 升麻 茯苓
知母各三兩 石膏八兩碎 生薑四兩 芍藥四兩
生葛八兩
右十三味切以水九升煮取二升去滓下竹瀝更煎三
五沸分三服忌酢物
千金翼蕪菁子主明目益飢膚方
蕪菁子三升淨淘高著水煮二十沸出著水盆中淘之
令水清接取以別釜煮之水盡即添益時嘗看味美
瀝出暴乾
右一味擣末酒飲等任意和服三方寸匕日惟服七合
飽食任性酒醒即服無限時慎生冷百日身熱瘡出不
久自差
又療目赤口乾脣裂方
石膏一斤 生地黃汁一升 赤蜜一升 淡竹葉五升
右四味以水一斗二升煮竹葉取七升去滓入石膏取
一升半下地黃汁蜜取三升細細服之忌蕪荑並出第十一卷中
文仲陶氏療數十歲眼爛眥方

摘蒴葉中心一把着鐺中水五升煮用小板覆上穿
作孔以目臨上蒸當痛食頃出淚一升便即差
必效朱砂散主人眼中有黑白花遮眼上下方
光明砂六分研 地骨白皮五分 車前子二分 龍腦香六分
決明子五分
右五味擣篩細研如粉少少傅之
近效療熱風眼赤瞼爛生瘡或瘀或痒或痛久患虛
熱遠視不明倫若霧縠看花或眼石乳發動冷熱淚出白
睛赤紅腫脹淚裂眼珠皆是肝膈實熱腎藏已虛宜先服
竹葉飲子治之然後可點藥凡患眼有遮睛瘀痛者皆不

謹按曰一本作玉

得以辛辣藥點之幸請細意詳思不得措手比見投方號
藥未曾試驗各說異能競施衆療微有疼障似醫者或有
膚人不審眼珠厚薄乃將針穿豆爪甲摩之傷敗非一今
輙附數方百無一失且服之不令吐利點藥不痛不疼將
攝既有所憑疾苦豈能不愈如前病狀宜服此竹葉飲子
除風客熱暴磣澁疼痛睛赤目黃冷淚熱淚並理石乳天
行眼疾方

竹葉一握 乾葛三兩 地骨白皮 蔡范各五兩
甘草二兩炙

右五味切以水二大升煎取半升去滓內車前子三兩

分三服一日令盡皆食後服之良不過三劑眼中疼痛
歇次得點藥一無疼痛神効前方亦須傳藥抽熱毒風
不然恐尋經脉入眼熱深入亦難差也又取羊肝一具
或豬肝亦得豬肉精處亦堪取三斤皆須破作手許大
片厚薄亦如手掌候其疼處或從眼後連耳上頭或有
從眉向上入頭掣痛者火急斫汲水中漬令極冷貼其
疼痛脉上及所患部分候肝或肉稍暖微則易之須臾
間其肝肉等並熱如煮來者豈不是熱毒之候出也此
即損眼之禍又恐三辰齋忌之月無肉以大豆蒸作四
五替如漬肝肉法更互熨之其疼痛忽定鼻中酸辛者

謹按大豆蒸然卸豆宮如今人眉睫

並是難差之候亦宜急覓具鹽菜葉擣如泥傅痛處亦
有差者十得三四凡是此患不宜久恐痛若深入於眼
中漸成痼疾
又療眼睛不疼亦不痛上下瞼赤風痒生瘡淚多者宜點
此藥方

蕤人四十九枚去赤皮研 胡粉如棊子許大上火燒冒赤變如金色

右二味各別研取好真酥如杏核許大都一處和研令
勻入龍腦香如大豆許大三粒研令消宜油帛裹或銅
合子盛之勿泄氣傷風則不堪用或有小兒胎赤並宜
用此方且不疼痛亦不損眼大人久患赤痛爛瘡者宜

先取鹽花或好白鹽一方寸七醋漿水不用純酢中中
者一大升煎鹽三五沸綿濾取汁欲夜臥先以清水洗
眼次以鹽湯洗之拭令眼乾次以爪甲挑取麻子許多
藥塗眼大小眥任眼開合須臾少淚出眼中涼冷狀若
人吹不經三日內其赤便差視物漸明恐眼中忽有倒
睫毛刺眼者速令一人以鑷子摘去之否則令眼淚多
磣痛若不除之塗藥終無益耳
又凡目疾不問少長男女等所忌有五一房室二麪酒三
目衝風冷霜雪向日遠視四哭泣嗔怒五終身不用吹生
五辛蕎芥蓴菜若因疾犯者則疾深難療幸細意將慎百

通按紅膚乃腎仍旁開之

無一失故具五忌也
又療眼赤腫熱疼淚出燒人皮肉不可堪忍或石乳發動連睛疼悶乍歇乍發頭痛增寒臉赤瘀爛無所見物白膜覆黑珠或因天行斑毒入眼無所見者一切藥並不可著唯宜用此法甚驗萬無失一方
千歲虆汁一名嬰薁藤汁也不問春秋冬夏並採其莖削去上蒼皮麤細如大母指大者即得截隨可長六七寸取一銅器或瓷器中盛水三五升漬之一食頃其頭白乳汁出可長半寸許取此汁將

通按濃沙或是蜃砂

又療眼中一切諸疾青盲瞖者天行風赤無端忽不見物悉主之此方兵部侍郎盧英所傳價重千金
石膽研 波斯鹽綠研 石決明 烏賊魚骨去甲
鉛丹 細辛 濃沙各三分 蕤人碎二兩
防風末二兩 秦皮支二兩 馬蹄決明淨二兩

右十一味擣散及研避風煮以白蜜鍊濾使淨和訖入臼中更擣五七千杵以油臘紙重裹之瓷合盛勿令見風可致百年不敗合之不欲見雞犬與鳥雀婦女及孝子穢惡之類仍取臘月合之有患取米粒更和上蜜如稍傷夜臥點之衛風行亦不畏每日點以差即止 夏侯拯處傳
又凡自天行病後皆不得食葵熱麪生五辛齋麥魚膾毒物傷目就中更犯房室加之疼痛連眉乍疼乍痒翳遮脈掣微似有疾愚醫不曉遂妄針灸兼服補藥因茲失明或有先服英乳之人亦同斯疾宜即將理不得妄服湯丸甘

苦酸辛須知冷熱只如腎風虛損膽人眼大無瞖而便失明假如肝藏熱風筋膜連睛生薄浮瞖宜服甘平苦味之藥辛酸温熱入口發其風毒唯宜傳薄膏散熱氣自除少飲湯方攝理不盈三劑日漸痊愈吐利湯鍼灸不得妄施宜服後方療天行從因犯食毒失明兩瞖脈掣熱疼兼頭痛憎寒天陰即發及先食英乳者方
前胡三兩 生麥門冬五兩去心 竹葉一握 甘草二兩炙
梔子二七枚 乾葛 萎蕤三兩 漏蘆各三兩
右八味切以水三大升煮取一大升分作三服神驗良
忌海藻生菜

又鼴鼠土膏療眼疼脉擘忽赤腫疼不可堪者方

取日中鼴鼠土二升 青木香一兩 大黃五兩 白斂三兩

寒水石六兩

右五味搗篩爲散用熟蔚臼汁和如錢傷當有早瘥厚之如手當付傳之乾即易至平且傳即止神効無比

又眼有倒睫毛或折在瞼中聚生瘡者因睛上迮窄閉澀赤瞼起睫上下瞼多赤生瘡若擘剌黑睛則疾出似肉擘上一則者婦人令眼疼痛磣澁不欲見明連頭皆痛兼腦使疾此多損傷宜速救療其法如左

若欲療之者皆取平晨日未出之際令一眼明人把

鑷子拔之去倒睫毛勿使毛斷連根去之下手十減八九疼痛立止至夜點前千歲藥汁三五日將息方得平復點首生男乳汁良若點辛辣之藥從此傷敗實可痛哉慎風寒日月光及煙火房室五辛一月內節差

又凡是黑睛及瞳人變薄有瘡瞖皆不可用辛辣及温藥此之並是害眼之兆宜用秦皮湯洗之方

秦皮一兩 梔子人二七枚 淡竹葉一握

右三味切綿裹以水一升半著銅器中煎三五沸以綿濾取洗眼切須淨器物盛之夏侯拯錄用

右廸功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十一卷終

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十二卷目録 耳鼻牙齒四十凡 [illegible]

耳聾方二十二首
風聾方三首
耳聾有膿方三首
久聾方五首
耳鳴方六首
聤耳方一十首
耳卒疼痛方三首
耳卒腫方二首
通耳中膿方二首
蟲入耳方九首
蜈蚣入耳方三首
蚰蜒入耳方三首
飛蛾入耳方二首
蟻入耳方二首
耳雜療方八首
鼻中息肉方一十一首
鼻齆方五首
肺寒鼻齆方二首
鼻窒塞不通利方七首

鼻塞常清涕方二首
鼻生瘡及疳蟲食方九首
牙疼方八首
齒痛方一十一首
齒疼方六首
牙齒疼痛方八首
蚛齒方五首
齒風痛疼方三首
齲齒方七首
齒䘌方五首
風齒方四首
風齒根出方二首
風齒口臭方二首
牙齒風齲方三首
牙齒疼風蟲俱療方五首
風衝牙齒搖動方二首
疳蟲食齒方一十首
齒痛有孔方四首
齒挺出及脫落方五首
齒間血出方三首

齒血不止方四首
齒齲方二首
牙疼痛及蟲方三首
牙齒雜療方七首
緊唇方一十三首
瀋唇緊爛方五首
脣瘡方三首
口瘡方一十一首
口瘡久不差方二首
口吻瘡方四首
口乾燥方五首
口臭方九首
舌論一首
舌本縮口噤方二首
舌上瘡方二首
咽喉舌諸疾方七首 今附方七首
口脣舌鼻雜療方一十四首 今附方六首

唐王燾先生外臺秘要方第二十二卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

耳聾方二十二首

病源腎爲足少陰之經而藏精氣通於耳耳宗脉之所聚也若精氣調和則腎氣強盛耳聞五音若勞傷血氣兼受風邪損於腎藏而精脫精脫者則耳聾然五藏六腑十二經脉有絡於耳者其陰陽經氣有相并時并則有藏氣逆名之爲厥厥氣相搏入於耳之脉則令聾其腎病精脫耳聾者其候頰顴色黑手少陽之脉動而氣厥逆而耳聾者其候耳内煇煇焞焞也手太陽厥而耳聾者其候聾而耳内氣滿養生方云勿塞故井及水瀆令人耳聾目盲其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後

養生方導引法云坐地交叉兩脚以兩手從曲脚中入低頭叉項上治久寒不自溫耳不聞聲又云脚著項上不息十二通必愈大寒不覺暖熱久頑冷患耳聾目眩久行卽成法法身五六不能變 出第二十九卷中

廣濟療耳聾方

生地黃長一寸半肥者 杏人七枚去皮熬令黃色 巴豆七枚去皮熬令黃

印成鹽二兩　蛇皮七寸燒

右五味擣碎研堪丸如棗核大用綿裹内耳中日一易耳内當痛有水出即去當直以綿塞耳耳内黄水出痛甚不得更著若未差還依前著藥取差千金翼同

又療耳聾不聞人語聲方

松脂四分　巴豆二分去皮心熬　麻子人二分　薫陸香二分　石鹽二分　一分

右六味擣如膏丸棗核大内耳中三日一易取差

集驗療耳聾方

杏人去皮尖熬　葶藶子熬　鹽末各等分

右三味擣研以少許豬脂和合煎以綿裹塞耳

又方

附子炮　瓜子　杏人去皮熬各等分

右三味擣以綿裹塞耳中

千金療耳聾方

淳醋微火煎附子五六宿削令可入耳以綿裹塞耳中取差

又方

巴豆十四枚去皮心熬　鐵砂　松脂二分

右二味合擣丸如黍米[illegible]著耳中以差爲度

又方

以竹筒盛鯉魚腦蒸之令烊以灌耳中

又方

雄黄　硫黄各等分綿裹塞耳中數月聞

又方

取鐵燒令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中差

又方

蓖麻子一百粒去皮　大棗十九枚去皮核

右二味擣丸如杏人内於耳中一十日差

又方

芥子擣碎以男乳和綿裹塞耳取差

又方

作泥餅子厚薄如餺飥覆耳上四邊勿令洩氣當耳孔上以刺泥餅穿作一小孔於上以艾灸之百壯候耳中痛不可忍則止頃側耳瀉却黄水出盡即差當

時泥乾即數易之

又方

截箭竿竹二寸内耳中以麪擁四畔勿令洩氣灸筒上七壯取差並出第六卷中

崔氏療耳聾方鄭云火鍼頻用

波律膏一蜆殼無以大麻脂一合小器中煎取一蜆殼著之
楓木脂半兩無以薰陸香著以乳頭香更佳　松脂半兩研
巴豆二七枚去皮熬研　蠟如彈丸大通按波律膏疑即胡桐淚
右五味先擣松脂巴豆一千杵次下大麻油令熱丸如棗核大一頭尖通中作孔以綿裹塞耳數日一易更互塞之取差不得併塞出第四卷中

備急療耳聾菖蒲根丸方
菖蒲一寸　巴豆一枚去皮心
右二味合擣可丸分作七丸以綿裹塞耳中日別一丸取差肘後同

又菖蒲散方
菖蒲二兩　附子二兩炮
右二味擣篩以苦酒和丸如棗核許綿裹臥即塞耳中夜一易之十日有黃水出便差肘後千金范氏同

又方
磁石　菖蒲　通草　薰陸香
杏人去皮熬　萆麻子去皮　松脂等分
右七味擣篩以蠟及鵞脂和丸稍長作以鉸腳子穿中心為孔先去耳中垢然後內藥日再初著痒及作聲月餘即差殷中侯監云非常良驗肘後同

救急療耳聾方
真崑崙青木香一兩碎以苦酒浸一宿胡麻油一合微火上緩煎之三上三下以綿濾去滓以點耳孔中以差為度

必效療耳聾方
以好神明膏如棗核許內耳中日一度頻著以差三五日以篦子挑耳中塞或痒取差亦治蟲入耳中

又方
取杏人七枚去皮拍碎為三分以綿裹各於中著一裹鹽如小豆許以器承於飯甑中蒸之候飯熟出一裹令患

耳者側臥和綿捻以油汁入耳中久又以一裹進前捻之差為度

又方
雞矢白半升熬令黃色　烏豆一升熬令爆聲絶
右二味先取無灰酒二升及熱以沃之良久濾去滓分溫服厚取汗其耳如鼓鞞勿訝

又療耳聾神驗方
取純烏羊新溼糞和杏子脂石鹽末
右三味研滿耳孔中塞勿令風入乾即易之乃至七日二七日耳內有聲漸大即以葦筒長二寸內耳孔裹四

呼以麫塞勿令氣出以麫溥餅子裹筒頭以艾灸上從第一度灸三壯為始耳內即有鳥聲乾隱出來聞內灸滿痛痛即出之即差但有聾什須挑挑却還依前法乃到一日兩日差即停以後常用 前法宜之甚驗

風聾方三首

病源足少陰之經宗脉之所聚其氣通於耳其經脉虛風邪乘之風入於耳之脉使經氣否塞不宣故為風聾風隨氣脉行於頭腦則聾而時頭痛故謂之風聾 出第二十九卷中

崔氏療耳風聾牙關急不得開方

取八角附子二枚醋漬之二宿令潤徹削一頭內耳中灸上十四壯令氣通耳中即差 出第四卷中

古今錄驗療風聾年久耳中鳴魚腦膏方

生雄鯉魚腦八分 當歸六銖 菖蒲六銖

細辛六銖 白芷六銖 附子六銖

右六味㕮咀以魚腦合煎三沸三下之膏香為成濾去滓冷以一棗核大內耳中以綿塞之取差

又方

附子 菖蒲各等分

右二味擣以綿裹塞兩耳中取差

耳聾有膿方二首

千金療耳聾有膿方

烏賊魚骨炙去甲 釜底墨各二分 附子四分炮

禹餘粮一分 龍骨二分 伏龍肝二分

右六味擣末取皂莢子許大綿裹以內耳中日一易取差

有蟲者加麝香一豆大

又方

擣桂末以魚膏和塞耳中不過二四度 並出第六卷中

必効耳聾有膿方

鯉魚腸一具切 醋三合

右二味合擣以布裹塞耳兩食頃當悶痛白蟲出更著新者蟲盡乃止取去無新者擇去蟲還可用良 千金同

久聾方五首

病源足少陰腎之經宗脉之所聚其氣通於耳勞傷於腎宗脉虛損血氣不足為風邪所乘故成耳聾勞傷甚者血氣虛極風邪停滯故為久聾 出第二十九卷中

廣濟療風聾三十年無所聞方

蓖麻子五分 杏人四分熬 桃人四分去皮熬 巴豆一枚去皮熬

石鹽三分 附子一分炮 薰陸香一分 磁石四分研

菖蒲四分 蠟八分 通草二分 松脂二兩

右十二味先擣菖蒲石鹽磁石通草附子薰陸香成末

別擣車麻子等四味乃內松脂臈擣一千杵可捻作丸如棗核大綿裹塞耳中日四五度抽出別捻之三日一易以差為度千金翼云日一易之

肘後療二三十年聾方

取故鐵三十斤以水七斗漬之三宿取其水以釀七斗米用麴如常法酒熟出酒一斗取引針磁石一斤研末置酒中三宿乃可飲之取醉以綿裹磁石塞兩耳中好覆衣衾臥酒醒良久去磁石即聞人語聲也飲盡更為以差為度甚良千金同

又方

茱萸 巴豆去皮熬 乾薑各等分

右三味擣末以葱涕和以綿裹塞耳食頃乾去之更和塞之如此五日當覺病去無苦八九日便聞人語取差止常以髮塞耳慎避風

又方

柘根三十斤剉之以水煮用釀酒如常法久而服之甚良

古今錄驗療三十年聾方

天雄一分 雞子一枚 附子一枚

右三味擣末取雞子開一孔取黃和藥却內雞子中封

合其頭還令雞覆之藥成以綿裹塞所聾耳中取差為度

耳鳴方六首

病源腎氣通於耳足少陰腎之經宗脈之所聚勞動經血而血氣不足宗脈則虛風邪乘虛隨脈入耳與氣相擊故為耳鳴診其右手脈寸口名曰氣口以前脈浮則為陽手陽明大腸脈也沉則為陰手太陰肺脈也陰陽俱虛者此為血氣虛損宗脈不足病苦耳鳴嘈嘈眼時妄見花此是肺與大腸俱虛也左手尺中名曰神門其脈浮為陽足太陽膀胱脈也虛者膀胱虛也腎與膀胱合病苦耳鳴忽然不聞時惡風膀胱虛則三焦實也膀胱為津液之府若三焦實則剋消津液故膀胱虛也耳鳴不止則變成聾出第二十九卷中

廣濟療耳鳴塞耳丸方

巴豆一枚去皮熬 桃人一枚去皮熬 松脂大豆許

右三味擣作二丸綿裹塞耳中

又療耳鳴沸鬧方

吳茱萸 巴豆去皮熬 乾薑 石菖蒲 磁石 細辛各一分

右六味擣末以鵝膏和少許以綿裹塞耳中以鹽五升

布裹蒸之以熨耳門令其煖氣通入耳內冷復易之如
此數用若後常以亂髮卷以塞耳中慎風
肘後療耳中常鳴方
生地黃截斷塞耳日十易之以差一云綿裹微火中
煨之用良 出第四卷中
千金療耳鳴聾方
當歸　細辛　防風　附子
芎藭　白芷各六銖
右六味末之以雄鯉魚腦和煎三上三下膏香去滓以
棗核許塞耳中以綿裹之魚腦用六合微火鍊之

又方
通草　細辛　桂心各三分　菖蒲四分
附子一分　礬石一分　當歸　甘草各二分
獨活六分　葱涕半合
右十味擣末以白鵝膏半合旋旋和以綿裹棗核大塞
耳中日三取差忌如常
又療耳聾鳴如流水聲久不治成聾方
生烏頭掘得承濕削如棗核大以塞耳中日一易之三日
愈亦療癢及卒風聾並出第六卷中
聤耳方一十首

夫聤耳者宗脉之所聚腎氣之所通足少陰腎之經也勞
傷血氣熱乘虛而入於其經邪隨血氣至耳熱氣聚則生
膿汁故謂之聤耳 出第二十九卷中
廣濟療聤耳痒有膿不止菖蒲散方
菖蒲一兩　狼毒　附子炮　礬石燒
慈石熬各一兩
右五味擣篩以羊髓和如膏取棗核大塞耳中以差爲
度
又療聤耳膿血出方
取車轄脂綿裹塞耳中差 用後同千金治蟲入耳

又療聤耳方
黃連　龍骨　白斂　赤石脂
烏賊魚骨各等分
右五味擣末以綿裹塞耳中每著以綿纏拭之著藥
肘後療聤耳耳中痛膿血出方
取釜月下灰吹滿耳令深日三易之每換卽以篦子
去之然後著藥取差爲度 千金云竈下灰薄耳中
又方
附子末以葱涕和灌耳中取差單葱涕亦佳側臥令
入耳中 出中卷

又方

桃人熟擣以故緋絹裹塞耳中日三易以差為度千金同

又方

黃連　附子炮各等分

右二味擣末以少許微微吹入耳中亦著藥先拭惡物然後吹之

又方

釜月下墨末以豬膏和綿裹內耳中日再

集驗療聤耳出膿水散方

礬石　烏賊魚骨　黃連　龍骨

右四味擣末以棗核許綿裹塞耳中日再

千金療聤耳出膿方

黃礬石　烏賊魚骨　黃連　赤石脂各一兩

右四味擣末以綿裹如棗核大內耳中取差止日二易方用龍骨無赤石脂出第六卷

耳卒疼痛方三首

病源耳中策策痛者皆是風入於腎之經也不治流入腎則卒然變脊強背直成痓也若因痛而腫生膿汁膿潰邪氣歇則不成痓所以然者足少陰為腎之經宗脈之所聚其氣通於耳上焦有風邪入於頭腦流至耳內與氣相擊故耳中痛耳為腎候其氣相通腎候腰脊主骨髓故邪流入腎脊強背直出第二十九卷中

肘後療耳卒疼痛方

蒸鹽以軟布裹熨之取差良

備急療耳疼痛有汁出方

熬杏人令焦黑擣如泥作丸以綿裹內耳中頻易之差

備急療耳卒疼痛求死者方

菖蒲　附子各一分

右二味末以麻油和以點耳中立止肘後崔氏同

耳卒腫方二首

肘後療耳卒腫出膿方

礬石燒末以葦管吹耳中日三四過或以綿裹塞耳孔內取差

備急療耳卒腫方

栝樓根削可入耳以臘月豬脂煎之三沸冷以塞耳中取差日三作七日愈肘後治卒得風覺耳中恍恍者

通耳中膿方二首

廣濟療耳膿水通耳礬石散方

吳白礬六分燒汁盡　麻勃一分　青木香二分　松脂四分
右四味搗末先消松脂後入藥末可丸如棗核淨拭以
塞耳中取差
又療耳膿水出方
吳白礬八分燒令汁盡末　紅藍花臙脂四十枚
右二味和研先拭耳中以粉粉之須拭然後著藥
蟲入耳方九首
廣濟療蟲入耳腫不聞人語聲有膿血出方
黃耆四分　乾薑一分　蜀椒一分
右三味搗末以生地黃搗取汁和用綿裹棗核大塞耳

中日三夜一以差止
肘後療百蟲入耳方
苦酒漬椒灌之卽出
又方
鹽湯灌耳中
又方
擣藍青汁以灌之
千金療蟲入耳方
取桃葉火熨以塞耳卷之入中　肘後同
又方
以葱涕灌耳中卽出　並出第六卷中
崔氏療蟲入耳方
若甲蟲入耳者以火照之手打水入勿令損之卽出
明出之或蚰蜒諸蟲入耳以酢灌之或麻油或人尿
亦佳或酢酪更妙
備急療蟲入耳方
以銅錢二七枚以猪膏煎之用將灌耳
又方
以兩刀於耳前相敲作聲蟲卽出走
蜈蚣入耳方三首

肘後療蜈蚣入耳方
以木葉裹鹽炙令熱以掩耳上卽出冷復易之驗
又方
閉氣滿卽吐之復閉準前以出爲度或死耳中徐徐
以銅鉗出之若積久不出者取新豬肉炙向耳中徧
之以出爲度
千金療蜈蚣入耳方
炙豬肉掩耳卽出　集驗小品同出六卷中
蚰蜒入耳方三首
肘後療蚰蜒入耳方

熬胡麻擣以葛囊盛枕之蟲聞香則自出
又方
以水銀大豆許瀉耳中欹臥空耳向下擊銅器叩齒
十下即出蚰蜒呼爲土蛄似蜈蚣黃色細長是也
備急療蚰蜒入耳神劾方
以牛酪滿耳灌之即出當半消若入腹空腹食好酪
一二升即化爲黃水不盡更服神劾肘後同
飛蛾入耳方二首
肘後療飛蛾入耳方
先大吸氣仍閉口掩鼻呼氣其蟲隨氣一旦出

又方
閉氣以葦管極吹之即出
蟻入耳方二首
肘後療蟻入耳方
燒陵鯉甲末以水和灌之即出
備急療蟻入耳方
炙猪脂安耳孔上即出或兩邊
耳雜療方八首
廣濟療耳鳴或聾漬酒方
菖蒲一斤　通草一斤　磁石一升碎綿裹

右三物切以絹袋盛清酒二斗漬之春夏三日秋冬五
日溫服三合漸加之至五合以下丸藥亦甚良
又療兩耳腫膿水出不聞人語聲方
黃耆　升麻　犀角屑　梔子各六分
玄參八分　乾藍　芍藥　人參各四分
大黃八分　青木香　黃芩　芒硝各六分
右十二味擣篩蜜和丸食後少時以枸杞根湯下二十
丸漸增之忌如常
又療兩耳腫方
青木香　防己　芍藥　玄參

白歛　大黃　芒硝　黃芩各八分
赤小豆十分　紫葛八分
右十味擣散以榆木白皮擣汁和之塗布帛上貼腫取
消
千金療卒聾方
細辛一分　菖蒲一分　杏人二分　麴末三分
右四味擣篩研杏人合之如脂棗核大以綿裹塞耳中
日一易小差二日一易夜去之旦即著
又底耳方
燒礬石擣末綿裹塞耳中二三日即差

又療耳聤耳膿不可出方

蚓擣白死蚯蚓取汁灌耳不過數灌即挑出之 並出第六卷中

千金翼赤膏主耳聾齒痛方

丹參五兩 蜀椒一升 大黃 白朮

細辛 芎藭各一兩 大附子十枚 乾薑二兩

巴豆十枚去心 桂心四寸

右十味㕮咀以苦酒漬一宿以豬膏三斤煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者綿裹膏內耳中齒冷痛著齒間諸痛皆摩腹內有痛以酒服一棗許大咽喉痛含一棗核大一枚 出第十一卷中

延年療風氣及腰腳并耳聾方

磁石十二兩碎 石菖蒲四兩 通草三兩 瞿麥二兩

山茱萸二兩 白朮二兩 獨活四兩 芎藭二兩

蔓荊三兩 甘草二兩炙 附子二兩炮 桂心三兩

生薑五兩 杏人一兩去皮熬碎 茯神二兩 人參

前胡各三兩 葱白一升切 竹葉一握 石膏二兩

右二十味切以水一斗五升煮取二升半去滓分三服

宜白齋服之今盤按延年云五日禁食羊肉

鼻中息肉方一十一首

肺氣通於鼻肺藏為風冷所乘則鼻氣不和津液壅塞而為鼻齆冷搏於血氣停結鼻內故變生息肉其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後 養生方導引法云端坐伸腰徐徐以鼻內氣以右手捻鼻除目暗淚苦出徐徐閉目吐氣鼻中息肉耳聾亦能除又云東向坐不息三通以手捻鼻兩孔治鼻中息肉 出第二十九卷中

肘後療鼻中塞肉不通利方

礬石一兩燒 通草半兩 真珠一兩

右三味末以綿裹如棗核內鼻中日三易之有加桂心細辛各一兩同前擣末和使用之

又方

陳瓜蒂擣末以傅塞肉上取差

又方

礬石燒 胡粉熬各等分

右二味末之以青羊脂和塗塞肉上以差

又方

細辛 瓜蒂各等分末以吹鼻中須臾涕出頻吹之即差 千金方以羅漿如豆大塞鼻中須臾急吹 文仲亦治鼻齆不聞香臭

小品療鼻中塞肉通草散方

通草半兩 真珠六銖碎 礬石一兩燒 細辛一兩

右四味擣末以綿裹如棗核沾散如小豆并綿頭內鼻中日三取差（千金同）

千金療鼻中息肉方

灸上星二百壯人髮際一寸又夾上星兩傍相去三寸各百壯灸之取差（出第六卷中）

千金翼療齆鼻中息肉不得息方

礬石一分（燒） 藜蘆二分 瓜蒂二七枚 附子二分（炮）

右四物擣末蘆管吹小豆許於鼻孔中或以綿裹塞鼻中日再以差為度一方加葶藶半兩（出第十一卷中）

崔氏療鼻中息肉不聞香臭方

燒礬石末以面脂和著鼻中數日息肉隨藥出（千金同）

必效療鼻中清涕生塞肉方

細辛六分 附子五分（炮） 甘遂六分 通草五分

乾薑四分 吳茱萸三合 桂心四分

右七味擣篩末蜜丸如杏人綿裹塞鼻卧時著即瘥日三避風以差為度或以帛裹頭甚良妙

古今錄驗療鼻中息肉通草散方

通草 細辛 蕤人 雄黃（研）

皂莢（去皮子各一分） 白礬二分（燒） 礬石三分（泥裹燒半日研）

藜蘆（炙二分） 地膽三分（熬） 瓜蒂三分 巴豆十枚（去皮）

蘭茹三分 地榆二分

右十三味擣篩末以細辛白芷煎湯和散傅息肉上又以脂膏和塗之取差

又療鼻中息肉方

生地膽一枚 細辛 白芷末

右三味以地膽押取汁和藥以塗貼息肉上取消亦只以地膽汁於竹筒中盛當上灌之即消無生者乾即酒煮汁用之

鼻齆方五首

病源肺主氣其經手太陰之脉也其氣通於鼻若肺藏調

和則鼻氣通利而知香臭若風冷傷於藏腑而邪氣乘於太陰之經其氣蘊積於鼻者則津液壅塞鼻氣不宣調故不知香臭而為鼻齆也（出第二十九卷中）

千金療鼻齆方

甘遂 通草 細辛 附子（炮各一分）

右四味擣末以白雄犬膽丸少許內鼻中差（崔氏同云辛熱涕鼻白）內五升食

又方

皂莢炙末如小豆以葦管吹鼻中

又方

以乾薑末吹之又蜜和塞之

又方

以鐵碌一云磨石取末以猪脂和綿裹塞鼻中取差

止

又方

伏面臨牀前以新汲水沐玉枕上取差 並出第六卷中 [illegible]

肺寒鼻齆方二首

删繁療肺寒損傷氣欬及多唾呼聲鼻塞乾棗補肺煎方

棗肉二升研 杏人一升去尖皮研 酥一升 薑汁一升

蜜一升 餳糖一升

右六味依常微火煎每服一匙差止

又療鼻塞有清涕出方

細辛 蜀椒汗 桂心 芎藭

吴茱萸各三分 皂莢炙去皮二分 附子八分炮

右七味切以苦酒漬一宿以猪脂一斤煎以附子色黄

膏成以綿裹內鼻中兼以摩頂

鼻窒塞不通利方七首

小品療鼻中窒塞香膏方

白芷 當歸 芎藭 細辛

辛夷 通草 桂心 薫草各三分

右八味㕮咀以苦酒漬一宿以猪膏一升煎以白芷色

黄成膏濾去滓取少許點鼻中或綿裹內鼻中以差止

千金無桂心不用薫草用莽草

千金鼻塞多年不聞香臭清水出不止方

取當道車輾過蒺藜一把擣以水三升煎令熟先仰

卧使人口含一合灌鼻中不過再大嚏出一兩箇息

肉似蝸蟲即差 一方用黄連各二兩

又療鼻窒氣息不通方

小薊一把

右一味以水三升煮取一升去滓分服

又方

綿裹瓜蔕末少許塞鼻中 並出第六卷中

古今錄驗療鼻中不通利窒塞者香膏方

當歸 芎藭 青木香 細辛

通草 蕤核人 白芷各二分

右七味切以羊髓微火煎白芷色黄膏成去滓以小豆

許內鼻中日再以差爲度 千金有莽草無青木香云大熱鼻中赤爛者以黄芩梔子

代當歸細辛

又療人鼻塞不通皂莢散方

皂莢去皮子炙一分 細辛 辛夷 蜀椒

附子 炮各等分

右五味擣末以少許吹鼻中或以綿裹塞之即通

又療鼻窒塞不得喘息皂莢散方

皂莢 去皮子炙　菖蒲 各等分

右二味以末綿裹塞鼻中暮臥之時乃著甚良

鼻塞常清涕方二首

病源夫津液涕唾得熱即乾燥得冷流溢不能自收肺氣通於鼻其藏有冷冷隨氣入乘於鼻故使津涕不能自收

出第二十九卷中

肘後療老小鼻塞常有清涕出方

杏人 二分　附子 二分　細辛 一分

右三味切以苦酒拌用猪脂五兩煎成膏去滓以點鼻中即通又以摩顖上佳

必効療鼻塞多清涕方

細辛　蜀椒　乾薑　芎藭

吳茱萸　皂莢 去皮尖　附子 各三兩　猪膏 一升三合

右八味切㕮咀以苦酒浸一宿以猪脂煎候附子色黃去滓膏成凝以綿裹少許導鼻中并摩頂

鼻生瘡及疳蟲蝕方九首

病源鼻是肺之候肺氣通於鼻其藏有熱氣冲於鼻故生瘡也養生方導引法云踞坐合兩膝張兩足不息五通治鼻瘡 出第二十九卷中

千金療疳蟲蝕鼻生瘡方

燒銅筯投酢中以塗之

又方

綿裹人屎灰夜臥著之

又方

燒祀竈飯末以傅之

又方

燒牛狗骨灰末以臘月猪脂和傅之差

又方

燒杏人壓取油傅之又乳和傅

又方

取烏牛耳垢傅之良

又方

燒故馬絆末傅之

又方

取牛鼻頭津傅之良 並出第六卷中

必効療鼻內熱氣生瘡有膿臭并有蟲方

礬石 一兩燒　生地黃 三兩　苦參 一兩

右三味切以水八合煮取三合以綿濾之微微點鼻中日三五度差止

牙疼方八首

廣濟療牙疼巴豆丸方

巴豆十枚去皮心熬研如膏　大棗二十枚取肉　細辛一兩末

右三味相和研爲丸以綿裹著所疼處咬之如有涕唾吐却勿咽入喉中日三差

崔氏療牙疼方

烏頭　獨活　郁李根白皮各一兩

右三味切綿裹以好酒一大升半漬一宿緩火煎取一

升去滓看冷熱衝含良久即吐却含取差齒痛不問風蟲無不差必須含吐之不可咽却也有毒恐傷人單用烏頭獨活亦差

又方

令患人所患牙齒齗宅東南柔枝一條教三姓人於柔枝灸三炷一炷咒之曰東方有蟲子不食五穀專食牙齒三炷灸齒痛蝕蟲自然死一咒一再拜即令灸人患人等還不得迴頭更看之

張文仲療牙疼驗方

獨活五分　莽草二分　細辛二分　附子一枚

右四味切以苦酒五合浸以銅器中溫之稍熱含良久吐却汁末差更含之勿咽汁欲食以煖水漱口並良

救急療牙疼方

莽草　細辛　枳根皮各三兩　椒汗一合

右四味切以水一升煮取半升稍稍含之十度未不發藥有毒不得嚥之含了以煖水三五度漱口訖以胡桐律一豆著痛齒上風痛蟲食並差

必效療牙疼方

取皂莢子擣末以綿裹如彈子大兩顆於釅醋中煮熱徹於牙疼處齧之冷即易日三五度以差爲度

又方

取桃李槐並白皮各等分以酒煮含之取定

[illegible]君療牙疼方

白楊皮一握　地骨皮一兩　椒二七枚　杏人二七枚去皮

細辛一兩　生地黃二兩碎　好鹽一合　蒼耳子二兩碎

右八味切以酒二升煎六七沸去滓含之冷即吐却別含以差爲度

齒痛方一十一首

病源手陽明之支脉入於齒齒是骨之所終髓之所養若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則齒痛若蟲食齒

而痛者齒根有孔蟲在其間此則針灸不差傅藥蟲死痛乃止其湯熨針不別有正方補養宜導今附於後養生方導引法云常向本命日櫛髮之始叩齒九通陰咒曰大帝散靈五老反真泥丸玄華保精長存左回拘月右引日根六合清鍊百疾愈因咽唾三過常數行之使齒不痛髮牢不白頭腦不痛又云東向坐不息四通琢齒二七治齒痛病大張口琢齒二七一通二七又解四通中間其二七大勢以意消息差病而已不復疼痛解病鮮白不蠹亦不䶕離久行不已能破金剛又云東向坐不息四通上下琢齒三十六下治齒痛出第二十九卷中

廣濟療齒痛及蟲蝕不脂傅方

取不脂研以人乳汁和以傅齒痛上或孔中日三兩度止痛後生齒百日復故齒生止每以新汲水漱令淨

集驗療齒痛方

雞屎白燒灰末以綿裹置齒痛上咬咋之差

又方

芎藭　細辛　防風　礬石燒令汁盡

附子炮　藜蘆　莽草

右七味各等分擣篩為末以綿裹彈丸大酒漬熨所患處含之勿嚥汁千金同

又方

獨活三分　黃芩　芎藭　當歸

蓽撥各二兩　丁香一兩

右六味切以水五升煮取二升去滓微微含漱良久吐却更含

又方

含白馬尿隨左右含之不三五日差張文仲備急同並出第六卷中

張文仲療齒疼痛方

燒牛膝根末以綿裹著齒痛處含之

又方

蜀椒　礬石各一兩

右二味以水一升煎取六合去滓含之漱口吐却勿咽之

備急療齒痛方

胡菜子五升應是胡荽子也以水五升煮取一升含吐之謹按本草葈耳一名胡葈叙所具圖封丁腫此方讀當相近即非是胡菜子也

又方

馬夜眼如米許以綿裹著痛孔中斷根源也[illegible]

古今錄驗療齒痛方

取楊柳細白皮卷如指大含嚼之以汁漬痛齒根數
過即差

又方

獨活三兩　芎藭一兩　當歸二兩　蓽撥二兩
黄芩二兩　甘草二兩　細辛二兩　雞舌香一兩

右八味切以水五升煮取三升去滓含之取差 千金無甘草

齒疼方七首

千金療齒疼方

灸外踝下高骨前交脉三壯

又方

以繩量手中指至掌後一横文又折爲四分量文後

當臂中灸一壯隨左右取之

又方

雞屎白以醋漬煮稍稍含之差

又方

生地黄一節　蒜一瓣

右二味擣以綿裹著痛處咬之勿咽汁汁盡吐出日日
爲之差止

又方

含驢尿須臾止 並出第六卷中

又生療齒疼方

附子一分　胡椒　蓽撥各二分

右三味搗末著齒痛上又以散乃飄和爲丸置齒痛孔
上取差止

牙齒疼痛方八首

病源牙齒痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之所終髓之所
養手陽明之支脉入於齒者髓氣不足陽明脉虚不能榮
於牙齒爲風冷所傷故疼痛也又有蟲食於牙齒則齒根
有孔蟲居其間又傳變餘齒亦皆疼痛此則針灸不差傅
藥蟲死痛乃止 出第二十九卷中

廣濟療牙齒疼痛牙斷腫痒齒根宣露方

肥松節四分　細辛　分　蜀椒二分　胡桐律四分

右四味切以清酒四升煮十沸承熱含之冷即吐却更
含差止

又療牙疼齒痛方

取槐白皮一握切

右一味以酢一升煮去滓著鹽少許適寒温含日三易
之

備急姚氏療牙齒疼痛方

取柿竹燒竹一頭以注錢上得汁多著齒上即差

尚從蘇言醫上發毖責也

必効療牙齒疼痛方

防風　附子　蜀椒各二兩　莽草一兩炙

右四味擣篩爲散溫清酒一盞和少許含勿嚥汁以酒漱口十年患亦差止

又方

獨頭蒜煨之乘熱截一頭以熨痛上轉易之亦主蟲痛

又礬石散療牙齒疼痛風齲蟲食挺根出齒已落者方

礬石燒令汁盡　藜蘆炙　防風　細辛

乾薑　白朮　椒汗　甘草炙

蛇牀子　附子炮各八分

右十味擣篩爲散溫酒半升內散方寸匕攪調含之勿嚥之日三度若百日齒已落者還生每食時更以空酒漱去藥氣然後喫食

又療牙齒疼肉宣露風疼効方

莨菪子擣末綿裹著痛上吐却汁勿嚥之良

又方

獨活十兩　生地骨白皮切三升　細辛一兩

楓柳皮一兩　甘草二兩炙

右五味切以水五升煮取一升細細含勿咽冷即吐之

疑損甘皮前衣中之節甘草不下不錢師否髮帝德間　逆按杜若夢一作竹射草

𧏾齒方五首

病源齒𧏾者是蟲蝕齒至斷膿爛汁臭如蝕之狀故謂之𧏾齒出第二十九卷中

廣濟療𧏾齒石鹽散方

五月五日乾蝦蟆燒灰石鹽甘皮各等分擣末以傅齒上取差

又療𧏾齒及口瘡蟲食紫藍灰方

取紫藍燒作灰以塗傅之日三五度取差爲度

又療𧏾齒并蟲積年不差從少至老方

雀麥一名牡姓草似牛尾草一味苦瓠葉三十枚淨

洗露一宿平旦取草屈長二寸廣一寸厚五分以瓠葉裹縛作五六十裹子以三年酢漬之至日中以兩裹火中炮令極熱內口中齒外邊熨之冷更易取銅器以水內中解裹於水中洗之即有蟲長三分老者黃色少者白色多即三二十枚少即一二十枚此方甚妙千金同

必効近貴勝共傳𧏾齒方

細辛　當歸　甘草炙　蛇牀子各一兩

青葙子二兩

右五味擣以綿裹如大豆著齒上日三勿嚥汁差止唐

後有

又匿齒方（許給事處得之）

拜見月拜兒云月阿姑匿齒蟲枯月阿殘匿齒蟲孔

以差即止

齒風疼痛方三首

張文仲療頭面風口齒疼痛不可忍方

椒一合　莽草十葉熬　白朮　郁李根（郁李根也）

獨活　芎藭各二兩　細辛　防風各一兩

右八味切以酒二升煮三五沸去滓含之以差為度勿嚥汁（千金無白朮）

救急療齒風動痛方

莽耳一握以漿煮著鹽含之

古今錄驗療齒中風疼痛齲腫芎藭湯方

細辛兩　芎藭二兩　附子一兩炮

右三味切以水六升煮取二升去滓含之少許冷即吐

却日三四度勿嚥汁

齲齒方七首

病源手陽明之支脈入於齒足太陽脈有入於頰遍於齒者其經虛風氣客之絡搏齒間與血氣相乘則齗腫熱氣加之膿汁出而臭侵食齒齗謂之齲齒亦曰風齲養生方云朝夕琢齒齒不齲又云食畢當漱口數過不爾使人病齲齒（出第二十九卷中）

廣濟療齒齲痛方

五月五日蝦蟇燒作灰　石黛　甘皮

細辛　白雞屎　麝香　乾薑

薰黃

右八味各等分以薄綿裹少許內蟲齒孔中日三易之差

集驗療齲齒方

取松脂銳如錐注齲孔內須臾齲蟲緣松脂出

又方

煮雞舌香汁含之差

千金療齲齒及蟲齒方

白附子一分　知母一分　細辛五分　芎藭三分

高良薑二分

右五味末以綿裹少許著齒上勿嚥汁日二三亦治口氣

又方

取白馬懸蹄少許塞孔中日二度即差（止翼同並出第六卷中）

張文仲療齲齒方

以郁李根白皮切水煮濃汁含之冷易之當吐蟲出

備急䘌齒方

皂莢炙去皮子末少許著齒痛上差

齒蟲方五首

病源齒蟲是蟲食於齒齒根有孔蟲在其間亦令齒疼痛食一齒盡又度食餘齒養生方云雞鳴時常叩齒三十六下長行之齒不蠹蟲令人齒牢又云朝未起早漱口中唾滿口乃吞之輒琢齒二七遍使人丁壯有顏色去蟲而牢齒又云人能常服玉泉必可丁壯妍悅去蟲牢齒謂口中唾也出第二十九卷中

小品療齒蟲蝕棘刺漱湯方

腐爛棘針二百枚即是棗木刺朽落地者用一物以水二升煎取一升含之即差日四五度以差為度

劉涓子療䘌齒蟲方

莨菪子三合青錢七文燒令赤取小口瓶子可令口含瓶子者將錢內瓶子中取莨菪子一撮安錢上令爆炮聲仍以水少許淋錢上即氣出用熏齒令止三合藥盡爲劑蟲食䘌齒風痛並用千金同

又療蟲齒痛椒湯方

蜀椒一兩　礬石半兩　桂心一兩

右三味以水三升煮取一升去滓含之漱齒勿嚥汁甚良

又附子塞蟲孔丸方

附子一枚炮末以臘和之爲丸準齒蟲孔大小內之取差止

必效殺齒蟲方

雄黃末以棗膏和爲丸塞牙孔中以膏少許置齒燒鐵篦烙之令徹熱以差止千一方有蜥蜴

風齒方四首

病源手陽明之支脈入於齒頭面有風陽明之脈虛風乘虛隨風流入於齒者則令齒有風微腫而根浮也出第二十九卷中

集驗療風齒疼腫問方

莽草二兩

右一味以水五升煎取三升含漱之勿嚥汁

又方

椒二十粒　枳根皮　莽草　細辛

菖蒲　牛膝各二兩切

右六味切以水四升煮取二升去滓細細含之以差爲度未差更作取差

備急療風齒疼刺腫方

煮獨活含之良

又療風齒腫杉葉湯方

杉葉三兩　芎藭　細辛各二兩

右三味切以酒四升煮取二升半稍稍含之取差勿嚥之

風齒根出方二首

廣濟療熱風齒斷內欲盡根出恐是疳蟲食齗及口齒疼痛方

石黛五分　細辛　棘刺　菖蒲

香附子　當歸　青木香　胡桐律

乾薑各四分　青葙子六分

右十味擣為散以半錢匕綿裹就齒痛處含之勿停差止服後丸方　一方無細辛有蜂房者

丸方

苦參八分　大黃　黃芩　枳實各六分

地骨皮六分　玄參八分　黃連八分

右七味擣篩蜜為丸食後少時以漿水服一十五丸日再服至二十丸增減自量之忌蒜麪豬肉

風齒口臭方二首

廣濟療風齒口氣臭芎藭湯方

芎藭三兩　當歸三兩　獨活四兩　細辛

白芷各四兩

右五味切以水五升煮取二升去滓含漱日三五度取差

齒敗口臭方

取芎藭煮一味含之

牙齒風齲方三首

延年療牙齒風齲方

鼠粘子

右一味擣以水四升煮取二升半濾去滓適寒溫含之

冷吐別含取差

又方

薏苡根四兩切

右一味以水四升煮取二升含冷易之

又方

郁李根白皮四兩切　細辛一兩　鹽一合

右三味切以水四升煮取二升半去滓內鹽含之取差

牙齒疼風蟲俱療方五首

廣濟療牙齒疼痛風蟲俱差方

獨活　防風各四兩　芎藭　細辛

當歸各五兩　沉香八分　雞舌香　零陵香各五兩
黃芩十分　升麻八分　甘草六分炙
右十一味擣篩爲散臘少許丸如小豆以薄綿裹當痛上
含有汁嚥亦無妨口臭氣尤妙
又療齒痛不問蟲風者方
雄黃一兩　莽草一兩　臘月羊脂　蜀葵莖一兩剉
右四味擣雄黃等爲末消羊脂以葵莖醮脂點藥末注
齒痛處孔中日三五度每令葵莖熱用之良
又療牙齒疼蟲痛含湯方
肥松脂三兩　皂莢一枚去皮子炙令黃　石鹽七枚

右三味切以水二升煮取八合去滓溫含冷吐之即差
止
崔氏療牙齒隱隱痛無問風齲搖動齒齗腳宜露令此藥
効其齗便生方
取細柳枝將去皮剉一升炒之內大豆一升和柳枝
更炒以豆炮聲盡於瓷器盛之以清酒三升漬之經
三日含之頻吐即無妨兩劑無不愈其齗亦生出第四卷中
必効療風蟲疼痛方
取屋間蜂窠一枚炙　椒七粒
右二味以水一升煎取半升含之或斷臚勿怪之

風衝牙齒搖動方二首
延年療風衝牙齒搖動方
車下李根白皮三兩切即李根也　蒼耳子三合碎
右二味以水三升煮取二升含之良
又方
芎藭三兩　細辛一兩　防風二兩　薏苡根二兩
右四味切以水六升煮取三升去滓含漱齒日三五度
差止
䘌蟲食齒方一十首
千金凡齒斷宜露多是疳䘌及月蝕方

以角蒿灰夜塗齒齗間使滿不過兩三度即差值
油膩沙糖乾棗及桂切忌之
又方
每旦以鹽一撚內口中以暖水含和鹽揩齒百遍可
長爲之口齒牢密
又凡人好患齒病多由月蝕夜食飲所致識者特宜慎之
所以日月蝕未平復時特忌飲食小兒亦然方
蚯蚓糞水和作稠泥團以火燒之令極赤末之如粉
以臘月豬脂和傅齒齗上日三即差止
又䘌蟲食齒根方

通按姜生作黃生

通按瑩當為今作焠急病方

伏龍肝置石上著一撮鹽須臾化為水以麪展取待凝厚取以內病上

又方

以皂莢去皮炙末塗上蟲即出

又方

純麻子燭燼研以井花水和傅之

又方

黑羖羊脂　莨菪子各等分

右二味和先燒鐵鋜使赤內其中煙出以布單覆頭令煙入口熏之蟲出第六卷中

張文仲療蟲方

大酢一升煮枸杞白皮一升取半升含之蟲即出

姜生論云齒斷虛軟而無膿血又口齒其齒斷爛著即膿血出又口痛其齒斷不觸自然膿血出又口中頭齒斷上有小孔如蜂巢形又齒痛其骨脆爛其齒斷唇口吻變作白色或作青紫黑色者是急痛之狀死不治宜急療之先有唇頰邊有赤白黑脉處即須以針針去惡血便燒鐵篦烙之如此變即定若附齒有黃色物如爛骨狀名為食床凡療齒者有此物先以鉗刀略去之然後依方用藥其齒斷內附著齒根者形如雞子膜有如蟬翼纏著齒者亦須細看之不爾其齒斷永不附著齒根也前狀如前後方自有委曲也又雄黃膏療齒中疳瘡䘌瘻蟲蝕牙齒已壞之疾皆療之其膏以十二月合即得一年用不爾輒久停

方

好牛酥五大兩　蜜臘半兩　雄黃一兩研　[illegible]一分

藁本半兩　藜蘆一分　杏人四分去皮尖研

白芷　鯽魚　升麻各三分

右十一味以鐺中煎諸藥魚令黃色去魚煎三上三下入腦麝於三上成收器中攪勿住手凝定以本方即揩藥並為末不去滓甚良

又升麻揩齒方

升麻半兩　白芷　藁本　細辛

沉香各三分　寒水石六分研

右六味擣篩為散每朝楊柳枝咬頭軟點取藥揩齒香而光潔一方云用石膏貝齒各三分麝香一分尤妙

齒痛有孔方四首

備急療牙齒有孔方

莨菪子數粒內齒孔中以蠟封之即差

古今錄驗療齒痛有孔不可食飲面腫莽草湯方

莽草七葉　蜀椒九箇

右二味以漿水二升煑取一升適寒溫含漱冷即吐之日二三含之千金同

又療齒齲痛有孔方

取雄雀屎以綿裹內齒孔中日二易之

姜生療齒有孔方

附子二分炮去皮　蜜臘五分

右二味相和爲丸塞齒孔中即差忌冷水猪肉

齒挺出及脫落方五首

廣濟療齒牙風挺出疼痛郁李根湯方

郁李根五兩　苦瓠二兩　細辛二兩　生地黃五兩

右四味以水六升煑取二升半去滓先以鹽湯漱口然後溫含之冷即吐更含取差

崔氏療牙齒挺出疼痛不可忍方

羊腎脂二合　泔淀二合　牛糞一合絞取汁　甘草半兩生用末之

青黛　熏黃末各一兩

右六味相和銅器中微火煎五六沸取東引桃枝如箸大六枚以綿纏頭點取藥更互熱烙齒齗際隔日又烙之不兩三度看好肉生以差乃止欲烙時淨刮齒牙根上然後爲之不爾肉不生十餘日忌生冷酢酒肉陳臭一年禁油

又療疳蟲牙齒脫落刺唇穿破及下部傳蝕并療口瘡悉療之方顧參軍援甘家秘之

青黛二兩　雄黃研　朱砂研　莨菪子熬

青礬石　黃礬石　白礬石熬汁盡各

附子炮　苦參　甘草炙　藜蘆炙

細辛　麝香研各一兩

右十三味擣篩爲散有患齒疳者以藥著上日二三遍患者以井花水平旦以取半錢匕太中服之兼以苦參末如棗核許著蝕蟲處日三著止下部中濕[illegible]之以苦參甘草竹湯和半錢匕灌之良並出[illegible]卷中

又文仲療齒根欲脫落方

取生地黃擣以綿裹塞齒根常含之甚妙

備急比見患齒風齒挺出一分者方

長啖地黃尤妙更不復發

齒間血出方三首

病源手陽明之支脈入於齒頭面有風而陽明脈虛風挾熱乘虛入齒齗搏於血故血出也出第二十九卷中

千金齒間血出者方

竹葉濃煑著鹽含之冷吐

又方

一童子小便溫含之冷吐血即止 並出第六卷中

備急療齒疼痛斷間血出神驗方

好鹽熬每夜封齒根上經水盡乃叩齒一二百遍

差只棗沙糖等

齒血不止方四首

千金療齒血不止方

刮生竹皮以苦酒漬之令其人解衣坐使人含噀其背三過仍取竹茹濃煮汁含之漱吐終日爲之

又療齒斷間津液血出不止方

生竹茹四兩醋浸一宿含之

又方

細辛二兩 甘草一兩炙

右二味醋一升煮夜含之及熱尤良

又方

礬石一兩燒末以水二升煮先拭血乃含之 並出第六卷中

齒腫方二首

千金療齒根腫方

松葉一把 鹽一合

右二味以好酒三升煮取一升含之冷吐差即止

又療齒腫痛及蟲方

黃芩 甘草 桂心 當歸

細辛 蛇床子各一兩

右六味切以漿水七升煮取三升去滓含之日三夜二

良 並出第六卷中

牙疼痛及蟲方三首

必效療牙風疼方

取東籬下朽骨削之如疼牙齒許大於燒灰中煨待令熱於所痛處齒之冷即易之

又牙齒痛并蟲蝕方

以水煮露蜂房細辛各等分含之即差止

又療牙疼及頭牙斷風腫口急不開面目虛腫皆須起者方

蒴藋五兩以水五升煮取四升去滓 蜀椒一兩 吳茱萸

獨活 烏賊魚骨 桃膠各一兩 桂心半兩

酒一合

右八味切以水二升煮取八合投蒴藋汁及酒更煎取一小升去滓含之就痛處日三以差止爲度

牙齒雜療方七首

集驗療齒楚痛方

生地黃 桂心

右二味合以含嚼咽汁無妨千金同

删繁療心虛寒口氣臭衝人又𧏾齒痛芎藭散方

芎藭八分 白芷七分 甘草五分炙 桂心四分

杜衡四分 當歸五分

右六味擣篩為末以酒和方寸匕服之日二服

千金療酒醉牙齒漏血出方

燒釘赤注血孔中即止

又療齒痛方

當歸 桂心 甘草炙各一兩 礬石燒六分

右四味切以漿水二升煮取一升含之日五六差止

張文仲療齒痛風引腫搖動發作不殊𧏾蝕盡方

礬石燒 乾薑 藜蘆 蛇牀子

甘草炙 細辛 蜀椒 防風各一兩

右八味擣散以一錢匕和溫酒二合含之勿嚥汁冷令吐出日三度差止齒落自復生甚效

又療歷齒科碎壞欲盡方

礬石如棗大以綿裹含之取差

古今錄驗療牙齒根搖欲盡者齲齒方

取生地黃綿裹含之微嚼候汁味盡棄之乃更含之

緊脣方一十三首

病源脾與胃合胃為足陽明其經脈起鼻環於脣其支脈入絡於脾胃脾胃有熱氣發於脣則脣生瘡而重被風邪寒濕之氣搏於瘡則微腫濕爛或冷或熱乍差乍發積月累年謂之緊脣亦名瀋脣出第三十卷中

廣濟療緊脣水銀膏方

水銀 熏黃研 青礬研 苦參各二兩末

梓州一方 亂髮雞子大一 細辛一兩末

右七物以綿裹髮用麻油一斤煎二兩先煎苦參細辛以綿髮消盡入水銀石藥及味候膏成收瓷定以傅病上取差為度水銀和石藥兩味研令盡入煎之

又療緊脣瘡久不差石硫黃膏方

石硫黃研 白礬燒 朱砂研 水銀

麝香 黃蘗末各一分

右六味和水銀研於瓷鉢中以水銀盡用臘月豬脂和如泥先拭淨塗之日三五以差為度甚良

小品療緊脣方

以白布纏作燭著空斧中燒布斧刃有汗出以指歷取塗瘡上取差千金同

千金療緊脣方

灸虎口男左女右七壯

又方

灸承漿三壯良

又方

青布燒灰酒服之又以脂和塗

又方

以蠟片炙貼之一宿差

又方

炙松脂貼上

又方

先灸瘡燒蛇皮灰以傅之 並出第六卷中

劉氏療緊脣方

取膝頭垢綿裹燒傅之

又方

取屠兒肉几上垢燒塗之

又方

燒人屎灰傅之

又方

馬芥一名刺芥擣取汁日暴令濃先揩脣使血出以

紫匕塗之亦療刺風 並出第四卷中

滋脣瘡爛方五首

肘後療瀋脣常瘡爛方

以五月五日鯉魚血鹽和塗

集驗療瀋脣緊脣方

以青布卷燒令著斧上取汁塗之良 千金同

又方

取亂髮蜂房六畜毛燒作灰以猪脂和如膏傅 千金同

又方

鼈甲及頭垢燒灰傅之 千金同

又方

礬石燒末和胡粉傅之差

脣瘡方三首

肘後療脣瘡方

以頭垢傅之日三 千金同

又方

以東壁土傅之

千金療脣瘡方

胡粉傅之

口瘡方一十一首

廣濟療口瘡煎方

龍膽 黃連 升麻 槐白皮

大青各二兩 苦竹葉一升 白蜜半升

右七味切以水五升煮取一升去滓下蜜煎之塗口瘡差

又療口舌生瘡含煎方

升麻 大青 射干各三兩 梔子

黃蘗各一升 蜜八合 薔薇白皮五兩 苦竹葉切一升

生地黃汁五合 生玄參汁五合無用乾者二兩

右十味切以水六升煎取二升去滓入生地黃汁蜜煎成一升如餳細細含之取差即止

又心脾中熱常患口瘡乍發乍差積年不差方

升麻八分 大青 枳實炙 甘草炙各六分

苦參七分 黃連八分 生乾地黃八分

右七味搗羅蜜丸以水服二十丸日再忌如常法

集驗療口瘡方

升麻 黃蘗 大青

右三味切以水煮含之冷吐差止

又方

蘆根四兩 黃蘗 升麻各三兩 生地黃五兩

右四味切以水四升煮取二升去滓含取差含極冷吐却更含之

千金療口瘡不歇生牛膝含煎方

生牛膝 生蘘荷根各二兩 刺蘗葉一兩

右三味剉綿裹以酒三升漬一宿微煎一兩沸含之

必效口瘡方

黃芩 芍藥 羚羊角屑 黃蘗

大青 苦竹葉各二兩 升麻二兩

右七味切以水七升煎取二升去滓內蜜一合攪含冷吐以差止忌同

古今錄驗療口瘡湯方

細辛 甘草 桂心各二兩

右三味切以酒一升煮取六合含之

又黃芩湯療口瘡喉咽中塞痛食不得入方

黃芩 黃連 甘草炙 黃蘗各一兩

右四味切以水三升煎取一升含之冷吐取差

又方

大青四分 山梔子 黃蘗各一兩 白蜜半升

右四味切以水三升煮取一升去滓下蜜更煎一兩沸含之取差止

又升麻散主口瘡方

升麻六分 黃蘗

右二味擣末以綿裹含之
口瘡久不差方二首
千金療口瘡不差入胷中生瘡三年以上不差方
薔薇根濃煮汁含之又稍稍嚥之三日三夜差冬取根夏取莖葉
又方
以角蒿灰塗之一宿知二宿差勿嚥汁取差爲度
又論云凡患口瘡及齒切禁油麪酒醬酢膩乾棗差後七日斷之彌佳若不久慎譯手即發發而更療其差稍遲慎之慎之薔薇根角蒿爲口瘡之神藥人皆不知之

口吻瘡方四首
病源足太陰爲脾之經其氣通於口足陽明爲胃之經手陽明爲大腸之經此二經並夾於口其腑藏虛爲風邪濕熱所乘氣發於脉與津液相搏則生瘡常濕爛有汁世謂之肥瘡亦名燕口瘡出第三十卷中
千金療口吻瘡方
楸白皮及濕貼之數易取差
又方
掘經年葵根欲腐者彌佳燒灰以傅之
又方
白楊枯枝鐵上燒一頭取熱塗之本方云療燕吻
又方
以新炊飯了甑脣及熱熨之三十下三兩度差止
口乾燥方五首
删繁療口熱乾燥甘草丸方
甘草六分炙 人參六分 半夏六分洗 烏梅肉六分
棗膏十分
右五味擣篩四味棗膏相和入蜜丸如彈子含之差千金同分兩小異
千金療口乾除熱下氣方

石膏五合碎
右一味以水三升煎取二升入蜜二升煮取二升去滓稍稍含咽之差止
又口乾方
豬肪脂雞子大擘內酢半升漬一宿絞汁服之取差爲度
又方
酸棗一升去核 酸石榴子五合 乾葛三兩 烏梅五合去核
麥門冬四兩去心 覆盆子三合 甘草炙 栝樓一兩
右八味擣以蜜丸含如棗核大潤爲度

張文仲主口乾方

乾棗肉三兩 甘草炙 杏人 烏梅二兩

右四味擣以蜜和丸如棗核含以潤差止

口臭方九首

千金療口中臭方

桂心 甘草 細辛 橘皮各等分

右四味擣篩以酒服一錢匕差止為度

又方

甘草五兩 芎藭四兩 白芷三兩

右三味擣篩以酒服方寸匕日三三十日口香

又方

濃煮細辛含之久却吐甚良

又方

橘皮五分 桂心三分 木蘭皮四分 芎藭六分一云麥門十銖

右四味擣篩以酒服方寸匕日再服一方無芎藭亦可以棗丸含化

又方

大豆熬令焦以醋沃取汁含之

又方

細辛 豆蔻

右二味等分擣末煮含之甚良

又方

梔子 甘草炙各三分 細辛五分 桂心二分

芎藭四分

右五味擣篩蜜丸食後服七丸日再差止

又方

芎藭 白芷 橘皮 桂心各四分

棗肉八分

右五味擣篩爲散以棗肉和丸食後服十丸又含之以差爲度此方甚驗

古今錄驗療口臭方

甘草炙二兩 細辛末二兩

右二味隨所三指撮以酒服之甚良千金同

舌論一首

删繁舌者主心小腸之候也舌重十兩長七寸廣二寸半善用機衡能知五味凡有所啖若多食鹹則舌脈凝而變色多食苦則皮槁而外毛拔多食辛則舌筋急而枯乾多食酸則舌肉胝而脣揭多食甘則舌根痛而外髮落又曰心欲苦肺欲辛肝欲酸脾欲甘腎欲鹹此五味内合五藏之氣也若臟熱則生瘡脣揭赤色若腑寒則舌本縮進口噤舌青寒宜補之熱宜寫之不寒不熱依腑藏調之

舌本縮口噤方二首

删繁療舌小腸腑寒應舌本縮口噤脣青獨活解噤膏方

獨活　芎藭各三兩　天雄一兩炮　防風一兩

蜀椒二合　莽草十葉　細辛　桂心各一

苦李根皮二兩　豬肪二升

右十味㕮咀綿裹以苦酒一升淹漬一宿以豬肪微火煎之去滓膏成凝以綿裹少許口含於舌下嚥之取差日二度易之此方甚良

又生艾葉薄法

無生艾葉者取乾者擣之以水淹一升已來熱擣以帛塗之於寒處上封裹之以差為度

舌上瘡方二首

千金云舌上瘡不得食舌本強頸兩邊痛此因心虛熱所致療之方

柴胡　升麻　梔子人　芍藥

通草各四兩　黃芩　大青　杏人去皮尖

生薑各三兩　石膏八兩

右十味切以水一斗煎取三升半分四服日三夜一

又療舌上瘡方

豬膏一斤　蜜一升　甘草如指館三十

通按瘖音隻閉字也

右三味相和煎相得即含棗許嚥之日三差止

咽喉舌諸疾方七首

千金喉舌諸疾方

松子　苦芥子

擣以苦酒和貼上

又方

麥麵以苦酒和塗之痛止

小品療喉諸病方

雞子一枚破以黃白攪吞之差

文仲療咽喉舌諸方

爪耳下張口解間突處痛爪勿止兩三食久即得開喉開

又方

隨所近左右刺手中指爪甲下令血出當先縛中指令血聚刺之

備急療急喉咽舌病者方

隨病所近左右以刀鋒裁刺手大指甲後爪中令出血即愈

又方

病人即急爪其臆心隨所近左右以差為度

通按一本咽喉舌諸疾方七首與前不同今附錄之

千金烏翣膏療喉嚨者脾胃之候若藏熱喉則腫塞神氣不通方

生烏翣十兩　升麻三兩　通草　羚羊角

芍藥各二兩　薔薇根切一升　生地黃切五合　猪脂一斤

艾葉六銖生者猶佳

右九味㕮咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏人大內喉中細細吞之

又方療喉痺

以牛角燒研末酒服方寸匕

又方療喉痺卒不語

煮大豆汁吞之

又方療喉痺燥腫連頰吐氣數者名馬喉痺

馬鞭草一握勿見風截去兩頭擣汁服之差

又方療舌腫

以醋和釜底墨厚傅舌上下脫皮更傅消息取差

又方療舌腫

用雄雞冠血蓋盛浸舌嚥下即縮

肘後療舌上出血如鑽孔者

煎香薷汁服一升日二服差

口脣舌鼻雜療方一十四首

廣濟療疳蟲蝕脣頰口及齦處生瘡方

石硫黃研　乾漆熬　文蛤燒作灰

右三味各等分細篩之每用減取胡桃大若棗核大研和先拭上瘡物血等然後傅之日一

肘後療脣裏忽生丸核稍大方

以刀鋒決之令血出差

刪繁療舌主心藏熱即應舌生瘡裂破脣揭赤升麻泄熱煎方

升麻三兩　射干三兩　黃蘗切一升　苦竹葉切五合

大青三兩　生蘆根　薔薇根白皮切各一升

生玄參汁五合　生地黃汁五合　赤蜜八合

右十味切以水四升煮七味取一升絞去滓下諸汁蜜更上火煎放冷以綿取之封貼舌上含之細細嚥之以差為度千金同

千金療舌上有瘡四五孔大如簪者出血如涌泉此心藏病方

戎鹽五分　黃蘗　黃芩各五分　人參一分

甘草二分炙　大黃三分　桂心二分

右七味擣末蜜和丸以水服十丸漸增之或燒鐵篦烙

孔上

又療膀胱熱不已口舌瘡咽腫升麻煎方

升麻　大青　苦竹葉各二兩　芒硝一兩

射干　玄參各四兩　蜜五合

右七味切以水七升煮六味取一升去滓下蜜合煎成含

之以差爲止

又療口傍瘡方

亂髮灰故絮灰黃連末各等分以傅瘡取差蜀中有乾薑

又療脣生瘡連年不差方

以八月藍葉十斤擣汁澄取淀以傅之

又療脣舌忽生瘡方

燒雞舌香末綿裹傅之取差

又療脣黑腫痛癢不可忍方

取大錢四文於石上磨以泥或乾用臘月豬脂和塗

之差

又方

以竹彈弓彈之要惡血出差

又療遠行脣口面皴破方皴音逡○無脣字一本作皸音均皸裂也

煎臘月豬脂傅之差

又療冬月脣乾坼血出方

搗桃人以豬脂和塗

張文仲療舌強不能言方

礬石　桂心各一兩

右二味擣末傅舌上差

必效療舌忽然腫滿口方

以釜下炭和鹽等分以塗舌底令遍滿淨水塗之取

差止

通按一本有後六方今附錄之

千金療口瘡白漫漫方

取桑樹汁先以髮拭口次以汁塗之

又療口中及舌上生瘡

爛嚼黃檗含之

又療重舌舌下生瘡涎出

以蒲黃末傅之不過三度差

又療舌無故出血不止

用槐花炒爲末摻上立止

又療鼻中外查瘤膿血出者

正月取鼠頭燒灰和臘豬脂傅之

又療咽喉閉塞口噤方

用牯牛糞研末每服溫水調灌半錢匕立差

台從事郎充兩浙東路提舉茶塩司幹辦公事 趙子孟

敵勘

外臺秘要方第二十二卷

重訂唐王燾先生外臺秘要方第二十三卷目録 癭瘤咽喉瘰癧等二十八門

癭病方一十八首

氣癭方一十首

五癭方八首

灸癭法一十三首

瘤方三首

白瘤及二三十年瘤方三首

喉痹方二十一首

咽喉中閉塞方三首

喉舌生瘡爛方八首

喉咽生瘡方四首

咽喉腫方五首

喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首

懸癰腫方三首

咽喉雜療方四首

寒熱瘰癧方一十一首

瘰癧結核方四首

惡核瘰癧方四首

癰腫瘰核不消方五首

鼠瘻及瘰癧方一十一首

[illegible]瘰癧方四首
灸瘰癧法六首
九瘻方三十一首
諸瘻方一十五首
腋臭方三十七首
漏液方三首
七孔臭氣方二首
令人體香方四首
雜療汗出不止方一十首

唐王燾先生外臺秘要方第二十三卷

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞檢院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

瘿病方一十八首

病源瘿者由憂恚氣結所生亦由飲沙水沙隨氣入於脈搏頸下而成之初作與櫻核相似而當頸下也皮寬不急垂捶捶然是也恚氣結成瘿者但垂核捶捶然無脈也飲沙水成瘿者有核瘰瘰然無根浮動在皮中又云有三種瘿有血瘿可破之息肉瘿可割之有氣瘿可具針之養生方云諸山水黑土中出泉流者不可久居常食令人作瘿病動氣增患出第三十一卷中

肘後療頸下卒結囊漸大欲成瘿海藻酒方

海藻一斤去鹹　清酒二升

右二味以絹袋盛海藻酒漬春夏二日一服二合稍稍含咽之日三酒盡更以酒二升漬飲之如前滓暴乾末服方寸匕日三盡更作三劑佳崔氏文仲同

又方

昆布　海藻等分末之蜜丸含如杏核大含稍稍咽汁日四五並出中卷

深師療癭方
桂心　昆布洗　海藻洗　甘草炙
白斂三分熬　龍膽草　海蛤研　土瓜根
半夏洗　吳茱萸　牡蠣熬各一兩
右十一味為散酢漿水服五分匕先食日三十日知禁
藥愈節食鹽羊肉餳生葱猪菜
又方
海藻洗二分　龍膽草二分　昆布洗二分　土瓜根二分
半夏洗二分　小麥麴熬二分
右六味為散先食酒服方寸匕日三二十日知三十日

愈忌羊肉餳　並出第二十九卷中
小品癭病者始作與癭核相似其癭病喜當頸下當中央
不偏兩邊也乃不急膇然則是癭也中國人息氣結癭者
但垂膇膇無核也長安及襄陽蠻人其飲沙水喜癭有核
瘰瘰耳無根浮動在皮中其地婦人患之腎氣實沙石性
合於腎則令腎實故病癭也北方婦人飲沙水者產乳其
於難非針不出是以比家有不救者良由此也
療癭方
小麥一升
醇苦酒一升漬小麥令釋漉出暴燥復漬使苦酒盡暴
燥搗篩以海藻三兩別搗以和麥末令調酒服方寸
匕日三禁鹽生魚生菜猪肉　肘後崔氏備急云療三十年癭疾并驗文仲范汪等
同出第十卷中肘後用海藻五兩
集驗療癭酒方
是水雨經露出柳根三十斤
右以水一斛煮得五斗同米二斗釀之酒成先食服一
升日三　范汪同出第四卷中
崔氏海藻散療癭方
海藻八兩洗　貝母二兩　土瓜根二分
小麥麴熬二分
右四味作散酒服方寸匕日三

又方
秫米三升依酒法作
右一味取圍葉白楊皮十兩去上蒼者慎勿令見風細
切以水五升煮取二升漬汁漬麴末五兩用前件秫米
依酒法釀之酒熟封塞一七日然後空腹服一大盞日
再服三日日即効神驗無比　並出第四卷中
張文仲隱居效驗療癭方
昆布　松蘿各三分　海藻五分
右三味擣蜜丸如杏核大含咽津日三夜一二

同

又療癭司農楊丞服効第一方

昆布六分洗　海藻七分洗　松蘿　乾薑

桂心各四分　通草五分

右六味擣篩蜜丸如梧子一服吞七丸即住在下療處欲至食時即先飲少酒下却丸子後進食不酢等鹽酪臭肉倉米等若癭大者加藥令多取差

又第二方

昆布洗　海藻洗各一斤

右二味細切好酒五升浸七日量力取數服酒盡以酒更浸兩遍藥力盡當以此酒下前丸藥益善出備急肘後

又方

小麥三升

右以三年米酢三升漬麥暴乾乾更浸使酢盡又暴乾擣篩爲散別擣昆布爲散每服取麥散二匕昆布散一匕旦飽食訖淸酒和服之若不能飲酒者以水和服亦得服盡即差多服彌善無所禁但不用舉重及悲啼煩惋等事肘後備急祭驗同

又含丸方

檳榔三兩　馬尾海藻三兩洗　昆布三兩洗

右三味末之蜜丸如雞子黃大每日空腹含一丸徐徐令津液取汁咽之忌鹽餘禁悉方服驗肘後備急同出第六卷中

救急療癭要切方

鼠粘草根一升湯洗

右細切除皮者一升一物以水三升煮取一升半分溫三服服相去如人行四五里一服宜頓服六劑病即差

一方用除皮細切取三大升擣篩爲散蜜和丸如梧子一服二十九日再服之稍稍加至三十九以酒灰酒進之出第五卷中

古今錄驗療氣癭方晉州呂公參徐公方

問荊一兩出海島　羯羊靨五具去脂炙　白歛　椒目

甘草各一分炙　小麥麪末二兩熬

右六味擣篩爲散羊靨一種別擣爲末相和好漿處更擣作丸如小棗大一服五丸無禁

又方

羊靨一百枚煖湯浸去脂炙大棗二十枚去皮作丸服忌慎如常藥法

又方

取羊靨一具去脂含汁汁盡去皮日一具七日含便差

又療瘿海藻散方

海藻洗十分 昆布洗一兩 海蛤研一兩 通草一兩

菘蘿 乾薑 桂心各半兩

右七味下篩酒服一錢七日三 出第四十一卷中服後無乾薑有白斂

氣瘿方一十首

廣濟療氣瘿氣胷膈滿塞咽喉項頸漸麤昆布丸方

昆布一兩洗 通草一兩 羊靨二具炙 海蛤一兩研

馬尾海藻一兩洗

右五味蜜丸如彈子細細含咽汁忌生菜熱麪炙肉蒜

筍

又療冷氣築咽喉噎塞兼瘿氣昆布丸方

昆布八分洗 乾薑六分 犀角六分屑 吳茱萸四分

人參八分 馬尾海藻四分洗 葶藶子六分熬

杏人八分去皮尖熬

右八味擣篩蜜丸如梧子空腹以飲服忌生冷粘食陳

臭等餘忌同前

又療氣咽塞方

昆布二兩洗 菘蘿 通草 柳根鬚各三兩水生者洗

右四味擣篩蜜丸如彈丸大以海藻湯[illegible]含之咽

盡勿停忌擧重生嗔憂悲等

又療瘿細氣方

昆布十二分洗 馬尾海藻十分洗 人參八分

通草 麥門冬去心 連翹各六分 乾薑

橘皮各六分 茯苓八分 松蘿二兩

右十味擣末以袋盛含之乃以齒微微嚼藥袋子汁出

入咽中日夜勿停有問荊加四分佳忌嗔及勞油膩粘

食 出第二卷中

深師[illegible]子膏療氣瘿方

臘月豬脂一升 桂心 大黃

當歸 乾薑 橘皮 蜀椒汗各三分

右八味切以水六升煮取二升去滓內豬脂消盡服差

忌生葱 出第二十九卷中

崔氏云凡水瘿氣瘿可差石瘿不可治療氣瘿方

平旦手挽瘿令離項掐其下根脉斷愈一日一度掐

易愈者七日如難差者三七日愈

又方

昆布二兩洗 海藻二兩洗 龍膽草一兩 馬刀半兩炙

海蛤半兩研 大黃一分 [illegible]黃半兩

右七味擣蜜丸如梧子大破除日以綿裹一丸含咽津

朝暮空腹服忌五辛豬肉

又方

海藻二兩洗

右一味以淸酒四升漬二宿，去滓，稍稍含咽之，盡即更造，以差為度。范汪同，並出第四卷中

必効主氣癭方

白頭翁半兩　昆布十分洗　海藻七分洗　通草七分

玄參　連翹各八分　桂心三分　白蘞六分

右八味擣篩，蜜丸如梧子，五丸，若冷用酒服。禁蒜、麪、豬、魚、生葱。出第五卷中

古今錄驗療癭，有在咽喉，初起游氣去來，陰陽氣相搏，遂停住喉中，前不去，癰起如斛，罌諸癭不差，小麥湯方

小麥三升　昆布二兩洗　厚朴一兩炙　橘皮

附子炮　海藻一兩洗，各　生薑五兩　半夏五兩洗

白前三兩　杏人一百枚，去尖皮

右十味切，以水一斗煮取三升半，分五服，相去一炊頃。忌豬肉、餳、羊肉、冷水。出第四十一卷中

五癭方八首

深師五癭丸方

取鹿靨，以酒漬，炙乾，再內酒中，更炙令香，含咽汁，味盡更易，十具愈。千金翼同，出第二十九卷中

范汪療五癭方

昆布三兩洗　海蛤二兩研　松蘿二兩　海藻二兩洗

通草　白蘞　桂心各二兩

右七味作散，酒服方寸匕，日一。千金翼同，出第四十二卷中

千金療石癭、勞癭、泥癭、憂癭、氣癭方

海藻洗　龍膽草　海蛤研　通草

昆布洗　礬石燒　松蘿各三分　小麥麴四分熬

半夏二分洗

右九味作散，酒服方寸匕，日三。禁食魚、豬肉、五辛、生菜、羊肉、餳。十日知，二十日愈。

又方

菖蒲二兩　海蛤一兩研　白蘞一兩　海藻一兩洗

松蘿一兩　桂心一兩　蜀椒一兩汗　羊靨百枚

半夏一兩洗　續斷一兩　神麴三兩　倒掛草一兩

右十二味擣作散，以羊牛髓和為丸如梧子，日服三丸。忌羊肉、生葱、餳等。翼同

又方

小麥麴一升　特生礜石一斤洗　海藻一斤洗

右三味以陳醋一升漬小麥麴，暴乾，更漬，令醋盡，乾，各擣下篩，為散，服兩方寸匕，日四五服，含乃咽之。忌口[illegible]前及

大誦大語吹火用氣第二十五卷中 翼原脫用小麥麪一斗餘同前上

千金翼五癭方

海藻洗一兩 昆布洗 半夏洗 細辛

土瓜根 松蘿各一兩 白歛 龍膽草各一兩

海蛤二兩 通草二兩

右十味作散酒服方寸匕日再忌羊肉餘忌同前

又方

昆布洗二兩

右一味切如大指酢漬含嚥汁盡愈

又方

海藻一斤 小麥麪一斤

右二味以陳酢一升浸宿暴令乾復漬令酢盡作散酒服方寸匕日三忌怒 出第十一卷中

千金灸諸癭法

灸癭法一十三首

灸肩髃左右相宛宛中男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯再三以差止

又法

灸風池百壯風池夾項兩邊兩穴兩耳上髮際中 按此条千金聖濟並作灸風池百壯又灸兩耳後髮際百壯乃是兩條然明堂無髮際穴

又法

灸大椎百壯兩邊相去各一寸半小下垂各三十壯

又法

灸頭衝頭衝在伸兩手直向前令臂著頭對鼻所住處灸之各隨年壯凡灸五處九穴 翼原缺○按頭衝即臂臑通穴在肘上七寸其灸五處九穴即風池髮際大椎大杼頭衝五處共九穴也

又癭上氣短氣方

灸肺俞一百壯

又癭上氣胸滿法

灸雲門五十壯

又癭上氣方

灸胸堂百壯

又癭惡氣法

灸天府十五壯

又癭方氣法

灸衝陽隨年壯在肘外屈橫文頭是 按此是曲池一名衝陽在足趺上

又[illegible]癭法

灸天瞿三百壯橫三間寸灸之

又癭氣面腫法

遭猶字對在是所謂前十此三斷士證失又後前方法出千金治下八卷第下十五卷也

灸通天五十壯在耳上二寸

又灸癭法

灸中封臨泣在兩足趺上内尺宛宛中 並出第二十五卷中

又灸癭法

灸耳後髮際有一陰骨骨間有一小穴亦有動脈準前灸大効 已上穴所在具三十九卷明堂中 出第六卷中

瘤方三首

肘後云皮肉中忽腫起初如梅李漸長大不痒不痛又不堅強按之柔軟此血瘤也不療乃至如盤大則不可復消而非殺人病爾亦慎不可破方乃有大療今如覓但依療

家療瘤若不消更引別大方 出中卷

深師療瘤脂細瘤方

吳茱萸一分 礬石燒 芎藭 當歸

大黃 黃連 芍藥 白斂

黃芩各二分

右九味合擣下篩和雞子塗著細故熟布上隨瘤大小薄厚貼之燥輒易之著藥當熟作膿脂細細從孔中出探知膿血盡著生肉膏若膿不盡復起故也生肉膏方如左

又生肉膏療癰瘤潰漏及金瘡百瘡瘑疥之方

真當歸 附子炮 甘草 白芷

芎藭各一兩 薤白一兩 生地黃三兩

右七味㕮咀以豬膏三升半合微火煎白芷地黃去滓稍以傅瘡上日三良 千金並同出第二十九卷中

千金云凡肉瘤勿療療則殺人慎之慎之 出第二十五卷中

千金癭瘤痼瘤方

瘤疣二種肉割如厚脯火炙令熱搨掩可因灸四易瘤狀似愈不除更灸納門用之良 出第二十四卷中

白瘤及二三十年瘤方三首

千金療白瘤方

先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熱刮瘤上洗之日三即愈

又方

白礬 硫黃等分

右二味末以醋和封上 並出第二十四卷中

千金陷腫散主二三十年瘤瘦及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤或大如杯盂[illegible]斗十年不差致有漏潰令人骨消肉盡或堅或耎或潰令人驚惕寐寤不安體中掣縮愈而復發療之方 千金異云消痿散

烏賊魚骨一分 白石英二分 石硫黃一分 紫石英二分

退溪 男虛 實證 生脈散 抵

鍾乳三分研 乾薑一兩 丹參三分 琥珀研一兩

大黃一兩 附子炮一兩 胡鷰屎一兩

右十一味為散貯以韋囊勿令泄氣若瘡瘍剛傳之若瘡乾無汁者以豬膏和傳日三四以乾為度若汗不盡者至五劑十劑止勿措意不作也若藥令人不瘀痛若不消加芒硝二兩益佳忌豬肉 出第二十五卷中 無鳥鷰屎

喉痺方二十一首

病源喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不得入也人陰陽之氣出於肺循喉嚨而上下也風毒客於喉間氣結蘊積而生熱故喉腫塞而痺痛脈沉者為陰浮者為陽若右手關上

脈陰陽俱實者是喉痺之候也亦令人壯熱而惡寒七八日不治則死其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云兩手拓兩頰手不動摟肘使急腰內亦然住定放兩肋頭向外肘伸胳氣散盡勢大悶始起來去七通去喉痺 出第三十卷中

廣濟療喉痺卒急疼悶妨不通方

馬藺子一升 升麻二兩 瞿麥二兩 射干十兩 犀角屑兩 通草一兩 玄參三兩

右七味切以水八升煮取二升去滓細細含之一日令盡得破膿慎熱麪炙肉蒜

又療喉痺方

馬藺子八分 牛蒡子六分

右二味擣為散每空腹以煖水服方寸匕漸加至一匕半日再 並出第二卷中

肘後療喉痺者喉裏腫塞痺痛水漿不下入七八日即殺人療之方

巴豆一枚去皮心

右一味以綿裹固堅令有絲出外以巴豆內鼻中隨腫左右時時吸氣半時辰即差無巴豆用杏人以塞耳如之 文仲范汪同

又方

熬杏人熟擣蜜丸如彈子含咽其汁亦可擣杏人末帛裹含之 小品文仲備急范汪同

又方

礬石一兩水三升漬洗手足

又方

生地黃汁二升蜜二升合微火煎之取二升稍稍含之

又方

射干 當歸各三兩

臣按蔛葥一作樹萌

右二味切以水三升煮取一升稍稍含之吐去更含

又方

剴蔛塞耳鼻孔日再易之有効

又方

菖蒲根嚼燒秤鉋令赤內一握酒中沸止飲之（文仲備急）

又療喉痹方

射干一片含咽汁

又方

升麻斷含之喉塞亦然

又方

桔梗（二兩）

右一味切以水三升煮取一升頓服之忌猪肉

又方

取芥子擣碎以水及蜜和滓傅喉下燥輒易

又傅用神効方

桔梗　甘草（炙各二兩）

右二味切以水一升煮取服即消有膿即出忌猪肉海藻菘菜（備急同）

又療喉痹死者方

擣馬蔺根一握少以水絞取汁稍稍咽之口噤以物灌之神良

古今錄驗雞子湯療喉痹方

半夏末（方寸匕）

右一味開雞子頭去中黃白盛淳苦酒令小滿內半夏末末中攪令和雞子著刀子鐶令穩炭上令沸藥成置杯中及煖稍咽之但腫即差忌羊肉餳（肘後文仲同此與仲景苦酒湯同半夏不可作末剉之可也）

又療喉痹塞射干丸方

射干（二兩）　豉（三合）　芎藭　杏人（去尖皮各一兩）

犀角（屑一兩）　升麻（二兩）　甘草（炙一兩）

右七味擣下篩蜜和丸含之稍稍咽津日五六忌海藻菘菜

又射干湯療喉痹閉不通利而痛不得飲食若閉喉并諸疾方

當歸（二兩）　升麻（一兩）　白芷（三兩）　射干

甘草（炙）　犀角（屑）　杏人（去尖皮各一兩）

右七味切以水八升煮取一升半分服神良忌海藻菘菜（出第十九卷中）

近効療喉痹方

大附子一箇刮去皮作兩片

右一味以蜜塗火上炙令熱即含咽汁甜盡又取一片準前含如已作頭即膿出如未作頭立消神驗忌豬肉冷水

又方

朴硝一兩細細含咽汁一食頃差

又若腫全塞語聲不出者方

大附子一枚炮裂去皮切如豆

右一味含一塊咽汁半食間即差烏頭亦得忌豬肉冷水

咽喉中閉塞方三首

廣濟療咽喉中塞鼻中瘡出及乾嘔頭痛食不下方

升麻　通草　黃蘗　玄參各八分

麥門冬十分去心　竹茹　前胡各六分　芒硝十分

右八味切以水八升煮取二升五合去滓內硝溫分三服服別如人食頃自利去硝

又方

生雞子一顆開頭取白去黃着米酢拌搪火煨沸起擎下沸定更三度成就熱飲酢盡不過一二即差出[illegible]第　卷中

延効療喉痹喉咽塞喘息不通須臾欲絕神驗方

馬藺根葉二兩

右一味切以水一大升半煮取一大盞去滓細細吸須臾即通絡石草亦療煎法分兩亦同

咽舌生瘡爛方八首

肘後療喉口中及舌生瘡爛方

含好淳苦酒即愈文仲備急同

又方

一酒漬蘘荷根半日含漱其汁

又方

杏人二十枚　甘草一寸　黃連一分

右三味末綿裹含之千金同

又方

礬石二兩燒去汁　黃連末一分

右二味同研內口中令布瘡上

又方

黃連一兩

右一味切以水三升煮取一升稍稍含冷吐忌豬肉冷水

張文仲療口中及舌生瘡爛方

取牛膝根酒漬含漱之無酒者但亦取含之 肘後同

又方

剉黃蘗含之 肘後同並出第七卷中

備急療喉中及舌生瘡爛方

剉薔薇根濃煮汁含漱之冬用根夏用枝葉 文仲肘後同出第四卷中

咽喉生瘡方四首

廣濟療咽中生瘡吐血不下食方 方怡雲曰此方余用已驗但不大便者先看難章汋見下之後用此方

生地黃五兩 青竹茹 玄參 雞蘇各二兩

茯苓 升麻 麥門冬去心各三兩

右七味切以水八升煮取二升五合去滓分溫三服服相去如人行七八里不能多服含細細咽亦得忌生冷熱麪炙肉油酢 出第五卷中

千金療口中瘡及咽喉不利生瘡口燥膏方

猪膏一斤 白蜜一斤 黃連一兩

右三味合煎去滓攪令相得含如半棗日四五度

又療熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸 射干 升麻各一兩 附子半兩炮

白蜜四兩

右五味切以猪膏四兩先煎之成膏下著地勿令大熱內諸藥微火煎附子色黃藥成絞去滓內蜜復上微火煎令相得盛器中令凝取如杏子大含之日四五度稍咽之 並出第六卷中

古今錄驗升麻湯療咽喉生瘡方

甘草炙一兩 升麻 石膏碎 牡丹皮各一兩

右四味切以水七升煮取三升一服七合日三忌海藻菘菜 出第二十九卷中

咽喉腫方五首

肘後恒喉卒癰腫食飲不通方

用薤一把搗傅腫上冷復易之用苦酒和亦佳 文仲同

又方

吞薏苡人子二枚

延年療喉中熱腫方

鼠粘根切一升

右一味以水五升煮取三升去滓分溫三四服忌蒜麪 出第十九卷中

古今錄驗羚羊角豉湯療喉痛腫結毒氣衝心胷方

豉一升半 犀角屑一兩 羚羊角屑一兩 芍藥二兩

升麻四兩 杏人一兩去尖皮 梔子七枚 甘草炙一兩

謹按高陽舍蓋此言疑未知是否

右八味切以水七升煮取一升半去滓分三服忌海藻
菘菜
又五香湯療諸惡氣喉腫結核方
沉香二兩 薰陸香一兩 麝香二分研
青木香二兩 雞舌香二兩
右五味以水五升煮取一升半去滓分三服 出第二十九卷中
喉卒塞痛及卒毒攻痛方三首
范汪療卒喉中塞痛不得飲食方
取敗筆一枚燒屑以漿飲服一方寸匕良驗 出第十五卷中
文仲療喉中卒毒攻痛方

章陸根切炙令熱隔布熨之冷輒易立愈姚云苦酒
熬熱傅喉亦療喉痺 肘後小品同
又方
擣艾傅之 並出第七卷中
懸癰腫方三首
肘後療懸癰腫卒長數寸如指隨喉出入不得食方
開口捧頭以箸抑舌及燒小鐵於管中灼之令破灼
火畢以鹽豉烙處塗之
又方
擣鹽綿纏箸頭點鹽傅以揩之日六七度 同文仲備急

千金療懸癰垂暴腫長方
乾薑 半夏洗等分
右二味末之以少少著舌本 翼同出第六卷中
咽喉雜療方四首
范汪療咽喉不利下氣丸方
射干 附子炮 人參 杏人各一分
右四味合擣下篩蜜丸如梧子含一丸咽汁日三夜一
忌豬肉冷水 千金同
又療口中咽喉不利當歸含丸方
當歸末三兩 杏人一兩
右二味擣合下篩以蜜和為丸如梧子二丸含稍稍咽

汁日三夜再
又療咽喉中痛不利丸方
升麻 甘草炙 鬼臼 射干
丹砂各一兩 雄黃一兩 杏人一十枚 麝香半兩
右八味擣下篩和以蜜丸如梧子飲服一丸日三漸加
之酒下亦得咽痛失聲不利用良忌海藻菘菜 千金同出第五十卷中
崔氏療口咽喉內瘡痛欲失聲方
桂心二兩 杏人二兩熬 黃芪一兩

右三味擣末合和綿裹含如杏人許咽汁消盡更含八三夜二忌臟食出第四卷中

寒熱瘰癧方一十一首

病源此由風邪毒氣客於肌肉隨虛處而停結為瘰癧或如梅李棗核等大小兩三相連在皮間而時發寒熱是也久則變膿潰成瘻也其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後養生方導引法云踑踞以兩手從膝入據地曲脚加其上舉尻其可用行氣愈瘰癧乳癰出第三十四卷中

甲乙經寒熱瘰癧論黃帝問曰寒熱瘰癧在於頸腋者皆何氣所生岐伯對曰此皆鼠瘻寒熱之氣也稽留於脈而不去者鼠瘻之本皆在於藏其末上出於頸腋之間其

浮於脈中未著於肌肉而外為膿血者去易問曰去之奈何對曰請從其末引其本可使衰去而絕其寒熱審按其道以予之徐往徐來以去之其小如麥者一刺知三刺而已決其生死法反其人目視之其中有赤脈從上下貫瞳子見一脈一歲死見一脈半一歲半死見二脈二歲死見二脈半二歲半死見三脈三歲死此赤脈不下貫瞳子者可療千金同出第八卷中

廣濟療瘰癧丸方

鶴骨 狸骨並炙 射干 玄參

升麻炙 青木香 沉香 犀角屑

丁香 羚羊角屑 丹參 甘草炙各四分

人參 沙參各三兩 鼈肝六分 連翹六分

光明砂二分研

右十七味擣篩蜜丸以飲服十五丸日二服漸加至三十丸空腹服之忌生冷油膩血食蒜麪熱肉海藻菘菜莧食陳臭生血物等

又療瘰癧方

連翹 射干 玄參 芍藥

青木香 芒硝 升麻 梔子人擘

前胡 當歸 甘草炙 大黃各二兩

右十二味切以水一斗煮取三升分三服服別相去如人行六七里快利忌同前方並出第五卷中

劉涓子療寒熱瘰癧散方

狸骨五兩炙 烏頭七分炮 黃連六分

右三味擣下篩先食以酒服一錢七日三良忌豬肉冷水范汪同出第十卷中

千金療瘰癧方

又方

白殭蠶為散以水服五分七日三十日差深師救急同

通按三朝服良四字衍誤

又方

於患人背兩邊腋下後文上隨年壯灸之

又方

灸耳後髮際七壯

又方

楸白皮二斤

右一味細切以水七升煑取三升去滓真珠砂方寸匕和汁一升旦向日服之強行須臾吐鼠出三朝服良

又方

貍頭一枚炙擣下篩旦白飲服方寸匕日再服之

又方

狼糞灰封上良

又療寒熱瘰癧散方

連翹 土瓜根 龍膽草 苦參

黃連 栝樓 芍藥 常山皮各一兩

貍頭骨一枚炙

右九味擣下篩酒服五分匕日三忌豬肉冷水 集驗古今錄驗方云無貍頭骨加之多驗頭散驗同並出第二十四卷中

救急療瘰癧方

馬齒莧陰乾燒灰臘月豬脂和之以暖泔清洗瘡拭乾傅之日三 出第三卷中

療瘰癧結核方四首

廣濟療瘰癧息肉結硬消方

白歛 甘草炙 青木香 芍藥

大黃各三兩 玄參三兩

右六味擣為散少減以少酢和如稀糊塗故帛貼上乾易之勿停忌豬肉五辛熱肉飲酒熱麪等

又療瘰癧結核令消散方

黃耆七分 玄參八分 連翹 人參

升麻 青木香 茯苓 蒼耳子

甘草炙 朴硝 桂心各四分 枳實炙去瓤

大黃 羚羊角屑 麥門冬去心各五分 鼠粘子

苦參各九分

右十七味擣蜜丸如梧子以酒下十丸日三夜四漸加至二三十丸以知為度忌同前方 並出第五卷中

肘後療頸下生瘰癧如梅李宜使消之方

海藻一斤去鹹

右一味以酒三升漬數日稍稍飲之 文仲備急等同

又方

人參 甘草炙 乾薑 白歛各四分

右四味擣篩酒服方寸匕日三忌同 劉涓子文仲備急同出第六卷中

惡核瘰癧方四首

文仲五香連翹湯療惡肉惡脉惡核瘰癧風結腫氣痛方

青木香　沉香　雞舌香各二兩　麝香半兩

薰陸香一兩　射干　紫葛　升麻

桑寄生　獨活　通草　連翹各二兩

大黃三兩　淡竹瀝二升

右十四味切以水九升煮取減半內竹瀝更煮取三升分三服忌五辛（千金方無紫葛雞舌香有丁香古今錄驗同出第五卷中）

延年丹參湯療惡肉核瘰癧諸風氣結聚腫氣諸病並主之方

蒴藋　丹參各兩　甘草炙　蓁艽

獨活　烏頭炮　牛膝各一兩　躑躅花

蜀椒各半兩汗

右九味切以水八升煮取三升溫服一升忌海藻菘菜豬肉冷水（古今錄驗有白及餘並同）

又玄參湯主惡核瘰癧風結方

玄參　升麻　獨活　連翹各二兩

木防已　菊花各一兩

右六味切以水八升煮取三升分服一升日三（文仲同）

又丹參膏主惡肉結核瘰癧脉腫氣痛方

丹參八分　白歛　獨活　連翹

白及各四分　升麻　蒴藋各六分　防已

玄參　杏人各五分去皮尖

右十味細切以生地黃汁浸一宿以煎成豬膏四升微火煎五上五下藥成絞去滓以摩病處日三四

瘰癧瘰癧核不消方五首

經效犀角丸療瘰癧方

犀角四分　升麻三分　大黃六分　牛蒡子八分

烏蛇十分炙去頭尾　玄參八分

右六味末之蜜和丸如梧子大每日二三午後煎牛蒡湯下二十五丸

又方

龍骨八分　牡蠣八分熬

右二味末之酒下三錢七日三度良

又大黃膏方

大黃六分　附子四分炮　細辛三分　連翹四分

巴豆一分

右五味以苦酒浸一宿以臘月豬膏煎三上三下去滓以綿濾之用傅之日三五度塗之良

集驗療寒熱瘰癧散方

連翹六分 土瓜根四分 龍膽草五分 黃連四分
苦參六分 栝樓四分 芍藥五分
右七味爲散食後溫酒下五分匕日二
又方
陵鯉甲二十一枚燒擣末傅瘡上千金同
鼠瘻及瘰癧方一十一首
文仲療瘰癧方
苦參四大兩擣末生牛膝和丸如梧子食後煖水下
十丸日三服
又方

昆布四分 海藻四分
右二味各洗去鹹擣末蜜和丸如杏核許大含之日三
度良差
救急療鼠瘻久不差方
取但鼠不限多少常作羹粥任喫之必驗千金留劫同
必效療鼠瘻瘰癧方
取臘月猪脂正月鼠頭燒令作灰以脂和傅之愈若
不差者療癧右灸右肩頭三指度以下指灸灶皆如
雞子大良若不能堪者可如中黃亦可已試有良驗
又療頸鼠瘻累累者方

川芎 乾薑 藁本 桂心
蜀椒各一分汗
右五味擣下篩先食以粟進一分以酒服一服忌生葱
又療鼠瘻瘰癧身熱方
[illegible]椒二十斤
右一味以水淹足煎熟去滓置瓶中覆瓶口以瘡當上
取候熱氣止痛出鼠當從瘡出便愈
又寒熱鼠瘻瘰癧方
狸骨炙 龍骨各五分 蜀椒汗半兩 一云猪子
當歸 王不留行 土瓜根各一兩

右七味擣合篩先食酒服方寸匕日再夜一並出第四十二卷中
集驗療鼠瘻及瘰癧膏方
白馬牛羊猪雞等矢屑各一斤
漏蘆 藁本各一斤
右七味並於石上燒作灰研絹篩之以猪脂一升三合
煎亂髮一兩半令沸髮盡乃內諸藥屑微火上煎五六
沸藥成先去瘡上痂以鹽湯洗新綿拭瘡令燥然後傅
膏若無痂猶須湯洗日再若著膏當以帛覆之勿令風冷
勿觸寒風以膏傅上亦日再占今依驗范正
又療寒熱瘰癧散方

白[illegible]　當歸　防風　栝樓

芎藭　黃耆　狸骨炙　甘草炙各二兩

細辛　乾薑　露蜂房炙各一兩　礬石熬半分

大附子炮　桂心各半兩　斑猫去足翅熬　芫青去首足翅熬各五枚

右十六味擣下篩為散以酒服一錢七日再忌豬肉冷

水海藻菘菜生蔥[illegible]出第八卷中

又療鼠瘻方

蛇腹中鼠蝦蟆燒末酒服方寸匕甚効

又方

以槲葉擣末傅瘻上熱灰鹽湯洗之即有良効並出第五卷中

毒腫瘰癧方四首

崔氏大五香湯療毒氣苦肌肉中腫痛結脉寒熱如瘰癧

痛不可近急者數日殺人苦心煩悶便當急速與湯并以

滓薄腫脉上方

青木香　雞舌香　沉香　升麻各五分

藿香　犀角屑　吳茱萸　桂心

麻黃　甘草炙各三分　薰陸香四分　細辛二分

右十二味㕮咀以水七升煮取二升分三服不差復合

若齒齒惡寒加附子中形者一枚炮令坼八破用忌生

冷醋菜海藻菘菜豬肉冷水生菜五辛[illegible]

又五香湯療毒腫瘰癧方

麝香研　青木香　雞舌香　藿香

薰陸香　當歸　黃芩　升麻

芒硝各三分　大黃五分

右十味㕮咀以水六升煮取二升去滓內硝分二服相

去如人行七八里再服諸卒尸注惡氣亦療出第五卷中

經心錄射干湯療惡毒身強痛瘰癧方

射干　桂心各二兩　麻黃去節　生薑

甘草炙各四兩　杏人四十枚去皮尖

右六味切以水四升煮取三升去滓分三服忌同前出

第五卷中

又升麻湯療風毒咽水不下及瘰癧腫方

升麻　芍藥各四兩　射干二兩　杏人去尖皮三兩

麻黃二兩去節　甘草二兩炙　楓香　葛根各三兩

右八味切以水八升煮取半分三服忌同前出第三卷中

灸瘰癧法六首

千金灸瘰癧法

兩腋中患瘰癧處宛宛中百壯上

又法

擣生商陸根捻作餅子置漏上以艾炷灸餅子上熟

熟易之灸三四炷

又法

灸五里大迎各三十壯

又法

葶藶二合　豉一升

右二味合擣令極熟作餅如大錢厚二分許取一枚當瘰孔上作艾炷如小指大灸餅上三壯一日易三餅九炷隔三日一灸集驗同古今錄驗崔氏文仲劉涓子同不可灸頭瘡葶藶氣入腦殺人

又法

一切瘰癧在項上及觸處但有肉結凝以作瘻及癰癤者以獨頭蒜截兩頭留心作孔大艾炷稱蒜大小貼癧子上灸之勿令上破肉但取熱而已七炷一易蒜日三易日日灸之取消止翼同

又方

七月七日日未出時取麻花五月五日取艾等分合擣作炷灸癧子一百壯並出第二十四卷中

九瘻方三十一首

廣濟療瘻有九種不過此方

芫青四足　海藻洗八分　昆布洗八分　雄黃研八分

狸骨灸三分　牡蠣熬四分　地膽二十枚熬　八分三分

右八味擣篩爲散酒服一錢匕日二服病從小便出如爛筋忌生冷粘食猪魚肉臭物出第五卷中

劉涓子療鼠瘻方

死蛇蛻燒作灰

右一味苦酒和塗之數過即愈先以鹽湯洗古今錄驗同

又方

五月五日櫻桃擣末先鹽湯洗拭之令乾以末傅瘡上櫻桃未詳

又方

烏頭炮　附子炮各二兩

右二味㕮咀著五升淳苦酒中漬之待乾復內苦酒中燥復內以苦酒盡暴令乾擣末酒服方寸匕日三忌猪肉冷水等

又張子仁療鼠瘻要方

柞木皮五升

右一味以水一斗煮熟去皮煎令汁得二升稍稍服盡當有宿肉出即愈備急文仲古今錄驗同並出第六卷中

肘後療苦鼠內肉外沓瘡膿並出者是蜂瘻方

取蜂房火炙焦末酒服方寸匕日一

深師療鼠瘻方

瘻按 集字疑 誤

鯽魚四兩 野豬皮 鸛骨一兩 巴豆去皮十五

斑猫二十枚去頭足翅熬 五月五日蟾蜍一枚 臘月豬脂五合

右七味擣野豬皮下篩合諸藥更擣下篩內豬脂鯽魚以膏和擣千杵平旦未食服如梧桐子二枚覺有寒熱不覺者復投明日旦起更服三丸稍稍增之愼勿食熱食煩悶殺人蟲當從小便出以器盛之承便視乃有百數耳不可以見亦大便出此方驗忌豬肉蘆笋等

又方

馬齒礬石燒 真珠粉

右二味擣下篩爲散厚塗瘡上不過三愈

又方

松脂 硫黃 狼毒各二兩 豬腦一具

白斂二兩

右五味熬豬腦取汁狼毒白斂㕮咀以水三升煮取一升內腦汁中煎令得五合細末硫黃松脂下篩內中攪令相得綿裹內瘡中七日知一七日病除神良

集驗凡有九種瘻

一曰狼瘻始發身熱頭腫有根起於缺盆上轉連耳本瘻大此得之因憂恚氣上不得下其根在肺空青主之商陸爲佐

二曰鼠瘻始發於頸無頭尾如鼷鼠瘻核時上時下使人寒熱脫肉此得之由食大鼠餘毒不去其根在胃狸骨主之知母爲佐

三曰螻蛄瘻始發於頸項狀如螻蛄腫潰連生瘡其汁赤黃得之食瓜蔞蛄餘毒及果實不去核其根在大腸荏子主之桔梗爲佐

四曰蜂瘻始發頸瘰癧三四處俱相連潰潰後此得之多飲流水水有蜂餘毒不去其根在脾雄黃主之黃芩爲佐

五曰蚍蜉瘻始發於頸初得之如傷寒此得之因飲食中

有蚍蜉毒不去其根在腎礬石主之防風爲佐

六曰蠐螬瘻始發於頸上下無頭尾如棗核塊多在皮中使人寒熱心痛滿此因喜怒哭泣得之其根在心礜石主之白朮爲佐

七曰浮疽瘻始發於頸如兩指使人寒熱欲臥此得之因思慮憂懣其根在膽地膽主之甘草爲佐

八曰瘰癧瘻始發於頸有根初苦痛瘰癧覺之使人寒熱得之於不得早臥發汗流入於頸所致其根在腎雌黃主之芍藥爲佐

九曰轉脈瘻始發於頸如大豆浮在脈中濯濯脈轉苦驚

惕身如振寒熱始得之時驚卧失枕其根在小腸疵𤻲主
之白芷爲佐
療瘻九種方
空青之研鍊　商陸根　狸骨炙　知母
荏子　桔梗　雄黄　黄芩
礬石燒　防風　礬石燒汁　地膽熬
白术　甘草炙　雌黄　芍藥
斑猫去足翅熬　白芷各二分
右十八味擣其論病者特加其分餘種令分等細篩末
空青及在後内之苦酒服一刀圭日三服三十日知五

一日愈七十日平復病者百日禁食魚肉忌生菜桃李
雀肉海藻菘菜犬肉生血物餘二大豆爲一刀圭小兒
服之半大人全服八歲以下寧從少起過度令人淋淋
即減之　出第九卷中
千金問曰何謂九瘻答曰一曰狼瘻二曰鼠瘻三曰螻蛄
瘻四曰蜂瘻五曰蚍蜉瘻六曰蠐螬瘻七曰浮沮瘻八曰
瘰癧瘻九曰轉脈瘻謂之九瘻
又療狼瘻發於頸頭腫有根起於缺盆上轉連延耳根腫
大此得之因憂恚氣上不得下其根在肝空青主之商陸
爲佐方
空青二分　蝟腦二分炙之　獨活一分　蝟肝一具炙之
芎藭半兩　女婦草一分　黄芩　鱉甲炙
斑猫去翅足　乾薑　當歸　茴香
礬石燒　地膽各一分　蜀椒二十枚去目
右十五味作散下篩酒服方寸匕日三十五日即止忌
生血物莧菜　劉涓子古今錄驗同
又療鼠瘻發於頸無頭尾如鼮鼠使人寒熱此得之因食
大鼠餘毒不去其根在胃狸骨主之知母爲佐方
陵鯉甲炙　山龜殼炙　甘草炙　桂心
雄黄　乾薑等分

右六味作散下篩服方寸匕日三蜜和内瘡中無不愈
先灸作瘡後與藥良忌海藻生葱　劉涓子備急古今錄驗文仲同
又療鼠瘻瘡差復發及不愈出膿血不止方
以不中水猪脂㕮咀生地黄内脂中令其脂與地黄
足相淹和煎六七沸去滓桑灰汁淨洗瘡去惡汁以
地黄膏塗上日一易　范汪同
又療鼠瘻方
得蛇虺所吞口中鼠燒末服方寸匕日再不過三服
此大驗但難遇耳并傅瘡中　范汪同
又療鼠瘻方

死鼠一枚中形者　亂髮如雞子一枚

右二物以臘月猪膏令淹鼠髮煎之令其鼠髮都盡消膏成分作二分一分稍稍塗瘡一分以酒服之即愈矣鼠子當從瘡出神良秘不傳 翼備急文仲集驗范汪同

又療螻蛄瘻發於頸項狀如螻蛄腫潰連生瘡其汁赤黃此得之食瓜螻蛄餘毒及果實不去核其根在大腸荏子主之桔梗為佐方

桂心　乾薑　桔梗　礬石燒

獨活各一分　附子一分炮　椒一百粒汗　芎藭半分

龍骨半分　荏子一分

右十味擣下篩棗二十枚合擣以酢漿丸如大豆溫漿下五丸 古今錄驗劉涓子同

又方

槲葉灰先以泔清煮槲葉取汁洗拭乾內灰瘡中

又療蜂瘻發於頸瘰癧三四處俱腫起相連潰潰移此得之飲流水有蜂毒不去其根在脾雄黃主之黃芩為佐方

蜂房一具炙　鼈甲一分炙　茴香一分　吳茱萸二分

椒一百粒汗　乾薑一分

右六味擣下篩作散傅瘡孔中日十度十日止已芫菜

又療蜂瘻初生時狀如桃而痒搔之則引大如雞子如覆手者方

蔥塩熨之三宿四日不差至百日成瘻其狀大如四五寸又廣三寸中生蜂作孔乃有數百治法以石硫黃隨多少燃燒令汁出著瘡孔中須臾皮中見蜂數十唯蜂盡即差

又療蚍蜉瘻發於頸初得如傷寒此因食中有蚍蜉毒不去其根在腎礜石主之防風為佐方

白朮四分　知母　雌黃　乾地黃

獨活　青黛　斑猫去足翅熬　白芷

栢脂　芍藥　海藻一云海苔　當歸各一分

蝟皮炙四分　椒一百粒汗　桃白皮一分

右十五味擣下篩作散服一錢匕日三 劉涓子古今錄驗同

又療蠐螬瘻發於頸無頭尾如棗核塊塊多在皮中使人寒熱心痛滿此因喜怒哭泣其根在心礬石主之白朮為佐方

白朮一分　礬石一分　空青二兩　當歸二分

細辛一分　蝟肉炙　枸杞根　斑猫去足翅熬

地膽各一分熬　乾烏腦三大豆

右十味擣下篩散服方寸匕日三酢漿服之病在上側臥在下高枕臥使藥流下 劉涓子古今錄驗同

七曰浮沮瘻發於頸如兩指使人寒熱欲卧得之因思慮
憂懣其根在膽地膽主之甘草爲佐方

雄黃一分 乾薑一分 龍膽一分一作龍骨 石決明一分
續斷 菴䕡根各一分 細辛一分 大黃半分
地膽熬一分

右九味擣下篩爲散傅瘡日四五忌生菜劉涓子同古今錄驗無雄苦參代黃餘同

又療蠐螬瘻發於頸有根初苦痛歷歷發之使人寒熱此得之新沐頭濕髮汗流入於頸其根在腎雌黃主之芍藥爲佐方

茯苓 續斷 礬石燒令汁盡 乾薑
雌黃 芍藥 桔梗 椒汗
乾地黃 常山 空青 狸肉
烏腦并腎 斑猫去翅足熬一分 附子炮一兩 礬石二分燒半日
虎指各一分一云虎腎

右十七味擣篩爲散蜜丸如大豆夜酒服十丸日三古今錄驗同

又療轉脈瘻發於頸如大豆浮在脈中濯濯脈轉苦驚惕身如振寒熱得之從驚卧失枕其根在小腸斑猫主之白芷爲佐方

綠青一分 礬石半分燒半日 防風一分 甘草半分炙
大黃二分 桂心二分 人參二分 當歸二分
升麻一分 地膽熬一分 白朮一分 鍾乳一分研
斑猫一分去翅足熬 白芷一分 續斷一分 麝香一分
麥門冬一分去心

右十七味擣下篩蜜丸酒服如大豆十丸日三勿食倉米慎房百日劉涓子古今錄驗同並出第二十四卷中

崔氏療九種瘻方

芫青二十枚去足翅熬 地膽十枚去翅足熬 斑猫二十枚
生犀大如棗核 豉四十九粒 大豆黃一百枚生用
牛黃大如棗熬 蜈蚣一枚炙大者擣寸半殺火熬

右八味擣篩蜜丸如梧子初欲服藥少夜食明旦飲服二丸須臾可煮蔓菁粥稍稍冷飲之其瘻蟲有形狀皆從小便出至日西甚虛悶可煮湯飯蔓菁菜羹皆食之其餘脂膩醋鹹一切口味五辛果子之類並不得食人強隔日一服人弱兩三日一服服藥以瘥差蟲盡爲度若差仍作二十日許將息藥欲盡彙合勿使斷絕藥氣不能將息便不須服救急千金同出第五卷中

張文仲療鼠瘻方

石南 生地黃 雌黃 茯苓

遒按一作蟲

黄連各二兩

右五味作散傳瘡日再 備急

又療鼠瘻諸惡瘡方

苦參三斤 露蜂五兩 麴二升

右三味以水三斗漬藥二宿去滓黍米二升釀熟飲日

三一方得蝟皮一具 劉涓子鼠並出第五卷中

備急劉涓子鼠瘻方

山龜殼炙 桂心 雄黄 乾薑

貍骨炙 甘草炙

右六味等分擣篩爲散飲服方寸匕日三服和内瘡中

外臺秘要 卷二十三 四 經餘居

無不愈先炙作瘡後與藥良

又方

礬石三分燒 斑猫一分去首足翅熬

右二味擣下篩用酢漿服半匕須臾瘻蟲從小便出

集文仲同出第五卷中

古今録驗療鼠瘻麝香塗方

麝香研 雄黄研

右二味等分並爲散取蝦蟇背白汁和塗瘡孔中日一

度

又療鼠瘻著頭生小者如杏大者如杯方

斑猫一分去首足翅熬 蛇蛻二分熬 [illegible]四分炙

右三味擣下篩酒服五分七日三病將從小便出如魚

腸忌蒜 並出第四十一卷中

諸瘻方二十五首

劉涓子療瘰癧方

斑猫四十枚去足翅熬 桂心四分 芫青十枚去足翅熬

葛上亭長十枚熬

右四味擣下篩酒服半錢七日一忌生葱

又療瘻方

斑猫四十枚去足翅熬 地膽三十枚去首足翅熬 蜥蜴炙三枚

外臺秘要 卷二十二 五 經餘居

右三味擣之千杵蜜和如大豆服二丸

又療瘻泉方不差効驗方

牡蒙數兩

右一味擣之湯和適寒温取一升許薄瘡上冷易經宿

佳

又療瘻生肉膏方

桑薪灰三升水四升淋之復重淋之取三升石灰熬

令黄内灰汁中以兩重帛裹絞去滓更煎自煎取二

升勿用急火煎塗瘻孔深淺初時作服敵而差孔若

深四寸新殺與孔爽蘿白使濡安藥蘿白入藥孔囊

通按鼠一作虫之類

若深四寸隨瘻根而灸兩處每處與四十壯雖勿灸瘻孔隨深淺去膿散與膏安著瘡孔裹十五過少還延日月取差肉滿膿亦斷神良無比 出第六卷中

肘後論此本在諸方瘡條中病類既多今狀出爲別一篇

凡瘻病有鼠蛇蜂蛙蚓類似而小異皆從飲食中得其精氣入人肌體變化成形瘡既穿潰浸諸經脈則亦殺人而鼠蟻最多以其聞近人故也

通治諸瘻方

以八月中多取斑猫蟲內苦酒中半日許出暴乾使十取六七枚著銅器中微火上遥熬令熟擣作屑

巴豆一粒去皮熬之又拔取黃犬背上毛二七枚亦熬作屑好朱以錢五分七都合和以苦酒頓服之蟲當盡出若一服未効先時可預作三兩劑後日服遠不過三兩劑 通按朱一作末

又方

虎劉根 杜衡 枳根 酸棗根各一把 斑猫一枚 去頭足翅熬 一方云三 猬劉根各一把

右六味擣蜜丸日一服如棗一枚以小丸著瘡中

又方

若先著下部邊或上出耳後頸項諸處者苦參切五

通按膿作食

升以苦酒一斗漬三四日宜服一升亦加之但多作以知爲度不過三四度必差

又療瘻方

柳木皮長一尺闊六寸去黑皮細切以水一斗煮取五升去滓內白糖十挺煎取一升分三服以銅器接吐出看視之

又方

新生兒矢一百日以來皆收置蜜器中五十六十日取塗瘡孔中

又方

鯉魚腸切作五段火上炙之洗瘡拭乾以腸封之冷即易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差

崔氏療瘻方

槲白皮 切取五升

右一味以水八升煮令泣泣絞去滓重煎令成膏日服半棗漸加至一棗許亦著瘡上無忌患瘡唯宜煮飯直着鹽醬又不得多食之 出第五卷中

備急療瘻生肉膏方

楝白皮二兩 鼠肉二兩 薤白三兩 當歸四兩 生地黃五兩

右五味以臘月豬膏三升煎薤白黃色膏成傅瘰癧上
令生肉 肘後文仲同
又葛氏若著口裏方
櫸木東引根切
右一味水煮取濃汁含之數吐勿咽 肘後同並出第五卷中
備急療瘰癧方
取葶藶子擣細羅取好白蜜和丸每欲着藥先溫泔
洗瘡孔中以丸內之若瘥以物遮閉日三度亦痛
是瘥候勿停藥大効 出第五卷中
必効療諸瘻方

先以泔清溫洗以綿拭之取葵葉微火煖貼之引膿
不過三二百葉膿盡出即肉生王丞頻用大奇効
腋臭方三十七首
病源人腋下臭如葱豉之氣者亦言如狐狸之氣者故謂
之狐臭此皆血氣不和蘊積故氣臭 出第三十一卷中
肘後療人體及腋下狀如狐狁氣世謂之胡臭方
炊飯及熱丸以拭腋下臭仍與犬食之七日一如
此即瘥 文仲備急同
又方
煮雞子兩枚熟去殼及熱各內腋下冷棄之三路口
勿反顧三爲之 文仲備急並同
又方
燒好礬石末絹囊盛之常以粉腋下不過十度 小品文仲備急同
又方
青木香二兩 附子一兩 礬石半兩燒 白灰一兩半
右四味細末著粉腋下汗出因以粉之亦差
又方
青木香一斤 石灰半斤熬
右二味常以粉身亦差並擣末傅之

又方
乾薑 胡粉 白灰等分
右三味合作末粉之 范汪同並出第五卷中
千金療胡臭漏腋有天生胡臭有爲人所染臭者天生者
難療爲人所染者易差然須三年傅白礬散勿止并服五
香丸乃可得差勿言一度傅藥即差止可傅藥時暫得一
度差耳凡胡臭人通忌食芸薹五辛療之終身不差胡臭
方
辛夷 芎藭 細辛 杜蘅
藁本各三分

右五味㕮咀以苦酒漬之一宿煎三日取汁傅之以差
爲度 小品集驗范汪同

五香丸主口臭及身臭止煩痛散血氣方

豆蔻子　丁香　藿香　白芷
青木香　當歸　桂心各一兩　零陵香一兩
甘松香二分　香附子二兩　檳榔二枚

右十一味擣下篩蜜丸如大豆日三夜一服含之咽津五日內口香十日身香二七日衣被香三七日下風人聞香四七日靜洗手水落地香五七日把他人手亦香禁五辛下氣去臭第一 出第六卷中

又石灰散主胡臭方

青木香　楓香　丁香　薰陸香各二兩
陽起石　橘皮各三兩　礬石熬四兩　石灰一升

右八味擣下篩以綿作袋子麤如四指長四寸展取藥著上即以綿囊盛之繫著腋先以布拭腋令熱然後夾之

又方

水銀胡粉面脂研和傅之大驗 救急同

又方

辛夷　細辛　芎藭　青木香

右四味等分擣下篩作散重卑敷之

又方

伏龍肝作泥傅之良

又方

牛脂和胡粉三合煎令可丸塗腋下一宿即愈薄者

又方

三年苦酒和石灰傅之

又方

赤銅屑以酢和銀器中炒極熱以布裹熨腋下冷復易差止

又方

附子炮　石灰熬　青木香一兩　礬石三分燒
米粉一升

右五味擣篩常粉之

又方

馬齒草一束

右一味擣碎以蜜和作團以紙裹之以泥紙厚半寸暴乾以火燒熟破取更以少許蜜和使熱勿令冷先以生布揩之夾藥腋下痛久忍不能得然後以手巾勒兩臂差 出第二十五卷中

崔氏療胡臭有効方
先用泔清淨洗又用清酢漿水淨洗訖微揩使破取
銅屑和醋酢熱揩之不過三四度差
又方
胡粉　銅青
右二味等分研以人乳和塗腋下若成瘡且停瘡差即
塗以差爲度 出第四卷中
張文仲療胡臭若股內陰下常汗濕且臭或作瘡者方
但以胡粉一物粉之即差常用大驗 備急同
又隱居効驗胡臭方

雞舌香　藿香　青木香　胡粉各二兩
右四味擣散作粉綿裹內腋下常傳即差 備急同出第七卷
救急療腋臭方
銅屑一斤　石灰三升熬
右二味合和囊盛粉之有汗便粉之
又方
甘草炙　松根白皮　甘瓜子　大棗各等分
右四味爲散食後服方寸匕日三 出第三卷中
又方
雞矢　白礬石熬令汁盡　黃礬熬　附子炮

木蘭皮　青木香各一六兩
右六味擣爲散粉之又石龍衣一大兩蛇蛻皮是也以
子日夜半燒爲灰服之
又方
常以鹽綠和醋酢塗之一遍一年停塗永除以胡粉
和水銀和令相入塗腋下十日以來無氣 出第八卷
又方
黃礬細研　浮萍各二兩　雄黃一兩
右四味擣下篩爲散先以泔清洗腋拔去毛令血出以
粉腋下 出第九卷中

必効療腋臭方
好硇砂三兩　好白礬熬　密陀僧各二兩　醋酢二兩
胡粉二分　金屑八分　鉛錫　生銅屑各二分
右八味並研令細醋一升新銅器中盛藥密封其口二
七日看上有綠色纔然其藥即成還須研令極細至
用時若乾更以好醋和藥以塗病處若有毛先拔去以
石灰水淨洗拭使乾以生布揩令微赤可作瘡一日一
塗先遍不過十日即待腋瘡差訖更取銅屑細研成粉
粉病處日五六即止病差終身不得帶麝香食胡荽
又方

取五月五日承露百草陰乾火燒爲灰用汁和
灰爲團重火鍊如鏵灰色鍊訖即以釅酢和爲餅厚
如掌大小徑二寸以灸即於兩腋下挾卽易灸所一
身速頭旋悶二日後若病不去復著菜微發亦不甚
臭還依法療之永斷

又金錯屑塗法

金錯屑一兩　銀錯屑一兩　赤銅屑　香附子

胡粉　鐵錯屑各一兩　三年醋三升

右七味以下醋一升於銅器中煮得二沸以用塗之

又方

一年醋醡一斤　碎銅一斤　鹽半合　灰二合

右四味浸藥攪藥色青卽塗腋下日三四塗三日小愈
月全差

又方

大銅錢二七文　烏梅二七　鹽一升

右三味以五月五日水一升共置坛子裹挂戶上百日
畢可取用塗不得婦人爲塗藥食枯食稀發

又方

以酢五合內銅器中以錢十四文胡粉五銖瓦中泥
頭七日後以粉十銖和之訖去腋下毛日兩傅之合

藥勿令人見秘之

又方

以首子男兒乳汁浸鹽研銅青拔去毛使血出塗差

又方

釅醋浸青木香置腋下夾之卽愈

又方

錢三七文　胡粉二兩　馬齒草乾者二兩　青木香一兩

大酢半升

右五味切先以醋漬錢五六日然後總漬諸藥一起煮
五六沸置磁器中先以石灰汁洗病處拭乾訖塗之以

差爲度並出第三卷中

古今錄驗療胡臭青羊脂粉方

胡粉　銅青等分

右二味先以鹽湯洗兩腋下及著藥且淋洗又以青羊
脂和傅數日差

又錢汁傅方

錢二七文

右以礦石磨令平以夾腋下神良范汪同並出第二十卷中

漏腋方三首

病源腋下常濕仍臭生瘡謂之漏腋此亦是氣血不和爲

風邪所搏津液蘊瘀故令濕臭 出第三十一卷中

集驗療漏腋腋下及足心手掌陰下股裏常如汗濕致臭六物胡粉傳方

乾枸杞根 半兩 胡粉 一兩 乾商陸根 一兩 滑石 一兩

乾薔薇根 半兩 甘草 炙半兩

右藥擣下篩以苦酒和塗腋下當微汗出易衣復塗著藥不過三傳便愈或更發復塗之不可多傳傷人腋餘處亦塗之 小品文仲備急范汪同出第九卷中

經心錄漏腋方

正朝旦以小便洗 文仲備急集驗小品范汪千金同

又方

擣馬齒草腋下夾之令燥後復易之先用雄黃石灰等分合水煎一兩沸如泥泥之毛落然後塗諸藥良 並出第五卷中

七孔臭氣方三首

千金療面目口齒七孔臭方

沉香 五兩 甘草 炙二兩 白瓜瓣 半升 芎藭 二兩

丁香 五兩 藁本 二兩 麝香 二兩 當歸 二兩

右八味擣下篩蜜丸食後含如小豆五粒日三秘不傳久服令人舉體皆香 救急同出第六卷中

救急療人七孔臭氣方

甘草 炙五分 芎藭 四分 白芷 三分

右三味作散下篩食後飲服方寸匕日三

又方

瓜子人 一分 芎藭 藁本 當歸

杜蘅 各一兩 細辛 二分 防風 一分

右七味擣下篩食後溫水服方寸匕日三

令人體香方四首

肘後令人體香方

白芷 薰草 杜若 杜蘅

藁本 等分

右五味末之蜜和旦服如梧子三丸暮服四丸三十日足下悉香 文仲備急范汪同

又方

甘草 炙 瓜子 大棗 一 松根皮 等分

右四味擣下篩食後服方寸匕日三二十日覺効五十日身體並香百日衣服床幃悉香 文仲備急范汪千金同

又方

瓜子人 芎藭 藁本 當歸

杜蘅 細辛 各二分 白芷 桂心 各五分

甘草二分炙

右九味擣下篩食後服方寸匕日三五日口香二十日

肉香 文仲備急同出第五卷中

千金療諸身體臭方

竹葉十兩 桃白皮四兩

右二味以水四石二斗煮取五斗浴即香出第六卷中

雜療汗出不止方一十首

集驗療止汗粉藥方

牡蠣二兩熬 附子半兩炮 麻黃根二兩

右三味擣篩以白粉一升和合粉汗汗止忌猪肉

又汗後遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸

桂枝加附子湯方

大棗十二枚擘 附子一枚炮 桂心三兩 芍藥三兩

生薑三兩 甘草二兩炙

右六味切以水七升煮取三升溫服一升延年同此本張仲景傷寒論方

千金止汗方

青松葉一斤

右一味擣令汁出清酒一升漬二宿近火一宿初服半升漸至一升頭面汗即止出第八卷中

延年澤瀉湯療大虛煩躁止汗治氣方

澤瀉 茯苓各二兩 牡蠣熬 白朮各一兩

生薑半升

右五味切以水八升煮取二升分服一升日再服

又都梁散療汗出如水及汗出衄血吐血小便血殆死方

都梁香二兩 紫菀 人參 青竹茹

蓯蓉各一兩 乾地黃二兩熬令燥

右六味擣下篩水服方寸匕不効須臾再服忌蕪荑

又療大病之後虛汗不可止方

杜仲 牡蠣熬等分

右二味擣下篩向暮臥以水服一錢匕午前汗止者不再服服之令人乾燥若汗不止者復服一錢不過再必愈有驗天行及百病後虛吸漏汗遂溫之無不止者

又療大病後虛汗出不禁者方

粢粉 豉等分熬炒 故竹扇如手掌大燒取灰

右三味合擣以絹囊盛粉體立止最驗當先熬末粉之

千金並同

又粉散療大病後身體虛腫汗出止汗方

麻黃根三兩 防風 乾薑 細辛各二兩

白歛一兩

右五味合下篩以粢粉五升熬令黄合和以粉身出第十一卷中

古今錄驗療汗出不止朮桂散方

麻黄　桂心各五分　白朮　附子炮

菖蒲各三分

右五味擣末酒服方寸匕日三未食服

又止汗熱雷丸散方

雷丸　桂心　牡蠣各五分熬

右三味擣下篩粉身日三出第二十六卷中

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元較正

外臺秘要　二十三卷　辛　經餘居

右從事郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事趙子孟較勘

新刊唐王燾先生外臺秘要方第二十三卷終